

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

N° W21-725423

MR.PPV

135496

☒ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 3216 Société : Retraite
☐ Actif ☐ Pensionné ☒ Autre : Retraite
 Nom & Prénom : Fatima HACHEAOUI
 Date de naissance : 15 Juin 1961
 Adresse : Des. du BAHA - Rue de TOUMALD
 Im. N° 11 - Casablanca
 Tél. : 06 61 886728

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin : [Cachet du médecin]
 Date de consultation : 03/08/2022
 Nom et prénom du malade : Fatima HACHEAOUI
 Lien de parenté : ☒ Lui-même ☐ Conjoint
 Nature de la maladie : DT2
 En cas d'accident préciser les causes et circonstances :
 Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : / /

Signature de l'adhérent(e) : /

Autorisation CNDP N° : A-A-215/2019



RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
03/08/22	8		300,00	INPE 091201335

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE MILAD Dr. Samir Milad 283, Bd. El Moudjahid Hay Salem - C.T. Tél: 0522.94.65.30 - CASABLANCA	31/8/22	298,40

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
Dr. Jamal PEX KSK Radio-Logique Tél: 0522.94.65.30	25/07/22	B570	770,00

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

VOLET ADHERENT



* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP : <input type="text"/>												
				COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/> MONTANTS DES SOINS <input type="text"/> DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/> FIN D'EXECUTION <input type="text"/>												
O.D.F. PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE <table border="1"> <tr> <td>H</td> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> </table>			H	25533412	21433552	D	00000000	00000000	G	00000000	00000000	B	35533411	11433553	
H	25533412	21433552														
D	00000000	00000000														
G	00000000	00000000														
B	35533411	11433553														
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/> MONTANTS DES SOINS <input type="text"/> DATE DU DEVIS <input type="text"/> DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>												

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Kanza BENOMAR

Spécialiste en Endocrinologie Diabétologie
Nutrition et Maladies Métaboliques

Lauréate de la Faculté de Médecine de LILLE en France
Ancienne Chef de Clinique au CHU de LILLE
Diplômée en Thyroïdologie
Diplômée en Echographie Thyroïdienne et Cytoponction
Diplômée en Obésité et Nutrition
Pose de pompes à insuline

Ex.Enseignante à la faculté de Médecine de LILLE - France



دكتورة كنزة بنعمر

اختصاصية في أمراض الغدد و السكري
و التغذية و أمراض الأيض

خريجة كلية الطب بجامعة ليل بفرنسا
رئيسة سابقة بالمستشفى الجامعي بليل
دبلوم جامعي في علاج الغدة الدرقية و الفحص بالصدى
دبلوم جامعي في علاج السمنة و التغذية
و تركيب مضخة الأنسولين

و أستاذة سابقا بكلية الطب بجامعة ليل بفرنسا

Casablanca le 02/08/2012

J. HARARI
Phila

18,00 x 6

- Dafaver

6,80 x 3

- Levothyrox 25mg

96,00 x 1

74,00 x 1 ALLVIT

298,40

PHARMACIE MILAD
Dr. Samira MILAD
283, Bd. Sidi Abderrahmane
Hay Salam - CIL
Tél: 0522.94 65 30-CASABLANCA

2 gélul / J

1 gélul / J

1 cp / J

Levothyrox® 25 µg,
Comprimés sécables B/30
PPV: 6,80 DH

Levothyrox® 25 µg,
Comprimés sécables B/30
PPV: 6,80 DH

300

83 Angle Bd ABDELMOUMEN et Rue SOUMAYA - Résidence SHEHRAZADE - 1er étage

83 ملتقي شارع عبد المومن زنقة سمية - إقامة شهرزاد - الطابق الأول

Tél : + 212 (0) 5 22 23 79 52 / + 212 (0) 6 29 45 90 17

E-mail : kanzzamed@hotmail.com - Site Web : cedmmn.ma

LEVOTHYROX[®] comprimé sécable

Lévothyroxine sodique, Voie orale

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que LEVOTHYROX, comprimé sécable et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LEVOTHYROX, comprimé sécable ?

L'association de Lévothyrox à des antithyroïdiens dans le traitement de l'hyperthyroïdie n'est pas indiquée au cours de la grossesse. En effet, Lévothyrox passe très peu la barrière placentaire, alors que les antithyroïdiens passent facilement celle-ci. Il en résulterait un risque d'hypothyroïdie chez le fœtus.

L'allaitement est possible pendant le traitement.

MINE

.850.00 mg

Antidiabétiques oraux - biguanides.

06/13

61180001041276

Diaformine® 850 mg
Metformine

Diaformine® 850 mg
Metformine

Pour certains examens radiologiques avec produits de contraste iodés, votre médecin vous demandera d'interrompre ce médicament avant ou au moment de cet examen et de ne le reprendre que 48 heures après l'examen, après s'être assuré de la normalité de la fonction rénale.



DIAFORMINE® 850 mg

metformine

COMPOSITION

Chlorhydrate de metformine850,00 mg

Excipient : q. s. pour un comprimé.

FORME PHARMACEUTIQUE


Comprimés pelliculés en boîte de 30.

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Antidiabétiques oraux - biguanides.

100136
06/13

6 118000 041276



Diatformine® 850 mg
Metformine
30 comprimés pelliculés

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Votre médecin pourra vérifier votre fonction rénale par un dosage de la créatinine dans le sang. Celle-ci doit être satisfaisante car l'élimination de ce médicament se fait en grande partie par les reins. Vous devez faire appel à votre médecin pour tout traitement associé et toute maladie infectieuse ou virale: grippe, infection broncho-pulmonaire, infection urinaire.

La survenue de certaines maladies ou la prise de certains médicaments (corticoïdes et certains diurétiques, ritodrine, salbutamol et terbutaline, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion) peuvent déséquilibrer plus ou moins gravement le diabète et nécessiter un recours transitoire à l'insuline.

En cas d'hospitalisation pour examens, pour une intervention chirurgicale ou pour une complication comme une maladie cardiaque, informez le médecin que vous prenez ce médicament.

Pour certains examens radiologiques avec produits de contraste iodés, votre médecin vous demandera d'interrompre ce médicament avant ou au moment de cet examen et de ne le reprendre que 48 heures après l'examen, après s'être assuré de la normalité de la fonction rénale.

Ce médicament est un antidiabétique oral destiné à être prescrit chez les patients diabétiques traités par

individuellement par votre médecin en fonction des besoins. En moyenne, la posologie usuelle est de 1 comprimé 2

fois par jour, avant ou à la fin des repas: par exemple, 1 comprimé avant le repas. La posologie est de 2 comprimés par jour.

Il est recommandé de ne pas interrompre le traitement sans avis médical, sauf interruption sauf recommandation particulière du

médecin. L'arrêt du traitement doit être fait à l'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

NE SAUTER JAMAIS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- Insuffisance rénale ou à l'un des constituants du produit,

- Insuffisance hépatique ou insuffisance modérée (défaillance des reins avec augmentation

de l'azotémie), infection broncho-pulmonaire, infection urinaire, chirurgicale ou un examen radiologique utilisant des

produits de contraste iodés, insuffisance respiratoire,

- Insuffisance du foie),

- Insuffisance

- Insuffisance

- Insuffisance rénale, maux de tête, vertiges, étourdissements, de douleurs abdominales accompagnées de

sensation de grande fatigue peut être le signe d'un

trouble du métabolisme. Ne prenez pas votre médicament avant sa visite.



DIAFORMINE® 850 mg

metformine

COMPOSITION

Chlorhydrate de metformine850,00 mg

Excipient : q. s. pour un comprimé.

FORME PHARMACEUTIQUE


Comprimés pelliculés en boîte de 30.

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Antidiabétiques oraux - biguanides.

100136
06/13

6 118000 041276



Diatformine® 850 mg
Metformine
30 comprimés pelliculés

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Votre médecin pourra vérifier votre fonction rénale par un dosage de la créatinine dans le sang. Celle-ci doit être satisfaisante car l'élimination de ce médicament se fait en grande partie par les reins. Vous devez faire appel à votre médecin pour tout traitement associé et toute maladie infectieuse ou virale: grippe, infection broncho-pulmonaire, infection urinaire.

La survenue de certaines maladies ou la prise de certains médicaments (corticoïdes et certains diurétiques, ritodrine, salbutamol et terbutaline, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion) peuvent déséquilibrer plus ou moins gravement le diabète et nécessiter un recours transitoire à l'insuline.

En cas d'hospitalisation pour examens, pour une intervention chirurgicale ou pour une complication comme une maladie cardiaque, informez le médecin que vous prenez ce médicament.

Pour certains examens radiologiques avec produits de contraste iodés, votre médecin vous demandera d'interrompre ce médicament avant ou au moment de cet examen et de ne le reprendre que 48 heures après l'examen, après s'être assuré de la normalité de la fonction rénale.

Le médicament est un antidiabétique oral destiné au patient qui doit être prescrit chez les patients diabétiques traités par

Le médicament doit être prescrit individuellement par votre médecin en fonction des caractéristiques de votre maladie. La posologie usuelle est de 1 comprimé 2

Le médicament doit être pris avant ou à la fin des repas: par exemple, 1 comprimé avant le repas. La posologie est de 2 comprimés par jour.

Le médicament doit être interrompu sauf recommandation particulière du médecin.

Le médicament doit être pris SELON L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

Le médicament NE DOIT JAMAIS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

Le médicament ne doit pas être utilisé en cas de maladie du foie ou à l'un des constituants du produit,

Le médicament ne doit pas être utilisé en cas de maladie rénale modérée (défaillance des reins avec augmentation

Le médicament ne doit pas être utilisé en cas d'infection broncho-pulmonaire, infection urinaire, infection chirurgicale ou un examen radiologique utilisant des

Le médicament ne doit pas être utilisé en cas de maladie respiratoire,

Le médicament ne doit pas être utilisé en cas de maladie du foie,

Le médicament ne doit pas être utilisé en cas de diabète,

Le médicament ne doit pas être utilisé en cas de maladies

Le médicament ne doit pas être utilisé en cas de douleurs abdominales accompagnées de nausées, de vomissements ou de sensation de grande fatigue peut être le signe d'un

Le médicament ne doit pas être utilisé avant votre visite.



DIAFORMINE® 850 mg

metformine

COMPOSITION

Chlorhydrate de metformine850,00 mg

Excipient : q. s. pour un comprimé.

FORME PHARMACEUTIQUE


Comprimés pelliculés en boîte de 30.

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Antidiabétiques oraux - biguanides.

100136
06/13

6 118000 041276



30 comprimés pelliculés
Diaformine® 850 mg
Metformine

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Votre médecin pourra vérifier votre fonction rénale par un dosage de la créatinine dans le sang. Celle-ci doit être satisfaisante car l'élimination de ce médicament se fait en grande partie par les reins. Vous devez faire appel à votre médecin pour tout traitement associé et toute maladie infectieuse ou virale: grippe, infection broncho-pulmonaire, infection urinaire.

La survenue de certaines maladies ou la prise de certains médicaments (corticoïdes et certains diurétiques, ritodrine, salbutamol et terbutaline, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion) peuvent déséquilibrer plus ou moins gravement le diabète et nécessiter un recours transitoire à l'insuline.

En cas d'hospitalisation pour examens, pour une intervention chirurgicale ou pour une complication comme une maladie cardiaque, informez le médecin que vous prenez ce médicament.

Pour certains examens radiologiques avec produits de contraste iodés, votre médecin vous demandera d'interrompre ce médicament avant ou au moment de cet examen et de ne le reprendre que 48 heures après l'examen, après s'être assuré de la normalité de la fonction rénale.



Le médicament est un antidiabétique oral destiné à être prescrit chez les patients diabétiques traités par

individuellement par votre médecin en fonction des besoins. En moyenne, la posologie usuelle est de 1 comprimé 2

fois par jour, avant ou à la fin des repas: par exemple, 1 comprimé avant le repas. La posologie est de 2 comprimés par jour.

En cas d'interruption sauf recommandation particulière du médecin.

NE PAS PRENDRE DE MÉDICAMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

NE PAS FAIRE D'EXERCICE PHYSIQUE MAIS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

avant ou à l'un des constituants du produit,

une insuffisance rénale modérée (défaillance des reins avec augmentation

de l'azotémie), infection broncho-pulmonaire, infection urinaire), après une intervention chirurgicale ou un examen radiologique utilisant des

produisant une insuffisance respiratoire,

une insuffisance du foie),

des ulcères,

des infections fongiques,

des maux de tête, des étourdissements, de douleurs abdominales accompagnées de nausées, une sensation de grande fatigue peut être le signe d'un

de votre médicament avant sa visite.

DIAFORMINE® 850 mg

metformine

COMPOSITION

Chlorhydrate de metformine850,00 mg

Excipient : q. s. pour un comprimé.

FORME PHARMACEUTIQUE


Comprimés pelliculés en boîte de 30.

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Antidiabétiques oraux - biguanides.

100136
06/13

6 118000 041276



Diatformine® 850 mg
Metformine
30 comprimés pelliculés

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Votre médecin pourra vérifier votre fonction rénale par un dosage de la créatinine dans le sang. Celle-ci doit être satisfaisante car l'élimination de ce médicament se fait en grande partie par les reins. Vous devez faire appel à votre médecin pour tout traitement associé et toute maladie infectieuse ou virale: grippe, infection broncho-pulmonaire, infection urinaire.

La survenue de certaines maladies ou la prise de certains médicaments (corticoïdes et certains diurétiques, ritodrine, salbutamol et terbutaline, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion) peuvent déséquilibrer plus ou moins gravement le diabète et nécessiter un recours transitoire à l'insuline.

En cas d'hospitalisation pour examens, pour une intervention chirurgicale ou pour une complication comme une maladie cardiaque, informez le médecin que vous prenez ce médicament.

Pour certains examens radiologiques avec produits de contraste iodés, votre médecin vous demandera d'interrompre ce médicament avant ou au moment de cet examen et de ne le reprendre que 48 heures après l'examen, après s'être assuré de la normalité de la fonction rénale.

Ce médicament est un antidiabétique oral destiné à être prescrit chez les patients diabétiques traités par

individuellement par votre médecin en fonction des besoins. En moyenne, la posologie usuelle est de 1 comprimé 2

fois par jour, avant ou à la fin des repas: par exemple, 1 comprimé avant le repas. La posologie est de 2 comprimés par jour.

Il est recommandé de ne pas interrompre le traitement sans avis médical, sauf interruption sauf recommandation particulière du

MEDECIN.

NE PAS MAIS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- insuffisance rénale ou à l'un des constituants du produit,

- insuffisance modérée (défaillance des reins avec augmentation

de l'azotémie), infection broncho-pulmonaire, infection urinaire), intervention chirurgicale ou un examen radiologique utilisant des

produits de contraste iodés, insuffisance respiratoire,

- insuffisance du foie),

- diabète,

- alcoolisées,

- douleurs abdominales accompagnées de nausées, sensation de grande fatigue peut être le signe d'un

problème de votre médicament avant sa visite.



DIAFORMINE® 850 mg

metformine

COMPOSITION

Chlorhydrate de metformine850,00 mg

Excipient : q. s. pour un comprimé.

FORME PHARMACEUTIQUE


Comprimés pelliculés en boîte de 30.

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Antidiabétiques oraux - biguanides.

100136
06/13

6 118000 041276



Diaformine® 850 mg
Metformine
30 comprimés pelliculés



PRECAUTIONS D'EMPLOI

Votre médecin pourra vérifier votre fonction rénale par un dosage de la créatinine dans le sang. Celle-ci doit être satisfaisante car l'élimination de ce médicament se fait en grande partie par les reins. Vous devez faire appel à votre médecin pour tout traitement associé et toute maladie infectieuse ou virale: grippe, infection broncho-pulmonaire, infection urinaire.

La survenue de certaines maladies ou la prise de certains médicaments (corticoïdes et certains diurétiques, ritodrine, salbutamol et terbutaline, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion) peuvent déséquilibrer plus ou moins gravement le diabète et nécessiter un recours transitoire à l'insuline.

En cas d'hospitalisation pour examens, pour une intervention chirurgicale ou pour une complication comme une maladie cardiaque, informez le médecin que vous prenez ce médicament.

Pour certains examens radiologiques avec produits de contraste iodés, votre médecin vous demandera d'interrompre ce médicament avant ou au moment de cet examen et de ne le reprendre que 48 heures après l'examen, après s'être assuré de la normalité de la fonction rénale.

Ce médicament est un antidiabétique oral destiné à être prescrit chez les patients diabétiques traités par

individuellement par votre médecin en fonction des besoins. En moyenne, la posologie usuelle est de 1 comprimé 2

fois par jour, avant ou à la fin des repas: par exemple, 1 comprimé avant le repas. La posologie est de 2 comprimés par jour.

Il est recommandé de ne pas interrompre le traitement sans avis médical, sauf interruption sauf recommandation particulière du

MEDECIN.

NE PAS MAIS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- insuffisance rénale ou à l'un des constituants du produit,

- insuffisance modérée (défaillance des reins avec augmentation

de l'azotémie), infection broncho-pulmonaire, infection urinaire), intervention chirurgicale ou un examen radiologique utilisant des

radiation ionisante (insuffisance respiratoire,

insuffisance du foie),

hypertension artérielle,

maladies alcoolisées,

insuffisance cardiaque, maux de tête, vertiges, étourdissements, de douleurs abdominales accompagnées de nausées, sensation de grande fatigue peut être le signe d'un

effet indésirable de votre médicament avant sa visite.



ALLVIT®

Ginseng + 12 Vitamines, 6 oligo-éléments

Description :

Complexe dynamisant, Stimulant et fortifiant à base de vitamines, minéraux, oligo-éléments et ginseng.

ALLVIT est spécialement formulé pour donner à l'organisme de l'énergie, vigueur et vitalité en cas de fatigue physique, intellectuelle et sexuelle.

Le ginseng stimulant naturel contribue à améliorer les performances et la résistance de l'organisme. Aide à renforcer le système immunitaire et accroît les capacités de concentration.

Ingrédients :

Glycérophosphate de magnésium, Agent d'enrobage : gélatine, vitamine C, Extrait de racine de ginseng, support : maltodextrine, agent de charge : amidon de maïs, hydrolysate de protéines de riz et sulfate de zinc, oxyde de magnésium, hydrolysate de protéines de riz et sulfate de cuivre, hydrolysate de protéines de riz et sulfate de manganèse, antiagglomérants : sels de magnésium d'acides gras, dioxyde de silicium, niance, vitamine E, vitamine A, supports : gomme d'arabique, sucre, amidon, DL-alpha-tocophérol, phosphate tricalcique, acide pantothénique, hydrolysate de protéines de riz et sélénite de sodium, vitamine B12, support : maltodextrine, hydrolysate de protéines de riz et chlorure de chrome, vitamine D, support : triglycérides chaîne moyenne, amidon de maïs, gomme arabique, sucre, vitamine B6, vitamine B1, vitamine B2, Folate et Biotine.

Forme et Présentations :

Gélule.

Boîte de 30 et boîte 20 gélules.

Conseils d'utilisation

Prendre 1 à 2 gélules p

Il est conseillé de suivre

souvent que nécessaire

Recommandé :

Adultes et adolescents

Recommandé également

psychique et sexuelle

Précautions d'emploi

A éviter chez la femme

N° CE : DA20191406324DMP/20UCA/MAV3

P.P.C : 96 DH

Lot : 22CP9

Exp : 05/2025

Fabriqué en France par
PileJe INDUSTRIE

Distribué par TOP PHARMA
233, ZI Sud-Ouest, 28800
Mohammédia, Maroc



Fabriqué en FRANCE

Titulaire TOP PHARMA

75, LOT. La Gare 20800 Mohammédia





75, LOT, La Gare 20800 Mohammédia

Titulaire TOP PHARMA

Fabriquée en FRANCE

Précautions d'emploi :
A éviter chez la femme enceinte ou allaitante et chez l'enfant de moins de 12 ans.

Recommandé :
Adultes et adolescents, séniors, sujets diabétiques, personnes convalescentes.
Recommandé également en cas de ménopause, de fatigue physique, psychique et sexuelle.
souvent que nécessaire.

Conseils d'utilisation:
Prendre 1 à 2 gélules par jour avec un grand verre d'eau de préférence le matin.
Il est conseillé de suivre un programme d'au moins un mois et de renouveler aussi

Forme et Présentations :
Gélule.
Boîte de 30 et boîte 20 gélules.

Ingédients :
Glycérophosphate de magnésium, Agent d'enrobage : gélatine, vitamine C, Extrait de racine de ginseng, support : maltodextrine, agent de charge : amidon de maïs, hydrolysat de protéines de riz et sulfate de zinc, oxyde de magnésium, hydrolysat de protéines de riz et sulfate de cuivre, hydrolysat de protéines de riz et sulfate de silicium, manganèse, antiagglomérants : sels de magnésium d'acides gras, dioxyde de silicium, niance, vitamine E, vitamine A, supports : gomme d'arabique, sucrose, amidon, DL-alpha-tocophérol, phosphate tricalcique, acide pantothénique, hydrolysat de protéines de riz et sélénite de sodium, vitamine B12, support : maltodextrine, hydrolysat de protéines de riz et chlorure de chrome, vitamine D, support : triglycérides chaîne moyenne, amidon de maïs, gomme arabique, sucrose, vitamine B6, vitamine B1, vitamine B2, Folate et Biotine.

ALLVIT est spécialement formulé pour donner à l'organisme de l'énergie, vigueur et vitalité en cas de fatigue physique, intellectuelle et sexuelle.
Le ginseng stimulant naturel contribue à améliorer les performances et la résistance de l'organisme. Aide à renforcer le système immunitaire et accroît les capacités de concentration.

minéraux,

N° C.E. : DA20191406320IMP/20UCA/MAV3
P.P.C. : 74 DH

Lot :
Exp :

Fabriquée en France par
PiLeJe INDUSTRIE

Distribué par TOP PHARMA
233, ZI Sud-Ouest, 28800
Mohammédia, Maroc



Docteur Kanza BENOMAR

Spécialiste en Endocrinologie Diabétologie
Nutrition et Maladies Métaboliques

Lauréate de la Faculté de Médecine de LILLE en France
Ancienne Chef de Clinique au CHU de LILLE
Diplômée en Thyroïdologie
Diplômée en Echographie Thyroïdienne et Cytoponction
Diplômée en Obésité et Nutrition
Pose de pompes à insuline

Ex.Enseignante à la faculté de Médecine de LILLE - France



دكتورة كنزة بنعمر

اختصاصية في أمراض الغدد و السكري
و التغذية و أمراض الأيض

خريجة كلية الطب بجامعة ليل بفرنسا
رئيسة سابقة بالمستشفى الجامعي بليل
دبلوم جامعي في علاج الغدة الدرقية و الفحص بالصدى
دبلوم جامعي في علاج السمنة والتغذية
وتركيب مضخة الأنسولين

و أستاذة سابقا بكلية الطب بجامعة ليل بفرنسا

Casablanca le 07/07/2012

M^{re} HAFSA
FATMA

- TSH ,
- HBA_{1c} , GAT
- سكر صائم
- CR. HbA_{1c} , HbA_{1c} 666



Docteur Kanza BENOMAR
Spécialiste en Endocrinologie
Diabétologie
Maladies Métaboliques et Nutrition
Tél: 0522 23 79 52 - 0629 45 90 1

83 Angle Bd ABDELMOUMEN et Rue SOUMAYA - Résidence SHEHRAZADE - 1er étage

83 ملتقي شارع عبد المومن زنقة سمية - إقامة شهرزاد - الطابق الأول

Tél : + 212 (0) 5 22 23 79 52 / + 212 (0) 6 29 45 90 17

E-mail : kanzzamed@hotmail.com - Site Web : cedmmn.ma

Anoual

Laboratoire de Biologie médicale
Genétique moléculaire
Radio immuno-analyse
Diagnostic Prenatal
Biologie de la Reproduction



مختبر أنوال

Docteur Jamal FEKKAK
Radio-biologiste
Ancien Attaché des Hôpitaux de Paris
Diplômé de l'Université Paris VII
et de l'Institut Pasteur de Paris
Biologiste Qualiticien

FACTURE N° 2207250016

Mme Fatiha HAFRAOUI

Demande N° 2207250016

Date de l'examen : 25-07-2022

Analyses :

Récapitulatif des analyses			
CN	Analyse	Val	Clefs
PSAD	Prélèvement sang adulte	E25	E
	Cholestérol	B30	B
	Créatinine	B30	B
	HbA1c	B100	B
	Triglycérides	B50	B
	LDL Dosage direct	B50	B
	Urée	B30	B
	Glycémie à jeun	B30	B
	TSHus	B200	B
	Cholestérol HDL	B50	B


Total des B : 570

TOTAL DOSSIER : 770 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de : sept cent soixante-dix dirhams DH



**Il est Strictement Interdit de Changer les Noms,
Prénoms et les Dates des Analyses.**



Mme Fatiha HAFRAOUI

Né(e) le : 15-06-1961

Dossier N° : 2207250016

Date de l'examen : 25-07-2022

Prélevé le : 25-07-2022 09:03 en interne

Edité le : 14-10-2022

DR : Kanza BENOMAR

Adresse : 83 Angle Bd Abdelmoumen et Rue Soumaya
Résidence SHERAZADE-1er étage casablanca

Page 1 / 2



ACCREDITATION
N° 8-3245
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole [AC].


BIOCHIMIE SANGUINE

Glycémie à jeun [AC] (HK/G6PDH- Cobas 6000® Roche)	1.25 g/l 6.94 mmol/l	(0.74-1.09) (4.11-6.05)	20-04-2022 1.44
Urée [AC] (Urease/GLDH-Cobas 6000® - Roche)	0.26 g/l 4.33 mmol/l	(<0.50) (<8.33)	
Créatinine [AC] (Jaffé, tamponné, cinétique- Cobas 6000® Roche)	6.6 mg/l 58.4 µmol/l	(5.0-9.0) (44.3-79.7)	23-02-2022 5.9
Cholestérol total [AC] (Colorimétrique Enzymatique - Cobas 6000® Roche)	1.94 g/l 5.02 mmol/l	(<2.00) (<5.17)	23-02-2022 3.24
HDL-Cholestérol [AC] (Enzymatique Colorimétrique PAP - Cobas 6000® Roche)	0.54 g/l 1.40 mmol/l	(>0.65) (>1.68)	23-02-2022 0.56
LDL-Cholestérol (direct) [AC] (Dosage Colorimétrique Enzymatique-Cobas 6000® Roche)	1.18 g/L 3.05 mmol/L	(<1.55) (<4.01)	
Les valeurs suivantes représentent les taux chez l'adulte en terme de risque de maladie coronarienne : -Faible: <1.29 g/L (2.59 mmol/L) -Intermédiaire: 1.30 à 1.59g/L (3.35 à 4.12 mmol/L) -Elevé: 1.60 à 1.89 g/L (4.13 à 4.92 mmol/L) -Très élevé: >1.90 g/L (>4.92 mmol/L)			
Triglycérides [AC] (GPO/PAP - Cobas 6000® Roche)	1.77 g/l 2.00 mmol/l	(<1.50) (<1.70)	23-02-2022 2.80



Anoual

Laboratoire de Biologie medicale
Genetique moleculaire
Radio immuno-analyse
Diagnostic Prenatal
Biologie de la Reproduction



مختبر أنوال

Docteur Jamal FEKKAK

Radio-biologiste

Ancien Attaché des Hôpitaux de Paris

Diplômé de l'Université Paris VII

et de l'Institut Pasteur de Paris

Biologiste Qualiticien

Mme Fatiha HAFRAOUI

Né(e) le : 15-06-1961

Dossier N° : 2207250016

Date de l'examen : 25-07-2022

Prélevé le : 25-07-2022 09:03 en interne

Edité le : 14-10-2022

DR : Kanza BENOMAR

Adresse : 83 Angle Bd Abdelmoumen et Rue Soumaya

Résidence SHERAZADE-1er étage casablanca

Page 2 / 2

cofrac



ACCREDITATION
N° 8-3245
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole [AC].

20-04-2022


HBA1c [AC]

6.9 %

(4.0-6.0)

6.9

TOSOH (sang total EDTA))



BILAN THYROIDIEN

échantillon primaire : sérum

20-04-2022

TSHus [AC]

3.53 μ UI/ml

(0.27-4.20)

1.95

((Chimiluminescence - COBAS 6000® Roche))