

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



MUPRAS

Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

M22- 0027343

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 11189 Société :

Actif Pensionné(e) Autre :

Nom & Prénom : HAFID M. A. HMEID

Date de naissance :

Adresse :

Tél. : 06 50 77 16 36 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

R. Abdellah MAMOU
Neuro - psychiatre
38, Bd. Rachidi - Casablanca
Tel: 05 22 47 60 00 / 10

Date de consultation : 2/11/2021

Nom et prénom du malade : HAFID M. A. HMEID Age :

Lien de parenté : lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : trouble neuro psychiatrique

Affection longue durée ou chronique ALD ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
2/01/2022	C30h		400	<i>Dr. Abdellah MIMOUNI Neuro - Psychiatre 88, Bd Rachidi 10000 Tanger Tunisie 1097436 INP</i>

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
GSM. 06.01.2000 Etablissement ou Addresse du pharmacien	21/12/04	1230,00

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Cœfficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

[Création, remont, adjonction]

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

الدكتور عبد الله مامو Docteur Abdellah MAMOU

NEURO - PSYCHIATRE
D.U. D'Angers
en expertise médicale
Ex. attaché des Hôpitaux de Paris
Médecin Expert auprès des Tribunaux



الخصاصي في الأمراض العقلية و النفسانية
حائز من جامعة أنجى على دبلوم
الخبرة الطبية.
ملحق سابق بمستشفيات باريس
طبيب مخالف لدى المحاكم

الدار البيضاء في ٢١١٢٢ Casablanca, Le

T' HAFID M. Ahmed.

- Ipratropium bromide 25 mg -
1 amp = 1/2 mg
205,00 x 6

- Ipratropium bromide 30 mg -
1 amp = 1/2 mg

123,00





234 E. Lathrop Avenue - Casper, WY 82601
Nada's Sour Barn - Casper, WY 82601
GSM: 307-234-6678

Durée de Traitement 3 mois

R.D.V. le

E. Abdellah MAMOU
Neuro - Psychiatre
38, Bd. Rachidi - Casablanca
Tél. 05 22 47 60 00 / 10

PRISDAL®

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Elle contient des informations importantes sur votre traitement. Si vous avez d'autres questions, s'informez à votre médecin ou à votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit, donc il ne doit pas être donné à d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif. Gardez cette notice, vous pourrez la consulter à tout moment.

1. IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

PRISDAL®

DENOUMÉNATION

Rispéridone (DCI)

b) COMPOSITIONS QUALITATIVES ET QUANTITATIVES

Par comprimé pelliculé

EXCIPIENTS (communs): Cellulose microcristalline, amidon prégalactosé; Pélliculage: Opadry jaune (cp à 0,2 mg), Opadry blanc (cp à 1 mg), Opadry vert (cp à 0,5 et 3 mg).

c) FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimés pelliculés

d) PRÉSENTATIONS

Boîtes de 30

e) CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

2. DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT?

• Traitement de la schizophrénie.

• Traitement des épisodes maniaques modérés à sévères associés aux troubles bipolaires.

• Traitement de courte durée (jusqu'à 6 semaines) de l'hypersensibilité persistante chez les patients présentant une dementia d'Alzheimer modérée à sévère répondant aux approches non pharmacologiques et lorsqu'il existe un risque de préjudice pour le patient lui-même ou les autres.

• Traitement symptomatique de courte durée (jusqu'à 6 semaines) de l'hypersensibilité persistante dans le trouble des conduites chez les enfants à partir de 5 ans et les adolescents présentant un fonctionnement intellectuel inférieur à la moyenne ou un retard mental diagnostiqués conformément aux critères du DSM-IV, chez lesquels la sévérité des comportements agressifs ou d'autres comportements perniciueurs nécessitent un traitement pharmacologique.

Le traitement pharmacologique doit faire partie intégrante d'un programme de traitement plus large, incluant des mesures psychosociales et éducatives.

Il est recommandé que la rispéridone soit prescrite par un spécialiste en neurologie de l'enfant et en psychiatrie de l'enfant ou un médecin très familiarisé avec le traitement du trouble des conduites ou de l'adolescence.

3. ATTENTION!

3.1 DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT?

• Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants: Hyper-sensibilité connue à la rispéridone ou à l'un des autres comprimés.

3.2 MIS EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

a) UTILISATION MÉDICAMENT AVEC PRÉCAUTION:

• Il est recommandé aux prescripteurs d'évaluer les risques et les bénéfices de l'administration de PRISDAL chez les patients âgés et devenus en prenant en compte les facteurs de risque prédictifs de survenue d'accident vasculaire cérébral tels que faiblesse ou insensibilité soudaines au niveau du visage, des bras ou des jambes, troubles d'élocution de la vision, des céphalées ou insomnies nocturnes.

• Pourront favoriser la survenue d'une hypertension orthostatique temporaire par la résistance, d'où la nécessité d'une surveillance lors de l'instauration progressive du traitement.

• Ce médicament sera utilisé avec prudence chez les patients à risque cardiovasculaire connu (insuffisance cardiaque, infarctus du myocarde, hypertension, troubles du rythme cardiaque, antécédents familiaux d'allongement du segment QT).

• Évaluer le rapport bénéfice-risque lors de la prescription de PRISDAL chez les patients présentant une maladie de Parkinson ou une déférence à Corps de Lewy.

• Possibilité d'hypertonie ou d'aggravation du diabète sous traitement par les rispétides, d'où la nécessité d'une surveillance clinique chez les personnes diabétiques ainsi que chez celles présentant des facteurs de risque.

• PRISDAL doit être utilisé avec prudence chez les patients à antécédents d'hypertonie et chez ceux qui présentent des lumeurs partiellement protacine-dépendantes.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents cliniques pouvant potentiellement entraîner la mort. PRISDAL peut altérer la conscience physique (mœurs d'un traitement concordant avec l'activité anticholinergique ou d'antagonisme).

• Le prescripteur est tenu à causer physiques et sociaux d'arrêter le traitement.

• A cause des effets sédatifs d'apprentissage).

• Du fait des effets potentielle d'arrêter régulièrement les troubles de la montée, d'arrêter le traitement.

• Augmentation du risque d'arrêter régulièrement les troubles de la montée, d'arrêter le traitement.

• Evaluation régulière des troubles de la montée, d'arrêter le traitement.

• Antagonisme de l'effet d'antagonismes benzodiazépines.

• Effet hypnotique lors d'arrêter régulièrement le traitement.

• Diminution des concentrations d'antipsychotique actives d'arrêter régulièrement le traitement.

• Afin d'éviter d'entraîner les interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre pharmacien.

4. COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT?

a) POSOLOGIE USUELLE

• Schizophrénie:

Adulte: PRISDAL doit être administré en 1 ou 2 prises par jour. Débuter le traitement par 2 mg/jour de rispéridone. La posologie peut être augmentée à 4 mg/jour le 2^{ème} jour. La posologie sera ensuite maintenue inchangée, ou adaptée individuellement, si nécessaire. La majorité des patients bénéficient de posologies journalières comprises entre 4 et 8 mg. Chez certains patients, une titration lente et progressive des doses initiales et d'entreprises plus faibles peuvent s'avérer nécessaires.

Les posologies de 4 à 10 mg/jour n'ont pas montré d'efficacité supérieure aux posologies plus faibles et peuvent entraîner une augmentation de l'incidence des symptômes extrasympathiques. La sécurité d'emploi de posologies des symptômes extrasympathiques a été évaluée, et elles ne sont donc pas recommandées.

PRISDAL®

Rispéridone
3 mg

LOT 0104471
EXP 07/24
PPV 2050H00

30 comprimés pelliculés

Voie orale

PRISDAL®

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Elle contient des informations importantes sur votre traitement. Si vous avez d'autres questions, s'informez à votre médecin ou à votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit, donc il ne doit pas être donné à d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif. Gardez cette notice, vous pourrez la consulter à tout moment.

1. IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

PRISDAL®

DENOUMÉNATION

Rispéridone (DCI)

b) COMPOSITIONS QUALITATIVES ET QUANTITATIVES

Par comprimé pelliculé

EXCIPIENTS (communs): Cellulose microcristalline, amidon prégalactosé; Pélliculage: Ecapolane (jaune à 0,5 mg), Opadry blanc (cp à 1 mg), Opadry vert (cp à 0,5 à 3 mg).

c) FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimés pelliculés

d) PRÉSENTATIONS

Boîtes de 30

e) CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

2. DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT?

• Traitement de la schizophrénie.
• Traitement des épisodes maniaques modérés à sévères associés aux troubles bipolaires.

• Traitement de courte durée (jusqu'à 6 semaines) de l'hypersensibilité persistante chez les patients présentant une dementia d'Alzheimer modérée à sévère répondant aux approches non pharmacologiques et lorsqu'il existe un risque de préjudice pour le patient lui-même ou les autres.

• Traitement symptomatique de courte durée (jusqu'à 6 semaines) de l'hypersensibilité persistante dans le trouble des conduites chez les enfants à partir de 5 ans et les adolescents présentant un fonctionnement intellectuel inférieur à la moyenne ou un retard mental diagnostiqués conformément aux critères du DSM-IV, chez lesquels la sévérité des comportements agressifs ou d'autres comportements perniciueurs nécessitent un traitement pharmacologique.

Le traitement pharmacologique doit faire partie intégrante d'un programme de traitement plus large, incluant des mesures psychosociales et éducatives.

Il est recommandé que la rispéridone soit prescrite par un spécialiste en neurologie de l'enfant et en psychiatrie de l'enfant ou un médecin très familier du traitement du trouble des conduites ou de l'adolescent.

3. ATTENTION!

b) DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants:

b) MISE EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

UTILISATION MÉDICALISME AVEC PRÉCAUTION:

Il est recommandé aux prescripteurs d'évaluer les risques et les bénéfices de l'administration de PRISDAL chez les patients âgés et de prendre en compte les facteurs de risque prédictifs de survenue d'accident vasculaire cérébral tels que faiblesse ou insensibilité soudaines au niveau du visage, des bras ou des jambes, troubles d'élocution ou de la vision. Pourtant, comme les propriétés alpha-histoacétioniques de la rispéridone peuvent favoriser la survenue d'une hypertension orthostatique lors de l'instauration progressive du traitement.

Ce médicament sera utilisé avec prudence chez les patients à risque cardiovasculaire connu (insuffisance cardiaque,

infarctus du myocarde, hypertension, troubles du rythme cardiaque, antécédents familiaux d'allongement de la segment OT).

Évaluer le rapport bénéfice-risque lors de la prescription de PRISDAL chez les patients présentant une maladie de Parkinson ou une déférence à Corps de Lewy. Possibilité d'hypertonie et d'aggravation du diabète lorsque le traitement par la rispéridone, d'où la nécessité d'une surveillance clinique chez les personnes diabétiques ainsi que celle présentant des facteurs de risque.

PRISDAL doit être utilisée avec prudence chez les patients à antécédents d'hypertonie et chez ceux qui présentent des lumeurs partiellement prolactine-dépendantes.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec un traitement concordant.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques

PRISDAL®

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Elle contient des informations importantes sur votre traitement. Si vous avez d'autres questions, s'informez à votre médecin ou à votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit, donc il ne doit pas être donné à d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif. Gardez cette notice, vous pourrez la consulter à tout moment.

1. IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

PRISDAL®

DENOUMÉNATION

Rispéridone (DCI)

b) COMPOSITIONS QUALITATIVES ET QUANTITATIVES

Par comprimé pelliculé

EXCIPIENTS (communs): Cellulose microcristalline, amidon prégalactosé; Pélliculage: Opadry jaune (cp à 0,2 mg), Opadry blanc (cp à 1 mg), Opadry vert (cp à 0,5 et 3 mg).

c) FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimés pelliculés

d) PRÉSENTATIONS

Boîtes de 30

e) CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

2. DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT?

• Traitement de la schizophrénie.

• Traitement des épisodes maniaques modérés à sévères associés aux troubles bipolaires.

• Traitement de courte durée (jusqu'à 6 semaines) de l'hypersensibilité persistante chez les patients présentant une dementia d'Alzheimer modérée à sévère répondant aux approches non pharmacologiques et lorsqu'il existe un risque de préjudice pour le patient lui-même ou les autres.

• Traitement symptomatique de courte durée (jusqu'à 6 semaines) de l'hypersensibilité persistante dans le trouble des conduites chez les enfants à partir de 5 ans et les adolescents présentant un fonctionnement intellectuel inférieur à la moyenne ou un retard mental diagnostiqués conformément aux critères du DSM-IV, chez lesquels la sévérité des comportements agressifs ou d'autres comportements perniciueurs nécessitent un traitement pharmacologique.

Le traitement pharmacologique doit faire partie intégrante d'un programme de traitement plus large, incluant des mesures psychosociales et éducatives.

Il est recommandé que la rispéridone soit prescrite par un spécialiste en neurologie de l'enfant et en psychiatrie de l'enfant ou un médecin très familiarisé avec le traitement du trouble des conduites ou de l'adolescence.

3. ATTENTION!

a) DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT?

• Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants:

• Hypersensibilité connue à la rispéridone ou à l'un des autres comprimés.

b) MIS EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

• UTILISATION MÉDICALISME AVEC PRÉCAUTION:

Il est recommandé aux prescripteurs d'évaluer les risques et les bénéfices de l'administration de PRISDAL chez les patients âgés et devenus en prenant en compte les facteurs de risque prédictifs de survenue d'accident vasculaire cérébral tels que faiblesse ou insensibilité soudaines au niveau du visage, des bras ou des jambes, troubles d'élocution de la vision, des céphalées ou une dépression importante.

• Pour favoriser la survenue des propriétés aérohalocytantes de la rispéridone lors de l'instauration progressive du traitement, il est recommandé de prendre la rispéridone au moins 15 minutes avant le repas.

• Ce médicament sera utilisé avec prudence chez les patients à risque cardiovasculaire connu (insuffisance cardiaque, infarctus du myocarde, hypertension, troubles du rythme cardiaque, antécédents familiaux d'allongement du segment QT).

• Évaluer le rapport bénéfice-risque lors de la prescription de PRISDAL chez les patients présentant une maladie de Parkinson ou une déférence à Corps de Lewy.

• Possibilité d'hypertonie et de surgravitation du diabète lors de l'instauration progressive du traitement.

• Ce médicament sera utilisé avec prudence chez celles présentant des facteurs de risque.

• PRISDAL doit être utilisé avec prudence chez les patients à antécédents d'hypertonie et chez ceux qui présentent des lumeurs partiellement prolactine-dépendantes.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents cliniques pouvant potentiellement entraîner la mort. PRISDAL peut altérer la conscience physique (mœurs d'un traitement concordant avec l'activité anticholinergique ou d'antagonisme).

• Le prescripteur est tenu à évaluer régulièrement les troubles de la moitié droite, débiter le traitement.

• A cause des effets sédatifs d'apprentissage, il faut faire des effets potentielle d'antagonisme.

• Évaluer régulièrement les troubles de la moitié droite, débiter le traitement.

• A cause des effets sédatifs d'apprentissage, il faut faire des effets potentielle d'antagonisme.

• Évaluer régulièrement les troubles de la moitié droite, débiter le traitement.

• A cause des effets sédatifs d'apprentissage, il faut faire des effets potentielle d'antagonisme.

• Évaluer régulièrement les troubles de la moitié droite, débiter le traitement.

• A cause des effets sédatifs d'apprentissage, il faut faire des effets potentielle d'antagonisme.

• Évaluer régulièrement les troubles de la moitié droite, débiter le traitement.

• A cause des effets sédatifs d'apprentissage, il faut faire des effets potentielle d'antagonisme.

• Évaluer régulièrement les troubles de la moitié droite, débiter le traitement.

• A cause des effets sédatifs d'apprentissage, il faut faire des effets potentielle d'antagonisme.

• Évaluer régulièrement les troubles de la moitié droite, débiter le traitement.

• A cause des effets sédatifs d'apprentissage, il faut faire des effets potentielle d'antagonisme.

• Évaluer régulièrement les troubles de la moitié droite, débiter le traitement.

• A cause des effets sédatifs d'apprentissage, il faut faire des effets potentielle d'antagonisme.

• Évaluer régulièrement les troubles de la moitié droite, débiter le traitement.

• A cause des effets sédatifs d'apprentissage, il faut faire des effets potentielle d'antagonisme.

• Évaluer régulièrement les troubles de la moitié droite, débiter le traitement.

• A cause des effets sédatifs d'apprentissage, il faut faire des effets potentielle d'antagonisme.

• Évaluer régulièrement les troubles de la moitié droite, débiter le traitement.

• A cause des effets sédatifs d'apprentissage, il faut faire des effets potentielle d'antagonisme.

• Évaluer régulièrement les troubles de la moitié droite, débiter le traitement.

• A cause des effets sédatifs d'apprentissage, il faut faire des effets potentielle d'antagonisme.

• Évaluer régulièrement les troubles de la moitié droite, débiter le traitement.

• A cause des effets sédatifs d'apprentissage, il faut faire des effets potentielle d'antagonisme.

• Évaluer régulièrement les troubles de la moitié droite, débiter le traitement.

• A cause des effets sédatifs d'apprentissage, il faut faire des effets potentielle d'antagonisme.

• Évaluer régulièrement les troubles de la moitié droite, débiter le traitement.

• A cause des effets sédatifs d'apprentissage, il faut faire des effets potentielle d'antagonisme.

• Évaluer régulièrement les troubles de la moitié droite, débiter le traitement.

• A cause des effets sédatifs d'apprentissage, il faut faire des effets potentielle d'antagonisme.

• Évaluer régulièrement les troubles de la moitié droite, débiter le traitement.

• A cause des effets sédatifs d'apprentissage, il faut faire des effets potentielle d'antagonisme.

PRISDAL®

Rispéridone
3 mg

LOT 0104471
EXP 07/24
PPV 2050H00

30 comprimés pelliculés

Voie orale

PRISDAL®

Rispéridone
3 mg

LOT 0104471
EXP 07/24
PPV 2050H00

30 comprimés pelliculés

Voie orale

PRISDAL®

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Elle contient des informations importantes sur votre traitement. Si vous avez d'autres questions, s'informez à votre médecin ou à votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit, donc il ne doit pas être donné à d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif. Gardez cette notice, vous la pourrez consulter à tout moment.

1. IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

PRISDAL®

DENOUMÉNATION

Rispéridone (DCI)

b) COMPOSITIONS QUALITATIVES ET QUANTITATIVES

Par comprimé pelliculé

EXCIPIENTS (communs): Cellulose microcristalline, amidon prégalactosé; Pélliculage: Opadry jaune (cp à 0,2 mg), Opadry blanc (cp à 1 mg), Opadry vert (cp à 0,5 et 3 mg).

c) FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimés pelliculés

d) PRÉSENTATIONS

Boîtes de 30

e) CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

2. DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT?

• Traitement de la schizophrénie.

• Traitement des épisodes maniaques modérés à sévères associés aux troubles bipolaires.

• Traitement de courte durée (jusqu'à 6 semaines) de l'hypersensibilité persistante chez les patients présentant une dementia d'Alzheimer modérée à sévère répondant aux approches non pharmacologiques et lorsqu'il existe un risque de préjudice pour le patient lui-même ou les autres.

• Traitement symptomatique de courte durée (jusqu'à 6 semaines) de l'hypersensibilité persistante dans le trouble des conduites chez les enfants à partir de 5 ans et les adolescents présentant un fonctionnement intellectuel inférieur à la moyenne ou un retard mental diagnostiqués conformément aux critères du DSM-IV, chez lesquels la sévérité des comportements agressifs ou d'autres comportements perniciueurs nécessitent un traitement pharmacologique.

Le traitement pharmacologique doit faire partie intégrante d'un programme de traitement plus large, incluant des mesures psychosociales et éducatives.

Il est recommandé que la rispéridone soit prescrite par un spécialiste en neurologie de l'enfant et en psychiatrie de l'enfant ou un médecin très familiarisé avec le traitement du trouble des conduites ou de l'adolescence.

3. ATTENTION!

a) DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT?

• Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants:

• Hypersensibilité connue à la rispéridone ou à l'un des autres comprimés.

b) MIS EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

UTILISATION MÉDICALISME AVEC PRÉCAUTION:

• Il est recommandé aux prescripteurs d'évaluer les risques et les bénéfices de l'administration de PRISDAL chez les patients âgés et devenus en prenant en compte les facteurs de risque prédictifs de survenue d'accident vasculaire cérébral tels que faiblesse ou insensibilité soudaines au niveau du visage, des bras ou des jambes, troubles d'élocution de la vision, des pouvoirs favorisant la survenue d'une hypertension orthostatique lors de l'instauration progressive du traitement.

• Ce médicament sera utilisé avec prudence chez les patients à risque cardiovasculaire connu (insuffisance cardiaque, infarctus du myocarde, hypertension, troubles du rythme cardiaque, antécédents familiaux d'allongement de la segment OT).

• Évaluer le rapport bénéfice-risque lors de la prescription de PRISDAL chez les patients présentant une maladie de Parkinson ou une déférence à Corps de Lewy.

• Possibilité d'hypertonie ou d'aggravation du diabète lorsque traité par la rispéridone, d'où la nécessité d'une surveillance lors de l'instauration progressive du traitement.

• Ce médicament sera utilisé avec prudence chez celles présentant des facteurs de risque.

• PRISDAL doit être utilisé avec prudence chez les patients à antécédents d'hypertonie et chez ceux qui présentent des lumeurs partiellement prolactine-dépendantes.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec

PRISDAL pour suivre un traitement concordant avec les recommandations.

Le prescripteur est tenu à évaluer régulièrement les

causes physiques et sociales

qui peuvent déclencher le traitement.

• A cause des effets sédatifs d'apprentissage.

• Du fait des effets potentiels d'une élévation régulière de la tension artérielle et de la fréquence cardiaque.

• Évaluer régulièrement les troubles de la miction.

• ÉVALUATION DE VOTRE MÉDECIN

c) INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

• Effets de PRISDAL sur d'autres substances agissant au niveau du système nerveux central.

• Antagonismes de l'effet d'autres substances agissant au niveau du système nerveux central.

• Effet hypertonique lors d'un traitement antihypertenseur.

• Diminution des concentrations plasmatiques de l'antipsychotique actif.

• Antagonismes de l'effet d'autres substances agissant au niveau du système nerveux central.

• Augmentation des concentrations plasmatiques de la rispéridone avec les inhibiteurs du CYP2D6 tels que la fluoxétine, la paroxétine, la quinidine ou l'haloperidol.

• Augmentation des concentrations plasmatiques de la rispéridone avec le verapamil, un inhibiteur du CYP3A4 et de la P-gp.

• PUISSANTS MÉDICAMENTS INTERAGISSANT AVEC PRISDAL OU VOTRE PHARMACIEN.

d) GROSSESSE ET ALLAITEMENT

• Grossesse: PRISDAL ne doit pas être utilisé au cours de la grossesse sauf cas de nécessité manifeste. Lorsque l'arrêt est nécessaire au cours de la grossesse, il ne doit pas être réalisé brutalement.

• Allaitement: les avantages de l'allaitement doivent réellement être évalués au regard des risques potentiels pour l'enfant.

• DEMANDER CONSEIL A VOTRE MÉDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE CE MÉDICAMENT.

e) CONDUCTEURS ET UTILISATEURS DE MACHINES

• PRISDAL peut avoir une influence mineure ou modérée sur l'aptitude à conduire et à utiliser des machines due à des effets potentiels sur le système nerveux et la vision. En conséquence, les patients doivent être informés de ne pas conduire ou utiliser de machines jusqu'à ce que leur sensibilité individuelle soit connue.

4. COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT?

a) POSOLOGIE USUELLE

• Schizophrénie:

• Adulte: PRISDAL peut être administré en 1 ou 2 prises par jour.

• Débuter le traitement par 2 mg/j de rispéridone. La posologie peut être augmentée à 4 mg/j le 2^{ème} jour. La posologie sera ensuite maintenue inchangée, ou adaptée individuellement, si nécessaire. La majorité des patients bénéficient de posologies journalières comprises entre 4 et 8 mg. Chez certains patients, une titration lente et progressive des doses initiales et d'entretenir plus faibles peuvent s'avérer nécessaires.

• Les posologies de 4 à 10 mg/jour n'ont pas montré d'efficacité supérieure aux posologies plus faibles et peuvent entraîner une augmentation de l'incidence des symptômes extrasympathiques. La sécurité d'emploi de posologies des symptômes extrasympathiques a été évaluée, et elles ne sont donc pas recommandées.

PRISDAL®

Rispéridone
3 mg

LOT 0104471
EXP 07/24
PPV 2050H00

30 comprimés pelliculés

Voie orale

PRISDAL®

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Elle contient des informations importantes sur votre traitement. Si vous avez d'autres questions, s'informez à votre médecin ou à votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit, donc il ne doit pas être donné à d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif. Gardez cette notice, vous la pourrez consulter à tout moment.

1. IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

PRISDAL®

DENOUMÉNATION

Rispéridone (DCI)

b) COMPOSITIONS QUALITATIVES ET QUANTITATIVES

Par comprimé pelliculé

Excipients (communs): Cellulose microcristalline, amidon prégalactosé; Pélliculage: Opadry jaune (cp à 0,2 mg), Opadry blanc (cp à 1 mg), Opadry vert (cp à 0,5 et 3 mg). Comprimés pelliculés

Boîtes de 30

c) CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

2. DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT?

• Traitement de la schizophrénie.

• Traitement des épisodes maniaques modérés à sévères associés aux troubles bipolaires.

• Traitement de courte durée (jusqu'à 6 semaines) de l'hypersensibilité persistante chez les patients présentant une dementia d'Alzheimer modérée à sévère non répondant aux approches non pharmacologiques et lorsqu'il existe un risque de préjudice pour le patient lui-même ou les autres.

• Traitement symptomatique de courte durée (jusqu'à 6 semaines) de l'hypersensibilité persistante dans le trouble des conduites chez les enfants à partir de 5 ans et les adolescents présentant un fonctionnement intellectuel inférieur à la moyenne ou un retard mental diagnostiqués conformément aux critères du DSM-IV, chez lesquels la sévérité des comportements agressifs ou d'autres comportements perniciieux nécessitent un traitement pharmacologique.

Le traitement pharmacologique doit faire partie intégrante d'un programme de traitement plus large, incluant des mesures psychosociales et éducatives.

Il est recommandé que la rispéridone soit prescrite par un spécialiste en neurologie de l'enfant et en psychiatrie de l'enfant ou un médecin très familiarisé avec le traitement du trouble des conduites de l'enfant ou de l'adolescent.

3. ATTENTION!

b) DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants:

• Hypersensibilité connue à la rispéridone ou à l'un des autres comprimés.

b) MIS EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

UTILISATION MÉDICALISME AVEC PRÉCAUTION:

Il est recommandé aux prescripteurs d'évaluer les risques et les bénéfices de l'administration de PRISDAL chez les patients âgés et devenus en prenant en compte les facteurs de risque prédictifs de survenue d'accident vasculaire cérébral tels que faiblesse ou insensibilité soudaines au niveau du visage, des bras ou des jambes, troubles d'élocution ou de la vision. Pourtant, comme les propriétés alpha-histoacétiques de la rispéridone peuvent favoriser la survenue d'une hypertension orthostatique lors de l'instauration progressive du traitement.

Ce médicament sera utilisé avec prudence chez les patients à risque cardiovasculaire connu (insuffisance cardiaque, infarctus du myocarde, hypertension, troubles du rythme cardiaque, antécédents familiaux d'allongement de la segment OT).

Évaluer le rapport bénéfice-risque lors de la prescription de PRISDAL chez les patients présentant une maladie de Parkinson ou une déférence à Corps de Lewy. Possibilité d'hypertonie ou d'aggravation du diabète lorsque le traitement par la rispéridone, d'où la nécessité d'une surveillance clinique chez les personnes diabétiques ainsi que celle présentant des facteurs de risque.

PRISDAL doit être utilisé avec prudence chez les patients à antécédents d'hypertonie et chez ceux qui présentent des lumeurs partiellement prolactine-dépendantes.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec une activité anticholinergique ou d'effets secondaires.

Le prescripteur est tenu à évaluer régulièrement les troubles de la miction, déclencher le traitement.

À cause des effets sédatifs d'apprentissage), dû à l'effet d'entraînement et à l'effet d'adaptation.

• Un traitement concordant avec un entraînement et à l'effet d'adaptation.

• Un entraînement et à l'effet d'adaptation.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec une activité anticholinergique ou d'effets secondaires.

Le prescripteur est tenu à évaluer régulièrement les troubles de la miction, déclencher le traitement.

À cause des effets sédatifs d'apprentissage), dû à l'effet d'entraînement et à l'effet d'adaptation.

• Un entraînement et à l'effet d'adaptation.

PRISDAL

PRISDAL®

Rispéridone

LOT 0104471
EXP 07/24
PPV 2050H00

30 comprimés pelliculés

Voie orale

PRISDAL®

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Elle contient des informations importantes sur votre traitement. Si vous avez d'autres questions, s'informez à votre médecin ou à votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit, donc il ne doit pas être donné à d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif. Gardez cette notice, vous la pourrez consulter à tout moment.

1. IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

PRISDAL®

DENOUMÉNATION

Rispéridone (DCI)

b) COMPOSITIONS QUALITATIVES ET QUANTITATIVES

Par comprimé pelliculé

EXCIPIENTS (communs): Cellulose microcristalline, amidon prégalactosé; Pélliculage: Opadry jaune (cp à 0,2 mg), Opadry blanc (cp à 1 mg), Opadry vert (cp à 0,5 et 3 mg).

c) FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimés pelliculés

d) PRÉSENTATIONS

Boîtes de 30

e) CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

2. DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT?

• Traitement de la schizophrénie.

• Traitement des épisodes maniaques modérés à sévères associés aux troubles bipolaires.

• Traitement de courte durée (jusqu'à 6 semaines) de l'hypersensibilité persistante chez les patients présentant une dementia d'Alzheimer modérée à sévère répondant aux approches non pharmacologiques et lorsqu'il existe un risque de préjudice pour le patient lui-même ou les autres.

• Traitement symptomatique de courte durée (jusqu'à 6 semaines) de l'hypersensibilité persistante dans le trouble des conduites chez les enfants à partir de 5 ans et les adolescents présentant un fonctionnement intellectuel inférieur à la moyenne ou un retard mental diagnostiqués conformément aux critères du DSM-IV, chez lesquels la sévérité des comportements agressifs ou d'autres comportements perniciueurs nécessitent un traitement pharmacologique.

Le traitement pharmacologique doit faire partie intégrante d'un programme de traitement plus large, incluant des mesures psychosociales et éducatives.

Il est recommandé que la rispéridone soit prescrite par un spécialiste en neurologie de l'enfant et en psychiatrie de l'enfant ou un médecin très familiarisé avec le traitement du trouble des conduites ou de l'adolescence.

3. ATTENTION!

a) DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT?

• Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants:

• Hypersensibilité connue à la rispéridone ou à l'un des autres comprimés.

b) MIS EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

UTILISATION MÉDICALISME AVEC PRÉCAUTION:

• Il est recommandé aux prescripteurs d'évaluer les risques et les bénéfices de l'administration de PRISDAL chez les patients âgés et devenus en prenant en compte les facteurs de risque prédictifs de survenue d'accident vasculaire cérébral tels que faiblesse ou insensibilité soudaines au niveau du visage, des bras ou des jambes, troubles d'élocution de la vision, des pouvoirs favorisant la survenue d'une hypertension orthostatique lors de l'instauration progressive du traitement.

• Ce médicament sera utilisé avec prudence chez les patients à risque cardiovasculaire connu (insuffisance cardiaque, infarctus du myocarde, hypertension, troubles du rythme cardiaque, antécédents familiaux d'allongement de la segment OT).

• Évaluer le rapport bénéfice-risque lors de la prescription de PRISDAL chez les patients présentant une maladie de Parkinson ou une déférence à Corps de Lewy.

• Possibilité d'hypertonie ou d'aggravation du diabète lorsque traité par la rispéridone, d'où la nécessité d'une surveillance lors de l'instauration progressive du traitement.

• Ce médicament sera utilisé avec prudence chez celles présentant des facteurs de risque.

• PRISDAL doit être utilisé avec prudence chez les patients à antécédents d'hypertonie et chez ceux qui présentent des lumeurs partiellement prolactine-dépendantes.

PRISDAL doit être utilisé présentant des antécédents

cliniques pouvant potentiellement être utilisés avec

PRISDAL pour suivre un traitement concordant avec les recommandations.

• Un prescripteur peut suivre

PRISDAL pour atténuer les symptômes physiques indésirables ou d'apprentissage.

• Étâlants et adolescents:

• Le prescripteur est tenu de faire régulièrement les évaluations physiques et sociales.

• A cause des effets sédatifs, il doit être effectué (consulter l'apprentissage).

• Du fait des effets potentiels d'une évaluation régulière de l'état de la montre, il est recommandé de faire régulièrement les évaluations physiques et sociales.

• En cas de douleur, il est recommandé de faire régulièrement les évaluations physiques et sociales.

• C) INTERACTIONS MÉDICALES:

• Effets de PRISDAL sur d'autres substances agissant au niveau de la montre.

• Antagonismes de l'effet d'autres substances agissant au niveau de la montre.

• Effet hypotenseur lors de la prise de PRISDAL.

• Diminution des concentrations plasmatiques de substances agissant au niveau de la montre.

• Antagonismes de l'effet d'autres substances agissant au niveau de la montre.

• Effet hypotenseur lors de la prise de PRISDAL.

• Diminution des concentrations plasmatiques de substances agissant au niveau de la montre.

• Afin de éviter d'éventuelles interactions entre PRISDAL et d'autres médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre pharmacien.

d) GROSSESSE ET ALLAITEMENT

• Grossesse: PRISDAL ne doit pas être utilisé au cours de la grossesse sauf cas de nécessité manifeste. Lorsque l'arrêt est nécessaire au cours de la grossesse, il ne doit pas être réalisé brutalement, mais progressivement, en utilisant des méthodes de l'allaitement.

• Ainsi, les avantages de l'allaitement doivent être évalués au regard des risques potentiels pour l'enfant.

• D'après CONSEIL A VOTRE MÉDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE CE MÉDICAMENT.

e) CONDUCTEURS ET UTILISATEURS DE MACHINES

• PRISDAL peut avoir une influence mineure ou modérée sur l'aptitude à conduire et à utiliser des machines due à des effets potentiels sur le système nerveux et la vision. En conséquence, les patients doivent être informés de ne pas conduire ou utiliser de machines jusqu'à ce que leur sensibilité individuelle soit connue.

f) PHYSIOLOGIE USUELLE

• Schizophrénie:

• Adulte: PRISDAL doit être administré en 1 ou 2 prises par jour.

• Débuter le traitement par 2 mg/jour de rispéridone. La posologie peut être augmentée à 4 mg, 10 mg, 20 mg/jour. La posologie sera ensuite maintenue inchangée, ou adaptée individuellement, si nécessaire. La majorité des patients bénéficient de posologies journalières comprises entre 4 et 8 mg. Chez certains patients, une titration lente et progressive des doses initiales et d'entretenir plus faibles peuvent s'avérer nécessaires.

• Les posologies de 10 mg/jour n'ont pas montré d'efficacité supérieure aux posologies plus faibles et peuvent entraîner une augmentation de l'incidence des symptômes extrasympathiques. La sécurité d'emploi de posologies des symptômes extrasympathiques a été évaluée, et elles ne sont donc pas recommandées.

PRISDAL®

Rispéridone
3 mg

LOT 0104471
EXP 07/24
PPV 2050H00

30 comprimés pelliculés

Voie orale