

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire, en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

N° M21- 0056354

☒ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique


☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 8606 Société : 136081
☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :
 Nom & Prénom : Foula Mohamed
 Date de naissance : 23/06/1955
 Adresse : Res EL Mastahbal GH26 IMMC 235 NR 5 Sidi Maarouf
 Casa
 Tél. : 0664 04 71 80 Total des frais engagés : 1915,10 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :




Date de consultation : 06/09/2022
 Nom et prénom du malade : EL Ghazal Karima Age : 60
 Lien de parenté : ☐ Lui-même ☒ Conjoint ☐ Enfant
 Nature de la maladie : Dépression - Anxiété - Angor
 En cas d'accident préciser les causes et circonstances :
 Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent(e) :



Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019

Adresses Mails utiles

- 0 Réclamation : contact@mupras.com
- 0 Prise en charge : pec@mupras.com
- 0 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

VOLET ADHERENT

Déclaration de maladie N° M21-056354

Remplissez ce volet, découpez le et conservez le.
 Il sera nécessaire de le présenter pour toute réclamation ultérieure.

Coupon à conserver par l'adhérent(e).

Matricule : 8606
 Nom de l'adhérent(e) : Foula Mohamed
 Total des frais engagés : 1915,10 Dhs
 Date de dépôt : 11/10/2022

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
06/09/2022	cont		100 000	
20 SEP. 2022			gros fruit	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	06/09/2022	513 10
	06/09/2022	252 00

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
	09.09.22	echog x2	400 000
	09.09.22	CXIS	1600

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

VOLET ADHERENT



* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				Coefficient DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE H 25533412 00000000 D 21433552 00000000 G 00000000 35533411 B 00000000 11433553 B			Coefficient DES TRAVAUX
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Fatima El Kherrat

الدكتورة فاطمة الخراط

Médecine Générale

Omnipraticienne Nutritionniste diplômée (Canada)

Spécialiste en médecine de Travail (Rennes-France)

Diplômée d'Echographie



الطب العام

حائزة على دبلوم التغذية بكلية الطب كندا

أخصائية طبّ الشغل كلية الطب (رانس - فرنسا)

حائزة على دبلوم الفحص بالصدى

Casablanca, le

06 SEP. 2022

الدار البيضاء في

Mr. Kaim EL Ghazouani

82,10

1/2 Egm 20mg



1 cp 1 jour pour
about 6 jrs.

126,80

1/2 Egm 20mg
#07/09/22#
#7629#

IMMUNE VACCINE RABV.
The Jamaleddine Miane MM
N°124 Complex Al Maustak
Sidi Maârouf Casablanca

1 cp 1 jour pour 1 mois

127,80

1/2 Egm 20mg
#07/09/22#
#7629#



LOT: 375
PER: FEB 2024
OPV: 125 DH 80

إقامة المستقبل GH4 عمارة 103 ش 3 - ط 1 - سيدي معروف - الدار البيضاء

Résid. AL Mostakbal GH4 imm. 103 N°3. 1er Etage Sidi Maârouf - Casablanca

الهاتف: 06 61 18 51 01 - النفاذ: 05 22 97 20 36

après le 12

67,40

W. polygone ou



Levée l'après midi 12h →

féminin original / le son = sonder

109,00

+ 1 Antigène

2 Achet

Nature



→ son 12h

la distance des sorties pour l'auto

T = 513,10

FAUCON ELKHERRAT
Service de Médecine Générale
Généraliste
3, 4, 5 Panorama
3, 4, 5 Etage - Casablanca
06 61 18 51 01

MAJIE YATHIR
Amie Jamaled
N° 24 Com
Sidi Maar
1e
Mame Mike
Moustak
Abblance

PPV: 82DH10
PEK: 09/23
LOT: K3637-2

EZIUM® 20 mg
Esomeprazole

14 gélules



6 118 000 04 1825

Composition :

Composition qualitative et quantitative en substance active par unité de prise.

Principe actif :	
Esomeprazole magnésium dihydrate	20 mg
Esomeprazole magnésium dihydrate	40 mg
Autres composants :	
sucre, amidon de maïs, hypromellose 3cF, diméthicone émulsion 35%, polyisobutylène 80, mannitol, diacétylène monoglycérides, talc, méthacrylate d'éthylacrylate copolymère adhésif 30%, triéthyle de citrate, stéaroyl macroglycérides, eau purifiée.	
Excipients à effet notoire :	
Mannitol, Saccharose	

Classe pharmacothérapeutique ou le type d'activité :

EZIUM® contient une substance appelée esomeprazole. C'est un médicament de la classe des inhibiteurs de la pompe à protons. Il diminue la sécrétion acide au niveau de l'estomac.

Indications thérapeutiques :

EZIUM® gélules gastro-résistantes est utilisé dans le traitement des maladies suivantes :

Adultes

- Le reflux gastro-œsophagien (RGO) lorsque l'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie votre gorge à votre estomac) et entraîne une douleur, une inflammation et des brûlures.
- L'ulcère de l'estomac ou du duodénum (intestin grêle) en cas d'infection par une bactérie appelée *Helicobacter pylori*. Si vous êtes dans cette situation votre médecin pourra également vous prescrire des antibiotiques pour traiter l'infection et permettre à l'ulcère de cicatriser.
- Le traitement et la prévention des ulcères associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). EZIUM® peut aussi être utilisé pour stopper la formation d'ulcères si vous prenez des anti-inflammatoires non stéroïdiens.
- Un excès d'acide dans l'estomac dû à un syndrome de Zollinger-Ellison.

Adolescents âgés de 12 ans et plus

- Le reflux gastro-œsophagien (RGO) lorsque l'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (tube qui relie votre gorge à votre estomac) et entraîne une douleur, une inflammation et des brûlures.
- L'ulcère de l'estomac ou du duodénum (intestin grêle) en cas d'infection par une bactérie appelée *Helicobacter pylori*. Si vous êtes dans cette situation votre médecin pourra également vous prescrire des antibiotiques pour traiter l'infection et permettre à l'ulcère de cicatriser.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement :

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant les indications de votre médecin ou pharmacien.

Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

EZIUM® n'est pas recommandé pour les enfants de moins de 12 ans.

Si vous prenez ce médicament depuis longtemps (en particulier depuis plus d'un an), votre médecin sera amené à instaurer une surveillance.

Si votre médecin vous a dit de prendre ce médicament « à la demande » en fonction des besoins, vous devez l'informez si les symptômes se modifient.

Mode d'administration

Vous pouvez prendre vos gélules à n'importe quel moment de la journée.

Vous pouvez prendre vos gélules pendant ou en dehors des repas.

Avez vos gélules entières avec un verre d'eau. Les gélules comme leur contenu ne doivent pas être mâchées ni croquées. En effet, les gélules contiennent des granules dont l'enrobage protège le médicament de l'acidité de l'estomac. Il est important de ne pas endommager les granules.

Que faire si vous avez des difficultés pour avaler les gélules

Si vous avez des difficultés pour avaler les gélules :

1) Ouvrez soigneusement les gélules au dessus d'un verre d'eau (non gazeuse) et vider le contenu des gélules (granules) dans le verre. Aucun autre liquide ne doit être utilisé.

2) Remuez, mélangez le mélange immédiatement ou dans les 30 minutes. Remuez toujours le mélange avec le boire.

3) Afin de prendre la totalité du médicament, rincez ensuite le verre en ajoutant le contenu d'un demi-verre d'eau et le boire. Tous les granules doivent être avalés sans être mâchés ni croqués.

Pour les patients ne pouvant pas avaler : le contenu des gélules peut être mélangé dans de l'eau et prélevé dans une seringue. Il peut alors être administré par sonde gastrique.

Posologie

Votre médecin vous dira le nombre de gélules à prendre et la durée du traitement. Ceci dépendra de votre état de santé et du fonctionnement de votre foie.

Les doses recommandées sont mentionnées ci-dessous.

Traitement des symptômes du reflux gastro-œsophagien (brûlures et remontées acides)

Adultes et adolescents à partir de 12 ans

Si votre médecin diagnostique une inflammation de l'œsophage, la dose recommandée est de 40 mg d'EZIUM® une fois par jour pendant 4 semaines. Un traitement supplémentaire de 4 semaines peut être nécessaire pour obtenir une guérison complète.

La dose recommandée après cicatrisation de l'œsophage est d'une gélule d'EZIUM® 20 mg une fois par jour.

Si votre œsophage ne présente pas d'inflammation, la dose recommandée est d'une gélule d'EZIUM® 20 mg une fois par jour. Une fois le contrôle des symptômes obtenu, votre médecin peut vous recommander de prendre une gélule d'EZIUM® 20 mg une fois par jour, en fonction de vos besoins.

Si vous avez des problèmes hépatiques sévères, votre médecin peut vous donner une dose plus faible.

En cas d'infection par la bactérie appelée *Helicobacter pylori*, traitement de l'ulcère du duodénum et prévention de la récurrence de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum

Adultes et adolescents à partir de 12 ans

La dose recommandée est d'une gélule d'EZIUM® 20 mg deux fois par jour pendant 7 jours.

Votre médecin vous demandera également de prendre des antibiotiques par exemple de l'amoxicilline et de la claritromycine.

Traitement des ulcères de l'estomac associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)

Adultes âgés de 18 ans et plus :

La dose recommandée est d'une gélule d'EZIUM® 20 mg une fois par jour pendant 4 à 8 semaines.

Prévention des ulcères associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)

Adultes âgés de 18 ans et plus :

La dose recommandée est d'une gélule d'EZIUM® 20 mg une fois par jour.

Traitement de l'excès d'acide dans l'estomac dû au syndrome de Zollinger-Ellison

Adultes âgés de 18 ans et plus :

La dose recommandée est d'une gélule d'EZIUM® 40 mg deux fois par jour.

Votre médecin vous indiquera la dose et la durée de traitement en fonction de vos besoins.

La dose maximale est de 80 mg deux fois par jour.

Poursuite du traitement après prévention par voie intraveineuse de la récurrence hémorragique d'un ulcère gastro-duodénal

Adultes âgés de 18 ans et plus :

La dose recommandée est d'une gélule à 40 mg une fois par jour pendant 4 semaines.

Contre-indications :

Ne prenez jamais EZIUM® 20mg, 40 mg, gélule gastro-résistante :

- si vous êtes allergique à l'esomeprazole ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament ;
- si vous êtes allergique à un autre inhibiteur de la pompe à protons (par exemple : pantoprazole, lansoprazole, rabeprazole, omeprazole) ;
- si vous prenez un médicament contenant du nelfinavir (utilisé dans le traitement du VIH). Si vous avez des doutes, si vous êtes dans une des situations décrites ci-dessus, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien avant toute administration d'EZIUM®.

Effets Indésirables :

Comme tous les médicaments, EZIUM®, gélule gastro-résistante peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Si vous remarquez l'un de ces effets indésirables graves, arrêtez de prendre EZIUM® et contactez un médecin immédiatement :

Apparition soudaine d'une respiration sifflante, gonflement des lèvres, de la langue, de la gorge ou du corps, éruptions cutanées, perte de connaissance ou difficultés à avaler (réactions allergiques graves).

Rougeurs de la peau avec des bulles ou une desquamation. Parfois, les bulles peuvent être importantes et s'accompagner d'un engourdissement au niveau des lèvres, des yeux, de la bouche, du nez ou des parties génitales. Ceci peut correspondre à un syndrome de Stevens-Johnson ou à une destruction toxique de la peau.

Jaunisse, urines foncées et fatigue peuvent être des symptômes d'une maladie du foie.

Ces effets sont rares et affectent 1 utilisateur sur 1000 :

Les autres effets indésirables sont :

Effets indésirables fréquents (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10) :

Maux de tête.

Effets sur l'estomac ou l'intestin : diarrhée, douleurs à l'estomac, constipation, flatulence, nausées, vomissements.

Effets indésirables peu fréquents (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 100) :

Troubles des pieds et des chevilles.

Troubles du sommeil (insomnie).

Étourdissements, fourmillements, somnolence.

Vertiges.

Sécheresse de la bouche.

Augmentation dans le sang des enzymes du foie.

Éruptions cutanées, urticaire et démangeaisons.

MAPHAR
POLYGYNAX 12 capsules vaginales
Km 10, route Côtière 111 - Quartier Industriel, Zenata
Ain Sebâa Maroc
P.R.V. - 67DH40



NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

POLYGYNAX®

capsule vaginale

Sulfate de néomycine / sulfate de polymyxine / nystatine

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que POLYGYNAX, capsule vaginale et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser POLYGYNAX, capsule vaginale ?
3. Comment utiliser POLYGYNAX, capsule vaginale ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver POLYGYNAX, capsule vaginale ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE POLYGYNAX, capsule vaginale ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Qu'est-ce que POLYGYNAX, capsule vaginale ?

Classe pharmacothérapeutique : ANTIINFECTIEUX et ANTISEPTIQUES à USAGE GYNÉCOLOGIQUE (G. Système génito urinaire et hormones sexuelles) - code ATC : G01AA51.

Ceci est un anti-infectieux local. POLYGYNAX, capsule vaginale

Conseils pratiques

En plus de votre traitement, il vous est conseillé de suivre certaines mesures d'hygiène :

- Afin de ne pas contaminer votre entourage, utilisez votre propre linge de toilette (gant, serviette).
- Portez des sous-vêtements en coton.
- Évitez les douches vaginales.
- Évitez d'utiliser des tampons périodiques pendant le traitement.
- N'interrompez pas le traitement pendant les règles.
- Votre médecin peut décider de traiter également votre partenaire.

Si vous avez utilisé plus de POLYGYNAX, capsule vaginale que vous n'auriez dû

Une administration excessive et prolongée pourra entraîner des effets sur l'appareil auditif et sur les reins notamment chez les insuffisants rénaux. Un emploi prolongé expose également à un risque accru d'eczéma allergique.

Si vous oubliez d'utiliser POLYGYNAX, capsule vaginale

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Si vous utilisez ce médicament de manière prolongée, une réaction allergique peut survenir. Vous la reconnaîtrez par l'apparition d'un eczéma (plaques rouges qui démangent) localement ou à distance du lieu d'application. Si cet effet survient, vous devez immédiatement arrêter le traitement et prévenir votre médecin.

Déclaration des effets

Si vous ressentez

250/500 mg

pelliculés, boîtes de 10 et 20
(Ciprofloxacine)

Lisez attentivement la notice avant de prendre ce médicament.
Elle contient des informations importantes pour votre traitement et votre maladie.
Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

I. IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT :

FORME/PRÉSENTATION :

Comprimé pelliculé :

ARES 250 mg Boîte de 10 / Boîte de 20

ARES 500 mg Boîte de 10 / Boîte de 20

COMPOSITION QUANTITATIVE ET QUALITATIVE :

Ciprofloxacine (DCI) Par comprimé pelliculé
.....250 ou 500 mg

EXCIPIENTS COMMUNS : Noyau : croscarmellose sodique, cellulose microcristalline, povidone, stéarate de magnésium, silice colloïdale, **pelliculage :** hypromellose, dioxyde de titane, talc, propylène glycol, alcool isopropylique

CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE :

Antibactérien à usage systémique.

II. DANS QUEL CAS UTILISER CE MÉDICAMENT :

INDICATIONS :


Les indications thérapeutiques de la spécialité pharmaceutique ARES 250 et 500 mg comprimés pelliculés seront limitées à :

Chez l'adulte au traitement :

- Urétrite et cervicite gonococcique
- Infections des voies respiratoires basses dues à des bactéries à Gram négatif
- Exacerbations de broncho-pneumopathie chronique obstructive
- Infections broncho-pulmonaires en cas de mucoviscidose ou de bronchectasie
- Pneumonie
- Ote moyenne chronique purulente
- Exacerbation aiguë de sinusite chronique, en particulier due à des bactéries à Gram négatif
- Infections urinaires
- Orchi-épididymite y compris les infections dues à *Neisseria gonorrhoeae*
- Infections gynécologiques hautes y compris les infections dues à *Neisseria gonorrhoeae*

Lorsque les infections de l'appareil génital citées ci-dessus sont suspectées ou confirmées à *Neisseria gonorrhoeae*, il est particulièrement important de disposer d'informations sur la prévalence de la résistance locale de cette bactérie à la ciprofloxacine et de confirmer sa sensibilité à l'antibiotique par des tests microbiologiques.

- Infections gastro-intestinales (par ex. diarrhée du voyageur)
- Infections intra-abdominales
- Infections de la peau et des parties molles dues à des bactéries à Gram négatif
- Ote maligne externe
- Infections ostéoarticulaires
- Traitement des infections chez les patients neutropéniques
- Prophylaxie anti-infectieuse chez les patients neutropéniques
- Prophylaxie des infections invasives à *Neisseria meningitidis*
- Maladie du charbon (prophylaxie après exposition et traitement curatif)



Oral Granules

20 single-use sachets

Relieves the gastrointestinal system from

✓ Pressure ✓ Bloating ✓ Discomfort

0919

INDICATIONS

Anti Gas® Adults is a medical device that relieves in a natural way the abdominal pain caused by flatulence. The movement of trapped air along the gastrointestinal track is a common cause of abdominal pain. Cases like this are presented either during simple processes such as air swallowing and natural treatment of certain food in the stomach and small intestine (eg. food with fiber) or by consuming carbonated, digestive drinks such as refreshments. Thus, a foam is created and accumulated (a condition called flatulence) in the narrow intestinal tract and its movement causes bloating, pain and discomfort.

Anti Gas® Adults contains simethicone, an antifoaming ingredient that disrupts the surface of the foam, releasing the trapped air and naturally relieving the user from bloating, abdominal pain and discomfort due to flatulence. It treats the feeling of contentment as well as the premature sense of satiety. It can be used supplementary for the preparation of the intestinal tract for diagnostic tests (eg. endoscopy, X-rays and ultrasound).

Anti Gas® Adults does not contain sugars, salt and gluten and has a pleasant flavor of mint. It is suitable for diabetics and children over six years old.

Each sachet contains: 125 mg Simethicone

Excipients: Isomalt, Talc, Aroma, Maltodextrin

C E 2265

MEDICAL DEVICE

INSTRUCTIONS

Consume without water.

- Place the content of 1 sachet / stick in the back of the tongue and allow it to dissolve.
- The use by children should be supervised by an adult.
- Use after meals and before bedtime.

DOSAGE

Children (over 6 years old) & Adults: 1-4 sachets/sticks per day.

Infants and children (till 6 years old): **Anti Gas® Adults** should not be used on children under 6 years old. For treating abdominal discomfort at these ages try **Anti Gas® Oral Solution Drops**, a solution in drops easily mixable with liquid preparations, suitable for infants.

PRECAUTIONS

- Store in a cool (<25°C) and dry place, keep out of children's reach

Docteur Fatima El Kherrat

الدكتورة فاطمة الخراط

Médecine Générale

Omnipraticienne Nutritionniste diplômée (Cahada)

Spécialiste en médecine de Travail (Rennes-France)

Diplômée d'Echographie



الطب العام

حائزة على دبلوم التغذية بكلية الطب كندا

أخصائية طب الشغل كلية الطب (پانس - فرنسا)

حائزة على دبلوم الفحص بالصدى

Casablanca, le

20 SEP. 2022

الدار البيضاء في

Mr. Nourine EL Hachemi

IMAGIE YATHIRIB SARL
Ame Jamaledine Imane Mike
h4 N°24 Complexe Al Mostakbal
Sidi Maarouf - Casablanca

18.00 x 2

Glucose 1000

IMAGIE YATHIRIB SARL
Ame Jamaledine Imane Mike
h4 N°24 Complexe Al Mostakbal
Sidi Maarouf - Casablanca

124 - 124 - 124
18.00 x 2

Dr. Fatima EL KHERRAT

Médecine Générale

Omnipraticienne

Rés:

1er Etage imm. Al Mostakbal - Casablanca
tel.: 0522 97 20 36 - 0522 18 51 01

IMAGIE YATHIRIB SARL
Ame Jamaledine Imane Mike
h4 N°24 Complexe Al Mostakbal
Sidi Maarouf - Casablanca
18.00 x 2

إقامة المستقبل GH4 عمارة 103 ش 3 - ط 1 - سيدي معروف - الدار البيضاء

Résid. AL Mostakbal GH4 imm. 103 N°3. 1er Etage Sidi Maarouf - Casablanca

الهاتف: 05 22 97 20 36 - النقال: 06 61 18 51 01

دواء
تخصي
مليات
المهم

28,00

إذا كنت تستهلك بكثرة
الأنسولين عليك إحدى
• يجب استشارة الطبيب
• إذا كنت مقبلاً على الخط
• حقن مادة مائية تحتوي على
• إذا كنت مقبلاً على الخط
• يجب التوقف عن تناول
• الجراحة، يسفر الطبيب إذا
• أن تتبع بدقة تعليمات الطبيب
• يجب الانتباه مع غليكوجان

خطر الحماض اللبني

قد يسبب غليكوجان مضاعفة خطر الإصابة بحمض الحماض اللبني، خاصة إذا كانت
كثافتها لا تعادل بصورة صحيحة. كما أن خطر الحماض اللبني يزيد في حال وجود
سكري غير متحكم به، والتهابات شديدة أو انقطاع طويل عن الطعام. واستهلاك
المشروبات الكحولية والجفاف، والتهالجات الإضافية أدناه (مثل مشاكل في الكبد وغيرها
من الحالات الطبية حيث يقل الأوكسجين على سبيل المثال، أمراض القلب الحادة).

إذا كان أي من هذه الحالات تنطبق عليك، اتصل بطبيبك للحصول على مزيد من التعليمات.
توقف عن تناول غليكوجان فوراً وقصيرة إذا كانت تعاني من مرض من المحتمل أن يكون مرتبطاً
بجفاف (فقدان مهم لسوائل الجسم) مثل القيء، الشديد، والإسهال، والحمى، والتعرض
للحرارة، أو سعال، أو فقدان للوعي. تحدث مع طبيبك للحصول على مزيد من التعليمات.
توقف عن تناول غليكوجان وعلى الفور اتصل بطبيبك أو باقرص مستشفى إذا كنت تعاني
من أعراض الحماض اللبني لأنه قد يؤدي إلى غيبوبة.

وتشمل أعراض الحماض اللبني:

• القيء

• اضطراب في المعدة (الام في البطن)

• تقلصات العضلات

• الشعور بالعدم الراحة مرتبطة بتعب كبير

• صعوبة في التنفس

• انخفاض درجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب

الحماض اللبني حالة طوارئ طبية يجب معالجتها في المستشفى
إذا اضطرت إلى إجراء عملية جراحية، يؤدي ذلك إلى تناول غليكوجان في وقت و بعد العملية.

سوف يقرر طبيبك متى توقف وتتأكد من أنك تستخدم غليكوجان.
وحدة واحدة لا يسبب انخفاض معدل السكر في الدم، لكن، إذا تناولت غليكوجان في

نفس الوقت مع أدوية أخرى لعلاج السكري والتي قد تؤدي إلى انخفاض معدل السكر في
الدم (مثل المساقمات) فخطر انخفاض معدل السكر في الدم، الإسهال، الغثيث، هناك

انخفاض معدل السكر في الدم. إذا أحسست بأعراض انخفاض معدل السكر في
الدم، مثل الشعور بالوهن، الدوخة، زيادة تصبب العرق، تسارع نظم القلب، اضطرابات

بصرية، صعوبة التركيز الذهني، فإن شرب أو أكل شيء ما يحتوي على سكر قد يساعدك
على تخفيف وزيادة الإحساس بالضحى.

إنشاء فترة العلاج بـ غليكوجان، سيقيم طبيبك بعض وظائف الكلى مرة واحدة على الأقل
سببها أو أكثر بشكل متكرر كل ستة أشهر / و / و سوف توظف وظائف الكلى.

معلومات عن سواغات لها تأثير ملحوظ لا ينطبق.

تناول أو استعمال أدوية أخرى

إذا كنت مقبلاً على حقن وعائي من مادة مائية تحتوي على البود، مثلاً للحصن بالأسعة
أو بالسكر، إذا لم يلقاق تناول غليكوجان قبل وبعد الحقن، سوف يقرر طبيبك متى يجب

التوقف واستئناف تناول غليكوجان.
عليك إعلام الطبيب إذا كنت تتناول، تناولت مؤخراً أو من الممكن أن تتناول أي دواء. عندئذ

قد تحتاج إلى إجراء اختبارات جلوكوز أكثر بشكل متكرر أو اختبارات وظائف الكلى وقد
يكون يجب أن يضبط طبيبك الجرعة.

من المهم معرفة طبيبك بالاعلام عن الأدوية التالية
الأدوية التي تزيد من كمية البول (مدرات البول).

الأدوية المستخدمة لعلاج الألم والتهابات مثل (مضادات التهابات خاصة التهابات الحادة للبرد أو الربو).

مضادات كوكس-2 (مضادات التهابات غير الستيرويدية أو
بعض الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم) (مضادات الالتهاب غير الستيرويدية أو

الأنجيوتنسين II)
• حاديات المستقبلات بيتا-2 الأدرينية مثل سالبوتامول أو تريوباتين (التي تستخدم لعلاج الربو)،

• كورتيكوستيرويدات (المستخدمة لعلاج مختلف الإعتلالات خاصة التهابات الحادة للبرد أو الربو).

• الأدوية التي قد تؤثر على الجلوكوز في الدم، وخاصة إذا كنت توظف الكلى
متخففة (مثل فيراباميل، ريفاميسين، ستيميتدين، دولوفين، رانولازين، تريموثيم،

فانديباتين، إيزوفلوكلوراز، كروزيتيب و / أو ألاباري)
• الأدوية المستخدمة لعلاج السكري.

غليكوجان مع استهلاك

تجنب الإفراط في تناول الكحول مع الأخذ غليكوجان لأن هذا قد يزيد من خطر الحماض
اللبن (انظر التحذيرات وقسم الاحتياطات).

الحمل والإرضاع

الفرص مغلف

الفرص مغلف

الفرص مغلف

الفرص مغلف

الفرص مغلف

الفرص مغلف

الفرص مغلف

الفرص مغلف

الفرص مغلف

الفرص مغلف

الفرص مغلف

الفرص مغلف

الفرص مغلف

الفرص مغلف

الفرص مغلف

الفرص مغلف

الفرص مغلف

الفرص مغلف

الفرص مغلف

الفرص مغلف

الفرص مغلف

الفرص مغلف

الفرص مغلف

الفرص مغلف

الفرص مغلف

الفرص مغلف

الفرص مغلف

الفرص مغلف

الفرص مغلف

الفرص مغلف

الفرص مغلف

الفرص مغلف

الفرص مغلف

الفرص مغلف

الفرص مغلف

الفرص مغلف

الفرص مغلف

الفرص مغلف

الفرص مغلف

الفرص مغلف

الفرص مغلف

الفرص مغلف

الفرص مغلف

الفرص مغلف

الفرص مغلف

الفرص مغلف

الفرص مغلف

الفرص مغلف

الفرص مغلف

الفرص مغلف

الفرص مغلف

الفرص مغلف

الفرص مغلف

الفرص مغلف

الفرص مغلف

28,00

إذا كنت تستهلك بكثرة
الأنسولين عليك إحدى
• يجب استشارة الطبيب
• إذا كنت مقبلاً على الخط
• حقن مادة مائية تحتوي على
• إذا كنت مقبلاً على الخط
• يجب التوقف عن تناول
• الجراحة، يسفر الطبيب إذا
• أن تتبع بدقة تعليمات الطبيب
• يجب الانتباه مع غليكوجان

خطر الحماض اللبني

قد يسبب غليكوجان مضاعفة خطر الإصابة بحمض الحماض اللبني، خاصة إذا كانت
كثافتها لا تعادل بصورة صحيحة. كما أن خطر الحماض اللبني يزيد في حال وجود
سكري غير متحكم به، والتهابات شديدة أو انقطاع طويل عن الطعام. واستهلاك
المشروبات الكحولية والجفاف، والعمليات الجراحية الإضافية أدناه (وشاكل في الكبد وغيرها
من الحالات الطبية حيث يقل الأوكسجين على سبيل المثال، أمراض القلب الحادة).

إذا كان أي من هذه الحالات تنطبق عليك، اتصل بطبيبك للحصول على مزيد من التعليمات.
توقف عن تناول غليكوجان فوراً وقصيرة إذا كانت تعاني من مرض من المحتمل أن يكون مرتبطاً
بجفاف (فقدان مهم لسوائل الجسم) مثل القيء، الشديد، والإسهال، والحمى، والتعرض
للحرارة، أو سواها. قلل من المعتاد. تحدث مع طبيبك للحصول على مزيد من التعليمات.
توقف عن تناول غليكوجان وعلى الفور اتصل بطبيبك أو باقرص مستشفى إذا كنت تعاني
من أعراض الحماض اللبني لأنه قد يؤدي إلى غيبوبة.

تشمل أعراض الحماض اللبني:

- القيء
- اضطراب في المعدة (الأم في البطن)
- تقلصات العضلات
- الشعور بالعدم الراحة مرتبطة بتعب كبير
- صعوبة في التنفس
- انخفاض درجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب
- الحماض اللبني حالة طوارئ طبية يجب معالجتها في المستشفى
- إذا اضطرت إلى إجراء عملية جراحية، تحدث مع طبيبك قبل تناول غليكوجان في
- سوف يقرر طبيبك متى توقف وتتأكد من أنك باستخدام غليكوجان.
- واحدة وحده لا يسبب انخفاض معدل السكر في الدم، لكن، إذا تناولت غليكوجان في
- نفس الوقت مع أدوية أخرى لخفض السكر والتي قد تؤدي إلى انخفاض معدل السكر في
- الدم (مثل المساقمات لخفض معدل السكر في الدم، الإنسولين، المغليتينيدات، هناك
- انخفاض معدل السكر في الدم. إذا أحسست أعراض انخفاض معدل السكر في
- الدم، مثل الشعور بالوهن، الدوخة، زيادة تصبب العرق، تسارع نظم القلب، اضطرابات
- بصرية، صعوبة التركيز الذهني، فإن شرب أو أكل شيء ما يحتوي على سكر قد يساعدك
- على تخفيف وإزالة الانسداد بالأنسولين.
- أثناء فترة العلاج بـ غليكوجان، سيقيم طبيبك بفحص مستويات الكلى مرة واحدة على الأقل
- سنوياً أو أكثر بشكل متكرر إذا كنت مصاباً / و / وذو وظائف الكلى.
- الاطباء لا ينطبق.

معلومات عن سواها لها تأثير ملحوظ لا ينطبق.

تناول أو استعمال أدوية أخرى

إذا كنت مقبلاً على حقن وعائي من مادة مائية تحتوي على البود، مثلاً لفحص الأشعة
أو بالسكر، إذا لزم إيقاف تناول غليكوجان قبل وبعد الحقن. سوف يقرر طبيبك متى يجب
التوقف واستئناف تناول غليكوجان.

عليك إعلام الطبيب إذا كنت تتناول، تناولت مؤخراً أو من الممكن أن تتناول أي دواء. عندئذ
قد تحتاج إلى إجراء اختبارات جلوكوز أكثر بشكل متكرر أو اختبارات وظائف الكلى وقد
يكون يجب أن يضبط طبيبك الجرعة.

من المهم وصفة طبية الإعلام عن الأدوية التالية
• الأدوية التي تزيد من كمية البول (مدرات البول).
• الأدوية المستخدمة لعلاج الألم والتهابات مثل (مضادات التهابات خاصة التهابات الحادة للبرد أو الربو).
• مثبطات كوكس-2، إيبوبروفين و سيليكوكسيب.
• بعض الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم (مثبطات ECA ومضادات مستقبلات
الأندوستينين II)

• ضادات المستقبلات بيتا-2 الأدرينالية مثل سالبوتامول أو تريوباتين (التي تستخدم لعلاج الربو)،
• كورتيكوستيرويدات (المستخدمة لعلاج مختلف الإعتلالات خاصة التهابات الحادة للبرد أو الربو).
• الأدوية التي قد تؤثر على كيفية الجليكوجان في الدم، وخاصة إذا كنت وظائف الكلى
متدهنة (مثل فيرأابام، ريفاميسين، سيمندين، دولوفيراغفير، رانولازين، تريموثيوم،
فانديباتين، إيزوفلوكلوراز، كروزيتيب و أوباربين)

• الأدوية أخرى مستعملة لعلاج السكري.

غليكوجان مع السكر

تجنب الإفراط في استهلاك الكحول مع الأخذ غليكوجان لأن هذا قد يزيد من خطر الحماض
اللبني (انظر التحذيرات وقسم الاحتياطات).

الحمل والإرضاع

معرض مغلف

مميزات المتقورمين

• يمكن استخدامها قبل تناول هذا الدواء.
• قد يحتاج لقراءتها من جديد.

• إذا كان لديك شك، اطلب المزيد من المعلومات عن الطبيب

• حتى ولو كانت لديه نفس
• إذا كنت لا تعرف، اسأل
• إذا كنت لا تعرف، اسأل
• إذا كنت لا تعرف، اسأل

على ماذا تحتوي هذه الفشرة

- 1- ما هو غليكوجان ، قرص مغلف وما هي حالات استعماله؟
- 2- ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول غليكوجان ، قرص مغلف؟
- 3- ما هي طريقة تناول غليكوجان ، قرص مغلف؟
- 4- ما هي التحذيرات عن الرغبة المحتملة؟
- 5- ما هي طريقة حفظ غليكوجان ، قرص مغلف؟
- 6- محتويات العلبة و معلومات إضافية.

1- ما هو غليكوجان ، قرص مغلف وما هي حالات استعماله؟

الصف الصيدلي العلاجي A10BA02 code ATC

دواعي الاستعمال:

يحتوي غليكوجان على مقنن، إنه دواء مستعمل لعلاج السكري. ينتمي إلى فئة الأدوية
المسماة بـغوانيد.
الإنسولين هرمون ينتجه البنكرياس يسهم للحمص باستعادة كمية الجلوكوز (السكر)
المتواجد في الدم. يستخدم الجسم الجلوكوز لإنتاج الطاقة أو يخزنه لاستخدام لاحقاً.
عندما تقارب مريضاً بالسكري، لا ينتج البنكرياس كمية كافية أو جسمك
ليس قادراً على استخدام الإنسولين الذي ينتج بشكل صحيح. يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدل
الجلوكوز في الدم. يساعد غليكوجان على تخفيض معدل الجلوكوز في الدم حتى يصبح
المستوى أقرب ما يمكن من المستوى الطبيعي.
إذا كنت بالغاً وتناول من وزن زائد، من شأن ذلك تناول غليكوجان على المدى الطويل
للمساعدة على فقدان من خلال اضطرابات المصاحبة للسكري. يشرك غليكوجان بالاستقرار
في الوزن أو الحد من زيادة الوزن.

ما هي الحالات التي يستعمل فيها غليكوجان؟

يستعمل غليكوجان لعلاج السكري من النوع 2 (السكري ذلك "السكري غير المتوقف على
الإنسولين") عندما لا يسمح النظام الغذائي والتدريب البدني وحدهما بالتحكم بمعدل
الجلوكوز في الدم. ويستخدم بشكل خاص لدى المرضى الذين يعانون من زيادة الوزن.
يستعمل المرضى البالغون تناول غليكوجان وحده أو مع أدوية أخرى ضد السكري (أدوية
قابلة للبول أو إنسولين).

يستعمل الأطفال في سن العاشرة وما فوق والمراهقين تناول غليكوجان وحده أو مع
الإنسولين.

2- ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول غليكوجان ، قرص مغلف؟

مواعيد الاستعمال:

لا تتناول إذا كنت تعاني من الحالات التالية

• إذا كنت تعاني من الكلى (الضعف الوظيفي) تجاه المتقورمين أو أحد المكونات الأخرى
لهذا الدواء المتقورمين في الفقرة 6.

• إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى
• إذا كنت تعاني من سكري غير متحكم به، يصاحبه فقدان سكر الدم (ارتفاع حاد لمعدل
السكر في الدم) بصورة صافية، غثان، غثان، إسهال، فقدان سريع للوزن، حمض لبني
(انظر "خطر حمض لبني" أسفل) أو حمض كيتوني، الحماض الكيتوني إصابية تكون
في تركيز مواد في الدم تسمى "أحماض كيتونية" والذي من شأنه التسبب بسببات سكري
أولى. الأعراض في تشمل ألم في المعدة، تنفس سريع وعميق، الرغبة في النوم، نفس ذو
رائحة فاكهة غير معتادة.
• إذا فقدت كمية كبيرة من الماء (جفاف)، مثلاً على إثر إسهال مستمر أو حاد، أو إذا
تقيت عدة مرات على التوالي، في يؤدي الجفاف إلى مشاكل كيتونية من شأنها أن تعرضك
لخطر الحماض اللبني (انظر "تحذيرات واحتياطات").
• إذا كنت تعاني من التهاب حاد، مثل التهاب الرئتين أو القصبات، أو التهاب الكلى، قد
تؤدي الاصابات الحادة إلى مشاكل في الكلى من شأنها تعريض لخطر الحماض اللبني
(انظر "تنبيه" مع غليكوجان أدناه).

• إذا كنت تتناول علاجا من المضور القلبي الحاد أو إذا عانيت من وقت قريب من نوبة
قلبية، أو إذا كنت تعاني من قصور قلبي حاد في بعض الأدوية المدوية (مثل صمغ)، أو إذا
إذا كنت تعاني من صعوبات في التنفس، ذلك من شأنه أن يؤدي إلى نقص في إمداد
الأنسجة بالأكسجين، مما يعرضك لخطر الحماض اللبني (انظر "تحذيرات واحتياطات").

28,00

إذا كنت تستهلك بكثرة
الأنسولين عليك إحدى
• يجب استشارة الطبيب
• إذا كنت مقبلاً على الخط
• حقن مادة مائية تحتوي على
• إذا كنت مقبلاً على الخط
• يجب التوقف عن تناول
• الجراحة، يسفر الطبيب إذا
• أن تتبع بدقة تعليمات الطبيب
• يجب الانتباه مع غليكوجان

خطر الحماض اللبني

قد يسبب غليكوجان مضاعفة خطر الإصابة بحمض الحماض اللبني، خاصة إذا كانت
كثافتها لا تعادل بصورة صحيحة. كما أن خطر الحماض اللبني يزيد في حال وجود
سكري غير متحكم به، والتهابات شديدة أو انقطاع طويل عن الطعام. واستهلاك
المشروبات الكحولية والجفاف، والعمليات الجراحية الإضافية أدناه (وشاكل في الكبد وغيرها
من الحالات الطبية حيث يقل الأوكسجين على سبيل المثال، أمراض القلب الحادة).

إذا كان أي من هذه الحالات تنطبق عليك، اتصل بطبيبك للحصول على مزيد من التعليمات.
توقف عن تناول غليكوجان فوراً وقصيرة إذا كانت تعاني من مرض من المحتمل أن يكون مرتبطاً
بجفاف (فقدان مهم لسوائل الجسم) مثل القيء، الشديد، والإسهال، والحمى، والتعرض
للحرارة، أو سواها. قلل من المعتاد. تحدث مع طبيبك للحصول على مزيد من التعليمات.
توقف عن تناول غليكوجان وعلى الفور اتصل بطبيبك أو باقرص مستشفى إذا كنت تعاني
من أعراض الحماض اللبني لأنه قد يؤدي إلى غيبوبة.

وتشمل أعراض الحماض اللبني:

- القيء
- اضطراب في المعدة (الام في البطن)
- تقلصات العضلات
- الشعور بالعدم الراحة مرتبطة بتعب كبير
- صعوبة في التنفس
- انخفاض درجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب
- الحماض اللبني حالة طوارئ طبية يجب معالجتها في المستشفى
- إذا اضطرت إلى إجراء عملية جراحية، تحدث مع طبيبك عن تناول غليكوجان في وقت وبعد العملية.
- سوف يقرر طبيبك متى توقف وتتأكد من أنك باستخدام غليكوجان.
- واحدة وحده لا يسبب انخفاض معدل السكر في الدم، لكن، إذا تناولت غليكوجان في نفس الوقت مع أدوية أخرى لخفض السكر والتي قد تؤدي إلى انخفاض معدل السكر في الدم (مثل المساقمات لخفض معدل السكر في الدم، الإنسولين، الغليبتينات، هناك انخفاض معدل السكر في الدم. إذا أحسست أعراض انخفاض معدل السكر في الدم، مثل الشعور بالوهج، الدوخة، زيادة تصبب العرق، تسارع نظم القلب، اضطرابات بصرية، صعوبة التركيز الذهني، فإن شرب أو أكل شيء ما يحتوي على سكر قد يساعدك على تخفيف وزيادة الإحساس بالضحى.
- أثناء فترة العلاج بـ غليكوجان، سيقيم طبيبك بفحص مستويات الكلى مرة واحدة على الأقل سنوياً أو أكثر بشكل متكرر إذا كنت مصاباً / و / وبوظيفة وظائف الكلى.
- الاطباء لا ينطبق.

معلومات عن سواها لها تأثير ملحوظ لا ينطبق.

تناول أو استعمال أدوية أخرى

إذا كنت مقبلاً على حقن وعائي من مادة مائية تحتوي على البود، مثلاً لفحص الأشعة
بالسكان، أو إذا إيقاظ تناول غليكوجان قبل وبعد الحقن، سوف يقرر طبيبك متى يجب
التوقف واستئناف تناول غليكوجان.

عليك إعلام الطبيب إذا كنت تناول، تناولت مؤخراً أو من الممكن أن تتناول أي دواء. عندئذ
قد تحتاج إلى إجراء اختبارات جلوكوز أكثر بشكل متكرر أو اختبارات وظائف الكلى وقد
يكون يجب أن يضبط طبيبك الجرعة.

من المهم وصفة طبية الإعلام عن الأدوية التالية
• الأدوية التي تزيد من كمية البول (مدرات البول).
• الأدوية المستخدمة لعلاج الألم والتهابات مثل (مضادات التهابات خاصة التهابات الحادة للبرد أو الربو).
• مثبطات كوكس-2، إيبوبروفين و سيليكوكسيب.
• بعض الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم (مثبطات ECA ومضادات مستقبلات الأندوستينين II)
• حادات المستقبلات بيتا-2 الأدرينالية مثل سالبوتامول أو تريوباتين (التي تستخدم لعلاج الربو)،
• كورتيكوستيرويدات (المستخدمة لعلاج مختلف الإعتلالات خاصة التهابات الحادة للبرد أو الربو).
• الأدوية التي قد تؤثر على الجليكوجان في الدم، وخاصة إذا كنت وظائف الكلى
متدهدة (مثل فيراباميل، ريفاميسين، سيمندين، دولوفين، رانولازين، تريموثيم،
فانديباتين، إيزوفلوكلور، كروزيتيب و أوباريب)
• الأدوية أخرى مستعملة لعلاج السكري.

غليكوجان مع السكوال

تجنب الإفراط في استهلاك الكحول مع الأخذ غليكوجان لأن هذا قد يزيد من خطر الحماض
اللبني (انظر التحذيرات وقسم الاحتياطات).

الحمل والإرضاع

معرض مغلف

مميزات المتقورمين

• ملابها بانتباه قبل تناول هذا الدواء.
• قد تحتاج لقراءتها من جديد.

• إذا كان لديك شك، اطلب المزيد من المعلومات عن الطبيب

• أنت الذي تأخذ هذا الدواء ك شخصياً. لا تعطه أبداً لأحد سواك، حتى ولو كانت لديه نفس
المرض. تأخذ أحد الأجزاء من الرغوية أو إذا لاحظت تأثيراً غير مرغوب لم يرد ذكره في هذه
نشرة، عليك إعلام الطبيب أو الصيدلي به.

على ماذا تحتوي هذه النشرة

- 1- ما هو غليكوجان ، قرص مغلف وما هي حالات استعماله؟
- 2- ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول غليكوجان ، قرص مغلف؟
- 3- ما هي طريقة تناول غليكوجان ، قرص مغلف؟
- 4- ما هي التحذيرات عن الرغبة المحتملة؟
- 5- ما هي طريقة حفظ غليكوجان ، قرص مغلف؟
- 6- متبوتى العلية و معلومات إضافية.
- 7- ما هو غليكوجان ، قرص مغلف وما هي حالات استعماله؟

الصفحة الصيدلي العلاجي A10BA02 code ATC

دواعي الاستعمال:

يحتوي غليكوجان على مقننومين، إنه دواء مستعمل لعلاج السكري. ينتمي إلى فئة الأدوية

المسماة بـغوانيد.
الإنسولين هرمون ينتجه البنكرياس يسعمل للحمص باستعادة كمية الغلوكونز (السكر)
المتواجد في الدم. يستعمل الجسم الغلوكونز لإنتاج الطاقة أو يخزنه لاستخدامه لاحقاً.
عندما تقارب مريضاً بالسكري، لا ينتج البنكرياس لديك الإنسولين بكمية كافية أو جسمك
ليس قادراً على استخدام الإنسولين الذي ينتج بشكل صحيح. يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدل
الغلوكونز في الدم. يساعد غليكوجان على تخفيض معدل الغلوكونز في دمك حتى يصبح
المستوى أقرب ما يمكن من المستوى الطبيعي.

إذا كنت بالغاً وتناولت من وزن زائد، من شأن ذلك تناول غليكوجان على المدى الطويل
للمساعدة على فقدان من أخطار المضاعفات المصاحبة للسكري. يشرك غليكوجان بالاستقرار
في الوزن أو الحد من زيادة الوزن.

ما هي الحالات التي يستعمل فيها غليكوجان؟

يستعمل غليكوجان لعلاج السكري من النوع 2 (السكري ذلك "السكري غير المتوقف على
الإنسولين") عندما لا يسمح النظام الغذائي والتدريب البدني وحدهما بالتحكم بمعدل
الغلوكونز في الدم. ويستعمل بشكل خاص لدى المرضى الذين يعانون من زيادة الوزن.
يستعمل المرضى البالغون تناول غليكوجان وحده أو مع أدوية أخرى ضد السكري (أدوية
قابلة للبلع أو إنسولين).

يستعمل الأطفال في سن العاشرة وما فوق والمراهقين تناول غليكوجان وحده أو مع
الإنسولين.

2- ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول غليكوجان ، قرص مغلف؟

مواعيد الاستعمال:

لا تتناول أبداً غليكوجان في الحالات التالية

• إذا كنت تعاني من الكلى (الضعف العضلية المفرطة) تجاه المقننومين أو أحد المكونات الأخرى
لهذا الدواء المتوفرة في الفقرة 6.
• إذا كنت تعاني من مشاكل في الكبد
• إذا كنت تعاني من مرض حاد في وظائف الكلى
• إذا كنت تعاني من سكري غير متحكم به، يصاحبه فقدان سكر الدم (ارتفاع حاد لمعدل
السكر في الدم) بصورة صافية، غثيان، قيء، إسهال، فقدان سريع للوزن، حمض لبني
(انظر "خطر حمض لبني" أسفل) أو حمض كيتوني، الحمض الكيتوني إصابة تكمن
في تراكم مواد في الدم تسمى "أحماض كيتونية" والتي من شأنها التسبب بسببات سكري
أولى. الأعراض في شمل أن في المعدة، تنفس سريع وعميق، والرغبة في النوم، نفس ذو
رائحة فاكهة غير معتادة.

إذا فقدت كمية كبيرة من الماء (اجفاف)، مثلاً على إثر إسهال مستمر أو حاد، أو إذا
تقيت عدة مرات على التوالي، في يؤدي الجفاف إلى مشاكل كبرى من شأنها أن تعرضك
لخطر الحمض اللبني (انظر "تحذيرات واحتياطات").

توقف عن تناول غليكوجان في حالات التهاب الكلى، أو القصب، أو التهاب الكلىتين. قد
تؤدي الاصابات الحادة إلى مشاكل في الكلىتين من شأنها تعريض لخطر الحماض اللبني
(انظر "تنبيه" مع غليكوجان أدناه).

إذا كنت تتناول علاجاً ضد الفيروس القلبي الحاد أو إذا عانيت من وقت قريب من نوبة
قلبية، أو إذا كنت تعاني من قصور قلبي حاد في بعض الأدوية المدوية (مثل صمغ)، أو إذا
إذا كنت تعاني من معوقات في التنفس، ذلك من شأنه أن يؤدي إلى نقص في إمداد
الأنسجة بالأكسجين، مما يعرضك لخطر الحماض اللبني (انظر "تحذيرات واحتياطات").

28,00

إذا كنت تستهلك بكثرة
الأنسولين عليك إحدى
• يجب استشارة الطبيب
• إذا كنت مقبلاً على الخط
• حقن مادة مائية تحتوي على
• إذا كنت مقبلاً على الخط
• يجب التوقف عن تناول
• الجراحة، يسفر الطبيب إذا
• أن تتبع بدقة تعليمات الطبيب
• يجب الانتباه مع غليكوجان

خطر الحماض اللبني

قد يسبب غليكوجان مضاعفة خطر الإصابة بحمض الحماض اللبني، خاصة إذا كانت
كثافتها أو لضعف بصوره صحيحه. كما أن خطر الحماض اللبني يزيد في حال وجود
سكري غير متحكم به أو التهابات شديدة أو انقطاع طويل عن الطعام أو استهلاك
المشروبات الكحولية والجفاف أو العلاجات الإضافية أدناه (مثل شاي الكبد وغيرها
من الحالات الطبية حيث يقل الأوكسجين على سبيل المثال، أمراض القلب الحادة).

إذا كان أي من هذه الحالات تنطبق عليك، اتصل بطبيبك للحصول على مزيد من التعليمات.
توقف عن تناول غليكوجان فوراً وقصيرة إذا كانت تعاني من مرض من المحتمل أن يكون مرتبطاً
بجفاف (فقدان مهم لسوائل الجسم) مثل القيء، الشديد، والإسهال، والحمى، والتعرض
للحرارة، أو سائل أوائل أقل من المعتاد. تحدث مع طبيبك للحصول على مزيد من التعليمات.
توقف عن تناول غليكوجان وعلى الفور اتصل بطبيبك أو باقرص مستشفى إذا كنت تعاني
من أعراض الحماض اللبني لأنه قد يؤدي إلى غيبوبة.

وتشمل أعراض الحماض اللبني:

- القيء
- اضطراب في المعدة (الام في البطن)
- تقلصات العضلات
- الشعور بالعدم الراحة مرتبطة بتعب كبير
- صعوبة في التنفس
- انخفاض درجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب
- الحماض اللبني حالة طوارئ طبية يجب معالجتها في المستشفى
- إذا اضطرت إلى إجراء عملية جراحية، تحدث مع طبيبك عن تناول غليكوجان في وقت وبعد العملية.
- سوف يقرر طبيبك متى توقف وتتأكد من أنك باستخدام غليكوجان.
- واحدة وحده لا يسبب انخفاض معدل السكر في الدم، لكن، إذا تناولت غليكوجان في نفس الوقت مع أدوية أخرى لخفض السكر والتي قد تؤدي إلى انخفاض معدل السكر في الدم (مثل المساقمات لخفض معدل السكر في الدم، الإنسولين، الغليبتينات، هناك انخفاض معدل السكر في الدم. إذا أحسست أعراض انخفاض معدل السكر في الدم، مثل الشعور بالوهن، الدوخة، زيادة تصبب العرق، تسارع نظم القلب، اضطرابات بصرية، صعوبة التركيز الذهني، فإن شرب أو أكل شيء ما يحتوي على سكر قد يساعدك على تخفيف وإزالة الانسجام بالأسبق.
- أثناء فترة العلاج بـ غليكوجان، سوف يقيم بعض وفحص الكلى مرة واحدة على الأقل سنوياً أو أكثر بشكل متكرر إذا كنت مصاباً / و / ودون وظائف الكلى.
- الاطباء لا ينطبق.

معلومات عن سواغات لها تأثير ملحوظ لا ينطبق.

تناول أو استعمال أدوية أخرى

إذا كنت مقبلاً على حقن وعاني من مادة مائية تحتوي على البود، مثلاً لفحص الأشعة
أو البكالن، إذا لاقى تناول غليكوجان قبل وبعد الحقن، سوف يقرر طبيبك متى يجب
التوقف واستئناف تناول غليكوجان.

عليك إعلام الطبيب إذا كنت تتناول، تناولت مؤخراً أو من الممكن أن تتناول أي دواء. عندئذ
قد تحتاج إلى إجراء اختبارات جلوكوز أكثر بشكل متكرر أو اختبارات وظائف الكلى وقد
يكون يجب أن يضبط طبيبك الجرعة.

من المهم وصفه طبيبك بالاعلام عن الأدوية التالية
• الأدوية التي تزيد من كمية البول (مدرات البول).
• الأدوية المستخدمة لعلاج الألم والالتهاب مثل (مضادات التهابات خاصة التهابات الحادة للبرد أو الربو).
• مثبطات كوكس-2، إيبوبروفين و سيليكوكسيب.
• بعض الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم (مثبطات ECA ومضادات مستقبلات الأندوستين (A)
• حادات المستقبلات بيتا-2 الأدرينالية مثل سالبوتامول أو تريوباتين (التي تستخدم لعلاج الربو)،
• كورتيكوستيرويدات (المستخدمة لعلاج مختلف الإعتلالات خاصة التهابات الحادة للبرد أو الربو).
• الأدوية التي قد تؤثر على الكلى (الجلوكوكورتيكويد)، وخاصة إذا كنت وظائف الكلى
متدهنة (مثل فيروس ابهام، ريقاميسين، ستيميتدين، ديلوفيرافير، رانولازين، تريموثيم،
فانديباتين، إيزافوكريزول، كروزيتيب و أوباريب)
• الأدوية أخرى مستعملة لعلاج السكري.

غليكوجان مع الكحول

تجنب الإفراط في استهلاك الكحول مع الأخذ غليكوجان لأن هذا قد يزيد من خطر الحماض
اللبني (انظر التحذيرات وقسم الاحتياطات).

الحمل والإرضاع

معرض مغلف

تعليمات المتقورمين

تعليمات متقورمين قبل تناول هذا الدواء.

قد تحتاج لقراءتها من جديد.

في أسئلة أخرى، إذا كان لديك شك، اسأل طبيبك عن المعلومات عن الطبيب

الذي سألتي الدواء لك شخصياً. لا تعطه أبداً لأحد سواك، حتى ولو كانت لديه نفس

الحالة. قد يكون أحد الأشخاص غير المرغوب إذا لاحظت تأثيراً غير مرغوب لم يرد ذكره في هذه

نشرة، عليك إعلام الطبيب أو الصيدلي به.

على ماذا تحتوي هذه النشرة

- 1- ما هو غليكوجان ، قرص مغلف وما هي حالات استعماله؟
- 2- ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول غليكوجان ، قرص مغلف؟
- 3- ما هي طريقة تناول غليكوجان ، قرص مغلف؟
- 4- ما هي التحذيرات غير المرغوبة المحتملة؟
- 5- ما هي طريقة حفظ غليكوجان ، قرص مغلف؟
- 6- متبوتى العلية و معلومات إضافية.
- 7- ما هو غليكوجان ، قرص مغلف وما هي حالات استعماله؟

الصف الصيدلي العلاجي A10BA02 code ATC

دواعي الاستعمال:

يحتوي غليكوجان على مقنن، إنه دواء مستعمل لعلاج السكري. ينتمي إلى فئة الأدوية
المساوية بغوانيد.

الإنسولين هرمون ينتجه البنكرياس يسهم للحمض باستعادة كمية الجلوكوز (السكر)
المتواجد في الدم. يستخدم الجسم الجلوكوز لإنتاج الطاقة أو يخزنه لاستخدامه لاحقاً.
عندما تقاوم مرضياً بالسكري، لا ينتج البنكرياس كمية كافية أو جسمك
ليس قادراً على استخدام الإنسولين الذي ينتج بشكل صحيح. يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدل
الجلوكوز في الدم. يساعد غليكوجان على تخفيض معدل الجلوكوز في الدم حتى يصبح
المستوى أقرب ما يمكن من المستوى الطبيعي.

إذا كنت بالغاً وتناولت من وزن زائد، يجب ذلك تناول غليكوجان على المدى الطويل
للمساعدة على فقدان من أخطار المضاعفات المصاحبة للسكري. يشرك غليكوجان بالاستقرار
في الوزن أو الحد من زيادة الوزن.

ما هي الحالات التي يستعمل فيها غليكوجان؟

يستعمل غليكوجان لعلاج السكري من النوع 2 (السكري ذلك "السكري غير المتوقف على
الإنسولين") عندما لا يسمح النظام الغذائي والتدريب البدني وحدهما بالتحكم بمعدل
الجلوكوز في الدم. ويستخدم بشكل خاص لدى المرضى الذين يعانون من زيادة الوزن.
يستعمل المرضى البالغون تناول غليكوجان وحده أو مع أدوية أخرى ضد السكري (أدوية
قابلة للبول أو إنسولين).

يستعمل الأطفال في سن العاشرة وما فوق والمراهقين تناول غليكوجان وحده أو مع
الإنسولين.

2- ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول غليكوجان ، قرص مغلف؟

مواعيد الاستعمال:

لا تتناول إذا كنت تعاني من الحالات التالية

• إذا كنت تعاني من الكلى (الضعف الوظيفي) تجاه المتقورمين أو أحد المكونات الأخرى
لهذا الدواء المتقورمين في الفقرة 6.

إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى

• إذا كنت تعاني من سكري غير متحكم به، يصبح خطراً فلا سكر الدم (ارتفاع حاد لمعدل
السكر في الدم) بصورة صافية، غثيان، إسهال، فقدان سريع للوزن، حمض لبني
(انظر "خطر حمض لبني" أسفل) أو حمض كيتوني، الحماض الكيتوني إصابية تكون
في تركيز مواد في الدم تسمى "أحماض كيتونية" والذي من شأنه التسبب بسببات سكري
أولى. الأعراض في تشمل ألم في المعدة، تنفس سريع وعميق، الرغبة في النوم، نفس ذو
رائحة فاكهة غير معتادة.

إذا فقدت كمية كبيرة من الماء (جفاف)، مثلاً على إثر إسهال مستمر أو حاد، أو إذا
تقيت عدة مرات على التوالي، في يؤدي الجفاف إلى مشاكل كبرى من شأنها أن تعرضك
لخطر الحماض اللبني (انظر "تحذيرات واحتياطات").

إذا كنت تعاني من التهاب حاد، مثل التهاب الرئتين أو القصب، أو التهاب الكلى، قد
تؤدي الالتهابات الحادة إلى مشاكل في الكلى من شأنها تعريض لخطر الحماض اللبني
(انظر "تنبيه" مع غليكوجان أدناه).

إذا كنت تتناول علاجاً ضد الحماض القلبي الحاد أو إذا عانيت من وقت قريب من نوبة
قلبية، أو إذا كنت تعاني من قصور قلبي حاد في بعض الأدوية المدوية (مثل صمغ)، أو إذا
إذا كنت تعاني من معوقات في التنفس، ذلك من شأنه أن يؤدي إلى نقص في إمداد
الأنسجة بالأكسجين، مما يعرضك لخطر الحماض اللبني (انظر "تحذيرات واحتياطات").

28,00

إذا كنت تستهلك بكثرة
الأنسولين عليك إحدى
• يجب استشارة الطبيب
• إذا كنت مقبلاً على الخط
• حقن مادة مائية تحتوي على
• إذا كنت مقبلاً على الخط
• يجب التوقف عن تناول
• الجراحة، يسفر الطبيب إذا
• أن تتبع بدقة تعليمات الطبيب
• يجب الانتباه مع غليكوجان

خطر الحماض اللبني

قد يسبب غليكوجان مضاعفة خطر خطورة تسمي الحماض اللبني، خاصة إذا كانت
كثباتاً لا تعالج بصورة صحيحة. كما أن خطر الحماض اللبني يزيد في حال وجود
سكري غير متحكم به، والتهابات شديدة أو انقطاع طويل عن الطعام واستهلاك
المشروبات الكحولية والجفاف، والظروف المعوية الإضافية أدناه (مثل مشاكل في الكبد وغيرها
من الحالات الطبية حيث يقل الأوكسجين على سبيل المثال، أمراض القلب الحادة).

إذا كان أي من هذه الحالات تنطبق عليك، اتصل بطبيبك للحصول على مزيد من التعليمات.
توقف عن تناول غليكوجان فوراً وقصيرة إذا كانت تعاني من مرض من المحتمل أن يكون مرتبطاً
بجفاف (فقدان مهم لسوائل الجسم) مثل القيء، الشديد، والإسهال، والحمى، والتعرض
للحرارة، أو سواها. قلل من المعتاد. تحدث مع طبيبك للحصول على مزيد من التعليمات.
توقف عن تناول غليكوجان وعلى الفور اتصل بطبيبك أو باقرص مستشفى إذا كنت تعاني
من أعراض الحماض اللبني لأنه قد يؤدي إلى غيبوبة.

وتشمل أعراض الحماض اللبني:

- القيء
- اضطراب في المعدة (الام في البطن)
- تقلصات العضلات
- الشعور بالعدم الراحة مرتبطة بتعب كبير
- صعوبة في التنفس
- انخفاض درجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب
- الحماض اللبني حالة طوارئ طبية يجب معالجتها في المستشفى
- إذا اضطرت إلى إجراء عملية جراحية، تحدث مع طبيبك قبل تناول غليكوجان في
- سوف يقرر طبيبك متى توقف وتتأكد من أنك باستخدام غليكوجان.
- واحدة وحده لا يسبب انخفاض معدل السكر في الدم، لكن، إذا تناولت غليكوجان في
- نفس الوقت مع أدوية أخرى لعلاج السكري والتي قد تؤدي إلى انخفاض معدل السكر في
- الدم (مثل المساقمات لمعدل السكر في الدم، الإينولين، المغليتينيدات، هناك
- انخفاض معدل السكر في الدم. إذا أحسست أعراض انخفاض معدل السكر في
- الدم، مثل الشعور بالوهن، الدوخة، زيادة تصبب العرق، تسارع نظم القلب، اضطرابات
- بصرية، صعوبة التركيز الذهني، فإن شرب أو أكل شيء ما يحتوي على سكر قد يساعدك
- على تخفيف وزيادة الإحساس بالضحى.
- أثناء فترة العلاج بـ غليكوجان، سيقيم طبيبك بعض وظائف الكلى مرة واحدة على الأقل
- سنوياً أو أكثر بشكل متكرر إذا كنت مصاباً / و / وبذرة وظائف الكلى.
- الاطباء لا ينطبق.

معلومات عن سواها لها تأثير ملحوظ لا ينطبق.

تناول أو استعمال أدوية أخرى

إذا كنت مقبلاً على حقن وعاني من مادة مائية تحتوي على البود، مثلاً لفحص الأشعة
أو البكالن، إذا لزم إيقاف تناول غليكوجان قبل وبعد الحقن. سوف يقرر طبيبك متى يجب
التوقف واستئناف تناول غليكوجان.

عليك إعلام الطبيب إذا كنت تتناول، تناولت مؤخراً أو من الممكن أن تتناول أي دواء. عندئذ
قد تحتاج إلى إجراء اختبارات جلوكوز أكثر بشكل متكرر أو اختبارات وظائف الكلى وقد
يكون يجب أن يضبط طبيبك الجرعة.

من المهم معرفة طبيبك على الأعلام عن الأدوية التالية
• الأدوية التي تزيد من كمية البول (مدرات البول).
• الأدوية المستخدمة لعلاج الألم والتهابات مثل (مضادات التهابات خاصة التهابات الحادة للبرد أو الربو).
• مثبطات كوكس-2، إيبوبروفين و سيليكوكسيب.
• بعض الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم (مثبطات ECA ومضادات مستقبلات
الأينوتروبيين A)
• حذارت المستقبلات بيتا-2 الأدرينالية مثل سالبوتامول أو تريوباتين (التي تستخدم لعلاج الربو)،
• كورتيكوستيروئيد (المستخدم لعلاج مختلف الإعتلالات خاصة التهابات الحادة للبرد أو الربو).
• الأدوية التي قد تؤثر على كيفية الجليكوجان في الدم، وخاصة إذا كنت وظائف الكلى
متدهنة (مثل فيروس ابهام، ريفامبين، سيمندين، دولوفيراغفير، رانولازين، تريموثيوم،
فانديباتين، إيزوفلوكلوراز، كروزيتيب و أوباريب)
• الأدوية أخرى مستعملة لعلاج السكري.

غليكوجان مع الكحول

تجنب الإفراط في استهلاك الكحول مع الأخذ غليكوجان لأن هذا قد يزيد من خطر الحماض
اللبني (انظر التحذيرات وقسم الاحتياطات).

الحمل والإرضاع

معرض مغلف

تعليمات المتقورمين

تعليمات متقورمين
• يجب اتباع تعليمات لقراءتها من جديد.
• إذا كان لديك شك، اسأل طبيبك.

عليك إبقاء الدواء لك شخصياً. لا تعطه أبداً لأحد سواك، حتى ولو كانت لديه نفس
المرض الذي لديك، لأن ذلك قد يسبب له الضرر.
• تأكد من إبقاء الدواء في الحاوية التي أتت بها. لا تلاحظ تأثيراً غير مرغوب له يرد ذكره في هذه
الشرة، عليك إعلام الطبيب أو الصيدلي به.

على ماذا تحتوي هذه الشرة

- 1 - ما هو غليكوجان ، قرص مغلف وما هي حالات استعماله؟
- 2 - ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول غليكوجان ، قرص مغلف؟
- 3 - ما هي طريقة تناول غليكوجان ، قرص مغلف؟
- 4 - ما هي التحذيرات غير المرغوبة المحتملة؟
- 5 - ما هي طريقة حفظ غليكوجان ، قرص مغلف؟
- 6 - محتويات العلبة و معلومات إضافية.

1 - ما هو غليكوجان ، قرص مغلف وما هي حالات استعماله؟

الصفحة الصيدلي العلاجي A10BA02 code ATC

دواعي الاستعمال:

يحتوي غليكوجان على مقنن، إنه دواء مستعمل لعلاج السكري. ينتمي إلى فئة الأدوية
المساوية بغوانيد.
الإنسولين هرمون ينتجه البنكرياس يسهم للجسم باستعادة كمية الجلوكوز (السكر)
المتواجد في الدم. يستخدم الجسم الجلوكوز لإنتاج الطاقة أو يخزنه لاستخدام لاحقاً.
عندما تقاوم مرضياً بالسكري، لا ينتج البنكرياس كمية كافية أو جسمك
ليس قادراً على استخدام الإنسولين الذي ينتج بشكل صحيح. يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدل
الجلوكوز في الدم. يساعد غليكوجان على تخفيض معدل الجلوكوز في الدم حتى يصبح
المستوى أقرب ما يمكن من المستوى الطبيعي.
إذا كنت بالغاً وتناول من وزن زائد، يجب ذلك تناول غليكوجان على المدى الطويل
للمساعدة على فقدان من أخطار المضاعفات المصاحبة للسكري. يشرك غليكوجان بالاستقرار
في الوزن أو الحد من زيادة الوزن.

ما هي الحالات التي يستعمل فيها غليكوجان؟

يستعمل غليكوجان لعلاج السكري من النوع 2 (السكري ذلك "السكري غير المتوقف على
الإنسولين") عندما لا يسمح النظام الغذائي والتدريب البدني وحدهما بالتحكم بمعدل
الجلوكوز في الدم. ويستعمل بشكل خاص لدى المرضى الذين يعانون من زيادة الوزن.
يستعمل المرضى البالغون تناول غليكوجان وحده أو مع أدوية أخرى ضد السكري (أدوية
قابلة للبول أو إنسولين).
يستعمل الأطفال في سن العاشرة وما فوق والمراهقين تناول غليكوجان وحده أو مع
الإنسولين.

2 - ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول غليكوجان ، قرص مغلف؟

مواعيد الاستعمال:

لا تتناول أبداً غليكوجان في الحالات التالية
إذا كنت تعاني من أي أوعية (الخصاسية المفرطة) تجاه المتقورمين أو أحد المكونات الأخرى
لهذا الدواء المتقورمين في الفقرة 6.

إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى

إذا كنت تعاني من سكري غير متحكم به، يصبح خطراً فلا سكر الدم (ارتفاع حاد لمعدل
السكر في الدم) بصورة صارية، غثيان، قيء، إسهال، فقدان سريع للوزن، حمض لبني
(انظر "خطر حمض لبني" أسفل) أو حمض كيتوني، الحماض الكيتوني إصابية تكون
في تركيز مواد في الدم تسمى "أحماض كيتونية" والذي من شأنه التسبب بسببات سكري
أولى. الأعراض في شمل أن في المعدة، تنفس سريع وعميق، الرغبة في النوم، نفس ذو
رائحة فاكهة غير معتادة.

إذا فقدت كمية كبيرة من الماء (جفاف)، مثلاً على إثر إسهال مستمر أو حاد، أو إذا
تقيت عدة مرات على التوالي، في يؤدي الجفاف إلى مشاكل كيميائية من شأنها أن تعرضك
لخطر الحماض اللبني (انظر "تحذيرات واحتياطات").

إذا كنت تعاني من التهاب حاد، مثل التهاب الرئتين أو القصبات، أو التهاب الكلى، قد
تؤدي الالتهابات الحادة إلى مشاكل في الكلى من شأنها تعريض لخطر الحماض اللبني
(انظر "تنبيه" مع غليكوجان أدناه).

إذا كنت تتناول علاجاً ضد الفيروس القلبي الحاد أو إذا عانيت من وقت قريب من نوبة
قلبية، أو إذا كنت تعاني من مشاكل حادة في ما يخص الدورة الدموية (مثل صدمة)، أو إذا
إذا كنت تعاني من معوقات في التنفس، ذلك من شأنه أن يؤدي إلى نقص في إمداد
الأنسجة بالأكسجين، مما يعرضك لخطر الحماض اللبني (انظر "تحذيرات واحتياطات").

28,00

إذا كنت تستهلك بكثرة
الأنسولين عليك إحدى
• يجب استشارة الطبيب
• إذا كنت مقبلاً على الخط
• حقن مادة مائية تحتوي على
• إذا كنت مقبلاً على الخط
• يجب التوقف عن تناول
• الجراحة، يسفر الطبيب إذا
• أن تتبع بدقة تعليمات الطبيب
• يجب الانتباه مع غليكوجان

خطر الحماض اللبني

قد يسبب غليكوجان مضاعفة خطر الإصابة بحمض الحماض اللبني، خاصة إذا كانت
كثباتاً لا تعالج بصورة صحيحة. كما أن خطر الحماض اللبني يزيد في حال وجود
سكري غير متحكم به، والتهابات شديدة أو انقطاع طويل عن الطعام واستهلاك
المشروبات الكحولية والجفاف، وانخفاض مستويات الأنسولين (مثلما في الكبد وغيرها
من الحالات الطبية حيث يقل الأوكسين (على سبيل المثال، أمراض القلب الحادة).

إذا كان أي من هذه الحالات تنطبق عليك، اتصل بطبيبك للحصول على مزيد من التعليمات.
توقف عن تناول غليكوجان فوراً وقصيرة إذا كانت تعاني من مرض من المحتمل أن يكون مرتبطاً
بجفاف (فقدان مهم لسوائل الجسم) مثل القيء، الشديد، والإسهال، والحمى، والتعرض
للحرارة، أو سواها. قلل من المعتاد. تحدث مع طبيبك للحصول على مزيد من التعليمات.
توقف عن تناول غليكوجان وعلى الفور اتصل بطبيبك أو باقرص مستشفى إذا كنت تعاني
من أعراض الحماض اللبني لأنه قد يؤدي إلى غيبوبة.

وتشمل أعراض الحماض اللبني:

- القيء
- اضطراب في المعدة (الام في البطن)
- تقلصات العضلات
- الشعور بالعدم الراحة مرتبطة بتعب كبير
- صعوبة في التنفس
- انخفاض درجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب
- الحماض اللبني حالة طوارئ طبية يجب معالجتها في المستشفى
- إذا اضطرت إلى إجراء عملية جراحية، تحدث مع طبيبك عن تناول غليكوجان في وقت وبعد العملية.
- سوف يقرر طبيبك متى توقف وتتأكد من أنك باستخدام غليكوجان.
- واحدة وحده لا يسبب انخفاض معدل السكر في الدم، لكن، إذا تناولت غليكوجان في
نفس الوقت مع أدوية أخرى لخفض السكر والتي قد تؤدي إلى انخفاض معدل السكر في
الدم (مثل المساقمات لخفض معدل السكر في الدم، الإنسولين، المغليتينيدات، هناك
انخفاض معدل السكر في الدم. إذا أحسست أعراض انخفاض معدل السكر في
الدم، مثل الشعور بالوهن، الدوخة، زيادة تصبب العرق، تسارع نظم القلب، اضطرابات
بصرية، صعوبة التركيز الذهني، فإن شرب أو أكل شيء ما يحتوي على سكر قد يساعدك
على تخفيف وزيادة الإحساس بالضحى.
- أثناء فترة العلاج بـ غليكوجان، سيقيم طبيبك بعض وظائف الكلى مرة واحدة على الأقل
سبباً أو أكثر بشكل متكرر كل 48 ساعة و / أو صورة وظائف الكلى.
- الاطباء لا ينطبق.

معلومات عن سواها لها تأثير ملحوظ لا ينطبق.

تناول أو استعمال أدوية أخرى

إذا كنت مقبلاً على حقن وعائي من مادة مائية تحتوي على البود، مثلاً للحصن بالأسعة
أو بالسكر، إذا لزم إيقاظ تناول غليكوجان قبل وبعد الحقن. سوف يقرر طبيبك متى يجب
التوقف واستئناف تناول غليكوجان.

عليك إعلام الطبيب إذا كنت تتناول، تناولت مؤخراً أو من الممكن أن تتناول أي دواء. عندئذ
قد تحتاج إلى إجراء اختبارات جلوكوز أكثر بشكل متكرر أو اختبارات وظائف الكلى وقد
يكون يجب أن يضبط طبيبك الجرعة.

من المهم وصفة طبية الإعلام عن الأدوية التالية
• الأدوية التي تزيد من كمية البول (مدرات البول).
• الأدوية المستخدمة لعلاج الألم والتهابات مثل (مضادات التهابات غير الستيرويدية أو
مثبطات كوكس-2، أيبوبروفين و سيليكوكسيب).
• بعض الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم (مثبطات ECA ومضادات مستقبلات
الأندوستينين II)
• ضادات المستقبلات بيتا-2 الأدرينالية مثل سالبوتامول أو تريوباتين (التي تستخدم لعلاج الربو)،
• كورتيكوستيرويدات (المستخدمة لعلاج مختلف الإعتلالات خاصة التهابات الحادة للحد أو الربو).
• الأدوية التي قد تؤثر على الجليكوجان في الدم، وخاصة إذا كنت وظائف الكلى
متدهدة (مثل فيراباميل، ريفاميسين، سميثينين، ديلوفينافير، رانولازين، تريموثيم،
فانديباتين، إيزافوكازول، كروزيتيب و أوباريب)
• الأدوية أخرى مستعملة لعلاج السكري.

غليكوجان مع الكحول

تجنب الإفراط في استهلاك الكحول مع الأخذ غليكوجان لأن هذا قد يزيد من خطر الحماض
اللبني (انظر التحذيرات وقسم الاحتياطات).

الحمل والإرضاع

معرض مغلف

مميزات المتقورمين

• يمكن استخدامها قبل تناول هذا الدواء.

• قد يحتاج لقراءتها من جديد.

• إذا كان لديك شك، اطلب المزيد من المعلومات عن الطبيب

• حتى ولو كانت لديه نفس

• إذا كان لديك شك، اطلب المزيد من المعلومات عن الطبيب

• إذا كان لديك شك، اطلب المزيد من المعلومات عن الطبيب

• إذا كان لديك شك، اطلب المزيد من المعلومات عن الطبيب

• إذا كان لديك شك، اطلب المزيد من المعلومات عن الطبيب

• إذا كان لديك شك، اطلب المزيد من المعلومات عن الطبيب

• إذا كان لديك شك، اطلب المزيد من المعلومات عن الطبيب

• إذا كان لديك شك، اطلب المزيد من المعلومات عن الطبيب

• إذا كان لديك شك، اطلب المزيد من المعلومات عن الطبيب

• إذا كان لديك شك، اطلب المزيد من المعلومات عن الطبيب

• إذا كان لديك شك، اطلب المزيد من المعلومات عن الطبيب

• إذا كان لديك شك، اطلب المزيد من المعلومات عن الطبيب

• إذا كان لديك شك، اطلب المزيد من المعلومات عن الطبيب

• إذا كان لديك شك، اطلب المزيد من المعلومات عن الطبيب

• إذا كان لديك شك، اطلب المزيد من المعلومات عن الطبيب

• إذا كان لديك شك، اطلب المزيد من المعلومات عن الطبيب

• إذا كان لديك شك، اطلب المزيد من المعلومات عن الطبيب

• إذا كان لديك شك، اطلب المزيد من المعلومات عن الطبيب

• إذا كان لديك شك، اطلب المزيد من المعلومات عن الطبيب

• إذا كان لديك شك، اطلب المزيد من المعلومات عن الطبيب

• إذا كان لديك شك، اطلب المزيد من المعلومات عن الطبيب

• إذا كان لديك شك، اطلب المزيد من المعلومات عن الطبيب

• إذا كان لديك شك، اطلب المزيد من المعلومات عن الطبيب

• إذا كان لديك شك، اطلب المزيد من المعلومات عن الطبيب

• إذا كان لديك شك، اطلب المزيد من المعلومات عن الطبيب

• إذا كان لديك شك، اطلب المزيد من المعلومات عن الطبيب

• إذا كان لديك شك، اطلب المزيد من المعلومات عن الطبيب

• إذا كان لديك شك، اطلب المزيد من المعلومات عن الطبيب

• إذا كان لديك شك، اطلب المزيد من المعلومات عن الطبيب

• إذا كان لديك شك، اطلب المزيد من المعلومات عن الطبيب

• إذا كان لديك شك، اطلب المزيد من المعلومات عن الطبيب

• إذا كان لديك شك، اطلب المزيد من المعلومات عن الطبيب

• إذا كان لديك شك، اطلب المزيد من المعلومات عن الطبيب

• إذا كان لديك شك، اطلب المزيد من المعلومات عن الطبيب

• إذا كان لديك شك، اطلب المزيد من المعلومات عن الطبيب

• إذا كان لديك شك، اطلب المزيد من المعلومات عن الطبيب

• إذا كان لديك شك، اطلب المزيد من المعلومات عن الطبيب

• إذا كان لديك شك، اطلب المزيد من المعلومات عن الطبيب

• إذا كان لديك شك، اطلب المزيد من المعلومات عن الطبيب

• إذا كان لديك شك، اطلب المزيد من المعلومات عن الطبيب

• إذا كان لديك شك، اطلب المزيد من المعلومات عن الطبيب

28,00

إذا كنت تستهلك بكثرة
الأنسولين عليك إحدى
• يجب استشارة الطبيب
• إذا كنت مقبلاً على الخط
• حقن مادة مابينة تحتوي على
• إذا كنت مقبلاً على الخط
• يجب التوقف عن تناول
• الجراحة، يسفر الطبيب إذا
• أن تتبع بدقة تعليمات الطبيب
• يجب الانتباه مع غليكوجان

خطر الحماض اللبني

قد يسبب غليكوجان مضاعفة خطر الإصابة بحمض الحماض اللبني، خاصة إذا كانت
كثافتاً لا تعادل بصورة صحيحة. كما أن خطر الحماض اللبني يزيد في حال وجود
سكري غير متحكم به، والتهابات شديدة أو انقطاع طويل عن الطعام. واستهلاك
المشروبات الكحولية والجفاف، والعمليات الجراحية الإضافية أدناه (وشاكل في الكبد وغيرها
من الحالات الطبية حيث يقل الأوكسجين على سبيل المثال، أمراض القلب الحادة).

إذا كان أي من هذه الحالات تنطبق عليك، اتصل بطبيبك للحصول على مزيد من التعليمات.
توقف عن تناول غليكوجان فوراً وقصيرة إذا كانت تعاني من مرض من المحتمل أن يكون مرتبطاً
بجفاف (فقدان مهم لسوائل الجسم) مثل القيء، الشديد، والإسهال، والحمى، والتعرض
للحرارة، أو سواها. قلل من المعتاد. تحدث مع طبيبك للحصول على مزيد من التعليمات.
توقف عن تناول غليكوجان وعلى الفور اتصل بطبيبك أو باقرص مستشفى إذا كنت تعاني
من أعراض الحماض اللبني لأنه قد يؤدي إلى غيبوبة.

وتشمل أعراض الحماض اللبني:

- القيء
- اضطراب في المعدة (الأم في البطن)
- تقلصات العضلات
- الشعور بالعدم الراحة مرتبطة بتعب كبير
- صعوبة في التنفس
- انخفاض درجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب

الحماض اللبني حالة طوارئ طبية يجب معالجتها في المستشفى
إذا اضطرت إلى إجراء عملية جراحية، يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدل
سوف يقرر طبيبك متى توقف وتتأكد من أنك باستخدام غليكوجان.
وحدة لا يسبب انخفاض معدل السكر في الدم، لكن، إذا تناولت غليكوجان في
نفس الوقت مع أدوية أخرى لعلاج السكري والتي قد تؤدي إلى انخفاض معدل السكر في
الدم (مثل المساقمات) لمعدل السكر في الدم، الإسهال، الغثيثيات، هناك
خطر انخفاض معدل السكر في الدم. إذا أحسست بأعراض انخفاض معدل السكر في
الدم، مثل الشعور بالوهن، الدوخة، زيادة تصبب العرق، تسارع نظم القلب، اضطرابات
بصرية، صعوبة التركيز الذهني، فإن شرب أو أكل شيء ما يحتوي على سكر قد يساعدك
على تخفيف وزيادة الإحساس بالضحى.
إنشاء فترة العلاج بـ غليكوجان، سيؤمّن بضعف وبضعف الكلى مرة واحدة على الأقل
سنوات أو أكثر بشكل متكرر إذا كنت مصاباً / و / وذو وظائف الكلى.

معلومات عن سواها لها تأثير ملحوظ لا ينطبق.

تناول أو استعمال أدوية أخرى

إذا كنت مقبلاً على حقن وعائي من مادة مابينة تحتوي على البود، مثلاً للحصن بالأسعة
أو بالسكر، إذا لاقى تناول غليكوجان قبل وبعد الحقن، سوف يقرر طبيبك متى يجب
التوقف واستئناف تناول غليكوجان.
عليك إعلام الطبيب إذا كنت تتناول، تناولت مؤخراً أو من الممكن أن تتناول أي دواء. عندئذ
قد تحتاج إلى إجراء اختبارات جلوكوز أكثر بشكل متكرر أو اختبارات وظائف الكلى وقد
يكون يجب أن يضبط طبيبك الجرعة.

من المهم وصفه طبيبك بالاعلام عن الأدوية التالية
• الأدوية التي تزيد من كمية البول (مدرات البول).
• الأدوية المستخدمة لعلاج الألم والتهابات مثل (مضادات التهابات خاصة التهابات الحادة للبرد أو الربو).
• مثبطات كوكس-2، إيبوبروفين و سيليكوكسيب.
• بعض الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم (مثبطات ECA ومضادات مستقبلات
الأندوستينين II)

• ضادات المستقبلات بيتا-2 الأدرينية مثل ساليوتامول أو تريوباتين (التي تستخدم لعلاج الربو)،
• كورتيكوستيرويدات (المستخدمة لعلاج مختلف الإعتلالات خاصة التهابات الحادة للبرد أو الربو).
• الأدوية التي قد تؤثر على كيفية الجليكوجان في الدم، وخاصة إذا كنت وظائف الكلى
منخفضة (مثل فيرأباميل، ريفاميسين، سيمندين، ديلوفيرافير، رانولازين، تريموثيم،
فانديباتين، إيزوفلوكلوراز، كروتيتيب و أوباربين)

• الأدوية أخرى مستعملة لعلاج السكري.

غليكوجان مع استهلاك

تجنب الإفراط في تناول الكحول مع الأخذ غليكوجان لأن هذا قد يزيد من خطر الحماض
اللبني (انظر التحذيرات وقسم الاحتياطات).

الحمل والإرضاع

معرض مغلف

مميزات المتقورمين

• ملبأ بانتباه قبل تناول هذا الدواء.

• قد تحتاج لقراءتها من جديد.

• إذا كان لديك شك، اطلب المزيد من المعلومات عن الطبيب

• إن شاء الله، لك شخصياً. لا تعطه أبداً لأحد سواك، حتى ولو كانت لديه نفس
• إن شاء الله، لك شخصياً. لا تعطه أبداً لأحد سواك، حتى ولو كانت لديه نفس

على ماذا تحتوي هذه الفشرة

- 1- ما هو غليكوجان ، قرص مغلف وما هي حالات استعماله؟
- 2- ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول غليكوجان ، قرص مغلف؟
- 3- ما هي طريقة تناول غليكوجان ، قرص مغلف؟
- 4- ما هي التحذيرات عن الرغبة المحتملة؟
- 5- ما هي طريقة حفظ غليكوجان ، قرص مغلف؟
- 6- محتويات العلبة و معلومات إضافية.

1- ما هو غليكوجان ، قرص مغلف وما هي حالات استعماله؟

الصف الصيدلي العلاجي A10BA02 code ATC

دواعي الاستعمال:

يحتوي غليكوجان على مقننومين، إنه دواء مستعمل لعلاج السكري. ينتمي إلى فئة الأدوية
المساوية بغوانيد.

الإنسولين هرمون ينتجه البنكرياس يسهم للحسم باستعادة كمية الجلوكوز (السكر)
المتواجد في الدم. يستعمل الجسم الجلوكوز لإنتاج الطاقة أو يخزنه لاستخدامه لاحقاً.
عندما تقارب مريضاً بالسكري، لا ينتج البنكرياس كمية كافية أو جسمك
ليس قادراً على استخدام الإنسولين الذي ينتج بشكل صحيح. يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدل
الجلوكوز في الدم. يساعد غليكوجان على تخفيض معدل الجلوكوز في الدم حتى يصبح
المستوى أقرب ما يمكن من المستوى الطبيعي.
إذا كنت بالغاً وتناولت من وزن زائد، ينصح ذلك تناول غليكوجان على المدى الطويل
للمساعدة على فقدان من أخطار المضاعفات المصاحبة للسكري. يشرك غليكوجان بالاستقرار
في الوزن أو الحد من زيادة الوزن.

ما هي الحالات التي يستعمل فيها غليكوجان؟

يستعمل غليكوجان لعلاج السكري من النوع 2 (السكري ذلك "السكري غير المتوقف على
الإنسولين") عندما لا يسمح النظام الغذائي والتدريب البدني وحدهما بالتحكم بمعدل
الجلوكوز في الدم. ويستعمل بشكل خاص لدى المرضى الذين يعانون من زيادة الوزن.
يستعمل المرضى الباقون تناول غليكوجان وحده أو مع أدوية أخرى ضد السكري (أدوية
قابلة للبلع أو إنسولين).

يستعمل الأطفال في سن العاشرة وما فوق والمراهقين تناول غليكوجان وحده أو مع
الإنسولين.

2- ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول غليكوجان ، قرص مغلف؟

مواعيد الاستعمال:

لا تتناول أبداً غليكوجان في الحالات التالية

• إذا كنت تعاني من الكلى (الضعف العضلي المفرط) تجاه المقننومين أو أحد المكونات الأخرى
لهذا الدواء المتقورمين في الفقرة 6.

• إذا كنت تعاني من مشاكل في الكبد

• إذا كنت تعاني من سكري غير متحكم به، يصبح خطراً فلا سكر الدم (ارتفاع حاد لمعدل
السكر في الدم) بصورة صافية، غثيان، إسهال، فقدان سريع للوزن، حمض لبني
(انظر "خطر حمض لبني" أسفل) أو حمض كيتوني، الحمض الكيتوني إصابة تكمن
في تراكم مواد في الدم تسمى "أحماض كيتونية" والتي من شأنها التسبب بسببات سكري
أولى. الأعراض في تشمل ألم في المعدة، تنفس سريع وعميق، الرغبة في النوم، نفس ذو
رائحة فاكهة غير معتادة.

• إذا فقدت كمية كبيرة من الماء (اجفاف)، مثلاً على إثر إسهال مستمر أو حاد، أو إذا
تقيت عدة مرات على التوالي. في يؤدي الجفاف إلى مشاكل كبرى من شأنها أن تعرضك
لخطر الحمض اللبني (انظر "تحذيرات واحتياطات").

• إذا كنت تعاني من التهاب حاد، مثل التهاب الرئتين أو القصبات، أو التهاب الكلى. قد
تؤدي الالتهابات الحادة إلى مشاكل في الكلى من شأنها تعريض لخطر الحماض اللبني
(انظر "تنبيه" مع غليكوجان أدناه).

• إذا كنت تتناول علاجا من المقننومين القلبي الحاد أو إذا عانيت من وقت قريب من نوبة
قلبية، أو إذا كنت تعاني من قصور قلبي حاد في بعض الأدوية المدوية (مثل صمغ)، أو (ربو).
إذا كنت تعاني من معوقات في التنفس، ذلك من شأنه أن يؤدي إلى نقص في إمداد
الأنسجة بالأكسجين، مما يعرضك لخطر الحماض اللبني (انظر "تحذيرات واحتياطات").

دواء
نفس
مليات
المهم

28,00

إذا كنت تستهلك بكثرة
الأنسولين عليك إحدى
• يجب استشارة الطبيب
• إذا كنت مقبلاً على الخط
• حقن مادة مائية تحتوي على
• إذا كنت مقبلاً على الخط
• يجب التوقف عن تناول
• الجراحة، يسفر الطبيب إذا
• أن تتبع بدقة تعليمات الطبيب
• يجب الانتباه مع غليكوجان

خطر الحماض اللبني

قد يسبب غليكوجان مضاعفة خطر الإصابة بحمض الحماض اللبني، خاصة إذا كانت
كثافتك لا تعادل بصورة صحيحة. كما أن خطر الحماض اللبني يزيد في حال وجود
سكري غير متحكم به، والتهابات شديدة أو انقطاع طويل عن الطعام. واستهلاك
المشروبات الكحولية والجفاف وانخفاض مستويات الأنسولين (مثلما في الكبد وغيرها
من الحالات الطبية حيث يقل الأوكسين (على سبيل المثال، أمراض القلب الحادة).

إذا كان أي من هذه الحالات تنطبق عليك، اتصل بطبيبك للحصول على مزيد من التعليمات.
توقف عن تناول غليكوجان فوراً وقصيرة إذا كانت تعاني من مرض من المحتمل أن يكون مرتبطاً
بجفاف (فقدان مهم لسوائل الجسم) مثل القيء، الشديد، والإسهال، والحمى، والتعرض
للحرارة، أو سعال، أو فقدان للوعي. تحدث مع طبيبك للحصول على مزيد من التعليمات.
توقف عن تناول غليكوجان وعلى الفور اتصل بطبيبك أو باقرص مستشفى إذا كنت تعاني
من أعراض الحماض اللبني لأنه قد يؤدي إلى غيبوبة.

وتشمل أعراض الحماض اللبني:

- القيء
- اضطراب في المعدة (الام في البطن)
- تقلصات العضلات
- الشعور بالعدم الراحة مرتبطة بتعب كبير
- صعوبة في التنفس
- انخفاض درجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب
- الحماض اللبني حالة طوارئ طبية يجب معالجتها في المستشفى
- إذا اضطرت إلى إجراء عملية جراحية، تحدث مع طبيبك عن تناول غليكوجان في وقت وبعد العملية.
- سوف يقرر طبيبك متى توقف وتتأكد من أنك باستخدام غليكوجان.
- واحدة وحده لا يسبب انخفاض معدل السكر في الدم، لكن، إذا تناولت غليكوجان في نفس الوقت مع أدوية أخرى لخفض السكر والتي قد تؤدي إلى انخفاض معدل السكر في الدم (مثل المساقمات لخفض معدل السكر في الدم، الأنسولين، الغليبينيدات، هناك انخفاض معدل السكر في الدم. إذا أحسست أعراض انخفاض معدل السكر في الدم، مثل الشعور بالوهن، الدوخة، زيادة تصبب العرق، تسارع نظم القلب، اضطرابات بصرية، صعوبة التركيز الذهني، فإن شرب أو أكل شيء ما يحتوي على سكر قد يساعدك على تخفيف وإزالة الانسجام بالأسبق.
- أثناء فترة العلاج بـ غليكوجان، سيقيم طبيبك بفحص مستويات الكلى مرة واحدة على الأقل سنوياً أو أكثر بشكل متكرر إذا كنت مصاباً / و / وبوظيفة وظائف الكلى.
- الاطباء لا ينطبق.

معلومات عن سواغات لها تأثير ملحوظ لا ينطبق.

تناول أو استعمال أدوية أخرى

إذا كنت مقبلاً على حقن وعاني من مادة مائية تحتوي على البود، مثلاً لفحص الأشعة
أو البكالن، إذا لزم إيقاظ تناول غليكوجان قبل وبعد الحقن. سوف يقرر طبيبك متى يجب
التوقف واستئناف تناول غليكوجان.

عليك إعلام الطبيب إذا كنت تتناول، تناولت مؤخراً أو من الممكن أن تتناول أي دواء. عندئذ
قد تحتاج إلى إجراء اختبارات جلوكوز أكثر بشكل متكرر أو اختبارات وظائف الكلى وقد
يكون يجب أن يضبط طبيبك الجرعة.

من المهم وصفة طبية الإعلام عن الأدوية التالية
• الأدوية التي تزيد من كمية البول (مدرات البول).
• الأدوية المستخدمة لعلاج الألم والتهابات مثل (مضادات التهابات خاصة التهابات الحادة للبرد أو الربو).
• مثبطات كوكس-2، إيبوبروفين، سيليكوكسيب.
• بعض الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم (مثبطات ECA ومضادات مستقبلات الأنجيوتنسين II)
• حذارت المستقبلات بيتا-2 الأدرينالية مثل سالبوتامول أو تريوباتين (التي تستخدم لعلاج الربو)،
• كورتيكوستيرويدات (المستخدمة لعلاج مختلف الإعتلالات خاصة التهابات الحادة للبرد أو الربو).
• الأدوية التي قد تؤثر على كيفية الجليكوجان في الدم، وخاصة إذا كنت وظائف الكلى
متدهنة (مثل فيروس ابهام، ريفاميسين، ستيميتدين، دولوفين، رانولازين، تريموثيم،
فانديباتين، إيزوفلوكلوراز، كروزيتيب، وألوبيارب)
• الأدوية أخرى مستعملة لعلاج السكري.

غليكوجان مع الكحول

تجنب الإفراط في استهلاك الكحول مع الأخذ غليكوجان لأن هذا قد يزيد من خطر الحماض
اللبني (انظر التحذيرات وقسم الاحتياطات).

الحمل والإرضاع

المرص مغلف

تعليمات المتقورمين

• يجب عليك اختيار وقت تناول هذا الدواء.
• قد تحتاج لقراءتها من جديد.

• إذا كان لديك شك، اسأل طبيبك. الميزان من المعلومات
• إذا كنت تشخيصاً، لا تعطه أبداً لأحد سواك، حتى ولو كانت لديه نفس
• إذا كنت تشخيصاً، لا تعطه أبداً لأحد سواك، حتى ولو كانت لديه نفس

• إذا كنت تشخيصاً، لا تعطه أبداً لأحد سواك، حتى ولو كانت لديه نفس
• إذا كنت تشخيصاً، لا تعطه أبداً لأحد سواك، حتى ولو كانت لديه نفس

على ماذا تحتوي هذه الفشرة

- 1- ما هو غليكوجان ، قرص مغلف وما هي حالات استعماله؟
- 2- ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول غليكوجان ، قرص مغلف؟
- 3- ما هي طريقة تناول غليكوجان ، قرص مغلف؟
- 4- ما هي التحذيرات عن الرغبة المحتملة؟
- 5- ما هي طريقة حفظ غليكوجان ، قرص مغلف؟
- 6- محتويات العلبة و معلومات إضافية.
- 7- ما هو غليكوجان ، قرص مغلف وما هي حالات استعماله؟

الصف الصيدي للعلاج A10BA02 code ATC

دواعي الاستعمال:

يحتوي غليكوجان على مقنن، إنه دواء مستعمل لعلاج السكري. ينتمي إلى فئة الأدوية
المسماة بـغوانيد.

الأنسولين هرمون ينتجه البنكرياس يسهم للحمض باستعادة كمية الجلوكوز (السكر)
المتواجد في الدم. يستخدم الجسم الجلوكوز لإنتاج الطاقة أو يخزنه لاستخدام لاحقاً.
عندما تقارب مريضاً بالسكري، لا ينتج البنكرياس كمية كافية أو جسمك
ليس قادراً على استخدام الأنسولين الذي ينتج بشكل صحيح. يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدل
الجلوكوز في الدم. يساعد غليكوجان على تخفيض معدل الجلوكوز في الدم حتى يصبح
المستوى أقرب ما يمكن من المستوى الطبيعي.

إذا كنت بالغاً وتناولت من وزن زائد، من شأن ذلك تناول غليكوجان على المدى الطويل
للمساعدة على فقدان من أخطار المضاعفات المصاحبة للسكري. يشرك غليكوجان بالاستقرار
في الوزن أو الحد من زيادة الوزن.

ما هي الحالات التي يستعمل فيها غليكوجان؟

يستعمل غليكوجان لعلاج السكري من النوع 2 (السكري ذلك "السكري غير المتوقف على
الأنسولين") عندما لا يسمح النظام الغذائي والتدريب البدني وحدهما بالتحكم بمعدل
الجلوكوز في الدم. ويستخدم بشكل خاص لدى المرضى الذين يعانون من زيادة الوزن.
يستعمل المرضى الباقون تناول غليكوجان وحده أو مع أدوية أخرى ضد السكري (أدوية
قابلة للبول والأنسولين).

يستعمل الأطفال في سن العاشرة وما فوق والمراهقين تناول غليكوجان وحده أو مع
الأنسولين.

2- ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول غليكوجان ، قرص مغلف؟

مواعيد الاستعمال:

لا تتناول أبداً غليكوجان في الحالات التالية
إذا كنت تعاني من أي أوعية (الخصاسية المفرطة) تجاه المتقورمين أو أحد المكونات الأخرى
لهذا الدواء المتقورمين في الفقرة 6.

إذا كنت تعاني من مشاكل في الكبد

إذا كنت تعاني من مرض حاد في وظائف الكلى
إذا كنت تعاني من سكري غير متحكم به، يصاحبه فقدان سكر الدم (ارتفاع حاد لمعدل
السكر في الدم) بصورة صافية، غثيان، قيء، إسهال، فقدان سريع للوزن، حمض لبني
(انظر "خطر حمض لبني" أسفل) أو حمض كيتوني، الحمض الكيتوني إصابة تكمن
في تراكم مواد في الدم تسمى "أحماض كيتونية" والتي من شأنها التسبب بسببات سكري
أولى. الأعراض في مثل تلك في المعدة، تنفس سريع وعميق، والرغبة في النوم، نفس ذو
رائحة فاكهة غير معتادة.

إذا كنت قد فقدت كمية كبيرة من الماء (اجفاف)، مثلاً على إثر إسهال مستمر أو حاد، أو إذا
تقيت عدة مرات على التوالي، في يؤدي الجفاف إلى مشاكل كيميائية من شأنها أن تعرضك
لخطر الحمض اللبني (انظر "تحذيرات واحتياطات").

إذا كنت تعاني من التهاب حاد، مثل التهاب الرئتين أو القصب، أو التهاب الكلى، قد
تؤدي الاصابات الحادة إلى مشاكل في الكلى من شأنها تعريض لخطر الحماض اللبني
(انظر "تنبيه" مع غليكوجان أدناه).

إذا كنت تتناول علاجاً ضد الفيروس القلبي الحاد أو إذا عانيت من وقت قريب من نوبة
قلبية، أو إذا كنت تعاني من قصور قلبي حاد في بعض الأدوية المدوية (مثل صمغ)، أو إذا
إذا كنت تعاني من معوقات في التنفس، ذلك من شأنه أن يؤدي إلى نقص في إمداد
الأنسجة بالأكسجين، مما يعرضك لخطر الحماض اللبني (انظر "تحذيرات واحتياطات").

Docteur Fatima El Kherrat

الدكتورة فاطمة الخراط

Médecine Générale

Omnipraticienne Nutritionniste diplômée (Canada)

Spécialiste en médecine de Travail (Rennes-France)

Diplômée d'Echographie



الطب العام

حائزة على دبلوم التغذية بكلية الطب كندا

أخصائية طب الشغل كلية الطب (رانس - فرنسا)

حائزة على دبلوم الفحص بالصدى

Casablanca, le 06 SEP. 2022 الدار البيضاء في

Dr. Karim EL Ghazouani

for me echographer
des membres inférieurs

Dr. Fatima EL KHERRAT
Médecine Générale
Kadiri Kas. Panorama
Etage - Casablanca
06 61 18 51 01
05 22 97 20 36

إقامة المستقبل GH4 عمارة 103 ش 3 - ط 1 - سيدي معروف - الدار البيضاء

Résid. AL Mostakbal GH4 imm. 103 N°3. 1er Etage Sidi Maàrouf - Casablanca

الهاتف: 05 22 97 20 36 - النقال: 06 61 18 51 01

Docteur Fatima El Kherrat

الدكتورة فاطمة الخراط

Médecine Générale

Omnipraticienne Nutritionniste diplômée (Canada)

Spécialiste en médecine de Travail (Rennes-France)

Diplômée d'Echographie



الطب العام

حائزة على دبلوم التغذية بكلية الطب كندا

أخصائية طب الشغل كلية الطب (رانس - فرنسا)

حائزة على دبلوم الفحص بالصدى

Casablanca, le

06 SEP. 2022

الدار البيضاء في

Dr. EL Ghogoum Naïme

for me echographie
certificat

Dr. Fatima ELKHERRAT
Médecine générale
Nutritionniste
Bd. du Panorama
1er étage - Casablanca
Tél: 05 22 97 20 36 / 06 61 18 51 01

Dr. A. ADABI
Radiologue
INPE: 001075739

إقامة المستقبل GH4 عمارة 103 ش 3 - ط 1 - سيدي معروف - الدار البيضاء

Résid. AL Mostakbal GH4 imm. 103 N°3. 1er Etage Sidi Maàrouf - Casablanca

الهاتف: 05 22 97 20 36 - النقال: 06 61 18 51 01

Docteur Fatima El Kherrat

الدكتورة فاطمة الخراط

Médecine Générale

Omnipraticienne Nutritionniste diplômée (Canada)

Spécialiste en médecine de Travail (Rennes-France)

Diplômée d'Echographie



الطب العام

حائزة على دبلوم التغذية بكلية الطب كندا

أخصائية طب الشغل كلية الطب (رانس - فرنسا)

حائزة على دبلوم الفحص بالصدى

06 SEP. 2022

Casablanca, le

الدار البيضاء في

Dr EL Ghazouani Naime

for me echographie
of dominals



Dr. Fatima ELKHERRAT
Médecine générale - Médecine Générale
Nutritionniste
Bd Mohammed V, Kadires. Panorama
Immeuble N°3, 1er Etage - Casablanca
Tél: 05 22 97 20 36 / 06 61 18 51 01

Dr. A. ADABI
Radiologue
INPE: 001935758

إقامة المستقبل GH4 عمارة 103 ش 3 - ط 1 - سيدي معروف - الدار البيضاء

Résid. AL Mostakbal GH4 imm. 103 N°3. 1er Etage Sidi Maàrouf - Casablanca

الهاتف: 05 22 97 20 36 - النقال: 06 61 18 51 01

POLYCLINIQUE C.N.S.S - INARA
Bd El-Qods Cité Inara 20150 CASABLANCA
Tél : 0522-21-30-90 (L.G) Fax : 0522-50-48-06
RDV : 0522-50-45-13
INPE: 090001520 ICE: 001757364000080 IF: 1602058



N° IPP : 924666	N° SEJOUR : 220035584	FACTURE N° 2203013650		DATE D'ENTREE : 09/09/2022		DATE DE SORTIE : 09/09/2022				
ASSURE :		UF: 5003 RADIOLOGIE N° IMMAT C.N.S.S : N° D'ADHERENT OU DE MUTUALISTE : N° SE. SOC. ETRANG. :		DESTINATAIRE : EL GHAZOUANI, Karima						
MALADE : EL GHAZOUANI, Karima										
NOM JEUNE FILLE :										
TIERS PAYANT 1 : TIERS PAYANT 2 : REF. PC 1 : REF. PC 2 :										
NATURE DE PRESTATION	LETTRE CLE	NOMBRE x COEF	PRIX UNITAIRE	TOTAL	TIERS PAYANT 1 % / Dh MONTANT		TIERS PAYANT 2 % / Dh MONTANT		PART DU MALADE % / Dh MONTANT	
ACTES DE RADIOLOGIE ECHOGRAPHIE	ECHOGR	2.00	200.00	400.00					0.00	400.00

Intervenant : 46208 DR ADABI AICHA	TOTAUX :	400.00						400.00
Arrêtée la présente facture à la somme de : QUATRE CENTS DHS	PLAFOND PC :						ACOMPTE :	
	REMISE :	0.00	REGLE :	400.00			AVOIR :	
	RESTE DU :	0.00						
DATE FACTURE : 09/09/2022	EDITEE LE : 09/09/2022	PAR: CHAKRI	ACCIDENT DE TRAVAIL :					
VISA			N° DE POLICE :		DATE AT :			
			Règlement à effectuer à l'ordre de :		POLYCLINIQUE C.N.S.S - INARA			
			BANQUE :		BMCE - INARA			
			N° compte bancaire :		011.780.0000 54 210 00 60 016 91			

SERVICE D'IMAGERIE MEDICALE

Radiologie conventionnelle – Echographie – Doppler

COMPTE RENDU

DATE 09/09/22

NOM & PRENOM : EL GHAZOUANI KARIMA

MEDCIN TRAITANT :

EXAMEN : ECHO CERVICALE

Thyroïde légèrement augmentée de volume au dépens du lobe gauche finement hétérogène, siège de micronodules associés :

A droite : petit nodule isoechogène inférieur de 9mm

A gauche : trois nodules spongiformes polaires inférieurs mesurant 8 x 10mm ; 10 x 19.6mm et 8.8 x 13.4mm

Isthme mesure 2 mm.

Lobe thyroïdien droit mesure : 41mm x 19 mm x 12.7 mm

Volume 5.2 cm³.

Lobe thyroïdien gauche mesure : 44 mm x 20.3 mm x 20 mm

volume 9.5 cm³.

Aspect échographique normal des glandes sous maxillaires et parotidiennes

Axes jugulocarotidiennes sont libres.

CONCLUSION :

Léger goitre au dépens du lobe gauche, hétérogène micronodulaire : thyroïdite

Nodules gauches classés EU- TIRADS 2

Petit nodule droit classé EU- TIRADS 1.

Dr. A. ADAB
Radiologue
INPE- 00107777

SERVICE D'IMAGERIE MEDICALE

Radiologie conventionnelle – Echographie – Doppler

COMPTE RENDU

DATE: 09/09/22

NOM & PRENOM : EL GHAZOUANI KARIMA

MEDCIN TRAITANT :

EXAMEN : ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

Aérocolie diffuse

Patiente obese difficile à examiner

Foie de taille normale échogène homogène

Tronc porte de calibre normal et perméable.

Cholecystectomie.

Les voies biliaires intra hépatiques et la voie biliaire principale ne sont pas dilatées.

Pancréas d'aspect échographique normal.

La rate est de taille normale et d'échostructure homogène.

Les deux reins sont de taille normale, de contour régulier avec une bonne différenciation cortico-médullaire sans dilatation des cavités pyélocalicielles ni d'image de lithiasse rénale échographiquement visible.

Absence d'épanchement péritonéal

Absence de masse visible sur cet examen

CONCLUSION :

Aérocolie diffuse.

Stéatose hépatique.

Dr. A. ADABI
Radiologue
INPE - 091035759

SERVICE D'IMAGERIE MEDICALE

Radiologie conventionnelle – Echographie – Doppler

COMPTE RENDU

DATE: 09 /09/2022

NOM & PRENOM : GHAZWANI KARIMA

MEDCIN TRAITANT :

EXAMEN : ECHO DOPPLER VEINEUX
DES MEMBRES INFERIEURES

A Droite ET A Gauche

RESEAU PROFOND :

Veine iliaque, veine femorale superficielle veine femorale profonde et veine poplitee
de calibre normale compressibles ; de flux normal
Pas de signes de TVP profonde

RESEAU SUPERFICIELLE :

Veine saphene interne drainee au niveau de la VFS permeable et continente
Veine saphene externe drainée au niveau de la veine poplitée continente et
permeable

AU TOTAL

ECHODOPPLER VEINEUX DES MEMBRES INFERIEURES NORMALE
PAS DE SIGNES DE THROMBOSE VEINEUSE PROFONDE OU
SUPERFICIELLE.

RESEAU VEINEUX PROFOND ET SUPERFICIEL CONTINENT

POLYCLINIQUE C.N.S.S - INARA
Bd El-Qods Cité Inara 20150 CASABLANCA
Tél : 0522-21-30-90 (L.G) Fax : 0522-50-48-06
RDV : 0522-50-45-13
INPE: 090001520 ICE: 001757364000080 IF: 1602058



N° IPP :	924670	N° SEJOUR :	220035589	FACTURE N° 2203013654		DATE D'ENTREE : 09/09/2022		DATE DE SORTIE : 09/09/2022			
ASSURE :				UF: 5003 RADIOLOGIE N° IMMAT C.N.S.S : N° D'ADHERENT OU DE MUTUALISTE : N° SE. SOC. ETRANG. :		DESTINATAIRE : EL GHAZWANI, Karima					
MALADE : EL GHAZWANI, Karima											
NOM JEUNE FILLE :											
TIERS PAYANT 1 :											
TIERS PAYANT 2 :											
REF. PC 1 :				REF. PC 2 :							
NATURE DE PRESTATION		LETTR CLE	NOMBRE x COEF	PRIX UNITAIRE	TOTAL	TIERS PAYANT 1 % / Dh		TIERS PAYANT 2 % / Dh		PART DU MALADE % / Dh	
ACTES DE RADIOLOGIE ECHO-DOPPLER VEINEUX PERIPHERIQUE		CX15	1.00	600.00	600.00					0.00 600.00	

Intervenant : 46205 DR NOURE TAOUFIK		TOTAUX :		600.00						600.00	
Arrêtée la présente facture à la somme de : SIX CENTS DH\$				PLAFOND PC :						ACOMPTE:	
				REMISE :		0.00	REGLE :		600.00		AVOIR :
				RESTE DU:		0.00					
DATE FACTURE : 09/09/2022		EDITEE LE : 09/09/2022		PAR: CHAKRI		ACCIDENT DE TRAVAIL :					
VISA						N° DE POLICE :		DATE AT :			
						Réglement à effectuer à l'ordre de :		POLYCLINIQUE C.N.S.S - INARA			
						BANQUE :		BMCE - INARA			
						N° compte bancaire :		011.780.0000 54 210 00 60 016 91			



SERVICE D'IMAGERIE MEDICALE

Radiologie conventionnelle – Echographie – Doppler

COMPTE RENDU

DATE: 09/09/22

NOM & PRENOM : EL GHAZOUANI KARIMA

MEDCIN TRAITANT :

EXAMEN : ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

Aérocolie diffuse

Patiente obese difficile à examiner

Foie de taille normale échogène homogène

Tronc porte de calibre normal et perméable.

Cholecystectomie.

Les voies biliaires intra hépatiques et la voie biliaire principale ne sont pas dilatées.

Pancréas d'aspect échographique normal.

La rate est de taille normale et d'échostructure homogène.

Les deux reins sont de taille normale, de contour régulier avec une bonne différenciation cortico-médullaire sans dilatation des cavités pyélocalicielles ni d'image de lithiase rénale échographiquement visible.

Absence d'épanchement péritonéal

Absence de masse visible sur cet examen

CONCLUSION :

Aérocolie diffuse.

Stéatose hépatique.

Dr. A. ADABI
Radiologue
INPF: 001035759