

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
 Prise en charge : pec@mupras.com
 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

M22- 0020555

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 1736 Société : Royal Air MAROC

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : IOTNI Ahmed (Signature)

Date de naissance : 01 Janvier 1958

Adresse : Loft DAHIA Rue 1 N°36 Q.I Berrehoussi

Casablanca Maroc

Tél. : 06.72.150702 Total des frais engagés : 833,00 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 28/10/2022

Nom et prénom du malade : Dr. H. ALEK (Signature)

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : Neuropathie - Bascinale (Signature)

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie : Patho (Signature)

En cas d'accident préciser les causes et circonstances : Patho accident (Signature)

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : 11/11/2022 Le : 11/11/2022

Signature de l'adhérent(e) : DR (Signature)



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
28.10.22	c		200.00	Dr Adil YAHIA Chirurgie Orthopédique Res. Al Assif Bd Ali Yata Imb. 54 - H.M. Casablanca - Tél.: 0522 620 603 INP : 091042804

~~EXECUTION DES ORDONNANCES~~

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
	28.10.22	V.G.Roch L.M. 2m + 3	<p>10,000</p> <p>Dr Adil YAHIA Chirurgie Orthopédique Rés. Al Assit Bd Al Yata Imp. 54 - H.M. Casablanca - Tel.: 0522 620 603 INP : 091042804</p>

AUXILIAIRES MEDICAUX


Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H 25533412 00000000	G 21433552 00000000	D 00000000 35533411	B 11433553 00000000
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Adil Yahia

Spécialiste en Chirurgie Traumatologique et Orthopédique

- Chirurgie de la main
- Chirurgie de Genou
- Chirurgie de Rhumatismes
- Chirurgie du Sport
- Médecine du Travail
- Expertise Médicale



الدكتور عادل يحيى

اختصاصي في جراحة العظام والمعاصل

- جراحة اليد
- جراحة الركبة
- جراحة الروماتيزم
- الطب الرياضي
- طب الشغل
- خبير طبي

Casablanca, le : 28/01/22

1) ~~où n'allez pas~~ 2) ~~à la pharmacie de la route de Sidi Ben Yousfi~~

1) Racine 2) Tégliatti

268,00

2) Armois 90



~~Midi 14h~~

~~PHARMACIE KOUOUNOUZ
Dr. KENZA SEKKAT
Bd. Chechchaoui, Route de Casablanca
N° 4240, Tél/Fax 05 22 67 41 03~~

3) GABLINE 25

2 Gel / L on week



prix 1 - 0 - 2/1

~~Dr Adil YAHIA~~

~~Chirurgie Orthopédique~~

~~Rés. Al Assil Bd Ali Yata 1^{me}, 54 - H.M.
Casablanca - Tél : 05 22 620 603
INP : 091042804~~

Résidence Al Assil, Bd. Ali Yata (Ex. Foum Lahcen) Imm 54, RDC N° 2 - Hay Mohammadi - Casablanca - Tél.: 05 22.620.603 - Urgence : 05 22.980.298

إقامة الأصيل شارع علي يعنة - فم الحصن سابق(أ) عمارة 54 - الحي المحمدية - الدار البيضاء - الهاتف: 05 22.620.603 - المستعجلات: 05 22.980.298

Notice : Information de l'utilisateur
GABLINE® 25 mg, 75 mg, 150 mg et 300 mg.
Gélules. Boîte de 56.
Prégabaline

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A DE PRENDRE GABLINE, gélule?

Ne prenez jamais GABLINE, gélule :
Si vous êtes allergique à la prégabaline ou à l'un des contenus dans ce médicament (mentionnés dans le tableau ci-dessous).

Faites attention avec GABLINE, gélule :
jez-vous à votre médecin ou pharmacien.

ques patients prenant GABLINE ont fait des réactions allergiques. Il s'agit généralement de réactions cutanées, comme les lèvres, de la langue et de la gorge, ou un œdème diffus. Contactez immédiatement votre médecin si vous avez une de ces réactions.

GABLINE a été associé à des étourdissements et à des nausées. Ces effets peuvent augmenter la survenue de blessures chez les patients âgés. Vous devez par conséquent faire attention lorsque vous prenez GABLINE.

GABLINE peut faire apparaître une vision trouble, des hallucinations ou d'autres modifications de la vue, la parole ou l'audition. Informez immédiatement votre médecin si vous avez une quelconque modification de votre vision.

• Une adaptation des médicaments utilisés en cas de diabète est nécessaire chez certains patients diabétiques qui prennent GABLINE.

• Certains effets indésirables peuvent être plus fréquents chez les personnes âgées, car les patients présentant une maladie de l'épine peuvent recevoir d'autres médicaments, comme la douleur ou la spasticité, qui sont des similitudes avec ceux de la Prégabaline et dont la fréquence peut augmenter lorsque ces traitements sont pris ensemble.

• Des cas d'insuffisance cardiaque ont été rapportés chez certains patients prenant GABLINE ; ces patients étaient également porteurs d'autres maladies cardiaques.

• Des cas d'insuffisance rénale ont été rapportés chez certains patients prenant GABLINE. Si au cours de votre traitement vous observez une diminution de votre miction, vous devez informer votre médecin car l'arrêt de votre traitement peut améliorer cette symptomatologie.

• Un petit nombre de personnes traitées avec GABLINE ont eu des idées autodestructrices ou des pensées négatives. Ces symptômes peuvent apparaître à tout moment pendant le traitement avec GABLINE. Informez immédiatement votre médecin.

• Des problèmes gastro-intestinaux peuvent apparaître, comme la constipation, le transit intestinal bloqué ou la paralysie. Ces symptômes peuvent être évités ou réduits en combinant GABLINE avec d'autres médicaments pour la constipation (tels que certaines classes de médicaments contre la douleur). Informez votre médecin si vous souffrez de ces symptômes.

• Avant de prendre ce médicament vous devez informer votre médecin si vous avez des antécédents d'alcoolisme, d'abus de drogues ou de dépendance. Ne prenez pas davantage de la dose prescrite.

• Des cas de convulsions ont été rapportés chez certains patients prenant GABLINE ou peu après l'arrêt du traitement. Contactez immédiatement votre médecin.

• Des cas de modification de la fonction cérébrale ont été rapportés chez certains patients prenant GABLINE. Ces symptômes peuvent être favorisés par certains facteurs, comme l'âge, la maladie ou les médicaments. Informez votre médecin si vous avez des symptômes de maladie grave, comme la maladie de foie ou la maladie de cœur.

Enfants et adolescents

La sécurité d'emploi et l'efficacité chez les enfants (moins de 18 ans) n'a pas été établie. La prégabaline n'a pas été utilisée dans cette population.

Autres médicaments et GABLINE

Informez votre médecin ou pharmacien si

Veuillez prendre



3. Comment prendre GABLINE, gélule ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver GABLINE, gélule ?

6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE GABLINE, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

GABLINE appartient à une classe de médicaments utilisés pour traiter l'épilepsie, les douleurs neuropathiques et le Trouble Anxieux Généralisé (TAG) chez l'adulte.

Douleurs neuropathiques périphériques et centrales : GABLINE est utilisé pour traiter les douleurs persistantes causées par des lésions des nerfs. Différentes pathologies comme le diabète ou le zona peuvent induire des douleurs neuropathiques périphériques. Les manifestations douloureuses peuvent être décrites comme étant des sensations de chaleur, de brûlure, de douleur lancinante, d'élançement, de coup de poignard, de douleur fulgurante, de crampes, d'endolorissement, de picotements, d'engourdissement, de pincements et de coups d'aiguille. Les douleurs neuropathiques périphériques et centrales peuvent aussi être associées à des changements de l'humeur, des troubles du sommeil, de la fatigue, et peuvent avoir un impact sur le fonctionnement physique et social, et sur la qualité de vie en général.

Épilepsie : GABLINE est utilisé pour traiter un type particulier d'épilepsie (crises épileptiques partielles avec ou sans généralisation secondaire) chez l'adulte. Votre médecin vous prescrira GABLINE pour aider à traiter votre épilepsie lorsque votre traitement actuel ne permet pas de contrôler complètement vos crises. Vous devez prendre GABLINE en association à votre traitement actuel. GABLINE ne doit pas être utilisé seul, mais doit toujours être utilisé en association à un autre traitement antiépileptique.

Trouble Anxieux Généralisé : GABLINE est utilisé pour traiter le Trouble Anxieux Généralisé (TAG). Les symptômes du TAG comprennent une anxiété excessive prolongée et une inquiétude difficile à contrôler. Le TAG peut également indiquer une agitation ou une sensation d'excitation ou d'énergie, une sensation d'être facilement fatigué, des difficultés à se concentrer ou des trous de mémoire, une irritabilité, une tension musculaire ou des troubles du sommeil. Ceci est différent du stress et des tensions de la vie quotidienne.



Esoméprazole magnésium

20mg et 40mg

Comprimés gastro-résistants

RIES LIM
nla Sahib
PradeshaROCCO L
Casablanca

V 82 DH 10

Veuillez lire attentivement la notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourrez la consulter plus tard.

Si vous avez toute autre question, contactez votre pharmacien.

Ce médicament vous a été prescrit par un professionnel de la santé.

quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre pharmacien.

CODE No.: HP/DRUGS/MN/35/2

1. COMPOSITION DU MÉDICAMENT

Chaque comprimé gastro-résistant contient 20mg ou 40mg de substance active : Esoméprazole (sous forme d'Esoméprazole magnésium).

Les autres composants sont : Sphères de sucre, Hydroxypropylcellulose (HPC-L), Crospovidone (PPXL-10), Povidone (PVP K-30), Macrogol 400, Talc purifié, Hydromellose phthalate (HP-55S), Hydromellose phthalate (HP-50), Diethylphthalate, Macrogol 6000, Cellulose microcristalline PH101, Cellulose microcristalline PH112, Crospovidone (PPXL), Fumarate de sodium stéaryl, Opadry 03B86651 marron, Macrogol 4000, Alcool isopropylique, Acétone, Chlorure de méthylène, Eau purifiée.

Liste des excipients à effet notable : saccharose (sphères de sucre).

2. CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

RACIPER® contient une substance active appelée esoméprazole. C'est un médicament de la classe des inhibiteurs de la pompe à protons. Il diminue la sécrétion acide au niveau de l'estomac.

3. INDICATIONS THERAPEUTIQUES

RACIPER® 20 mg, comprimés gastro-résistants sont utilisés dans le traitement des maladies suivantes :

Adultes et Jeunes gens âgés de 12 ans et plus

- Le reflux gastro-œsophagien (RGO) lorsque l'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage et entraîne une douleur, une inflammation et des brûlures,

- L'ulcère de l'estomac ou du duodénum en cas d'infection par une bactérie appelée *Helicobacter pylori*. Si vous êtes dans cette situation votre médecin pourra également vous prescrire des antibiotiques pour traiter l'infection et permettre à l'ulcère de cicatriser,

Adultes

- Le traitement et la prévention des ulcères associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS),

- Un excès d'acide dans l'estomac dû à un syndrome de Zollinger-Ellison.

RACIPER® 40 mg, comprimés gastro-résistants sont utilisés dans le traitement des

Troubles rénaux sévères.

Gonflement des seins chez l'homme.

Effets indésirables de fréquence indéterminée (ne peut pas être estimée à partir des données disponibles).

- Si vous prenez RACIPER® 20 mg et 40mg, comprimés gastro-résistants pendant plus de trois mois, il est possible que le taux de magnésium dans votre sang diminue. De faibles taux de magnésium peuvent se traduire par une fatigue, des contractions musculaires involontaires, une désorientation, des convulsions, des sensations vertigineuses, une tachycardie ou rythme cardiaque. Si vous présentez l'un de ces symptômes, veuillez en évidemment votre médecin. De faibles taux de magnésium peuvent également entraîner une diminution des taux de potassium ou de calcium dans le sang. Votre médecin peut effectuer des examens sanguins réguliers pour surveiller votre taux de

de l'intestin (entrant dans les diarrhées)

peut dans de très rares cas affecter les globules blancs entraînant un déficit

- Vous devez consulter votre médecin dès que possible si vous avez une ou plusieurs de ces symptômes tels que de la fièvre avec une fatigue générale très importante, ou de la fièvre avec des symptômes d'infection locale tels que des douleurs dans le cou, la gorge, la bouche, ou des difficultés à uriner. Si vous avez ces symptômes, un déficit de globules blancs (agranulocytose) pourra être éliminé par un test sanguin. Il est important que vous donnez des informations sur vos médicaments dans ce cas.

Ne soyez pas inquiet par cette liste d'effets indésirables possibles, vous pouvez n'en avoir aucun.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

7. MISES EN GARDE SPÉCIALES ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Faites attention avec RACIPER® 20 mg et 40mg, comprimés gastro-résistants

- Si vous avez des problèmes hépatiques sévères.

- Si vous avez des problèmes rénaux sévères.

Parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien avant toute administration de RACIPER® 20 mg et 40mg, comprimés gastro-résistants.

RACIPER® 20 mg et 40mg, comprimés gastro-résistants peuvent masquer des symptômes d'autres maladies. Si vous prenez RACIPER® 20 mg et 40mg, comprimés gastro-résistants, vous devez informer immédiatement votre médecin si :

- Vous perdez du poids sans raison et vous avez des problèmes pour avaler,

- Vous avez des douleurs à l'estomac ou une indigestion,

- Vous vomissez de la nourriture ou du sang,

- Vous avez des selles noires teintées de sang.

En cas de prescription d'un traitement « à la demande » en fonction des besoins, vous devez contacter votre médecin si les symptômes persistent ou se modifient.

La prise d'un inhibiteur de la pompe à protons tel que RACIPER® 20 mg et 40mg, comprimés gastro-résistants, en particulier sur une période supérieure à un an, peut légèrement augmenter le risque de fracture de la hanche, du poignet ou des vertèbres. Prévenez votre médecin si vous souffrez d'ostéoporose ou si vous prenez des corticoïdes (qui peuvent augmenter le risque d'ostéoporose).

Excipients à effet notable: Saccharose. En raison de la présence de saccharose, l'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose, une intolérance au sucrose et/ou au lactose.

**ARCOXIA® 60 mg, comprimés pelliculés
ARCOXIA® 90 mg, comprimés pelliculés
ARCOXIA® 120 mg, comprimés pelliculés**
Etoricoxib

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Si vous avez des symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre pharmacien. Cet effet s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que ARCOXIA et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ARCOXIA
3. Comment prendre ARCOXIA
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver ARCOXIA
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que ARCOXIA et dans quel cas est-il utilisé

Qu'est-ce que ARCOXIA ?

- ARCOXIA contient la substance active etoricoxib. ARCOXIA est l'un des médicaments de la classe des inhibiteurs sélectifs de la cyclo-oxygénase (COX-2). Ceux-ci appartiennent à une famille de médicaments nommée anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS).

Dans quel cas est ARCOXIA utilisé?

- ARCOXIA contribue à réduire la douleur et le gonflement (inflammation) des articulations et des muscles chez les patients âgés de 16 ans et plus, atteints d'arthrose, de polyarthrite rhumatoïde, de spondylarthrite ankylosante et de goutte.
- ARCOXIA est également utilisé, chez les patients âgés de 16 ans et plus, pour le traitement de courte durée de la douleur modérée après chirurgie dentaire.

Qu'est-ce que l'arthrose

L'arthrose est une maladie des articulations, provenant de la décomposition progressive du cartilage protégeant les extrémités de l'os. Elle entraîne un gonflement (inflammation), une douleur, une sensibilité, une raideur et un handicap.

Qu'est-ce que la polyarthrite rhumatoïde

La polyarthrite rhumatoïde est une maladie inflammatoire chronique des articulations. Elle provoque une douleur, une raideur, un gonflement et une perte progressive du mouvement des articulations atteintes ; Elle peut entraîner également une inflammation d'autres parties du corps.

Qu'est-ce que la goutte

La goutte est une maladie qui se manifeste, au niveau des articulations, par des crises soudaines et récurrentes associant une inflammation, une rougeur et une très vive douleur. Elle est provoquée par des dépôts de cristaux minéraux dans les articulations.

Qu'est-ce que la spondylarthrite ankylosante

La spondylarthrite ankylosante est une maladie inflammatoire de la colonne vertébrale et des grandes articulations.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ARCOXIA

Ne prenez jamais ARCOXIA :



acien.
même en
cien. Ceci
ion 4.

Dr yahia adil

Chirurgien orthopédiste

Tel 0522620603

Compte rendu de radiologie

28/01/12

A = oumarbek KHAZIA op koto

Re Behis anal

- pas d'effacement articulaire = Tassement vertébral
- présente intervertébral étroit



DR YAHIA ADIL
CHIRURGIEN ORTHOPEDISTE
Tel 0522620603

FACTURE N° 9899/22

INP 091042804

17 - AVENUE KHALED JADOUR KOTBI LE 28/10/22

Re facture ancien

2n + 2_g

Mrs. 00

Dr Adil YAHIA
Chirurgie Orthopédique
Res. Al Assil Bd Ali Yaata Imm. 54 - H.M
Casablanca - Tel: 0522 620 603
INP: 091042804

Résidence Al Assil Bd Ali Yaata Imm 54 RDC N°2 HayMohammadi