

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 5795 Société : RAM

Actif Pensionné(e) Autre :

Nom & Prénom : EL Gattaya A. Abdellah

Date de naissance : 01.01.1958

Adresse : Hay Al Orod, Res. El FAJR 5mn H

N° 5 Bemoussi Casab

Tél. : 06 61 73 60 33 Total des frais engagés : 300 + 769,8 = 1069,8 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 22 NOV 2022

Nom et prénom du malade : Nou KHADIM Moulaye Aga

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : Cardiopathie

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : 22 NOV 2022

Signature de l'adhérent(e) : Dr. MOUSTAID Hayat

Signature : Dr. MOUSTAID Hayat
Cardiologue
Centre de soins et de réadaptation à l'Amir Allal Ben Abdellah, Casablanca, N° 25 Avenue Sidi Ben Abdellah, 25000 Casablanca, Tél. : 0522 73 09 25

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Date des Actes	Nature des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
22 Mai 2022	Consultation	3000mfp	Dr. MOUSTAFA B. Sidi Mousa Cardiologiste N° 36 Avenue 22 Mai 13 Télé: 522 13 00	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
 PHARMACIE BLOC "C" SIDI BERNOUSSI Rue de l'Algérie 10 Bloc (C) Sidi Bernoussi	22/11/22	 PHARMACIE BLOC "C" SIDI BERNOUSSI Rue de l'Algérie 10 Bloc (C) Sidi Bernoussi

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Cœfficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de cocher la case correspondante pour indiquer la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODE.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			COEFFICIENT DES TRAVAUX
	H 25533412 21433552 00000000 00000000 D 00000000 G 35533411 11433553 B			MONTANTS DES SOINS
	[Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS	VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION			

Dr MOUSTAID Hayat

Spécialiste des maladies du Cœur
et des Vaisseaux

HTA. Echocardiographie doppler

Hotler ECG et tensionnel

Epreuve d'effort

الدكتورة مستعد حياة

اختصاصية في أمراض القلب والشرايين

وارتفاع الضغط الدموي



التشخيص بالصدى والدوبلر. تعرير الجهد

تسجيل مستمر لضغط الدم لمدة 24 ساعة

تسجيل مستمر لخطيط القلب لمدة 24 ساعة

لا تغير تاريخ الشخص ولا التاريخ الموجود على أوراق التعاضدية

Casablanca, le :

22 NOV 2022

M : Mr khalid Noucours

100

1's

Relaxine

99,00

-

16,00

-

41,80

-

20,92,00

-

Propriol

30,133,00

-

Propantheline

PHARMACIE BLOC "C"

Rue 2 N° 716 Bloc C
GHOUDANE
Casablanca

PHARMACIE BLOC "C"
Rue 2 N° 716 Bloc C
GHOUDANE
Casablanca

PHARMACIE BLOC "C"
Rue 2 N° 716 Bloc C
GHOUDANE
Casablanca

769,80



N° 36 Avenue Souhaib E

AL Souhaib Erouimi N° 36 Amal 2 Sidi Bernoussi - Tél.: 05

46,00
16DH00

BIOMARTIAL PLUS

LIPOFER
microcapsules

Vitamine C

FORME ET PRÉSENTATION :

Gélule, Boîte de 30.

COMPOSITION :

Substance active: Lipofer (fer micronisé et microencapsulé)

Amidon de Maïs, Substance active: Vitamine C, Anti-agglomérant: Stéarate de magnésium : Capsule Végétale (HPMC).

LOT: 2209916
FAB: 09/2022
EXP: 09/2025
PUC: 132.000H

PROPRIÉTÉS :

BIOMARTIAL PLUS Lipofér est à base de lipofer et de vitamine C.

La vitamine C a un effet antioxydant qui protège les cellules contre les dommages infligés par les radicaux libres. Elle participe aussi à la formation des globules rouges et augmente l'absorption du fer.

Le fer est un oligoélément nécessaire à notre organisme. Il contribue notamment :

À la synthèse de l'hémoglobine qui assure le transport de l'oxygène,

au fonctionnement normal du système immunitaire,

À réduire la fatigue,

Au développement normal des tissus.

CONSEILS D'UTILISATION :

Selon la prescription médicale.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

À conserver à l'abri de l'humidité et de la lumière.

Food supplement, is not a medicine.

Fabriqué et Distribué par **HEALTH INNOVATION**

10 Rue Racine Valfleuri, Maarif,

Casablanca, Maroc.

+212 522 23 22 51

contact@healthinnovation.ma

www.healthinnovation.ma

ONSSA N°: CAPV.59.217.19

N°Enregistrement au ministère de la santé :

DA20202007430DMP/20UCA/V1

BIOMARTIAL PLUS

LIPOFER
microcapsules

Vitamine C

FORME ET PRÉSENTATION :

Gélule, Boîte de 30.

COMPOSITION :

Substance active: Lipofer (fer micronisé et microencapsulé)

Amidon de Maïs, Substance active: Vitamine C, Anti-agglomérant: Stéarate de magnésium : Capsule Végétale (HPMC).

LOT: 2209916
FAB: 09/2022
EXP: 09/2025
PUC: 132.000H

PROPRIÉTÉS :

BIOMARTIAL PLUS Lipofér est à base de lipofer et de vitamine C.

La vitamine C a un effet antioxydant qui protège les cellules contre les dommages infligés par les radicaux libres. Elle participe aussi à la formation des globules rouges et augmente l'absorption du fer.

Le fer est un oligoélément nécessaire à notre organisme. Il contribue notamment :

À la synthèse de l'hémoglobine qui assure le transport de l'oxygène,

au fonctionnement normal du système immunitaire,

À réduire la fatigue,

Au développement normal des tissus.

CONSEILS D'UTILISATION :

Selon la prescription médicale.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

À conserver à l'abri de l'humidité et de la lumière.

Food supplement, is not a medicine.

Fabriqué et Distribué par **HEALTH INNOVATION**

10 Rue Racine Valfleuri, Maarif,

Casablanca, Maroc.

+212 522 23 22 51

contact@healthinnovation.ma

www.healthinnovation.ma

ONSSA N°: CAPV.59.217.19

N°Enregistrement au ministère de la santé :

DA20202007430DMP/20UCA/V1

BIOMARTIAL PLUS

LIPOFER
microcapsules

Vitamine C

FORME ET PRÉSENTATION :

Gélule, Boîte de 30.

COMPOSITION :

Substance active: Lipofer (fer micronisé et microencapsulé)

Amidon de Maïs, Substance active: Vitamine C, Anti-agglomérant: Stéarate de magnésium : Capsule Végétale (HPMC).

LOT: 2209916
FAB: 09/2022
EXP: 09/2025
PUC: 132.000H

PROPRIÉTÉS :

BIOMARTIAL PLUS Lipofér est à base de lipofer et de vitamine C.

La vitamine C a un effet antioxydant qui protège les cellules contre les dommages infligés par les radicaux libres. Elle participe aussi à la formation des globules rouges et augmente l'absorption du fer.

Le fer est un oligoélément nécessaire à notre organisme. Il contribue notamment :

À la synthèse de l'hémoglobine qui assure le transport de l'oxygène,

au fonctionnement normal du système immunitaire,

À réduire la fatigue,

Au développement normal des tissus.

CONSEILS D'UTILISATION :

Selon la prescription médicale.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

À conserver à l'abri de l'humidité et de la lumière.

Food supplement, is not a medicine.

Fabriqué et Distribué par **HEALTH INNOVATION**

10 Rue Racine Valfleuri, Maarif,

Casablanca, Maroc.

+212 522 23 22 51

contact@healthinnovation.ma

www.healthinnovation.ma

ONSSA N°: CAPV.59.217.19

N°Enregistrement au ministère de la santé :

DA20202007430DMP/20UCA/V1

AVLOCARDYL®

PROPRANOLOL

40 mg

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

• Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire. • Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, ou votre pharmacien. • Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres. • Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

1. QU'EST-CE QUE AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament contient une substance active, le propranolol qui appartient à la famille des bêta-bloquants. Il agit en diminuant la tension artérielle, en réduisant les troubles du rythme cardiaque et en ralentissant le cœur.

Ce médicament est utilisé principalement : • pour traiter une tension artérielle élevée, • pour éviter des douleurs au niveau de la poitrine (crises douloureuses de l'angine de poitrine), • après une crise cardiaque (infarctus du myocarde), • pour des maladies du cœur et des vaisseaux causées par un taux élevé d'hormones thyroïdiennes dans le sang, • pour traiter certaines maladies du cœur et notamment certains troubles du rythme cardiaque, • pour éviter des migraines, • pour traiter certains types de tremblements, • pour éviter des palpitations liées par une situation stressante (tel que le trac), • pour éviter des saignements digestifs chez les personnes qui souffrent d'une maladie grave du foie (cirrhose).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable ?

Ne prenez jamais AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable :

• Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active (le propranolol) ou à l'un des composants contenus dans ce médicament. Vous trouverez la liste des composants à la section 6. • Si vous êtes asthmatique ou si vous avez un encombrement des bronches et des poumons (bronchopneumopathie chronique obstructive). • Si vous souffrez d'insuffisance cardiaque non contrôlée par un traitement. • Si vous avez eu un problème cardiaque grave (choc cardiogénique). • Si votre tension artérielle élevée est causée par une maladie d'une glande située au-dessus du rein (phéochromocytome non traité). • Si vous souffrez d'une certaine forme d'angine de poitrine appelée angor de Prinzmetal (reconnaissable par des douleurs au niveau de la poitrine). • Si votre cœur bat trop lentement (moins de 45-50 battements par minute). • Si vous souffrez de troubles de la conduction : blocs auriculo-ventriculaires des second et troisième

degrés, bloc sino-atrien, circulation du sang à l'opposé de l'ordre normal (maladie de Raynaud).

- Si vous avez une prédisposition à faire des crises d'angine de poitrine.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre

docteur ou pharmacien

pour toute question

ou tout doute.

mg, comprimé sécable.

Vous devez prévenir votre médecin : • Si vous avez un taux de sucre élevé dans le sang (diabète), • Si vous avez une maladie grave du foie et/ou du rein, • Si vous avez une maladie de la peau (psoriasis), • Si vous avez déjà eu des allergies, • Si vous avez une maladie de la circulation sanguine (telle que la maladie de Raynaud), • Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, • Si vous avez des antécédents cardiaques.

Vous ne devez jamais arrêter brutalement votre traitement sans avoir demandé, au préalable, l'avis de votre médecin.

• Si vous devez subir une opération, vous devez prévenir votre anesthésiste que vous prenez ce médicament.

Patients devant faire attention au risque d'hypoglycémie

Une hypoglycémie est un taux trop bas de sucre dans le sang. Ce médicament peut aggraver une hypoglycémie en particulier, chez les personnes souffrant de diabète et les personnes non diabétiques mais qui sont prédisposées à l'hypoglycémie (le nourrisson, l'enfant, la personne âgée, les personnes souffrant d'une maladie du foie, les personnes sous dialyse, les personnes qui ont fait un jeûne ou les personnes qui ont pris trop de comprimés).

Cette hypoglycémie peut conduire à des convulsions ou un coma. Vous reconnaîtrez les signes annonciateurs d'une hypoglycémie par une faiblesse, des sueurs, une fringale, des tremblements, une somnolence, des vertiges, des maux de tête, des troubles de la vision, mangez ou buvez quelque chose de sucré. Si l'un de ces signes survient, mangez ou buvez quelque chose de sucré et contactez votre médecin.

La substance active de ce médicament (le propranolol) peut provoquer un test positif lors d'un contrôle antidopage.

Autres médicaments et AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable

Sauf avis contraire de votre médecin, n'utilisez pas AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable avec certains médicaments pour le cœur (les antagonistes du calcium : bêpridil, diltiazem, vérapamil et fentanyl). Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse

En cas de besoin, ce médicament peut être pris durant votre grossesse.

Si ce traitement est pris en fin de grossesse, une surveillance médicale du nouveau-né est nécessaire pendant quelques jours, si certains effets du traitement se manifestent aussi chez l'enfant.

Allaitement

Ce médicament passe dans le lait maternel. En conséquence,

PER 100
100/100

AVLOCARDYL 40 MG
CP SEC 850

P.P.V : 41DH80



de
its
e.
re
ns



INOPRIL 4 et 8 mg

Périndopril

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Si vous avez des questions, si vous avez un doute, demandez plus d'information au pharmacien.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de vous y référer à nouveau. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez à personne de lui causer du tort, même si elle présente les mêmes symptômes que vous.

LOT 220083 1

EXP 01 2024

PPV 92 00

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

DENOMINATION

INOPRIL 4 mg, comprimés

INOPRIL 8 mg, comprimés

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

INOPRIL 4 mg, comprimés

La substance active est :

Tert-butylamine dépérindopril..... 4 mg

INOPRIL 8 mg, comprimés

La substance active est :

Tert-butylamine de périndopril..... 8 mg

Pour un comprimé

Pour un comprimé

Les autres composants communs sont :

Lactose monohydraté, cellulose microcristalline, silice colloïdale, stéarate de magnésium.

NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBERATION DES LOTS, SI DIFFERENT

Laboratoires SOTHEMA

B.P. N° 1, 27182 Bouskoura

Maroc

FORME PHARMACEUTIQUE ET PRESENTATION

Comprimé, boîte de 30 sous plaquettes thermoformées.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

Inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC).

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

INOPRIL 4 mg

Ce médicament est indiqué :

- dans l'insuffisance cardiaque symptomatique (le cœur n'envoie pas le sang dans l'organisme comme il le devrait),
- dans le traitement de la pression artérielle élevée (hypertension artérielle),
- pour diminuer le risque d'accident cardiaque, tel que infarctus, chez les patients ayant une maladie coronaire stable (lorsque l'alimentation sanguine du cœur est réduite ou quasi nulle) et ayant déjà souffert d'un infarctus et/ou ayant subi un pontage ou une dilatation des artères coronaires.

INOPRIL 8 mg

Ce médicament est indiqué :

- dans le traitement de la pression artérielle élevée (hypertension artérielle),
- pour diminuer le risque d'accident cardiaque, tel que infarctus, chez les patients ayant une maladie coronaire stable (lorsque l'alimentation sanguine du cœur est réduite ou quasi nulle) et ayant déjà souffert d'un infarctus et/ou ayant subi un pontage ou une dilatation des artères coronaires.

ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ne prenez jamais INOPRIL dans les cas suivants :

- allergie (hypersensibilité) au périndopril ou à l'un des autres composants du médicament ou à tout autre médicament de la même classe (inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine),
- antécédents d'œdème de Quincke (angio-œdème) (réaction allergique avec brusque gonflement du visage et du cou) lié à la prise d'un inhibiteur de l'enzyme de conversion,
- si quelqu'un de votre famille a déjà eu un angio-œdème ou si vous avez déjà eu un angio-œdème, quelqu'en soient les circonstances ;
- deuxième et troisième trimestres de la grossesse.

Ce médicament est généralement déconseillé en association avec les diurétiques épargneurs de potassium, l'estramustine, les sels de potassium, et le lithium (cf. interactions médicamenteuses).

EN CAS DE DOUCE IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

Il est possible qu'INOPRIL ne vous convienne pas, ou qu'une surveillance individuelle soit régulièrement nécessaire. Par conséquent, avant de prendre INOPRIL, informez votre médecin dans les cas suivants :

- Si vous souffrez d'angine de poitrine stable (alimentation sanguine du cœur réduite ou quasi nulle) ;
- Si vous avez une cardiomyopathie hypertrophique (épaississement du muscle cardiaque) ou une valvulopathie (anomalie des valves du cœur) ;
- Sténose de l'aorte et/ou de l'artère rénale (rétrécissement) ;



INOPRIL 4 et 8 mg

Périndopril

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Si vous avez des questions, si vous avez un doute, demandez plus d'information au pharmacien.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de vous y référer à nouveau. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez à personne de lui causer du tort, même si elle présente les mêmes symptômes que vous.

LOT 220083 1

EXP 01/2024

PPV 92 00

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

DENOMINATION

INOPRIL 4 mg, comprimés

INOPRIL 8 mg, comprimés

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

INOPRIL 4 mg, comprimés

La substance active est :

Tert-butylamine dépérindopril..... 4 mg

INOPRIL 8 mg, comprimés

La substance active est :

Tert-butylamine de périndopril..... 8 mg

Pour un comprimé

Pour un comprimé

Les autres composants communs sont :

Lactose monohydraté, cellulose microcristalline, silice colloïdale, stéarate de magnésium.

NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBERATION DES LOTS, SI DIFFERENT

Laboratoires SOTHEMA

B.P. N° 1, 27182 Bouskoura

Maroc

FORME PHARMACEUTIQUE ET PRESENTATION

Comprimé, boîte de 30 sous plaquettes thermoformées.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

Inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC).

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

INOPRIL 4 mg

Ce médicament est indiqué :

- dans l'insuffisance cardiaque symptomatique (le cœur n'envoie pas le sang dans l'organisme comme il le devrait),
- dans le traitement de la pression artérielle élevée (hypertension artérielle),
- pour diminuer le risque d'accident cardiaque, tel que infarctus, chez les patients ayant une maladie coronaire stable (lorsque l'alimentation sanguine du cœur est réduite ou quasi nulle) et ayant déjà souffert d'un infarctus et/ou ayant subi un pontage ou une dilatation des artères coronaires.

INOPRIL 8 mg

Ce médicament est indiqué :

- dans le traitement de la pression artérielle élevée (hypertension artérielle),
- pour diminuer le risque d'accident cardiaque, tel que infarctus, chez les patients ayant une maladie coronaire stable (lorsque l'alimentation sanguine du cœur est réduite ou quasi nulle) et ayant déjà souffert d'un infarctus et/ou ayant subi un pontage ou une dilatation des artères coronaires.

ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ne prenez jamais INOPRIL dans les cas suivants :

- allergie (hypersensibilité) au périndopril ou à l'un des autres composants du médicament ou à tout autre médicament de la même classe (inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine),
- antécédents d'œdème de Quincke (angio-œdème) (réaction allergique avec brusque gonflement du visage et du cou) lié à la prise d'un inhibiteur de l'enzyme de conversion,
- si quelqu'un de votre famille a déjà eu un angio-œdème ou si vous avez déjà eu un angio-œdème, quelqu'en soient les circonstances ;
- deuxième et troisième trimestres de la grossesse.

Ce médicament est généralement déconseillé en association avec les diurétiques épargneurs de potassium, l'estramustine, les sels de potassium, et le lithium (cf. interactions médicamenteuses).

EN CAS DE DOUCE IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

Il est possible qu'INOPRIL ne vous convienne pas, ou qu'une surveillance individuelle soit régulièrement nécessaire. Par conséquent, avant de prendre INOPRIL, informez votre médecin dans les cas suivants :

- Si vous souffrez d'angine de poitrine stable (alimentation sanguine du cœur réduite ou quasi nulle) ;
- Si vous avez une cardiomyopathie hypertrophique (épaississement du muscle cardiaque) ou une valvulopathie (anomalie des valves du cœur) ;
- Sténose de l'aorte et/ou de l'artère rénale (rétrécissement) ;

Khadim
ID: Mouloda

ans cm kg

Méd: ,
Service:

22-Nov-2022 12:54:39

Fréq. Card.: 54 BPM
Int PR: 141 ms
Dur.QRS: 89 ms
QT/QTc: 415/401 ms
Axes P-R-T: 24 29 16

