

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Herminette - Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° M21- 073832

139303

- Maladie Dentaire Optique Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 3472 Société :

Actif Pensionné(e) Autre : Veuve

Nom & Prénom : LAHROU Fatima

Date de naissance :

Adresse : 197 Lattissier KHAOUJA DERBA

Tél. : 0777818953 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr. Mouhsine Mustapha
Traumato - Orthopédie
Rue Okba Ibn Nafie - Berrechid
Tél: 05 22 22 79 59

Date de consultation : 45 Nov 2022

Nom et prénom du malade : Age :

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : Affection de l'appareil locomoteur

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : 2024 Le : 30/11/22
Signature de l'adhérent(e) :

Autorisation CNDP N° : AA-215 / 2019

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
15 Nov 2022		05	200	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	15.11.22	172,30

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
	15 Nov 2022	Rx	200

AUXILIAIRES MEDICAUX


Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	PC	IM	IV	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	Coefficient DES TRAVAUX														
							<input type="text"/>											
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>														
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>														
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>														
O.D.F. PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			Coefficient DES TRAVAUX														
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">H</td> </tr> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>G</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> <tr> <td colspan="2">B</td> </tr> </table>		H		25533412	21433552	00000000	00000000	D	G	00000000	00000000	35533411	11433553	B			<input type="text"/>
	H																	
25533412	21433552																	
00000000	00000000																	
D	G																	
00000000	00000000																	
35533411	11433553																	
B																		
	(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>														
				DATE DU DEVIS <input type="text"/>														
				DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>														

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr. Mouhsine Mustapha
Traumatolo - Orthopedie
Rue Okba Ibn Nafie - Berrechid
Tél: 0522 33 79 59

Le: 15 Nove 2022

ORDONNANCE

CATERON Lactom

M480

~~Tdex 200~~



LOT 22002
PER 02/25
RPV 144DH 3/0

~~re 2x/2h~~

1800

~~Neolo deo~~

~~re 2x/2h~~



172, 20

Dr. Mouhsine Mustapha
Traumatolo - Orthopedie
Rue Okba Ibn Nafie - Berrechid
Tél: 0522 33 79 59

PHARMACIE CHAWKI
Dr. A. CHAWKI ELAMARI
Tél: 0522.53.27.56

NO-DOL®

Paracétamol / Codéine Phosphate Hémihydraté

Comprimé

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

• Gardez cette notice. Vous pourrez avoir besoin de la relire.
• Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, ou votre pharmacien.

• Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

• Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que NO-DOL Codéine 500 mg/30 mg, comprimé et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre NO-DOL Codéine 500 mg/30 mg, comprimé ?

3. Comment prendre NO-DOL Codéine 500 mg/30 mg, comprimé ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver NO-DOL Codéine 500 mg/30 mg, comprimé ?

6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. **QU'EST-CE QUE NO-DOL Codéine 500 mg/30 mg, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

CLASSE pharmacothérapeutique : ANALGÉSQUES PÉRIPHÉRIQUES.

Code ATC : N02BE51

N : système nerveux central

Ce médicament est réservé à l'adulte et à l'adolescent à partir de 15 ans.

Ce médicament contient du paracétamol et de la codéine : c'est un

antalgique (calme la douleur).

La codéine appartient à un groupe de médicaments appelés les

antalgiques opioïdes qui agissent pour soulager la douleur. Elle peut être

utilisée seule ou en association avec d'autres antalgiques comme le

paracétamol.

Ce médicament peut être utilisé chez l'adulte et l'adolescent à partir de 15

ans sans aucun contre-indication et des douleurs non soulagées par d'autres antalgiques comme le paracétamol ou l'ibuprofène utilisés seuls.

Vous devez-vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

PRENDRE NO-DOL Codéine 500 mg/30 mg, comprimé ?

• **NE PRENEZ JAMAIS NO-DOL Codéine 500 mg/30 mg, comprimé :**

• chez les enfants de moins de 15 ans,

• si vous souffrez de déshydratation,

• si vous souffrez de l'alcool récemment,

• de l'alcool récemment,

• si vous avez subi récemment de l'alcool ou que vous avez arrêté de boire

• si vous avez subi récemment de l'alcool ou que vous avez arrêté de boire

• si vous souffrez de malnutrition chronique, si vous êtes en

• Si vous êtes allergiques au paracétamol et/ou à la codéine, ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la

rubrique 6,
• si vous souffrez d'une maladie grave du foie,
• si vous avez des difficultés pour respirer (insuffisance respiratoire),

• si vous avez de l'asthme, si vous allaitez (voir grossesse et allaitement),

• si vous allaitez (voir grossesse et allaitement),

• Pour soulager la douleur chez l'enfant et l'adolescent (0 - 18 ans) après

ablation des amygdales ou des végétations dans le cadre d'un syndrome

d'apnée obstructive du sommeil,

• Si vous savez que vous êtes un métaboliseur ultra-rapide de la codéine

en morphine.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre NO-DOL

Codéine 500 mg/30 mg, comprimé.

Mises en garde spéciales

Ce médicament contient du paracétamol et de la codéine.

D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas afin de ne pas

dépasser les doses maximales conseillées (voir Foliole et Mode

d'administration).

• Ne pas utiliser de façon prolongée sans avis médical :

• L'usage prolongé de ce médicament peut entraîner une dépendance.

Tout autre signe après la prise du médicament.

• Ne pas dépasser les posologies indiquées et consulter rapidement le

médecin en cas de surdosage accidentel.

La codéine est transformée en morphine dans le foie par une enzyme. La

morphine est la substance qui soulage la douleur. Pour d'autres

informations, et en particulier sur la façon de prendre NO-DOL Codéine

ADULTES, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

• Demandez l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant de

prendre NO-DOL Codéine ADULTES.

de la famille des benzodiazépines.

La prise

du foie.

• si vous devez

• si vous avez

• si vous êtes ?

• si vous souffrez d'une maladie grave du foie,

• si vous avez des difficultés pour respirer (insuffisance respiratoire),

• si vous allaitez (voir grossesse et allaitement),

• si vous avez de l'asthme, si vous allaitez (voir grossesse et allaitement),

• Pour soulager la douleur chez l'enfant et l'adolescent (0 - 18 ans) après

ablation des amygdales ou des végétations dans le cadre d'un syndrome

d'apnée obstructive du sommeil,

• Si vous savez que vous êtes un métaboliseur ultra-rapide de la codéine

en morphine.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre NO-DOL

Codéine 500 mg/30 mg, comprimé.

Mises en garde spéciales

Ce médicament contient du paracétamol et de la codéine.

D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas afin de ne pas

dépasser les doses maximales conseillées (voir Foliole et Mode

d'administration).

• Ne pas utiliser de façon prolongée sans avis médical :

• L'usage prolongé de ce médicament peut entraîner une dépendance.

Tout autre signe après la prise du médicament.

• Ne pas dépasser les posologies indiquées et consulter rapidement le

médecin en cas de surdosage accidentel.

La codéine est transformée en morphine dans le foie par une enzyme. La

morphine est la substance qui soulage la douleur. Pour d'autres

informations, et en particulier sur la façon de prendre NO-DOL Codéine

ADULTES, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

• Demandez l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant de

prendre NO-DOL Codéine ADULTES.

de la famille des benzodiazépines.

La prise

du foie.

• si vous devez

• si vous avez

• si vous êtes ?

• si vous souffrez d'une maladie grave du foie,

• si vous avez des difficultés pour respirer (insuffisance respiratoire),

• si vous allaitez (voir grossesse et allaitement),

• si vous avez de l'asthme, si vous allaitez (voir grossesse et allaitement),

• Pour soulager la douleur chez l'enfant et l'adolescent (0 - 18 ans) après

ablation des amygdales ou des végétations dans le cadre d'un syndrome

d'apnée obstructive du sommeil,

• Si vous savez que vous êtes un métaboliseur ultra-rapide de la codéine

en morphine.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre NO-DOL

Codéine 500 mg/30 mg, comprimé.

Mises en garde spéciales

Ce médicament contient du paracétamol et de la codéine.

D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas afin de ne pas

dépasser les doses maximales conseillées (voir Foliole et Mode

d'administration).

• Ne pas utiliser de façon prolongée sans avis médical :

• L'usage prolongé de ce médicament peut entraîner une dépendance.

Tout autre signe après la prise du médicament.

• Ne pas dépasser les posologies indiquées et consulter rapidement le

médecin en cas de surdosage accidentel.

La codéine est transformée en morphine dans le foie par une enzyme. La

morphine est la substance qui soulage la douleur. Pour d'autres

informations, et en particulier sur la façon de prendre NO-DOL Codéine

ADULTES, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

• Demandez l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant de

prendre NO-DOL Codéine ADULTES.

de la famille des benzodiazépines.

La prise

du foie.

• si vous devez

• si vous avez

• si vous êtes ?

• si vous souffrez d'une maladie grave du foie,

• si vous avez des difficultés pour respirer (insuffisance respiratoire),

• si vous allaitez (voir grossesse et allaitement),

• si vous avez de l'asthme, si vous allaitez (voir grossesse et allaitement),

• Pour soulager la douleur chez l'enfant et l'adolescent (0 - 18 ans) après

ablation des amygdales ou des végétations dans le cadre d'un syndrome

d'apnée obstructive du sommeil,

• Si vous savez que vous êtes un métaboliseur ultra-rapide de la codéine

en morphine.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre NO-DOL

Codéine 500 mg/30 mg, comprimé.

Mises en garde spéciales

Ce médicament contient du paracétamol et de la codéine.

D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas afin de ne pas

dépasser les doses maximales conseillées (voir Foliole et Mode

d'administration).

• Ne pas utiliser de façon prolongée sans avis médical :

• L'usage prolongé de ce médicament peut entraîner une dépendance.

Tout autre signe après la prise du médicament.

• Ne pas dépasser les posologies indiquées et consulter rapidement le

médecin en cas de surdosage accidentel.

La codéine est transformée en morphine dans le foie par une enzyme. La

morphine est la substance qui soulage la douleur. Pour d'autres

informations, et en particulier sur la façon de prendre NO-DOL Codéine

ADULTES, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

• Demandez l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant de

prendre NO-DOL Codéine ADULTES.

de la famille des benzodiazépines.

La prise

du foie.

• si vous devez

• si vous avez

• si vous êtes ?

• si vous souffrez d'une maladie grave du foie,

• si vous avez des difficultés pour respirer (insuffisance respiratoire),

• si vous allaitez (voir grossesse et allaitement),

• si vous avez de l'asthme, si vous allaitez (voir grossesse et allaitement),

• Pour soulager la douleur chez l'enfant et l'adolescent (0 - 18 ans) après

ablation des amygdales ou des végétations dans le cadre d'un syndrome

d'apnée obstructive du sommeil,

• Si vous savez que vous êtes un métaboliseur ultra-rapide de la codéine

en morphine.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre NO-DOL

Codéine 500 mg/30 mg, comprimé.

Mises en garde spéciales

Ce médicament contient du paracétamol et de la codéine.

D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas afin de ne pas

dépasser les doses maximales conseillées (voir Foliole et Mode

d'administration).

• Ne pas utiliser de façon prolongée sans avis médical :

• L'usage prolongé de ce médicament peut entraîner une dépendance.

Tout autre signe après la prise du médicament.

• Ne pas dépasser les posologies indiquées et consulter rapidement le

médecin en cas de surdosage accidentel.

La codéine est transformée en morphine dans le foie par une enzyme. La

morphine est la substance qui soulage la douleur. Pour d'autres

informations, et en particulier sur la façon de prendre NO-DOL Codéine

ADULTES, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

• Demandez l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant de

prendre NO-DOL Codéine ADULTES.

de la famille des benzodiazépines.

La prise

du foie.

• si vous devez

• si vous avez

• si vous êtes ?

• si vous souffrez d'une maladie grave du foie,

• si vous avez des difficultés pour respirer (insuffisance respiratoire),

• si vous allaitez (voir grossesse et allaitement),

• si vous avez de l'asthme, si vous allaitez (voir grossesse et allaitement),

• Pour soulager la douleur chez l'enfant et l'adolescent (0 - 18 ans) après

ablation des amygdales ou des végétations dans le cadre d'un syndrome

d'apnée obstructive du sommeil,

• Si vous savez que vous êtes un métaboliseur ultra-rapide de la codéine

en morphine.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre NO-DOL

Codéine 500 mg/30 mg, comprimé.

Mises en garde spéciales

Ce médicament contient du paracétamol et de la codéine.

D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas afin de ne pas

dépasser les doses maximales conseillées (voir Foliole et Mode

d'administration).

• Ne pas utiliser de façon prolongée sans avis médical :

• L'usage prolongé de ce médicament peut entraîner une dépendance.

Tout autre signe après la prise du médicament.

• Ne pas dépasser les posologies indiquées et consulter rapidement le

médecin en cas de surdosage accidentel.

La codéine est transformée en morphine dans le foie par une enzyme. La

morphine est la substance qui soulage la douleur. Pour d'autres

informations, et en particulier sur la façon de prendre NO-DOL Codéine

ADULTES, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

• Demandez l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant de

prendre NO-DOL Codéine ADULTES.

de la famille des benzodiazépines.

La prise

du foie.

• si vous devez

• si vous avez

• si vous êtes ?

• si vous souffrez d'une maladie grave du foie,

• si vous avez des difficultés pour respirer (insuffisance respiratoire),

• si vous allaitez (voir grossesse et allaitement),

• si vous avez de l'asthme, si vous allaitez (voir grossesse et allaitement),

• Pour soulager la douleur chez l'enfant et l'adolescent (0 - 18 ans) après

ablation des amygdales ou des végétations dans le cadre d'un syndrome

d'apnée obstructive du sommeil,

• Si vous savez que vous êtes un métaboliseur ultra-rapide de la codéine

en morphine.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre NO-DOL

Codéine 500 mg/30 mg, comprimé.

Mises en garde spéciales

Ce médicament contient du paracétamol et de la codéine.

D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas afin de ne pas

dépasser les doses maximales conseillées (voir Foliole et Mode

d'administration).

• Ne pas utiliser de façon prolongée sans avis médical :

• L'usage prolongé de ce médicament peut entraîner une dépendance.

Tout autre signe après la prise du médicament.

• Ne pas dépasser les posologies indiquées et consulter rapidement le

médecin en cas de surdosage accidentel.

La codéine est transformée en morphine dans le foie par une enzyme. La

morphine est la substance qui soulage la douleur. Pour d'autres

informations, et en particulier sur la façon de prendre NO-DOL Codéine

ADULTES, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

• Demandez l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant de

prendre NO-DOL Codéine ADULTES.

de la famille des benzodiazépines.

La prise

du foie.

• si vous devez

• si vous avez

• si vous êtes ?

• si vous souffrez d'une maladie grave du foie,

Dr. Mouhsine

Traumatolo - C.

Rue Okba Ibn Nafie - Berrichid

Tél: 0522 33 79 59

Le:

15 Nove 2022

ORDONNANCE

Fat DR

Attention

Epauk Antouveug

Sauke epauk rade

Roum lation ol

d epauk saulw

12 June 2022

Dr. Mouhsine Mustapha

Traumatolo - Orthopedie

Rue Okba Ibn Nafie - Berrichid

Tél: 0522 33 79 59

Dr. Mustapha MOUHSINE

Ancien enseignant à la Faculté
de Médecine à Casablanca
Ex. Maître Assistant au CHU

Ibn ROCHD
Spécialiste en
TRAUMATO - ORTHOPEDIE



الدكتور مصطفى محسن

أستاذ بكلية الطب و الصيدلة

و بمستشفى ابن رشد سابقا

إختصاصي في

جراحة العظام و المفاصل

Berrechid, le 15 Nove 2022 في برشيد،

Note d'Honoraire

- Nom : LATARON

- Prenom : FATIMA

- Consultation : 200

- Radiographie : 200

- Platre :

- Infiltration :

- Autre Acte :

Total : 400



Rue Okba Ibn Nafie, Résidence Dahane - Berrechid - Tél: 05 22 33 79 59