

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
26/01/2022			15000	INP : 091115168 Cabinet Médical Dr Naïm Mohamed Dabma

Cabinet Médical
Docteur Naimi Mohamed
Soc. 16 N°62 Rue Rahma
Dar Bouazza - Casablanca

EXECUTION DES ORDONNANCES - Casablanca

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Demandé	Montant de la Facture
PHARMACIE GRANADA LAHLOU NABIL Loubna - Onssemment Meknassa Lot. N° 39 Rue 25 N° 27 Casablanca Tél.: 05 22 80 48 44	26/11/2022		739,40

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

AUXILIAIRES MÉDICAUX

Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est tenu de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important:

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP : []														
				COEFFICIENT DES TRAVAUX []														
				MONTANTS DES SOINS []														
				DEBUT D'EXECUTION []														
				FIN D'EXECUTION []														
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			COEFFICIENT DES TRAVAUX []														
	<table border="1"> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">D</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> <tr> <td colspan="2">B</td> </tr> <tr> <td colspan="2">G</td> </tr> </table>			25533412	21433552	00000000	00000000	D		00000000	00000000	35533411	11433553	B		G		MONTANTS DES SOINS []
25533412	21433552																	
00000000	00000000																	
D																		
00000000	00000000																	
35533411	11433553																	
B																		
G																		
				DATE DU DEVIS []														
				DATE DE L'EXECUTION []														
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS																		
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION																		

Casablanca, Le 26.11.2022 الدار البيضاء في

Conseil de HASSAN.

109.70

- Contiflo



CONTIFLO®



91.00 x 2 = 182.00

- stat sol



79.90

- furosemide



140.90

- Aspirin



48.75

- collyre



192.80

- Risperidone



PPV: 140.90 DH

ARMERIA GRANADA
LAHLOU MABIL Loubna
dissement M. Bouzoua Lot. N° 39
Rue 25 Novembre Casablanca
Tél.: 0661 22 89 48 44




Cabinet Médical
Docteur Naimi Mohamed
Bld. 16 N°62 Ville Rahma
Dar Bouazza - Casablanca

55.40

200

200

739.40



Surgam® 200 mg

Acide tiaprofénique

comprimé sécable.

1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

a/ Dénomination :

SURGAM 200 mg, comprimé sécable.

b) Composition :

Acide tiaprofénique..... 200 mg.
Excipients : amidon de maïs, pluronics F68, stéarate de magnésium, talc.

c) Forme pharmaceutique :

Comprimé sécable, boîte de 20.

d) Classe pharmaco-thérapeutique :

ANTI-INFLAMMATOIRE, ANTIRHUMATISME, NON STÉROÏDIEN.

2. DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

(INDICATIONS THERAPEUTIQUES)

Ce médicament est indiqué, chez l'adulte et l'enfant à partir de 20 kg (soit environ à partir de 6 ans) :

- en traitement de longue durée dans :
 - certains rhumatismes inflammatoires chroniques,
 - certaines arthroses sévères ;
 - en traitement de courte durée dans :
 - les douleurs aiguës d'arthrose,
 - les douleurs lombaires aiguës,
 - les douleurs et œdèmes liés à un traumatisme ;
 - lors de règles douloureuses ;
 - en traitement de certaines douleurs inflammatoires (gorge, oreille, bouche, nez).

3. ATTENTION !

a) Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament : (Contre-indications)

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

- au delà de 5 mois de grossesse révolus (24 semaines d'aménorrhée),
- antécédents d'allergie ou d'asthme déclenchés par la prise de ce médicament ou d'un médicament apparenté, notamment autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, aspirine,
- antécédents d'allergie à l'un des constituants du comprimé,
- ulcère de l'estomac ou du duodénum en évolution,
- maladie grave du foie,
- maladie grave des reins,
- maladie grave du cœur,
- enfants de moins de 20 kg, soit environ 6 ans (en raison du dosage inadapté).

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

b) Mises en garde spéciales :

CE MEDICAMENT NE DOIT ETRE PRIS QUE SOUS SURVEILLANCE MEDICALE.

LO1 : 20E017
PER : 12 2022
P.P.V.: 55DH40

6 118000 060657

PREVENIR VOTRE MEDECIN :

- en cas d'antécédent d'asthme associé à une rhinite chronique, une sinusite chronique ou des polypes dans le nez. L'administration de Surgam peut entraîner une crise d'asthme, notamment chez certains sujets allergiques à l'aspirine ou à un anti-inflammatoire non stéroïden (cf. contre indications) ;
- en cas de traitement anticoagulant concomitant. Ce médicament peut entraîner des manifestations gastro-intestinales graves ;
- en cas d'infection. La surveillance médicale doit être renforcée ;
- en cas de varicelle. Ce médicament est déconseillé en raison d'exceptionnelles infections graves de la peau.

INTERROMPRE IMMEDIATEMENT LE TRAITEMENT en cas de :

- hémorragie gastro-intestinale,
- lésions sévères de la peau à l'aspect de cloques et de brûlures sur tout le corps (cf. Effets non souhaités et gênants).
- signes évocateurs d'allergie à ce médicament, notamment crise d'asthme ou brusque gonflement du visage et du cou (cf. Effets non souhaités et gênants).

CONTACTEZ IMMEDIATEMENT UN MEDECIN OU UN SERVICE MEDICAL D'URGENCE.

c) Précautions d'emploi :

Ce médicament existe sous forme d'autres dosages qui peuvent être plus adaptés.

En raison de la nécessité d'adapter le traitement, il est important de PREVENIR VOTRE MEDECIN en cas :

- d'antécédents digestifs (ulcère de l'estomac ou du duodénum ancien), hémorragie digestive,
- de maladie du cœur, du foie ou du rein,
- d'asthme : la survenue de crise d'asthme chez certains sujets peut être liée à une allergie à l'aspirine ou à un anti-inflammatoire non stéroïden (cf. Contre-indications).

EN CAS DE DOUCE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

d) Interactions médicamenteuses et autres interactions :

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, notamment avec les anticoagulants oraux, les autres anti-inflammatoires non stéroïdiens (y compris l'aspirine et ses dérivés), l'héparine, le lithium, le méthotrexate (à doses supérieures à 15 mg par semaine). IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

e) Grossesse-Allaitements :

Au cours du 1er trimestre de grossesse (12 semaines d'aménorrhée soit 12 semaines après le 1er jour de vos dernières règles), votre médecin peut être amené, si nécessaire, à vous prescrire ce médicament.

De 2,5 à 5 mois de grossesse révolus (12 à 24 semaines d'aménorrhée), ce médicament ne sera utilisé que sur les



Solution buvable

Fitora

Lot :
À consommer
avant le :

210698

09/2024

PPC : 79,90 DH

FORMES ET PRESENTATIONS :

Fitora® Adultes Solution buvable, flacon 200ml.

Fitora® Enfants Solution buvable, flacon 200ml.

PROPRIETES :

Fitora® solution buvable est à base d'extraits de Propolis, d'Échinacée ainsi que d'autres actifs naturels qui contribuent à libérer les voies respiratoires encombrées et à apaiser l'irritation de la gorge tout en fortifiant les défenses naturelles de l'organisme procurant ainsi un confort respiratoire global.

UTILISATIONS :

- Voies respiratoires encombrées.
- Gorge irritée.
- Enrouement.

CONSEILS D'UTILISATION :

Fitora® Solution buvable Adultes : 1 cuillère à soupe 3 à 4 fois par jour.

Fitora® Solution buvable Enfants : - Moins de 4 ans : 1 cuillère à café 3 fois par jour.

- De 4 à 12 ans : 1 cuillère à soupe 3 fois par jour.

PRECAUTIONS D'UTILISATION :

- Déconseillé aux personnes allergiques aux produits de la ruche.
- Tenir hors de la portée des enfants.
- Après ouverture, à conserver au frais et à consommer dans un délai d'un mois.
- Le produit peut présenter des sédiments dûs à la nature de ses composants, toutefois sa qualité et son efficacité ne sont pas altérées.
- Fitora® Solution buvable Adultes est déconseillé chez la femme enceinte.

Complément alimentaire, ce n'est pas un médicament

Fabriqué par Pharmalife Research - Italie.

Importé et distribué au Maroc par MEDIPRO Pharma.

Autorisations du Ministère de la Santé n° :

Fitora® Solution buvable Adultes : DA20211405040/MAv2/DMP/CA/18

Fitora® Solution buvable Enfants : DA 20161405271DMP/20UCA/v1

STATICOL® 20 et 40 mg

Comprimé pelliculé
Simvastatine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la referer.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

Composition qualitative et quantitative

SIMVASTATINE (DCI)	P cp
	20 mg ou... 40 mg

Excipients..... O.S.P..... 1 comprimé pelliculé

EXCIPENTS A EFFET NOTOIRE

Lactose.

Forme pharmaceutique :

STATICOL® 20 mg : Boîtes de 14 et de 28 ;

STATICOL® 40 mg : Boîtes de 30.

Classe pharmaco-thérapeutique

Hypolipémiant : inhibiteur de l'HMG-CoA réductase.

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

STATICOL® est un médicament utilisé pour faire baisser les taux du cholestérol total, du mauvais cholestérol (cholestérol LDL), et des substances grasses appelées triglycérides dans le sang. De plus, STATICOL® augmente les niveaux du bon cholestérol (cholestérol HDL). STATICOL® fait partie de la classe de médicaments appelés statines.

Le cholestérol est une des nombreuses substances grasses trouvées dans le système sanguin. Votre cholestérol total est composé principalement de cholestérol LDL et de cholestérol HDL.

Le LDL cholestérol est souvent appelé le « mauvais » cholestérol parce qu'il peut s'agglomérer sur les parois de vos artères en formant une plaque. L'augmentation de cette plaque peut mener à un rétrécissement des artères. Ce rétrécissement peut ralentir ou bloquer le flux sanguin vers les organes vitaux comme le cœur et le cerveau. Ce blocage du flux sanguin peut entraîner une crise cardiaque ou une attaque cérébrale.

Le HDL cholestérol est souvent appelé le « bon » cholestérol parce qu'il aide à empêcher le mauvais cholestérol de s'agglomérer dans les artères et protège contre les maladies cardiaques.

Tes triglycérides sont une autre forme de graisse dans votre sang qui peuvent augmenter votre risque de maladie cardiaque.

Vous devez poursuivre un régime hypocholestérolémiant pendant la prise de ce médicament.

STATICOL® est utilisé en complément d'un régime hypocholestérolémiant, si vous avez :

- Un taux élevé de cholestérol dans votre sang (hypercholestérolémie primaire) ou des niveaux élevés de graisse dans votre sang (dyslipidémie mixte).

- Une maladie héréditaire (hypercholestérolémie familiale homozygote) qui augmente le taux de cholestérol dans le sang. Vous pouvez également recevoir d'autres traitements.

- Une insuffisance coronarienne ou un risque élevé d'insuffisance coronarienne (parce que vous avez un diabète, avec un antécédent d'accident vasculaire cérébral ou une maladie vasculaire d'origine athéroscléreuse). STATICOL® peut prolonger votre vie en réduisant le risque de problèmes cardiaques, indépendamment de votre cholestérol sanguin.

Chez la plupart des gens, il n'y a pas de symptôme immédiat dû à un taux élevé de cholestérol. Votre médecin peut mesurer votre cholestérol à l'aide d'un simple test sanguin. Consultez votre médecin régulièrement, vérifiez votre cholestérol, et discutez avec votre médecin des résultats à atteindre.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?

POSLOGIE :

Votre médecin déterminera la posologie en fonction de votre état de santé, de votre traitement en cours tout en tenant compte de vos facteurs de risque.

Toujours prendre ce médicament comme votre médecin vous l'a indiqué. Vérifiez avec votre médecin ou votre pharmacien si vous n'êtes pas sûr.

Vous devez suivre un régime faisant baisser le cholestérol pendant le traitement par STATICOL®.

Dosage :

La dose recommandée est de 5mg, 10mg, 20mg, 40mg ou 80mg de simvastatine, par voie orale, par jour.

Adultes :

La dose habituelle de départ est de 10, 20 ou dans quelques cas 40 mg par jour. Votre médecin pourra ajuster la posologie après au moins 4 semaines de traitement à une dose maximum de 80 mg/jour. Ne prenez pas plus de 80 mg par jour.

Votre médecin peut vous prescrire un peu faible dosage, surtout si vous prenez certains des médicaments listés ci-dessus, ou si vous avez des problèmes rénaux.

La dose de 80 mg est uniquement recommandée aux patients adultes à très haut taux de cholestérol et à fort risque de problèmes cardiaques et qui n'ont pas atteint le taux de cholestérol souhaité à de faibles doses.

Enfants :

Pour les enfants (âgés de 10 à 17 ans), la dose usuelle recommandée pour débuter le traitement est de 10 mg par jour à prendre le soir. La dose maximale recommandée est de 40 mg par jour.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION :

Prenez STATICOL® en prise unique le soir. Vous pouvez le prendre avec ou sans aliments.

DURÉE DE TRAITEMENT :

Continuez à prendre STATICOL®, à moins que votre médecin ne vous demande d'arrêter.

Si votre médecin vous a prescrit STATICOL® avec un autre médicament qui fait baisser le cholestérol contenant un inhibiteur de l'acide biliaire, vous devez prendre STATICOL® au moins 2 heures avant ou 4 heures après avoir pris le inhibiteur de l'acide biliaire.

NE DÉPASSEZ PAS LA POSLOGIE NI LA DUREE DE TRAITEMENT PRÉSCRITES PAR VOTRE MÉDECIN.

ATTENTION !

NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT.

91,00

- Des inhibiteurs de protéase ou... dans le traitement des infections par le VIH,
- Du bocepril ou du telagrévir (utilisés dans le traitement de...),
- De la néfazodone (utilisé dans le traitement de la dépression),
- Du cobicistat,
- Du gemfibrozil (utilisé pour baisser le cholestérol),
- De la cyclosporine (utilisée chez les patients transplantés),
- Du danazol (une hormone de synthèse, utilisée pour traiter l'extériorisation de l'utérus).

• Si vous prenez ou avez pris, dans les 7 derniers jours, ou si vous pourrez traiter les infections bactériennes).

• Ne dépassez pas la dose de STATICOL® 40mg si vous prenez ce rare liée au cholestérol).

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS

EFFECTS NON SOUHAITS ET GENANTS

COMME TOUS LES MÉDICAMENTS, STATICOL®, COMME TOUTES LES AUTRES SUBSTANCES CHIMIQUES, PEUT CAUSER DES EFFETS INDÉSIRABLES, SURTOUT DURANT LA PÉRIODE DE TRAITEMENT.

• Douleurs musculaires, sensibilité musculaire, faiblesse musculaire, douleurs articulaires, etc. Ces effets peuvent être graves, y compris une atteinte musculaire provoquant des problèmes de santé.

• Réactions d'hypersensibilité (allergie) incluant :

- Gonflement du visage, de la langue et/ou de la gorge pouvant entraîner une difficultés à respirer,
- Douleurs musculaires graves, généralement dans les épaules,
- Eruption accompagnée d'une faiblesse des membres et des muscles,
- Douleur ou inflammation des articulations (rhumatisme inflammatoire),
- Inflammation des vaisseaux sanguins (vasculite),
- Bleus exceptionnels, éruptions cutanées et gonflement (dermatonévrose),
- Esoufflements (dyspnée) et malaises,
- Syndrome lupique (incluant éruption, troubles des articulations, etc.)

• Troubles du foie avec les symptômes suivants : jaunissement décoloré, sensation d'être fatigué(e) ou faible, perte de l'appétit,

• Inflammation du pancréas souvent avec douleur abdominale se déplaçant vers le dos,

• Diminution des globules rouges (anémie),

• Engourdissement et faiblesse des bras et jambes,

• Maux de tête, sensation de fourmissement, étourdissements,

• Problèmes digestifs (douleur abdominale, constipation, flatulence),

• Éruption, démangeaisons, perte de cheveux,

• Faiblesse,

• Sommeil agité (très rare),

• Mauvaise mémoire (très rare), perte de mémoire, confusion,

• Troubles de l'érection,

• Dépression,

• Inflammation des poumons causant des problèmes de respiration,

• Problèmes de tendon, parfois compliqués par une rupture du tendon,

• Troubles du sommeil, y compris cauchemars,

• Troubles sexuels,

• Diabète. Vous pouvez débuter un diabète si vous avez un taux élevé de sucre dans le sang et si vous avez une pression artérielle élevée.

• Traitement avec ce médicament.

Test biologiques :

L'augmentation de certains tests hépatiques et d'une enzyme mu-

MISE EN GARDE SPÉCIALES ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Avertissements et précautions :

Informez votre médecin :

• D'un problème médical que vous avez ou avez eu, et de toute autre maladie que vous avez.

• Si vous consommez d'importantes quantités d'alcool.

• Si vous avez ou avez eu une maladie du foie : STATICOL® peut entraîner une maladie du foie.

• Si vous devez subir une opération. Vous pouvez être amené à arrêter le traitement.

• Si vous êtes asthmatique, parce qu'un dosage différent peut être nécessaire.

• Votre médecin devra vous prescrire un bilan sanguin avant de commencer le traitement avec ce médicament.

Votre médecin peut également vous prescrire un bilan sanguin au début du traitement par STATICOL®.

A cours de votre traitement avec ce médicament, si vous êtes dans l'un de ces groupes, informez votre médecin.

• Vous seriez suivi attentivement par votre médecin. Vous pouvez avoir des symptômes de maladie du foie.

• Vous seriez suivi attentivement par votre médecin.

STATICOL® 20 et 40 mg

Comprimé pelliculé
Simvastatine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la referer.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

Composition qualitative et quantitative

SIMVASTATINE (DCI)	P cp
	20 mg ou... 40 mg

Excipients..... O.S.P..... 1 comprimé pelliculé

EXCIPENTS A EFFET NOTOIRE

Lactose.

Forme pharmaceutique :

STATICOL® 20 mg : Boîtes de 14 et de 28 ;

STATICOL® 40 mg : Boîtes de 30.

Classe pharmaco-thérapeutique

Hypolipémiant : inhibiteur de l'HMG-CoA réductase.

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

STATICOL® est un médicament utilisé pour faire baisser les taux du cholestérol total, du mauvais cholestérol (cholestérol LDL), et des substances grasses appelées triglycérides dans le sang. De plus, STATICOL® augmente les niveaux du bon cholestérol (cholestérol HDL). STATICOL® fait partie de la classe de médicaments appelés statines.

Le cholestérol est une des nombreuses substances grasses trouvées dans le système sanguin. Votre cholestérol total est composé principalement de cholestérol LDL et de cholestérol HDL.

Le LDL cholestérol est souvent appelé le « mauvais » cholestérol parce qu'il peut s'agglomérer sur les parois de vos artères en formant une plaque. L'augmentation de cette plaque peut mener à un rétrécissement des artères. Ce rétrécissement peut ralentir ou bloquer le flux sanguin vers les organes vitaux comme le cœur et le cerveau. Ce blocage du flux sanguin peut entraîner une crise cardiaque ou une attaque cérébrale.

Le HDL cholestérol est souvent appelé le « bon » cholestérol parce qu'il aide à empêcher le mauvais cholestérol de s'agglomérer dans les artères et protège contre les maladies cardiaques.

Tes triglycérides sont une autre forme de graisse dans votre sang qui peuvent augmenter votre risque de maladie cardiaque.

Vous devez poursuivre un régime hypocholestérolémiant pendant la prise de ce médicament.

STATICOL® est utilisé en complément d'un régime hypocholestérolémiant, si vous avez :

- Un taux élevé de cholestérol dans votre sang (hypercholestérolémie primaire) ou des niveaux élevés de graisse dans votre sang (dyslipidémie mixte).

- Une maladie héréditaire (hypercholestérolémie familiale homozygote) qui augmente le taux de cholestérol dans le sang. Vous pouvez également recevoir d'autres traitements.

- Une insuffisance coronarienne ou un risque élevé d'insuffisance coronarienne (parce que vous avez un diabète, avec un antécédent d'accident vasculaire cérébral ou une maladie vasculaire d'origine athéroscléreuse). STATICOL® peut prolonger votre vie en réduisant le risque de problèmes cardiaques, indépendamment de votre cholestérol sanguin.

Chez la plupart des gens, il n'y a pas de symptôme immédiat dû à un taux élevé de cholestérol. Votre médecin peut mesurer votre cholestérol à l'aide d'un simple test sanguin. Consultez votre médecin régulièrement, vérifiez votre cholestérol, et discutez avec votre médecin des résultats à atteindre.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?

POSLOGIE :

Votre médecin déterminera la posologie en fonction de votre état de santé, de votre traitement en cours tout en tenant compte de vos facteurs de risque.

Toujours prendre ce médicament comme votre médecin vous l'a indiqué. Vérifiez avec votre médecin ou votre pharmacien si vous n'êtes pas sûr.

Vous devez suivre un régime faisant baisser le cholestérol pendant le traitement par STATICOL®.

Dosage :

La dose recommandée est de 5mg, 10mg, 20mg, 40mg ou 80mg de simvastatine, par voie orale, par jour.

Adultes :

La dose habituelle de départ est de 10, 20 ou dans quelques cas 40 mg par jour. Votre médecin pourra ajuster la posologie après au moins 4 semaines de traitement à une dose maximum de 80 mg/jour. Ne prenez pas plus de 80 mg par jour.

Votre médecin peut vous prescrire un peu faible dosage, surtout si vous prenez certains des médicaments listés ci-dessus, ou si vous avez des problèmes rénaux.

La dose de 80 mg est uniquement recommandée aux patients adultes à très haut taux de cholestérol et à fort risque de problèmes cardiaques et qui n'ont pas atteint le taux de cholestérol souhaité à de faibles doses.

Enfants :

Pour les enfants (âgés de 10 à 17 ans), la dose usuelle recommandée pour débuter le traitement est de 10 mg par jour à prendre le soir. La dose maximale recommandée est de 40 mg par jour.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION :

Prenez STATICOL® en prise unique le soir. Vous pouvez le prendre avec ou sans aliments.

DURÉE DE TRAITEMENT :

Continuez à prendre STATICOL®, à moins que votre médecin ne vous demande d'arrêter.

Si votre médecin vous a prescrit STATICOL® avec un autre médicament qui fait baisser le cholestérol contenant un inhibiteur de l'acide biliaire, vous devez prendre STATICOL® au moins 2 heures avant ou 4 heures après avoir pris le inhibiteur de l'acide biliaire.

NE DÉPASSEZ PAS LA POSLOGIE NI LA DUREE DE TRAITEMENT PRÉSCRITES PAR VOTRE MÉDECIN.

ATTENTION !

NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT.

91,00

- Des inhibiteurs de protéase ou... dans le traitement des infections par le VIH,
- Du bocepril ou du telagrévir (utilisés dans le traitement de...),
- De la néfazodone (utilisé dans le traitement de la dépression),
- Du cobicistat,
- Du gemfibrozil (utilisé pour baisser le cholestérol),
- De la cyclosporine (utilisée chez les patients transplantés),
- Du danazol (une hormone de synthèse, utilisée pour traiter l'extériorisation de l'utérus).

• Si vous prenez ou avez pris, dans les 7 derniers jours, ou si vous pourrez traiter les infections bactériennes).

• Ne dépassez pas la dose de STATICOL® 40mg si vous prenez ce rare liée au cholestérol).

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS

EFFECTS NON SOUHAITS ET GENANTS

COMME TOUS LES MÉDICAMENTS, STATICOL®, COMME TOUTES LES AUTRES

EFFECTS INDÉSIRABLES, SURTOUT DURANT LA PREMIÈRE TRAITEMENT.

- Douleurs musculaires, sensibilité musculaire, faiblesse musculaire, douleurs articulaires, etc., peuvent être graves, y compris une atteinte musculaire provoquant des problèmes de

• Réactions d'hypersensibilité (allergie) incluant :

- Gonflement du visage, de la langue et/ou de la gorge pouvant entraîner une difficultés à respirer,

- Douleurs musculaires graves, généralement dans les épaules,

- Eruption accompagnée d'une faiblesse des membres et des muscles,

- Douleur ou inflammation des articulations (rhumatisme inflammatoire),

- Inflammation des vaisseaux sanguins (vasculite),

- Bleus exceptionnels, éruptions cutanées et gonflement (dermatonévrose),

- Essoufflement (dyspnée) et malaises,

- Syndrome lupique (incluant éruption, troubles des articulations),

- Troubles du foie avec les symptômes suivants : jaunissement décoloré, sensation d'être fatigué(e) ou faible, perte de l'appétit,

- Inflammation du pancréas souvent avec douleur abdominale se

- Diminution des globules rouges (anémie),

- Engourdissement et faiblesses des bras et jambes,

- Maux de tête, sensation de fourmissement, étourdissements,

- Problèmes digestifs (douleur abdominale, constipation, flatulence),

- Éruption, démangeaisons, perte de cheveux,

- Faiblesse,

- Sommeil agité (très rare),

- Mauvaise mémoire (très rare), perte de mémoire, confusion,

- Troubles de l'érection,

- Dépression,

- Inflammation des poumons causant des problèmes de respiratoires,

- Problèmes de tendon, parfois compliqués par une rupture du tendon,

- Troubles du sommeil, y compris cauchemars,

- Troubles sexuels,

- Diabète. Vous pouvez débuter un diabète si vous avez un taux de

- en surpoids et si vous avez une pression artérielle (tension) élevée.

traitement avec ce médicament.

Test biologiques :

L'augmentation de certains tests hépatiques et d'une enzyme mu-

MISES EN GARDE SPÉCIALES ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Avertissements et précautions :

Informez votre médecin :

- D'un problème médical que vous avez ou avez eu, et de toute

- Si vous consommez d'importantes quantités d'alcool.

- Si vous avez ou avez eu une maladie du foie : STATICOL® peut entraîner une maladie du foie.

- Si vous devez subir une opération. Vous pouvez être amené à arrêter le traitement.

- Si vous êtes asthmatique, parce qu'un dosage différent peut être nécessaire.

Votre médecin devra vous prescrire un bilan sanguin avant de commencer le traitement avec ce médicament.

Votre médecin peut également vous prescrire un bilan sanguin au début du traitement par STATICOL®.

A cours de votre traitement avec ce médicament, si vous êtes

vous seriez suivi attentivement par votre médecin. Vous pouvez vous sentir

grasse élevée dans le sang, si vous êtes en surpoids et si vous avez

informez votre médecin si vous avez une insuffisance respiratoire.

En cas de douleur musculaire, de sensibilité musculaire douloreuse

médicament traitant. Ceci, car en de rares cas, les problèmes musculaires

entraînant des lésions des reins ; et très rarement des décès sont



Solupred® 20 mg

Prednisolone
Comprimé effervescent

Solupred Long

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

Composition

Métaulfobenoate de prednisolone et de sodium quantité correspondant en prednisolone à ... 20 mg. Excipients : Acide tartrique, acide citrique anhydre, bicarbonate de sodium, benzoate de lithium, citron arôme naturel, saccharinate de sodium, silicone émulsion anti-mousse.

Chaque comprimé contient 50,80 mg de sodium.

Forme pharmaceutique et présentation

Comprimé effervescent. (Flacon (verre) de 20).

Classe pharmaco-thérapeutique

GLUCOCORTICOIDES - USAGE SYSTEMIQUE
(H : Hormones systémiques non sexuelles)

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament est un corticoïde.

Il est indiqué dans certaines maladies, où il est utilisé pour son effet anti-inflammatoire.

ATTENTION !

Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- la plupart des infections,
- certaines maladies virales en évolution (hépatites virales, herpès, varicelle, zona),
- certains troubles mentaux non traités,
- vaccination par des vaccins vivants,
- allergie à l'un des constituants.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Mises en garde spéciales

Ce médicament doit être pris sous stricte surveillance médicale.

AVANT LE TRAITEMENT :

Prévenir votre médecin en cas de vaccination récente, en cas d'ulcère digestif, de maladies du colon, d'intervention chirurgicale récente au niveau de l'intestin, de diabète, d'hypertension artérielle, d'infection (notamment antécédents

de tuberculose), d'insuffisance hépatique, d'insuffisance rénale, d'ostéoporose et de myasthénie grave (maladie de muscle avec fatigue musculaire).

Prévenir votre médecin en cas de séjour dans les régions tropicales, subtropicales ou les îles de l'Europe, en raison du risque de maladie parasitaire.

La prise de ce médicament en association avec le sultopride (un médicament agissant sur le système nerveux central) ou avec un vaccin vivant atténué est à éviter (voir rubrique "interactions médicamenteuses et autres interactions").

PENDANT ET APRES LE TRAITEMENT :

Eviter le contact avec les sujets atteints de varicelle ou de rougeole.

En cas de traitement prolongé ne jamais arrêter brutalement le traitement mais suivre les recommandations de votre médecin pour la diminution des doses.

Sous traitement et au cours de l'année suivant l'arrêt du traitement, prévenir le médecin de la prise de corticoïde, en cas d'intervention chirurgicale ou de situation de stress (fièvre, maladie).

Les corticoïdes oraux ou injectables peuvent favoriser l'apparition de tendinopathie, voire de rupture tendineuse (exceptionnelle).

Prévenir votre médecin en cas d'apparition de douleur tendineuse.

Précautions d'emploi

Pendant le traitement, votre médecin pourra vous conseiller de suivre un régime, en particulier pauvre en sel. Tenir compte de l'apport en sodium (environ 51 mg par comprimé).

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Interactions médicamenteuses et autres interactions

Ce médicament DOIT ETRE EVITE en association avec le sultopride (un médicament agissant sur le système nerveux central) ou avec un vaccin vivant atténué (cf "Mises en garde spéciales").

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse - Allaitement

Grossesse :

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse qu'en cas de nécessité.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin