

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 7952

Société :

Actif Pensionné(e) Autre :

Nom & Prénom : AFKIR Mohamed

Date de naissance : 01/01/1951

Adresse : Rue 7 N° 21 Sidi EL Khatib Hay Hassan

Casablanca

Tél. : 06 60 88 11 50

Total des frais engagés : 1747,00 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 29/11/2022

Nom et prénom du malade : AIT KADDO ZAINA Age:

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : Gout/khore bi latimla

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.


Fait à : Casablanca

Le : 08/12/2022

Signature de l'adhérent(e) :





RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
29/11/22	CS		300,-	

EXECUTION DES ORDONNANCES

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<i>RECEPTE PHARMACIE DE LA CITE MONTAUBAN</i>	<i>28/01/2022</i>	<i>527,00</i>

. ANALYSES - RADIOGRAPHIES

ANALYSES - RADIOGRAPHIES			
Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
 10, Imm. Comptoir d'Oran - route de la Gourma el Bd. Sidi Abderrahmane - 31000 ORAN Tel : 05 22 90 10 10 / 05 22 90 07	01-12-21	Z ₉₂	920,00

AUXILIAIRES MEDICAUX

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important:

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
D	G
00000000	00000000
35533411	11433553

[Création, remont, adjonction]

The diagram shows a circular arrangement of numbers from 1 to 16 in a hexagonal pattern. The numbers are arranged in a circle with 16 positions. The vertices of the circle are labeled with letters: H at the top, D on the left, G on the right, and B at the bottom. The numbers are distributed as follows: the top row has 1, 2, 1; the second row has 2, 3, 1, 2; the third row has 3, 4, 2, 3; the fourth row has 4, 5, 3, 4; the fifth row has 5, 6, 4, 5; the sixth row has 6, 7, 5, 6; the seventh row has 7, 8, 6, 7; the eighth row has 8, 9, 7, 8; the ninth row has 9, 10, 8, 9; the tenth row has 10, 11, 9, 10; the eleventh row has 11, 12, 10, 11; the twelfth row has 12, 13, 11, 12; the thirteenth row has 13, 14, 12, 13; the fourteenth row has 14, 15, 13, 14; the fifteenth row has 15, 16, 14, 15; and the sixteenth row has 16, 1, 15, 16.

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Abderrahmane ABOUCHAMA

Chirurgien Orthopédiste et Traumatologue

- Diplômé de l'Université de Louvain à Bruxelles
- Ancien Interne des Hôpitaux de France
- Ancien Praticien en Belgique
- Diplôme de Médecine et traumatologie du Sport à Reims
- Chirurgie Traumatologique et du Rhumatisme
- Chirurgie de la Colonne Vertébrale
- Chirurgie de la Main et Pied
- Chirurgie Arthroscopique



الدكتور عبد الرحمن أبو شامة

اختصاصي في جراحة العظام و المفاصل

- شهادة من جامعة لوفان ببروكسل
- طبيب داخلي سابق بمستشفى فرنسا
- وممارس سابق ببليجيكا
- دبلوم في الطب الرياضي والإصابات ببرنس
- الجراحة بالمنظار الداخلي للمفاصل
- جراحة الكسور و الروماتيزم
- جراحة العمود الفقري
- جراحة اليد و القدم

Casablanca, le : 29/11/2022 الدار البيضاء، في:

Dr AIT KADDO ZAINA

1- 14950

Curaflex Sacher
lsacher f.i

1S

3 mg

14950

2- Curaflex
1S + 2Li

1S

1 mg
2 mg

3 19840

Moncef

1S

Dr M

4- 80451 mg + 3Li

1S


Dr M

4s 527,00 1S + 2Li

61, Boulevard Oued Darâa, Oulfa - Casablanca شارع واد درعة، الألفة - الدار البيضاء

الهاتف : 06 61 24 13 16 Tél. : 05 22 27 48 01 المستعجلات :

PHARMACIE RAJAA
Angle Av. (A) et (E)
Sidi El Khadir H. Hassan
Tél : 05 22 90 32 49





Comprimé
Voie orale

curarti®
forte

PPC : 149,50 DH

Lot :
À consommer ~~avant~~ préférence avant le :

curarti® forte
comprimé

325086
06/2025

FORME ET PRÉSENTATION :

Comprimé, boîte de 30.

COMPOSITION (par comprimé) :

Agents de charge (cellulose, phosphate de calcium), Complexe soluble de bêta-cyclodextrine (humectant) et de curcumine (extrait de rhizomes de Curcuma-Curcuma longa standardisé), Acide ascorbique (vitamine C), antiagglomérant (dioxyde de silicium), stabilisant (carboxyméthylcellulose sodique réticulée), antiagglomérant (sels de magnésium d'acides gras végétaux), molybdate d'ammonium, agent d'enrobage : hydroxypropylméthylcellulose, cellulose, acides gras et colorants (dioxyde de titane et oxyde de fer).

CURAFLEX®



FORME ET PRES

Sachets - doses,

COMPOSITION

Eau déminéralisé
citrique, Vitamine

Lot : VT235

A consommer de
préférence avant le : 04/2025

PPC : 149,50 DH

difiant : acide
sodium,

conservateurs : sorbitol, sucre, potassium, arômes, Gluconate de manganèse (manganèse : 1mg), édulcorants : sucralose, glycosides de stéviol, Gluconate de cuivre (cuivre : 0,5 mg).

SANS GLUTEN-SANS LACTOSE-AVEC EDULCORANT.

PROPRIÉTÉS :

CURAFLEX® sachets est à base d'un complexe bio-optimisé innovant qui renferme des peptides actifs de Collagène, de l'Acide hyaluronique ainsi que de la Vitamine C, du Manganèse et du Cuivre qui agissent en synergie pour aider à favoriser la régénération du cartilage et à augmenter la souplesse et la mobilité procurant ainsi un confort articulaire durable.

CONSEILS D'UTILISATION :

Prendre 1 sachet par jour, pur ou dilué dans un verre d'eau.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION :

- Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
- Tenir hors de portée des enfants de moins de 3 ans.
- Conserver dans un endroit frais et sec.
- Doit être utilisé dans le cadre d'un mode de vie sain et d'une alimentation équilibrée.

Complément alimentaire, ce n'est pas un médicament

Fabriqué par ERBOZETA SPA - RSM.

Importé et distribué au Maroc par Thérapharm.

Autorisation du Ministère de la Santé n° : DA 20201912214DMP/20UCA/v1.

SEDALGIC® 325 mg/37,5mg, comprimé pelliculé - Boîte de 20. Paracétamol / Chlorhydrate de Tramadol

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice de médicament car elle contient des informations.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin d'en parler à votre pharmacien.
- Si vous avez d'autres questions, demandez à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit personnellement à d'autres personnes. Il pourrait leur être néfaste. Les malades sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient un effet indésirable non mentionné dans ce médicament ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

- Qu'est-ce que SEDALGIC 325 mg/37,5mg ?
- Quelles sont les informations à connaître à propos de SEDALGIC 325 mg/37,5mg, comprimé pelliculé ?
- Comment prendre SEDALGIC 325 mg/37,5mg ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver SEDALGIC 325 mg/37,5mg ?
- Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE SEDALGIC® 325mg/37,5mg, COMPRIMÉ PELLICULÉ ?

DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

SEDALGIC est une association de 2 analgésiques : le tramadol et le paracétamol, qui agissent ensemble pour soulager votre douleur. SEDALGIC est indiqué dans le traitement des douleurs modérées à intenses lorsque votre médecin pense qu'une association de chlorhydrate de tramadol et de paracétamol est nécessaire.

SEDALGIC est réservé à l'adulte et l'adolescent à partir de 12 ans.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE SEDALGIC® 325mg/37,5mg, COMPRIMÉ PELLICULÉ ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

No prenez jamais SEDALGIC 325mg/37,5mg, comprimé pelliculé :

- si vous êtes allergique au chlorhydrate de tramadol, au paracétamol ou à tout autre composant de ce médicament (cf. la rubrique 6).
- en cas d'intoxication aigüe par l'alcool, par les somnifères, par d'autres médicaments contre la douleur ou des médicaments psychotropes (médicaments qui agissent sur l'humeur et les émotions).
- si vous prenez en même temps des inhibiteurs de la Monoamine Oxydase (médicaments utilisés pour le traitement de la dépression ou la maladie de Parkinson) ou si vous en avez pris au cours des deux semaines précédant le traitement par SEDALGIC,
- si vous avez une maladie grave du foie,
- si vous avez une épilepsie non contrôlée par un traitement.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre SEDALGIC :

- si vous prenez d'autres médicaments contenant du paracétamol ou du tramadol,
- si vous avez des problèmes au foie ou une maladie du foie ou si vous remarquez que votre peau et vos yeux deviennent jaunes. Cela peut suggérer une jaunisse ou des troubles biliaires.
- si vous avez une maladie des reins,
- si vous avez des difficultés sévères à respirer telles que de l'asthme ou une maladie sévère des poumons,
- si vous êtes épileptique ou si vous avez déjà eu des convulsions,
- si vous avez eu récemment une blessure à la tête ou si vous avez de violents maux de tête accompagnés de vomissements,
- si vous êtes dépendant de médicaments notamment ceux utilisés pour soulager la douleur comme la morphine,
- si vous prenez d'autres médicaments contre la douleur, à base de buprénorphine, de nalbuphine ou de pentazocine,
- si vous allez prochainement subir une anesthésie. Dites à votre médecin ou à votre dentiste que vous prenez SEDALGIC.

Troubles respiratoires liés au sommeil

SEDALGIC contient une substance active appartenant au groupe des opioïdes. Les opioïdes peuvent provoquer des troubles respiratoires liés au sommeil, tels que l'apnée centrale du sommeil (respiration superficielle/pause respiratoire pendant le sommeil) et l'hypoxémie liés au sommeil (faible taux d'oxygène dans le sang).

Le risque de souffrir d'apnée centrale du sommeil dépend de la dose d'opioïdes. Votre médecin peut envisager de diminuer votre dose totale d'opioïdes si vous souffrez d'apnée centrale du sommeil.

Le tramadol est transformé dans le foie par une enzyme. Des variations au niveau de cette enzyme sont présentes chez certains patients, ce qui peut avoir des conséquences différentes selon les personnes. Chez certains, la douleur pourra ne pas être suffisamment soulagée, tandis que d'autres seront plus susceptibles de présenter des effets indésirables graves. Si vous remarquez l'un des effets indésirables suivants, vous devez arrêter de prendre ce médicament et consulter immédiatement un médecin : respiration lente ou superficielle, confusion, somnolence, rétrécissement des pupilles, nausées ou vomissements, constipation, perte d'appétit.

Si vous avez été concerné par l'un des points ci-dessus dans le passé ou si

vous êtes concerné pendant la prise de SEDALGIC assurez-vous que le professionnel de santé qui vous suit (médecin, dentiste, anesthésiste...) est au courant. Il/elle pourra décider de la poursuite éventuelle du traitement.

Enfants et adolescents :

Utilisation chez les enfants présentant des problèmes respiratoires : enfants présentant des problèmes respiratoires : enfant de 12 mois et plus, comprimé pelliculé à prendre récemment pris.

utilisation chez les enfants présentant des problèmes respiratoires : enfant de 12 mois et plus, comprimé pelliculé à prendre récemment pris.

utilisation chez les enfants présentant des problèmes respiratoires : enfant de 12 mois et plus, comprimé pelliculé à prendre récemment pris.

utilisation chez les enfants présentant des problèmes respiratoires : enfant de 12 mois et plus, comprimé pelliculé à prendre récemment pris.

utilisation chez les enfants présentant des problèmes respiratoires : enfant de 12 mois et plus, comprimé pelliculé à prendre récemment pris.

utilisation chez les enfants présentant des problèmes respiratoires : enfant de 12 mois et plus, comprimé pelliculé à prendre récemment pris.

utilisation chez les enfants présentant des problèmes respiratoires : enfant de 12 mois et plus, comprimé pelliculé à prendre récemment pris.

utilisation chez les enfants présentant des problèmes respiratoires : enfant de 12 mois et plus, comprimé pelliculé à prendre récemment pris.

utilisation chez les enfants présentant des problèmes respiratoires : enfant de 12 mois et plus, comprimé pelliculé à prendre récemment pris.

utilisation chez les enfants présentant des problèmes respiratoires : enfant de 12 mois et plus, comprimé pelliculé à prendre récemment pris.

utilisation chez les enfants présentant des problèmes respiratoires : enfant de 12 mois et plus, comprimé pelliculé à prendre récemment pris.

utilisation chez les enfants présentant des problèmes respiratoires : enfant de 12 mois et plus, comprimé pelliculé à prendre récemment pris.

utilisation chez les enfants présentant des problèmes respiratoires : enfant de 12 mois et plus, comprimé pelliculé à prendre récemment pris.

utilisation chez les enfants présentant des problèmes respiratoires : enfant de 12 mois et plus, comprimé pelliculé à prendre récemment pris.

utilisation chez les enfants présentant des problèmes respiratoires : enfant de 12 mois et plus, comprimé pelliculé à prendre récemment pris.

utilisation chez les enfants présentant des problèmes respiratoires : enfant de 12 mois et plus, comprimé pelliculé à prendre récemment pris.

utilisation chez les enfants présentant des problèmes respiratoires : enfant de 12 mois et plus, comprimé pelliculé à prendre récemment pris.

utilisation chez les enfants présentant des problèmes respiratoires : enfant de 12 mois et plus, comprimé pelliculé à prendre récemment pris.

utilisation chez les enfants présentant des problèmes respiratoires : enfant de 12 mois et plus, comprimé pelliculé à prendre récemment pris.

utilisation chez les enfants présentant des problèmes respiratoires : enfant de 12 mois et plus, comprimé pelliculé à prendre récemment pris.

utilisation chez les enfants présentant des problèmes respiratoires : enfant de 12 mois et plus, comprimé pelliculé à prendre récemment pris.

utilisation chez les enfants présentant des problèmes respiratoires : enfant de 12 mois et plus, comprimé pelliculé à prendre récemment pris.

utilisation chez les enfants présentant des problèmes respiratoires : enfant de 12 mois et plus, comprimé pelliculé à prendre récemment pris.

utilisation chez les enfants présentant des problèmes respiratoires : enfant de 12 mois et plus, comprimé pelliculé à prendre récemment pris.

utilisation chez les enfants présentant des problèmes respiratoires : enfant de 12 mois et plus, comprimé pelliculé à prendre récemment pris.

utilisation chez les enfants présentant des problèmes respiratoires : enfant de 12 mois et plus, comprimé pelliculé à prendre récemment pris.

LOT : 220390

EXP : 05/2024

PPV : 30,00DH

Dr Abderrahmane ABOUCHAMA

Chirurgien Orthopédiste et Traumatologue

- Diplômé de l'Université de Louvain à Bruxelles
- Ancien Interne des Hôpitaux de France
- Ancien Praticien en Belgique
- Diplôme de Médecine et traumatologie du Sport à Reims
- Chirurgie Traumatologique et du Rhumatisme
- Chirurgie de la Colonne Vertébrale
- Chirurgie de la Main et Pied
- Chirurgie Arthroscopique



الدكتور عبد الرحمن أبو شامة

اختصاصي في جراحة العظام و المفاصل

- شهادة من جامعة لوفان ببروكسل
- طبيب داخلي سابق بمستشفيات فرنسا و ممارس سابق ببلجيكا
- دبلوم في الطب الرياضي و الإصابات بربنس
- الجراحة بالمنظار الداخلي للمفاصل
- جراحة الكسور و الروماتيزم
- جراحة العمود الفقري
- جراحة اليد و القدم

Casablanca, le :

29 / 11 / 2022

الدار البيضاء، في:

84 AIT KADDA ZAINA

①

RX Genoux Flp

+

Genou jntellier 30 / 60°

Gommette
Gen. Gen

Dr. ABDELLAH ABOU CHAMA
Orthopedic Surgeon
Spine & Sports Medicine
Arthroscopic Surgery
Hand & Foot Surgery
Arthroscopy
Fracture & Joint Reconstruction
Sports Medicine
Emergency Services: 06 61 24 13 16
Mobile: 05 22 27 48 01
Address: 61, Boulevard Oued Darâa, Oulfa - Casablanca

61، شارع واد درعة، الألفة - الدار البيضاء - المغرب

الهاتف : 06 61 24 13 16 Tél. : 05 22 27 48 01 المستعجلات : Urgences : 06 61 24 13 16

IF : 2221555

01/12/2022

Casablanca, le -----

Facture N° 3857/12/2022

Nom patient : AIT KADDA ZAINA

**Examen(s) réalisé(s) : INCIDENCE AXIALE 30°
RX 2 GENOUX EN CHARGE F/P
INCIDENCE AXIALE 60°**

Date Examen(s) : 01/12/2022

Montant : 920 DH

Montant Produits : 0,00 DH

**ARRETEE LA PRESENTE FACTURE A LA SOMME DE :
MONTANT TOTAL :
NEUF CENT VINGT DIRHAMS**

(Signature)
RADIOLOGIE
10, Imm. Communal, Angle route d'Alzemmour et Bd. Sidi Abderrahmane - Casablanca
Tél. : 05 22 90 10 10 / 05 22 90 07 07 - Fax : 05 22 93 37 13
Pantente : 35 00 38 66 - TVA : 73 39 10 - ICE : 001686337000022



Dr. O. Alami

Spécialiste en Radiologie
Lauréate de l'Université Nancy I
Ex Radiologue au CHU Ibn Rochd

Dr. N. Faris

Spécialiste en Radiologie
Lauréate de l'Université Nancy I
Ex Radiologue au CHU Ibn Rochd

Casablanca , le 01/12/2022

PATIENT : Mme. AIT KADDA ZAINA
MEDECIN TRAITANT : DR ABOUCHAMA ABDERRAHMANE
EXAMEN(S) REALISE(S) : RX DES GENOUX F/P /30°/60°

Cher Docteur,
Je vous remercie de nous avoir adressé votre patiente dont voici le résultat de l'examen.

RX DES GENOUX F/P INCIDENCES AXIALES 30°/60°

- ❖ Transparence osseuse normale.
- ❖ Pincement tibio fémoral interne bilatéral.
- ❖ Ostéophytose condylienne interne, bilatérale et rotulienne postérieure minime.
- ❖ Rotules centrées.

AU TOTAL

Gonarthrose bilatérale.

