

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Optique

Autres

Maladie

Dentaire

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 7462 Société : RAM

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : NABIL DAoud

Date de naissance : 11.07.1963

Adresse : 31 Avenue Hassan II Casablanca

Tél. : 066 131 6664 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin : Docteur Fatiha CHEMLALI
Médecine Générale
Echographie
1 Bd Bourguiba 6^e Etage - Casa - Anta

Date de consultation : 07/12/2022

Nom et prénom du malade : BEN DAoud Samia Age :
 Conjoint
 Enfant

Lien de parenté : Lui-même

Nature de la maladie :
 ALD ALC Pathologie :

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casa Le : 11/12/2022

Signature de l'adhérent(e) : Hydro

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
07/12/2022 C			20000	Docteur Faitha CHEM Médecine Générale Echographie Europe 1er Etage 06 22 85 31 61

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Pharmacie de Picardie Mme. BENBRAHIM Alima 2. Rue Badr Assayab - Quartier Gauthier Casablanca 267923	07/12/22	2756,80

ANALYSES - RADIographies

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.


O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

	H
25533412	21433552
00000000	00000000
D	
00000000	00000000
35533411	11433553

[Création, remont, adjonction]

fonctionnel. Thérapeutique nécessaire à la profession



Années

ATTICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Fatiha Chemlali

Médecine Générale

Echographie

الدكتورة فتيحة شملالي

الطب العام

الفحص بالصدى

Casablanca, le :

07/12/2022

الدار البيضاء في

Pharmacie de Picardie
Mme. BENBRAHIM Alima
12, Rue Badr Assayab - Quartier Gauthier
Casablanca 1022267923

Bendlaad, Samia

2715

Aripophli 10 1h f le Jatu 1000
350,00 268,00 3100
2715

Wellfatin 150 1h f le Jatu 1000
268,00 3100
2715

Flufflov 100 1000
36,30 62,50 3100
2756,80 2715
2715

Dr. Fatiha CHEMLALI
Médecine Générale
Echographie
Bd. Bourgogne 1er Etage. Casablanca
Tel. 022.227746

119 , شارع بوركون - أقامة فينيسيس - الطابق الاول (امام مستوصف احمد) الدار البيضاء - الهاتف : 0522.22.85.46
119, Bd. Bourgogne - Résidence Phénicia - 1er étage(en face de centre de santé OUHOUD)Casablanca - Tél : 0522.22.85.46



Wellbutrin

XR

WELLBUTRIN XR 150 mg comprimé à libération modifiée
WELLBUTRIN XR 300 mg comprimé à libération modifiée
 Chlorhydrate de bupropion

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourra leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne sera pas mentionné dans cette notice.

Que contient cette notice?

1. Qu'est-ce que Wellbutrin XR et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Wellbutrin XR ?
3. Comment prendre Wellbutrin XR ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Wellbutrin XR ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Wellbutrin et dans quel cas est-il utilisé ?
 Wellbutrin XR est un médicament qui vous a été prescrit par votre médecin pour traiter votre dépression. On pense que ce médicament interagit dans le cerveau avec la noradrénaline et dopamine, des substances chimiques ayant un lien avec la dépression.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Wellbutrin XR ?

Ne prenez jamais Wellbutrin XR

- Si vous êtes allergique au bupropion, ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6).
- Si vous prenez d'autres médicaments contenant du bupropion
- Si vous souffrez d'épilepsie ou si vous avez déjà eu des

On ne sait pas si elles sont Les ingrédients de Wellbutrin maternel. Demandez conseil avant de prendre Wellbutrin.

Conduite de véhicules et machines
 Il est déconseillé de conduire de véhicules ou machines, si Wellbutrin XR ou des étourdissements.

3. Comment prendre Wellbutrin XR

VEILLEZ à toujours prendre les indications de votre médecin. La posologie indiquée dans cette notice n'est pas nécessairement adaptée à votre cas personnel. Veuillez demander à votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Il est possible que vous deviez attendre un certain temps avant de commencer à vous sentir mieux. Il faut parfois attendre des semaines voire des mois avant que le médicament n'agisse complètement. Lorsque vous commencerez à vous sentir mieux, il se peut que votre médecin vous conseille de continuer à prendre Wellbutrin XR pour éviter que la dépression ne revienne.

En quelle quantité ?

La dose habituellement recommandée chez l'adulte est de un comprimé à 150 mg par jour.

Il est possible que votre médecin augmente la dose à 300 mg/jour si votre dépression ne s'améliore pas après plusieurs semaines.

Prenez la dose de Wellbutrin XR le matin. Ne prenez pas Wellbutrin XR plus d'une fois par jour.

Le comprimé est recouvert d'une enveloppe qui libère lentement le médicament dans votre organisme.

Vous remarquerez peut-être dans vos selles quelque chose qui ressemble à un comprimé. Il s'agit de l'enveloppe vide qui est éliminée de votre organisme.

Avaler vos comprimés en entier. Les comprimés ne peuvent pas être mâchés, écrasés ou coupés – dans ce cas, il y aurait un risque de surdosage car le médicament serait libéré trop rapidement dans votre corps. Le risque de développer des effets secondaires, y compris des convulsions serait alors augmenté.

Certaines personnes continueront à prendre 150 mg par jour pendant toute la durée de leur traitement. Il est possible que votre médecin vous prescrive cette dose si vous avez des problèmes hépatiques ou rénaux.

Pendant combien de temps ?

Vous seul, et votre médecin, pouvez décider pendant combien de temps vous devez prendre Wellbutrin XR.

Il faut parfois attendre des semaines voire des mois avant de remarquer une amélioration quelconque. Parlez régulièrement de vos symptômes à votre médecin pour décider de la durée du traitement. Lorsque vous commencerez à vous sentir mieux, il est possible que votre médecin vous conseille de continuer à prendre Wellbutrin XR pour éviter que la dépression ne revienne.

Si vous avez pris plus de Wellbutrin XR que vous n'auriez dû
 Si vous avez pris un trop grand nombre de comprimés, il est possible que le risque de convulsions ou de crise épileptique augmente. N'attendez pas pour appeler votre médecin ou un centre d'urgence.

GlaxoSmithKline M
 Ain El Aouda
 Région de Rabat
 ID: 650215
 PPV: 268.00
 6 118001 1426



Wellbutrin

XR

WELLBUTRIN XR 150 mg comprimé à libération modifiée
WELLBUTRIN XR 300 mg comprimé à libération modifiée
 Chlorhydrate de bupropion

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourra leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne sera pas mentionné dans cette notice.

Que contient cette notice?

1. Qu'est-ce que Wellbutrin XR et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Wellbutrin XR ?
3. Comment prendre Wellbutrin XR ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Wellbutrin XR ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Wellbutrin et dans quel cas est-il utilisé ?
 Wellbutrin XR est un médicament qui vous a été prescrit par votre médecin pour traiter votre dépression. On pense que ce médicament interagit dans le cerveau avec la noradrénaline et dopamine, des substances chimiques ayant un lien avec la dépression.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Wellbutrin XR ?

Ne prenez jamais Wellbutrin XR

- Si vous êtes allergique au bupropion, ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6).
- Si vous prenez d'autres médicaments contenant du bupropion
- Si vous souffrez d'épilepsie ou si vous avez déjà eu des

On ne sait pas si elles sont Les ingrédients de Wellbutrin maternel. Demandez conseil avant de prendre Wellbutrin.

Conduite de véhicules et machines
 Il est déconseillé de conduire de véhicules ou de machines, si Wellbutrin XR ou des étourdissements.

3. Comment prendre Wellbutrin XR

VEILLEZ à toujours prendre les indications de votre médecin. La posologie indiquée dans cette notice n'est pas nécessairement adaptée à votre cas personnel. Veuillez demander à votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Il est possible que vous deviez attendre un certain temps avant de commencer à vous sentir mieux. Il faut parfois attendre des semaines voire des mois avant que le médicament n'agisse complètement. Lorsque vous commencerez à vous sentir mieux, il se peut que votre médecin vous conseille de continuer à prendre Wellbutrin XR pour éviter que la dépression ne revienne.

En quelle quantité ?

La dose habituellement recommandée chez l'adulte est de un comprimé à 150 mg par jour.

Il est possible que votre médecin augmente la dose à 300 mg/jour si votre dépression ne s'améliore pas après plusieurs semaines.

Prenez la dose de Wellbutrin XR le matin. Ne prenez pas Wellbutrin XR plus d'une fois par jour.

Le comprimé est recouvert d'une enveloppe qui libère lentement le médicament dans votre organisme.

Vous remarquerez peut-être dans vos selles quelque chose qui ressemble à un comprimé. Il s'agit de l'enveloppe vide qui est éliminée de votre organisme.

Avaler vos comprimés en entier. Les comprimés ne peuvent pas être mâchés, écrasés ou coupés – dans ce cas, il y aurait un risque de surdosage car le médicament serait libéré trop rapidement dans votre corps. Le risque de développer des effets secondaires, y compris des convulsions serait alors augmenté.

Certaines personnes continueront à prendre 150 mg par jour pendant toute la durée de leur traitement. Il est possible que votre médecin vous prescrive cette dose si vous avez des problèmes hépatiques ou rénaux.

Pendant combien de temps ?

Vous seul, et votre médecin, pouvez décider pendant combien de temps vous devez prendre Wellbutrin XR.

Il faut parfois attendre des semaines voire des mois avant de remarquer une amélioration quelconque. Parlez régulièrement de vos symptômes à votre médecin pour décider de la durée du traitement. Lorsque vous commencerez à vous sentir mieux, il est possible que votre médecin vous conseille de continuer à prendre Wellbutrin XR pour éviter que la dépression ne revienne.

Si vous avez pris plus de Wellbutrin XR que vous n'auriez dû
 Si vous avez pris un trop grand nombre de comprimés, il est possible que le risque de convulsions ou de crise épileptique augmente. N'attendez pas pour appeler votre médecin ou un centre d'urgence.

GlaxoSmithKline M
 Ain El Aouda
 Région de Rabat
 ID: 650215
 PPV: 268.00
 6 118001 1426



Wellbutrin

XR

WELLBUTRIN XR 150 mg comprimé à libération modifiée
WELLBUTRIN XR 300 mg comprimé à libération modifiée
 Chlorhydrate de bupropion

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourra leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne sera pas mentionné dans cette notice.

Que contient cette notice?

1. Qu'est-ce que Wellbutrin XR et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Wellbutrin XR ?
3. Comment prendre Wellbutrin XR ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Wellbutrin XR ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Wellbutrin et dans quel cas est-il utilisé ?
 Wellbutrin XR est un médicament qui vous a été prescrit par votre médecin pour traiter votre dépression. On pense que ce médicament interagit dans le cerveau avec la noradrénaline et dopamine, des substances chimiques ayant un lien avec la dépression.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Wellbutrin XR ?

Ne prenez jamais Wellbutrin XR

- Si vous êtes allergique au bupropion, ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6).
- Si vous prenez d'autres médicaments contenant du bupropion
- Si vous souffrez d'épilepsie ou si vous avez déjà eu des

On ne sait pas si elles sont Les ingrédients de Wellbutrin maternel. Demandez conseil avant de prendre Wellbutrin.

Conduite de véhicules et machines
 Il est déconseillé de conduire de véhicules ou machines, si Wellbutrin XR ou des étourdissements.

3. Comment prendre Wellbutrin XR

VEILLEZ à toujours prendre les indications de votre médecin. La posologie indiquée dans cette notice n'est pas nécessairement adaptée à votre cas personnel. Veuillez demander à votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Il est possible que vous deviez attendre un certain temps avant de commencer à vous sentir mieux. Il faut parfois attendre des semaines voire des mois avant que le médicament n'agisse complètement. Lorsque vous commencerez à vous sentir mieux, il se peut que votre médecin vous conseille de continuer à prendre Wellbutrin XR pour éviter que la dépression ne revienne.

En quelle quantité ?

La dose habituellement recommandée chez l'adulte est de un comprimé à 150 mg par jour.

Il est possible que votre médecin augmente la dose à 300 mg/jour si votre dépression ne s'améliore pas après plusieurs semaines.

Prenez la dose de Wellbutrin XR le matin. Ne prenez pas Wellbutrin XR plus d'une fois par jour.

Le comprimé est recouvert d'une enveloppe qui libère lentement le médicament dans votre organisme.

Vous remarquerez peut-être dans vos selles quelque chose qui ressemble à un comprimé. Il s'agit de l'enveloppe vide qui est éliminée de votre organisme.

Avaler vos comprimés en entier. Les comprimés ne peuvent pas être mâchés, écrasés ou coupés – dans ce cas, il y aurait un risque de surdosage car le médicament serait libéré trop rapidement dans votre corps. Le risque de développer des effets secondaires, y compris des convulsions serait alors augmenté.

Certaines personnes continueront à prendre 150 mg par jour pendant toute la durée de leur traitement. Il est possible que votre médecin vous prescrive cette dose si vous avez des problèmes hépatiques ou rénaux.

Pendant combien de temps ?

Vous seul, et votre médecin, pouvez décider pendant combien de temps vous devez prendre Wellbutrin XR.

Il faut parfois attendre des semaines voire des mois avant de remarquer une amélioration quelconque. Parlez régulièrement de vos symptômes à votre médecin pour décider de la durée du traitement. Lorsque vous commencerez à vous sentir mieux, il est possible que votre médecin vous conseille de continuer à prendre Wellbutrin XR pour éviter que la dépression ne revienne.

Si vous avez pris plus de Wellbutrin XR que vous n'auriez dû
 Si vous avez pris un trop grand nombre de comprimés, il est possible que le risque de convulsions ou de crise épileptique augmente. N'attendez pas pour appeler votre médecin ou un centre d'urgence.

GlaxoSmithKline M
 Ain El Aouda
 Région de Rabat
 ID: 650215
 PPV: 268.00
 6 118001 1426



Wellbutrin

XR

WELLBUTRIN XR 150 mg comprimé à libération modifiée
WELLBUTRIN XR 300 mg comprimé à libération modifiée
 Chlorhydrate de bupropion

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourra leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne sera pas mentionné dans cette notice.

Que contient cette notice?

1. Qu'est-ce que Wellbutrin XR et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Wellbutrin XR ?
3. Comment prendre Wellbutrin XR ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Wellbutrin XR ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Wellbutrin et dans quel cas est-il utilisé ?
 Wellbutrin XR est un médicament qui vous a été prescrit par votre médecin pour traiter votre dépression. On pense que ce médicament interagit dans le cerveau avec la noradrénaline et dopamine, des substances chimiques ayant un lien avec la dépression.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Wellbutrin XR ?

Ne prenez jamais Wellbutrin XR

- Si vous êtes allergique au bupropion, ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6).
- Si vous prenez d'autres médicaments contenant du bupropion
- Si vous souffrez d'épilepsie ou si vous avez déjà eu des

On ne sait pas si elles sont Les ingrédients de Wellbutrin maternel. Demandez conseil avant de prendre Wellbutrin.

Conduite de véhicules et machines
 Il est déconseillé de conduire de véhicules ou machines, si Wellbutrin XR ou des étourdissements.

3. Comment prendre Wellbutrin XR

VEILLEZ à toujours prendre les indications de votre médecin. La posologie indiquée dans cette notice n'est pas nécessairement adaptée à votre cas personnel. Veuillez demander à votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Il est possible que vous deviez attendre un certain temps avant de commencer à vous sentir mieux. Il faut parfois attendre des semaines voire des mois avant que le médicament n'agisse complètement. Lorsque vous commencerez à vous sentir mieux, il se peut que votre médecin vous conseille de continuer à prendre Wellbutrin XR pour éviter que la dépression ne revienne.

En quelle quantité ?

La dose habituellement recommandée chez l'adulte est de un comprimé à 150 mg par jour.

Il est possible que votre médecin augmente la dose à 300 mg/jour si votre dépression ne s'améliore pas après plusieurs semaines.

Prenez la dose de Wellbutrin XR le matin. Ne prenez pas Wellbutrin XR plus d'une fois par jour.

Le comprimé est recouvert d'une enveloppe qui libère lentement le médicament dans votre organisme.

Vous remarquerez peut-être dans vos selles quelque chose qui ressemble à un comprimé. Il s'agit de l'enveloppe vide qui est éliminée de votre organisme.

Avaler vos comprimés en entier. Les comprimés ne peuvent pas être mâchés, écrasés ou coupés – dans ce cas, il y aurait un risque de surdosage car le médicament serait libéré trop rapidement dans votre corps. Le risque de développer des effets secondaires, y compris des convulsions serait alors augmenté.

Certaines personnes continueront à prendre 150 mg par jour pendant toute la durée de leur traitement. Il est possible que votre médecin vous prescrive cette dose si vous avez des problèmes hépatiques ou rénaux.

Pendant combien de temps ?

Vous seul, et votre médecin, pouvez décider pendant combien de temps vous devez prendre Wellbutrin XR.

Il faut parfois attendre des semaines voire des mois avant de remarquer une amélioration quelconque. Parlez régulièrement de vos symptômes à votre médecin pour décider de la durée du traitement. Lorsque vous commencerez à vous sentir mieux, il est possible que votre médecin vous conseille de continuer à prendre Wellbutrin XR pour éviter que la dépression ne revienne.

Si vous avez pris plus de Wellbutrin XR que vous n'auriez dû
 Si vous avez pris un trop grand nombre de comprimés, il est possible que le risque de convulsions ou de crise épileptique augmente. N'attendez pas pour appeler votre médecin ou un centre d'urgence.

GlaxoSmithKline M
 Ain El Aouda
 Région de Rabat
 ID: 650215
 PPV: 268.00
 6 118001 1426



Wellbutrin

XR

WELLBUTRIN XR 150 mg comprimé à libération modifiée
WELLBUTRIN XR 300 mg comprimé à libération modifiée
 Chlorhydrate de bupropion

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourra leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne sera pas mentionné dans cette notice.

Que contient cette notice?

1. Qu'est-ce que Wellbutrin XR et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Wellbutrin XR ?
3. Comment prendre Wellbutrin XR ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Wellbutrin XR ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Wellbutrin et dans quel cas est-il utilisé ?
 Wellbutrin XR est un médicament qui vous a été prescrit par votre médecin pour traiter votre dépression. On pense que ce médicament interagit dans le cerveau avec la noradrénaline et dopamine, des substances chimiques ayant un lien avec la dépression.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Wellbutrin XR ?

Ne prenez jamais Wellbutrin XR

- Si vous êtes allergique au bupropion, ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6).
- Si vous prenez d'autres médicaments contenant du bupropion
- Si vous souffrez d'épilepsie ou si vous avez déjà eu des

On ne sait pas si elles sont Les ingrédients de Wellbutrin maternel. Demandez conseil avant de prendre Wellbutrin.

Conduite de véhicules et machines
 Il est déconseillé de conduire de véhicules ou machines, si Wellbutrin XR ou des étourdissements.

3. Comment prendre Wellbutrin XR

VEILLEZ à toujours prendre les indications de votre médecin. La posologie indiquée dans cette notice n'est pas nécessairement adaptée à votre cas personnel. Veuillez demander à votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Il est possible que vous deviez attendre un certain temps avant de commencer à vous sentir mieux. Il faut parfois attendre des semaines voire des mois avant que le médicament n'agisse complètement. Lorsque vous commencerez à vous sentir mieux, il se peut que votre médecin vous conseille de continuer à prendre Wellbutrin XR pour éviter que la dépression ne revienne.

En quelle quantité ?

La dose habituellement recommandée chez l'adulte est de un comprimé à 150 mg par jour.

Il est possible que votre médecin augmente la dose à 300 mg/jour si votre dépression ne s'améliore pas après plusieurs semaines.

Prenez la dose de Wellbutrin XR le matin. Ne prenez pas Wellbutrin XR plus d'une fois par jour.

Le comprimé est recouvert d'une enveloppe qui libère lentement le médicament dans votre organisme.

Vous remarquerez peut-être dans vos selles quelque chose qui ressemble à un comprimé. Il s'agit de l'enveloppe vide qui est éliminée de votre organisme.

Avaler vos comprimés en entier. Les comprimés ne peuvent pas être mâchés, écrasés ou coupés – dans ce cas, il y aurait un risque de surdosage car le médicament serait libéré trop rapidement dans votre corps. Le risque de développer des effets secondaires, y compris des convulsions serait alors augmenté.

Certaines personnes continueront à prendre 150 mg par jour pendant toute la durée de leur traitement. Il est possible que votre médecin vous prescrive cette dose si vous avez des problèmes hépatiques ou rénaux.

Pendant combien de temps ?

Vous seul, et votre médecin, pouvez décider pendant combien de temps vous devez prendre Wellbutrin XR.

Il faut parfois attendre des semaines voire des mois avant de remarquer une amélioration quelconque. Parlez régulièrement de vos symptômes à votre médecin pour décider de la durée du traitement. Lorsque vous commencerez à vous sentir mieux, il est possible que votre médecin vous conseille de continuer à prendre Wellbutrin XR pour éviter que la dépression ne revienne.

Si vous avez pris plus de Wellbutrin XR que vous n'auriez dû
 Si vous avez pris un trop grand nombre de comprimés, il est possible que le risque de convulsions ou de crise épileptique augmente. N'attendez pas pour appeler votre médecin ou un centre d'urgence.

GlaxoSmithKline M
 Ain El Aouda
 Région de Rabat
 ID: 650215
 PPV: 268.00
 6 118001 1426



Wellbutrin

XR

WELLBUTRIN XR 150 mg comprimé à libération modifiée
WELLBUTRIN XR 300 mg comprimé à libération modifiée
 Chlorhydrate de bupropion

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourra leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne sera pas mentionné dans cette notice.

Que contient cette notice?

1. Qu'est-ce que Wellbutrin XR et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Wellbutrin XR ?
3. Comment prendre Wellbutrin XR ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Wellbutrin XR ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Wellbutrin et dans quel cas est-il utilisé ?
 Wellbutrin XR est un médicament qui vous a été prescrit par votre médecin pour traiter votre dépression. On pense que ce médicament interagit dans le cerveau avec la noradrénaline et dopamine, des substances chimiques ayant un lien avec la dépression.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Wellbutrin XR ?

Ne prenez jamais Wellbutrin XR

- Si vous êtes allergique au bupropion, ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6).
- Si vous prenez d'autres médicaments contenant du bupropion
- Si vous souffrez d'épilepsie ou si vous avez déjà eu des

On ne sait pas si elles sont Les ingrédients de Wellbutrin maternel. Demandez conseil avant de prendre Wellbutrin.

Conduite de véhicules et machines
 Il est déconseillé de conduire de véhicules ou machines, si Wellbutrin XR ou des étourdissements.

3. Comment prendre Wellbutrin XR

VEILLEZ à toujours prendre les indications de votre médecin. La posologie indiquée dans cette notice n'est pas nécessairement adaptée à votre cas personnel. Veuillez demander à votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Il est possible que vous deviez attendre un certain temps avant de commencer à vous sentir mieux. Il faut parfois attendre des semaines voire des mois avant que le médicament n'agisse complètement. Lorsque vous commencerez à vous sentir mieux, il se peut que votre médecin vous conseille de continuer à prendre Wellbutrin XR pour éviter que la dépression ne revienne.

En quelle quantité ?

La dose habituellement recommandée chez l'adulte est de un comprimé à 150 mg par jour.

Il est possible que votre médecin augmente la dose à 300 mg/jour si votre dépression ne s'améliore pas après plusieurs semaines.

Prenez la dose de Wellbutrin XR le matin. Ne prenez pas Wellbutrin XR plus d'une fois par jour.

Le comprimé est recouvert d'une enveloppe qui libère lentement le médicament dans votre organisme.

Vous remarquerez peut-être dans vos selles quelque chose qui ressemble à un comprimé. Il s'agit de l'enveloppe vide qui est éliminée de votre organisme.

Avaler vos comprimés en entier. Les comprimés ne peuvent pas être mâchés, écrasés ou coupés – dans ce cas, il y aurait un risque de surdosage car le médicament serait libéré trop rapidement dans votre corps. Le risque de développer des effets secondaires, y compris des convulsions serait alors augmenté.

Certaines personnes continueront à prendre 150 mg par jour pendant toute la durée de leur traitement. Il est possible que votre médecin vous prescrive cette dose si vous avez des problèmes hépatiques ou rénaux.

Pendant combien de temps ?

Vous seul, et votre médecin, pouvez décider pendant combien de temps vous devez prendre Wellbutrin XR.

Il faut parfois attendre des semaines voire des mois avant de remarquer une amélioration quelconque. Parlez régulièrement de vos symptômes à votre médecin pour décider de la durée du traitement. Lorsque vous commencerez à vous sentir mieux, il est possible que votre médecin vous conseille de continuer à prendre Wellbutrin XR pour éviter que la dépression ne revienne.

Si vous avez pris plus de Wellbutrin XR que vous n'auriez dû
 Si vous avez pris un trop grand nombre de comprimés, il est possible que le risque de convulsions ou de crise épileptique augmente. N'attendez pas pour appeler votre médecin ou un centre d'urgence.

GlaxoSmithKline M
 Ain El Aouda
 Région de Rabat
 ID: 650215
 PPV: 268.00
 6 118001 1426

ARIPIPHI®

(Aripiprazole)

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire. Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif. Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Composition du médicament:

ARIPIPHI 5 mg	ARIPIPHI 10 mg	ARIPIPHI 15 mg	ARIPIPHI 30 mg
Principe actif : Aripiprazole 5mg.	Principe actif : Aripiprazole 10mg.	Principe actif : Aripiprazole 15mg.	Principe actif : Aripiprazole 30mg.
Excipients : lactose monohydraté, cellulose microcristalline, amidon de maïs, FD&C Blue N°2, hydroxypropylcellulose faiblement substituée, stéarate de magnésium, eau purifiée qs.	Excipients : lactose monohydraté, cellulose microcristalline, amidon de maïs, oxyde de fer rouge, hydroxypropylcellulose faiblement substituée, stéarate de magnésium, eau purifiée qs.	Excipients : lactose monohydraté, cellulose microcristalline, amidon de maïs, oxyde de fer jaune, hydroxypropylcellulose faiblement substituée, stéarate de magnésium, eau purifiée qs.	Excipients : lactose monohydraté, cellulose microcristalline, amidon de maïs, oxyde de fer rouge, hydroxypropylcellulose faiblement substituée, stéarate de magnésium, eau purifiée qs.

Excipient à effet notoire : lactose

2. Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité

Autres antipsychotiques (code ATC : N05AX12)

3. Forme pharmaceutique et présentations

ARIPIPHI 5mg boîte de 15 et 30 comprimés

ARIPIPHI 10mg boîte de 15 et 30 comprimés

ARIPIPHI 15mg boîte de 15 et 30 comprimés

ARIPIPHI 30mg boîte de 15 et 30 comprimés

4. Indications thérapeutiques

- Traitement de la schizophrénie chez l'adulte et l'adolescent âgé de 15 ans ou plus.
- Traitement des épisodes maniaques modérés à sévères des troubles bipolaires de type I et prévention de récidives d'épisodes maniaques chez l'adulte ayant présenté des épisodes à prédominance maniaque et pour qui les épisodes maniaques ont répondu à un traitement par aripiprazole.
- Traitement des épisodes maniaques modérés à sévères des troubles bipolaires de type I chez l'adolescent âgé de 13 ans ou plus pour une durée allant jusqu'à 12 semaines.

5. Posologie

Adultes :

Schizophrénie :

La posologie initiale recommandée d'ARIPIPHI est de 10 ou 15 mg/jour avec une posologie d'entretien de 15 mg/jour, en une seule prise, pendant ou en dehors des repas.

ARIPIPHI est efficace dans un intervalle de doses allant de 10 à 30 mg/jour.

Une augmentation de l'efficacité pour des doses supérieures à la dose quotidienne recommandée de 15 mg n'a pas été démontrée, toutefois certains patients peuvent bénéficier d'une dose plus élevée.

ARIPIPHI n'est pas recommandé pour les patients de moins de 13 ans.

7. Effets indésirables

Les effets indésirables suivants ont été rapportés et ont été identifiés comme des effets indésirables par l'astérisque :

Les fréquences ci-dessous sont définies en utilisant 1/10 ; peu fréquent (>= 1/100, < 1/100).

Affections psychiatriques :

- Fréquent : agitation, insomnie, anxiété.
- Peu fréquent : dépression*.

Affections du système nerveux :

- Fréquent : troubles extrapyramidaux, akathisia, céphalée.

Affections oculaires :

- Fréquent : trouble de la vision.

Affections cardiaques :

- Peu fréquent : tachycardie*.

Affections vasculaires :

- Peu fréquent : hypotension orthostatique*.

Affections gastro-intestinales :

- Fréquent : dyspepsie, vomissements, nausées, constipation, hypersécrétion salivaire.

Troubles généraux et anomalies au site d'administration :

- Fréquent : fatigue.

8. Mise en garde spéciale et précautions d'emploi

Avant de prendre ARIPIPHI, prévenez votre médecin si vous souffrez de

- Taux élevé de sucre dans le sang (se manifestant par des symptômes tels que la faim excessive, urines abondantes, augmentation de l'appétit et sensation de faiblesse) ou antécédent de diabète.

- Epilepsie

- Mouvements musculaires involontaires, irréguliers, en particulier au niveau de la face, accent vasculaire

- Maladies cardiovasculaires, antécédents familiaux de maladie cardiovasculaire, accident vasculaire

- Cébral ou accident ischémique transitoire ("attaque"), pression artérielle élevée

- Caillots sanguins, ou antécédents familiaux de caillots sanguins, car les psychotiques ont été

associés à la formation de caillots sanguins

- Antécédent de jeux d'argent excessifs

Si vous constatez une prise de poids, des mouvements anormaux, une somnolence gênante de votre activité quotidienne habituelle, si vous rencontrez des difficultés pour manger ou vous présentez des symptômes allergiques, prévenez votre médecin.

Si vous êtes une personne âgée souffrant de démentie (perte de la mémoire et/autres capacités mentales) et si vous avez déjà eu un accident vasculaire cérébral ou accident ischémique transitoire ("attaque"), vous ou votre entourage soignant devez en informer votre médecin.

Informez immédiatement votre médecin si vous avez des pensées suicidaires et d'autoagression, Des idées et des comportements suicidaires ont été rapportés pendant le traitement par aripiprazole.

Informez immédiatement votre médecin si vous souffrez de raideur musculaire et d'inflexibilité avec une forte fièvre, sueurs, altération des facultés mentales, ou battements du cœur très rapides ou irréguliers.

Enfants et adolescents

ARIPIPHI ne doit pas être utilisé chez l'enfant et l'adolescent âgés de moins de 13 ans. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ARIPIPHI. ARIPIPHI contient du lactose. Les patients atteints de maladies héréditaires rares telles qu'intolérance au galactose, déficit en lactase ou malabsorption du glucose ou du galactose doivent pas prendre ce médicament.

9. Interactions

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Médicaments réduisant la pression artérielle :

ARIPIPHI peut augmenter l'effet de certains médicaments utilisés pour la tension artérielle.



Flagyl® 500mg

Métronidazole

Ovule

SANC

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, **VOUS pourrez avoir besoin de relire.**
- Si **VOUS avez toute autre question, si vous avez doute,** demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Qu'est-ce que FLAGYL 500 mg, ovule et dans quels cas est-il utilisé ?

ANTIBIOTIQUES ANTIBACTERIENS ANTI-PARASITAIRES de la famille des nitro-5-imidazolés.

Ce médicament est indiqué dans le traitement local de certaines vaginites (infections du vagin).

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser FLAGYL 500 mg, ovule ?

• N'utilisez jamais FLAGYL 500 mg, ovule en cas d'allergie aux médicaments de la famille des imidazolés (famille d'antibiotiques à laquelle appartient le métronidazole).

• Ce médicament ne doit généralement pas être utilisé en association avec le disulfirame ou l'alcool (boissons alcoolisées, médicaments contenant de l'alcool).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec FLAGYL 500 mg, ovule :

Mises en garde

• Ce traitement ne doit pas être prescrit pendant plus de 10 jours et ne doit pas être répété plus de 2 à 3 fois par an.

• La prise de boissons alcoolisées durant ce traitement est déconseillée en raison du risque de réactions à type de rougeur du visage, chaleur, vomissements, accélération du rythme cardiaque.

• Il convient d'interrompre le traitement et de consulter un médecin en cas d'apparition d'une mauvaise coordination des mouvements volontaires, apparition de vertiges ou de confusion.

• Attention à la prise de ce médicament si vous souffrez de troubles nerveux sévères, chroniques ou qui évoluent.

Précautions d'emploi

• En cas d'antécédents de troubles sanguins, de

traitement à forte dose et/ou de traitement prolongé, votre médecin peut être amené à contrôler régulièrement par des examens sanguins votre numération formule sanguine.

• En cas de tumeur

36,30

disulfirame et l'alcool, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

La prise de ce médicament peut perturber les résultats de certains examens de laboratoire (recherche de tréponèmes); le métronidazole peut en effet faussement positiver un test de Nelson.

Grossesse – Allaitement

En cas de besoin, ce médicament peut être pris pendant la grossesse. Il convient cependant de demander l'avis à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Eviter l'allaitement pendant la prise de ce médicament. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

L'attention est attirée, notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines, sur les risques de vertiges, de confusion, d'hallucinations ou de convulsions, attachés à l'emploi de ce médicament.

3. Comment utiliser FLAGYL 500 mg, ovule ?

Posologie

Ce médicament est réservé à l'adulte.

À titre indicatif, la posologie usuelle est :

1 ovule par jour par voie vaginale en association si nécessaire avec un traitement par voie orale. Votre partenaire doit être impérativement traité, qu'il présente ou non des signes cliniques.

DANS TOUTS LES CAS SE CONFORMER A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

Mode d'administration

Voie vaginale.

L'ovule s'administre en position allongée.

Fréquence d'administration

1 fois par jour.

L'ovule s'administre de préférence le soir au coucher.

Durée du traitement

Pour être efficace, cet antibiotique doit être utilisé régulièrement aux doses prescrites et aussi longtemps que votre médecin vous l'aura conseillé.

La disparition de la fièvre ou de tout autre symptôme, ne signifie pas que vous êtes guéri. L'éventuelle impression de fatigue n'est pas due au traitement antibiotique mais



Veuillez lire
avant de prendre ce médicament.
Si vous avez des questions, consultez
un pharmacien.
Gardez cette notice pour pouvoir la consulter à nouveau.

LOT

220977

EXP

04 2025

PPV

62.50

DENOMINA-
URISPAS®

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Flavoxate chlorhydrate (DCI)....200 mg
Excipients...q.s.p un comprimé pelliculé

FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimé pelliculé, Boîte de 30.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

Antispasmodique urinaire.

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Vessie irritable (incontinence d'urgence, dysurie, ténesme vésical, douleurs suprapubiennes, pollakiurie et nycturie) dans le cas de :

- cystite, urétrite, uréthrocystite, trigonite et prostatite,
- hyperplasie bénigne de la prostate,
- lithotripsie extracorporelle,
- cathétérisme ou cystoscopie,
- intervention chirurgicale sur les voies urinaires inférieures.

ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

EN CAS DE DOUBTE IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

- Hypersensibilité au produit;
- Lésions obstructives pyloriques

EMENI
PREVENIR VOTRE MEDECIN OU
VOTRE PHARMACIEN AVANT DE
PRENDRE UN MEDICAMENT.

Il convient d'éviter l'utilisation de ce médicament pendant la grossesse. L'administration de ce médicament est à éviter pendant l'allaitement.

CONDUCTEURS ET UTILISATEURS DE MACHINES

A utiliser avec précautions chez les personnes utilisant des machines ou conduisant un véhicule à moteur car le flavoxate peut provoquer fatigues, vertige, et troubles visuels.

LISTE DES EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NÉCESSAIRE POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE CHEZ CERTAINS PATIENTS

Le lactose est un excipient à effet notoire, contre-indiqué chez les personnes souffrant d'une galactosémie ou de syndrome de malabsorption du glucose/galactose ou déficit en lactase.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT

POSOLOGIE

Pour les adultes et les enfants de plus de 12 ans : en principe, 1 comprimé 3 fois par jour jusqu'à disparition des symptômes.