

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° M21- 0053426

140726

- Maladie Dentaire Optique Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 0000 802 Société :

Actif Pensionné(e) Autre :

Nom & Prénom : Hajji Aicha /ve/ Nekhoum Bouazza


Date de naissance : 1/1/1944

Adresse : Hay Adil Bloc A N° 204/n Hay Mohammadi

Tél. : 0630442589 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 02/12/2022

Nom et prénom du malade : Hajji Aicha Age:

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : allergie respiratoire

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le :/...../.....

Signature de l'adhérent(e) :

Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
02/12/2022		CS	150.00	
09/12/2022		gratuit		

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	02/12/2022	819.50
	09/12/2022	
	09/12/2022	884.60

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient																
				COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>															
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>															
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>															
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>															
	O.D.F PROTHESES DENTAIRES			DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE	COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>														
		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">H</td> </tr> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>G</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> <tr> <td colspan="2">B</td> </tr> </table>		H		25533412	21433552	00000000	00000000	D	G	00000000	00000000	35533411	11433553	B			MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
		H																	
		25533412	21433552																
		00000000	00000000																
		D	G																
00000000		00000000																	
35533411		11433553																	
B																			
(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			DATE DU DEVIS <input type="text"/>																
				DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>															

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr Safaa LAHRACH

Lauréate de la Faculté de Médecine
et de Pharmacie Casablanca
Ex-Médecin Interne à l'Hôpital
Ben Msik Sidi Othmane

Omnipraticien
Médecin de Travail

Casablanca, le : 02/12/2021

الطبيبة صفاء لحرش

خريجة كلية الطب
والصيدلة بالدار البيضاء
طبيبة داخلية سابقا بمستشفى
ابن امسيك سيدي عثمان

طب الأسرة
طب الأشغل



Hajji Aïcha

79,90 x 3

Natrixam 1,5 / 5 mg

82,80 x 2

Ramipril 5 mg (2 Boites)

21,80 x 2

Aspiric nomission

124,00

Soclar 1g (2 Boites)

36,60

Koprod 2mg 3 fois le matin pda 5j

210,00

Romilast 10mg pda 1mes

819,30

Dr. LAHRACH Safaa
Médecin Généraliste
Hay Adil, Rue 26 - N° 14 - Hay Mohammadi
Tel: 05 22 60 51 71



Dr. LAHRACH SAFAA
Omnipraticien
Médecin de Travail
NPE : 09176074
Hay Adil, Rue 26 - N° 14 RDC
Hay Mohammadi - Casablanca

حي عادل - زنقة 26 - رقم 14 - الطابق السفلي - الحي المحمدي (شارع الفوارات قرب سينما المسيرة) - الدار البيضاء
Hay Adil - Rue 26 - N° 14 - Rdc - Hay Mohammadi (Bd Fouarat près de Cinéma Massira) - Casablanca

Tél.: 05 22 600 517 - E-mail : dr.lahrach1@gmail.com

PPV : 210DH00

LOT : 9694
PER : 06-25
P.P.V : 36 DH 40

14011124



NATRIXAM 1,5 mg / 5 mg-
30 comprimés à Libération Modifiée
PPV : 79.90 DH



Mohammadi - Casablanca
N° 14011124
RDC

DR. LAHBAÏGH SAÏMA

14011124



NATRIXAM 1,5 mg / 5 mg-
30 comprimés à Libération Modifiée
PPV : 79.90 DH



ASPEGIC NOURRISSONS 100mg

Acétylsalicylate de D,L-Lysine

poudre pour solution buvable en sachet-dose

SANOFI

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin, ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
 - Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
 - Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
 - Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si votre enfant se sent moins bien après 3 jours.
- Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

1. QU'EST-CE QUE ASPEGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : AUTRES ANALGESIQUES ET ANTIPTYRIÉTIQUES.

Code ATC : N02BA01.

Ce médicament contient de l'aspirine. L'aspirine appartient à la famille des médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens.

L'aspirine peut être utilisée pour calmer la douleur (antalgique), faire baisser la fièvre (antipyrétique) et/ou diminuer l'inflammation.

ASPEGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose contient 100 mg d'aspirine. Il est utilisé :

- en cas de douleur et/ou fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires ou courbatures,
- dans le traitement de certaines affections rhumatismales.

Le dosage est réservé aux nourrissons et aux enfants pesant entre 6 et 22 kg (soit environ de 3 mois à 7 ans).

Pour les enfants ayant un poids différent, il existe d'autres présentations d'aspirine dont le dosage est plus adapté. N'hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER ASPEGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, consultez-le avant d'utiliser ce médicament.

Ne prenez jamais ASPEGIC sachet-dose :

- Si votre enfant est contenu dans des médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens.
- Si votre enfant est traité par un autre médicament anti-inflammatoire non stéroïdien.
- Si vous êtes enceinte ou si vous attendez des semaines d'aménorrhée.
- Si votre enfant a déjà eu une réaction allergique provoquée par la prise d'aspirine.
- Si votre enfant souffre d'ulcères de l'estomac ou du duodénum.
- Si votre enfant a déjà eu une hémorragie ou une perforation au niveau de l'estomac après avoir pris de l'aspirine ou un autre médicament de la même famille (les

anti-inflammatoires non stéroïdiens).

• Si votre enfant a des saignements ou si votre médecin a identifié chez lui des risques de saignements.

• Si votre enfant a une maladie grave du foie, des reins ou du cœur.

• Si votre enfant prend un autre médicament, assurez-vous que l'association avec ASPEGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose n'est pas contre-indiquée (voir le paragraphe "Autres médicaments et ASPEGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose").

• Si votre enfant est atteint d'une mastocytose (maladie des cellules impliquées dans les réactions allergiques) car il existe un risque de réactions allergiques sévères.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Avertissements et précautions

Avant d'utiliser ASPEGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose.

ASPEGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose est disponible sans ordonnance. Toutefois, vous devez consulter votre médecin avant de donner ce médicament à votre enfant en cas de :

- maladies rhumatismales,
- maladie héréditaire des globules rouges, également appelée déficit en G6PD (car des doses élevées d'aspirine peuvent provoquer une destruction des globules rouges),
- antécédents d'ulcère de l'estomac ou du duodénum ou une inflammation de l'estomac (gastrite),
- antécédents de saignements digestifs (vomissements de sang ou présence de sang dans les selles),
- maladie des reins ou du foie,
- règles abondantes,
- si votre enfant suit déjà un autre traitement anti-inflammatoire ou anticoagulant (référer-vous au paragraphe "Autres médicaments et ASPEGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose" pour avoir plus de détails),
- maladie virale, en particulier varicelle ou syndrome grippal ; des cas de syndrome de Reye (maladie rare, très grave associant principalement troubles neurologiques et atteintes du foie) ont été observés chez des enfants présentant une maladie virale et recevant de l'aspirine.

Si votre enfant a moins d'un mois, vous devez d'abord consulter votre médecin avant d'utiliser un médicament contenant de l'aspirine, quel que soit le dosage.

Pendant le traitement chez l'enfant

Ce dosage est adapté pour l'enfant entre 6 kg et 22 kg. Pour les enfants pesant moins de 6 kg ou plus de 22 kg, il existe d'autres présentations d'aspirine dont le dosage est plus adapté. N'hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Pendant le traitement, consultez immédiatement votre médecin si votre enfant a :

- des troubles de la conscience ou du comportement et des vomissements, arrêtez le traitement car un syndrome de Reye est possible (voir le paragraphe "Avant d'utiliser ASPEGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose"),
- des saignements ou des douleurs dans le ventre. Le risque de survenue de ces effets augmente avec la dose, chez les personnes âgées, chez les personnes de faible poids corporel, chez les personnes ayant déjà souffert d'ulcère de l'estomac et en cas d'association à certains médicaments (voir rubrique « Autres médicaments et ASPEGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose »),
- une crise d'asthme. Cela peut être le signe d'une allergie à l'aspirine ou à un anti-inflammatoire non stéroïdien.

En cas d'administration prolongée de fortes doses d'antalgiques, vous ne devez pas augmenter les doses d'ASPEGIC NOURRISSONS en cas de maux de tête.

L'utilisation régulière de médicaments soulageant la douleur peut conduire à des complications rénales.

Si votre enfant doit subir une opération



ASPEGIC NOURRISSONS 100mg

Acétylsalicylate de D,L-Lysine

poudre pour solution buvable en sachet-dose

SANOFI

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin, ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
 - Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
 - Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
 - Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si votre enfant se sent moins bien après 3 jours.
- Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

1. QU'EST-CE QUE ASPEGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : AUTRES ANALGESIQUES ET ANTIPTYRIÉTIQUES.

Code ATC : N02BA01.

Ce médicament contient de l'aspirine. L'aspirine appartient à la famille des médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens.

L'aspirine peut être utilisée pour calmer la douleur (antalgique), faire baisser la fièvre (antipyrétique) et/ou diminuer l'inflammation.

ASPEGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose contient 100 mg d'aspirine. Il est utilisé :

- en cas de douleur et/ou fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires ou courbatures,
- dans le traitement de certaines affections rhumatismales.

Le dosage est réservé aux nourrissons et aux enfants pesant entre 6 et 22 kg (soit environ de 3 mois à 7 ans).

Pour les enfants ayant un poids différent, il existe d'autres présentations d'aspirine dont le dosage est plus adapté. N'hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER ASPEGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, consultez-le avant d'utiliser ce médicament.

Ne prenez jamais ASPEGIC sachet-dose :

- Si votre enfant est contenu dans des médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens.
- Si votre enfant est atteint d'asthme.
- Si vous êtes enceinte ou pendant les semaines d'aménorrhée.
- Si votre enfant a déjà subi une perforation de l'estomac ou du duodénum, provoquée par la prise d'aspirine.
- Si votre enfant souffre d'ulcères de l'estomac ou du duodénum.
- Si votre enfant a déjà eu une hémorragie ou une perforation au niveau de l'estomac après avoir pris de l'aspirine ou un autre médicament de la même famille (les

anti-inflammatoires non stéroïdiens).

• Si votre enfant a des saignements ou si votre médecin a identifié chez lui des risques de saignements.

- Si votre enfant a une maladie grave du foie, des reins ou du cœur.
 - Si votre enfant prend un autre médicament, assurez-vous que l'association avec ASPEGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose n'est pas contre-indiquée (voir le paragraphe "Autres médicaments et ASPEGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose").
 - Si votre enfant est atteint d'une mastocytose (maladie des cellules impliquées dans les réactions allergiques) car il existe un risque de réactions allergiques sévères.
- EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Avertissements et précautions

Avant d'utiliser ASPEGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose.

ASPEGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose est disponible sans ordonnance. Toutefois, vous devez consulter votre médecin avant de donner ce médicament à votre enfant en cas de :

- maladies rhumatismales,
- maladie héréditaire des globules rouges, également appelée déficit en G6PD (car des doses élevées d'aspirine peuvent provoquer une destruction des globules rouges),
- antécédents d'ulcère de l'estomac ou du duodénum ou une inflammation de l'estomac (gastrite),
- antécédents de saignements digestifs (vomissements de sang ou présence de sang dans les selles),
- maladie des reins ou du foie,
- règles abondantes,
- si votre enfant suit déjà un autre traitement anti-inflammatoire ou anticoagulant (référer-vous au paragraphe "Autres médicaments et ASPEGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose" pour avoir plus de détails),
- maladie virale, en particulier varicelle ou syndrome grippal : des cas de syndrome de Reye (maladie rare, très grave associant principalement troubles neurologiques et atteintes du foie) ont été observés chez des enfants présentant une maladie virale et recevant de l'aspirine.

Si votre enfant a moins d'un mois, vous devez d'abord consulter votre médecin avant d'utiliser un médicament contenant de l'aspirine, quel que soit le dosage.

Pendant le traitement chez l'enfant

Ce dosage est adapté pour l'enfant entre 6 kg et 22 kg. Pour les enfants pesant moins de 6 kg ou plus de 22 kg, il existe d'autres présentations d'aspirine dont le dosage est plus adapté. N'hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Pendant le traitement, consultez immédiatement votre médecin si votre enfant a :

- des troubles de la conscience ou du comportement et des vomissements, arrêtez le traitement car un syndrome de Reye est possible (voir le paragraphe "Avant d'utiliser ASPEGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose"),
- des saignements ou des douleurs dans le ventre. Le risque de survenue de ces effets augmente avec la dose, chez les personnes âgées, chez les personnes de faible poids corporel, chez les personnes ayant déjà souffert d'ulcère de l'estomac et en cas d'association à certains médicaments (voir rubrique « Autres médicaments et ASPEGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose »),
- une crise d'asthme. Cela peut être le signe d'une allergie à l'aspirine ou à un anti-inflammatoire non stéroïdien.

En cas d'administration prolongée de fortes doses d'antalgiques, vous ne devez pas augmenter les doses d'ASPEGIC NOURRISSONS en cas de maux de tête.

L'utilisation régulière de médicaments soulageant la douleur peut conduire à des complications rénales.

Si votre enfant doit subir une opération



AURIDOL®

Mode d'emploi

CE 1434

Gouttes auriculaires

Contenu :

1. Qu'est-ce que AURIDOL et dans quel cas est-il utilisé?
2. Informations importantes avant utilisation.
3. Comment utiliser AURIDOL.
4. Les effets secondaires possibles.
5. Comment conserver AURIDOL?
6. Autres informations.

1) - Qu'est-ce que AURIDOL et dans quel cas est-il utilisé ?

Composition : Solution à 0,5% de chlorhydrate de lidocaïne dans du glycérol (anhydre).

AURIDOL (gouttes auriculaires) est un dispositif médical dont l'action est basée sur les propriétés osmotiques du glycérol. Le composant principal d'AURIDOL est le glycérol. Le glycérol a deux principales caractéristiques relatives à son utilisation dans les gouttes auriculaires: i) sa consistance huileuse, qui lui permet d'adhérer avec douceur à la peau au niveau du site d'application et qui lui confère des propriétés protectrices et ii) l'hygroscopicité du glycérol, qui à son tour permet au glycérol administré par voie topique d'éliminer l'eau des tissus oedématisés (effet osmotique), entraînant une réduction du gonflement, et donc un soulagement de la douleur. La lidocaïne est utilisée comme agent auxiliaire anesthésique local, qui potentialise l'action du glycérol et apaise la douleur d'oreille.

Le glycérol dans le dispositif médical AURIDOL adoucit aussi le cérumen, facilite son élimination et, grâce à ses propriétés hygroscopiques (de rétention d'eau) élimine l'excès de liquide des tissus du canal auditif (effet osmotique), conduisant ainsi à la disparition de la douleur et du gonflement de l'oreille. Le glycérol a un effet causal.

AURIDOL a un effet positif sur :

- L'inflammation du canal auditif externe caractérisée par un gonflement, une douleur et des démangeaisons.
- La douleur causée par une exposition régulière à l'eau et l'humidité
- La douleur causée par un port prolongé d'écouteurs ou par l'excès de cérumen qui obstrue le conduit auditif externe
- Les affections accompagnées de douleurs causées par l'utilisation de détergents, qui détruisent la membrane naturelle protégeant l'oreille, comme les shampoings, savons, et gels.

AURIDOL peut être utilisé chez les enfants à partir de 6 mois.

2) - Informations importantes avant utilisation :

Contre-indications :

Les interactions avec d'autres produits n'ont pas été connues. Il est connu que les médicaments anti-arythmiques exacts de la lidocaïne; une utilisation simultanée peut entraîner des effets secondaires graves. La Cimétidine, les β -bloquants, la norépinéphrine, les



Dr Safaa LAHRACH

Lauréate de la Faculté de Médecine
et de Pharmacie Casablanca
Ex-Médecin Interne à l'Hôpital
Ben Msik Sidi Othmane



الدكتورة صفاء لجرش

خريجة كلية الطب
والصيدلة بالدار البيضاء
طبيبة داخلية سابقا بمستشفى
أبن امسيك سيدي عثمان

Omnipraticien
Médecin de Travail

طب الأسرة
طب الشغل

Casablanca, le : 09/12/2022

58.00

Hajji Archo

+ Amridal

152.00

202.

76.60 → Amridib gran

169.50 x 4

also felt 2g.

Amridal

of new felt med.

884.60

ARIBX® 60 mg et 90 mg

Comprimé pelliculé

en boîte de 7 et 14

Etoricoxib

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que ARIBX®, comprimé pelliculé et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ARIBX®, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre ARIBX®, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ARIBX®, comprimé pelliculé ?
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE ARIBX®, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Qu'est-ce que ARIBX®, comprimé pelliculé ?

ARIBX®, comprimé pelliculé contient la substance active « étoricoxib ».

ARIBX®, comprimé pelliculé est l'un des médicaments de la classe des inhibiteurs sélectifs de la cyclo-oxygénase-2 (COX-2).

Ceux-ci appartiennent à une famille de médicaments nommée anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS).

Dans quels cas ARIBX®, comprimé pelliculé est-il utilisé ?

ARIBX®, comprimé pelliculé contribue à réduire la douleur et le gonflement (inflammation) des articulations et des muscles chez les patients âgés de 16 ans et plus atteints d'arthrose, de polyarthrite rhumatoïde, de spondylarthrite ankylosante et de goutte.

ARIBX®, comprimé pelliculé est également utilisé pour le traitement de courte durée de la douleur modérée après chirurgie dentaire chez les patients âgés de 16 ans et plus.

Qu'est-ce que l'arthrose ?

L'arthrose est une maladie des articulations. Elle résulte d'une altération progressive du cartilage qui protège les extrémités des os.

Elle entraîne un gonflement (inflammation), une douleur, une sensibilité, une raideur et un handicap.

Qu'est-ce que la polyarthrite rhumatoïde ?

La polyarthrite rhumatoïde est une maladie inflammatoire chronique des articulations. Elle provoque douleur, raideur, gonflement et perte progressive du mouvement des articulations atteintes. Elle peut entraîner également une inflammation d'autres parties du corps.

Qu'est-ce que la goutte ?

La goutte est une maladie qui se manifeste, au niveau des articulations, par des crises soudaines et récurrentes associant une inflammation, une rougeur et une très vive douleur. Elle est provoquée par des dépôts de cristaux minéraux dans les articulations.

Qu'est-ce que la spondylarthrite ankylosante ?

La spondylarthrite ankylosante est une maladie inflammatoire de la colonne vertébrale et des articulations sacro-iliaques.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ARIBX®, comprimé pelliculé ?

Ne prenez jamais ARIBX®, comprimé pelliculé dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à l'étoricoxib ou à l'un

des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6,

- Si vous avez une allergie aux anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), y compris l'aspirine et les inhibiteurs sélectifs de la COX-2 (voir rubrique 4 "Quels sont les effets indésirables éventuels" ?),

- Si vous avez un ulcère de l'estomac évolutif ou saignement gastro-intestinal,

- Si vous avez une maladie grave du foie,

- Si vous avez une maladie grave des reins,

- Si vous êtes enceinte ou prévoyez de l'être ou si vous allaitez (voir rubrique "Grossesse, allaitement et fertilité"),

- Si vous êtes âgé(e) de moins de 16 ans,

- Si vous avez une maladie inflammatoire de l'intestin, telle que maladie de Crohn, recto-colite hémorragique ou colite,

- Si vous présentez une hypertension artérielle non contrôlée par un traitement (vérifiez avec votre médecin ou votre infirmière si vous n'êtes pas sûr(e) que votre pression artérielle soit bien contrôlée),

- Si votre médecin vous a diagnostiqué une maladie cardiaque de type d'insuffisance cardiaque (modérée ou sévère), d'angine de poitrine (douleurs thoraciques),

- Si vous avez des antécédents de crise cardiaque, pontage coronarien, maladie des artères périphériques (mauvaise circulation dans les jambes et les pieds due à des artères rétrécies ou bouchées),

- Si vous avez eu un accident vasculaire cérébral, quelle que soit la sorte, y compris un accident ischémique transitoire). L'étoricoxib pourrait légèrement augmenter le risque de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral, c'est la raison pour laquelle il ne doit pas être utilisé chez les patients ayant déjà eu des problèmes cardiaques ou un accident vasculaire cérébral.

Si vous pensez que l'un de ces points vous concerne, ne prenez pas les comprimés sans avoir consulté votre médecin au préalable.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ARIBX®, comprimé pelliculé si :

- Vous avez des antécédents de saignement ou d'ulcère de l'estomac,

- Vous êtes déshydraté(e), par exemple à cause d'accès prolongés de vomissements ou de diarrhée prolongés,

- Vous avez des oedèmes dus à une rétention d'eau,

- Vous avez des antécédents d'insuffisance cardiaque ou de toute autre forme de maladie cardiaque,

- Vous avez des antécédents d'hypertension artérielle. ARIBX®, comprimé pelliculé peut augmenter la tension artérielle chez certains patients, en particulier lorsqu'il est utilisé à hautes doses. Votre médecin peut être amené à contrôler votre tension artérielle plus régulièrement,

- Vous avez des antécédents de maladie du foie ou des reins,

- Vous avez des traitements anti-infectieux. ARIBX®, comprimé pelliculé peut masquer une fièvre, qui peut être un signe d'infection,

- Vous avez du diabète, du cholestérol élevé ou vous êtes fumeur. Cela peut augmenter votre risque de maladie cardiaque,

- Vous êtes une femme et souhaitez concevoir un enfant,

- Vous êtes âgé(e) de plus de 65 ans.

Si vous n'êtes pas sûr que l'un des points ci-dessus vous concerne, contactez votre médecin avant de prendre ARIBX®, comprimé pelliculé pour vérifier que ce médicament

En particulier, si vous prenez l'un de ces médicaments, votre médecin peut être amené à modifier votre traitement par ARIBX®, comprimé pelliculé.

- Médicaments qui fluidifient le sang (comme la warfarine,

- Rifampicine (un antibiotique),

- Méthotrexate (un médicament utilisé dans la polyarthrite rhumatoïde),

- Ciclosporine ou tacrolimus (immunosuppresseurs),

- Lithium (médicament pour la dépression),

- Médicaments pour aider à contrôler l'insuffisance cardiaque appelée insuffisance cardiaque (par exemple l'oseltamivir et le valsartan),

- Diurétiques,

- Digoxine (médicament pour traiter le rythme cardiaque irrégulier),

- Minoxidil (médicament pour traiter l'hypertension artérielle),

- Salbutamol en comprimé (médicament pour traiter l'asthme),

- Pilule contraceptive (association d'un effet secondaire),

- Traitement hormonal substitutif (pour les femmes enopause) peut augmenter votre risque d'ulcère,

- Aspirine car le risque d'ulcère est augmenté si vous prenez ARIBX®, comprimé pelliculé.

- Aspirine en prévention d'un accident vasculaire cérébral

- ARIBX®, comprimé pelliculé est contre-indiqué à faibles doses. Si vous prenez des doses faibles pour la prévention d'un accident vasculaire cérébral, interrompre le traitement par ARIBX®, comprimé pelliculé.

- Aspirine et autres médicaments anti-inflammatoires stéroïdiens (AINS) :

- Ne prenez pas d'aspirine à fortes doses pendant le traitement par ARIBX®, comprimé pelliculé.

- ARIBX®, comprimé pelliculé est contre-indiqué si vous êtes enceinte, allaitement et fertilité

- Grossesse

- Les comprimés pelliculés d'ARIBX®, comprimé pelliculé pendant la grossesse. Si vous êtes enceinte ou en cas de désir de le devenir, consultez votre médecin avant de prendre les comprimés. Consultez votre médecin si vous avez besoin de plus de conseils.

- Allaitement

- Le passage de l'étoricoxib dans le lait maternel n'a pas été étudié. Si vous allaitez ou envisagez d'allaiter, consultez votre médecin avant de prendre ARIBX®, comprimé pelliculé.

- Fertilité

- ARIBX®, comprimé pelliculé n'a pas été étudié chez les femmes souhaitant concevoir un enfant.

- Si vous êtes enceinte ou envisagez d'être enceinte, consultez votre médecin avant de prendre ARIBX®, comprimé pelliculé.

- Si vous êtes enceinte ou envisagez d'être enceinte, consultez votre médecin avant de prendre ARIBX®, comprimé pelliculé.

- Si vous êtes enceinte ou envisagez d'être enceinte, consultez votre médecin avant de prendre ARIBX®, comprimé pelliculé.

- Si vous êtes enceinte ou envisagez d'être enceinte, consultez votre médecin avant de prendre ARIBX®, comprimé pelliculé.

- Si vous êtes enceinte ou envisagez d'être enceinte, consultez votre médecin avant de prendre ARIBX®, comprimé pelliculé.

- Si vous êtes enceinte ou envisagez d'être enceinte, consultez votre médecin avant de prendre ARIBX®, comprimé pelliculé.

- Si vous êtes enceinte ou envisagez d'être enceinte, consultez votre médecin avant de prendre ARIBX®, comprimé pelliculé.

- Si vous êtes enceinte ou envisagez d'être enceinte, consultez votre médecin avant de prendre ARIBX®, comprimé pelliculé.

- Si vous êtes enceinte ou envisagez d'être enceinte, consultez votre médecin avant de prendre ARIBX®, comprimé pelliculé.

- Si vous êtes enceinte ou envisagez d'être enceinte, consultez votre médecin avant de prendre ARIBX®, comprimé pelliculé.

- Si vous êtes enceinte ou envisagez d'être enceinte, consultez votre médecin avant de prendre ARIBX®, comprimé pelliculé.

- Si vous êtes enceinte ou envisagez d'être enceinte, consultez votre médecin avant de prendre ARIBX®, comprimé pelliculé.

- Si vous êtes enceinte ou envisagez d'être enceinte, consultez votre médecin avant de prendre ARIBX®, comprimé pelliculé.

LOT : 221186

EXP : 09/2025

PPV : 152,00DH

ARIXIB® 60 mg et 90 mg

Comprimé pelliculé

en boîte de 7 et 14

Etoricoxib

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que **ARIXIB®**, comprimé pelliculé et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre **ARIXIB®**, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre **ARIXIB®**, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver **ARIXIB®**, comprimé pelliculé ?
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE **ARIXIB®**, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Qu'est-ce que **ARIXIB®, comprimé pelliculé ?**

ARIXIB®, comprimé pelliculé contient la substance active « etoricoxib ».

ARIXIB®, comprimé pelliculé est l'un des médicaments de la classe des inhibiteurs sélectifs de la cyclo-oxygénase-2 (COX-2).

Ceux-ci appartiennent à une famille de médicaments nommée anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS).

Dans quels cas **ARIXIB®, comprimé pelliculé est-il utilisé ?**
ARIXIB®, comprimé pelliculé contribue à réduire la douleur et le gonflement (inflammation) des articulations et des muscles chez les patients âgés de 16 ans et plus atteints d'arthrose, de polyarthrite rhumatoïde, de spondylarthrite ankylosante et de goutte.

ARIXIB®, comprimé pelliculé est également utilisé pour le traitement de courte durée de la douleur modérée après chirurgie dentaire chez les patients âgés de 16 ans et plus.

Qu'est-ce que l'arthrose ?

L'arthrose est une maladie des articulations. Elle résulte d'une altération progressive du cartilage qui protège les extrémités des os.

Elle entraîne un gonflement (inflammation), une douleur, une sensibilité, une raideur et un handicap.

Qu'est-ce que la polyarthrite rhumatoïde ?

La polyarthrite rhumatoïde est une maladie inflammatoire chronique des articulations. Elle provoque douleur, raideur, gonflement et perte progressive du mouvement des articulations atteintes. Elle peut entraîner également une inflammation d'autres parties du corps.

Qu'est-ce que la goutte ?

La goutte est une maladie qui se manifeste, au niveau des articulations, par des crises soudaines et récurrentes associées à une inflammation, une rougeur et une très vive douleur. Elle est provoquée par des dépôts de cristaux minéraux dans les articulations.

Qu'est-ce que la spondylarthrite ankylosante ?

La spondylarthrite ankylosante est une maladie inflammatoire de la colonne vertébrale et des articulations sacro-iliaques.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE **ARIXIB®**, comprimé pelliculé ?

Ne prenez jamais **ARIXIB®**, comprimé pelliculé dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à l'etoricoxib ou à l'un

des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

- Si vous avez une allergie aux anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), y compris l'aspirine et les inhibiteurs sélectifs de la COX-2 (voir rubrique 4 "Quels sont les effets indésirables éventuels ?").

- Si vous avez un ulcère de l'estomac évolutif ou saignement gastro-intestinal,

- Si vous avez une maladie grave du foie,

- Si vous avez une maladie grave des reins,

- Si vous êtes enceinte ou prévoyez de l'être ou si vous allaitez (voir rubrique "Grossesse, allaitement et fertilité").

- Si vous êtes âgé(e) de moins de 16 ans,

- Si si vous avez une maladie inflammatoire de l'intestin, telle que maladie de Crohn, recto-colite hémorragique ou colite,

- Si vous présentez une hypertension artérielle non contrôlée par un traitement (vérifiez avec votre médecin ou votre infirmière si vous n'êtes pas sûr(e) que votre pression artérielle soit bien contrôlée),

- Si votre médecin vous a diagnostiqué une maladie cardiaque à type d'insuffisance cardiaque (modérée ou sévère), d'angine de poitrine (douleurs thoraciques),

- Si si vous avez des antécédents de crise cardiaque, pontage coronarien, maladie des artères périphériques (mauvaise circulation dans les jambes et les pieds due à des artères rétrécies ou bouchées),

- Si si vous avez eu un accident vasculaire cérébral, quelle que soit la sorte, y compris un accident ischémique transitoire). L'etoricoxib pourrait légèrement augmenter le risque de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral, c'est la raison pour laquelle il ne doit pas être utilisé chez les patients ayant déjà eu des problèmes cardiaques ou un accident vasculaire cérébral. Si vous pensez que l'un de ces points vous concerne, ne prenez pas les comprimés sans avoir consulté votre médecin au préalable.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre **ARIXIB®**, comprimé pelliculé si :

- Vous avez des antécédents de saignement ou d'ulcère de l'estomac,

- Vous êtes déshydraté(e), par exemple à cause d'accès prolongés de vomissements ou de diarrhée prolongés,

- Vous avez des œdèmes dus à une rétention d'eau,

- Vous avez des antécédents d'insuffisance cardiaque ou de toute autre forme de maladie cardiaque,

- Vous avez des antécédents d'hypertension artérielle. **ARIXIB®**, comprimé pelliculé peut augmenter la tension artérielle chez certains patients, en particulier lorsqu'il est utilisé à hautes doses. Votre médecin peut être amené à contrôler votre tension artérielle plus régulièrement.

- Vous avez des antécédents de maladie du foie ou des reins,

- Vous avez des traitements anti-infectieux. **ARIXIB®**, comprimé pelliculé peut masquer une fièvre, qui peut être un signe d'infection,

- Vous avez du diabète, du cholestérol élevé ou vous êtes fumeur. Cela peut augmenter votre risque de maladie cardiaque.

- Vous êtes une femme et souhaitez concevoir un enfant,

- Vous êtes âgé(e) de plus de 65 ans.

Si vous n'êtes pas sûr que l'un des points ci-dessus vous concerne, contactez votre médecin avant de prendre **ARIXIB®**, comprimé pelliculé pour vérifier que ce médicament convient à votre cas.

En particulier, si vous prenez votre médicament peut être amené à traiter par **ARIXIB®**, ces médicaments agissent correcte

- Médicaments qui fluidifient le sang, que la warfarine,

- Rifampicine (un antibiotique),

- Méthotrexate (un médicament utilisé dans la polyarthrite rhumatoïde),

- Ciclosporine ou tacrolimus (immunosuppresseurs),

- Lithium (médicament pour la dépression).

- Médicaments pour aider à contrôler l'insuffisance cardiaque appelés convertisseurs (par exemple les antagonistes des récepteurs angiotensiniques et le valsartan).

- Diurétiques,

- Digoxine (médicament pour le rythme cardiaque irrégulier),

- Minoxidil (médicament pour traiter l'hypertension artérielle),

- Salsbutamol en comprimé (médicament pour traiter l'asthme),

- Pilsule contraceptive (association d'effets secondaires),

- Traitement hormonal substitutif peut augmenter votre risque d'effets secondaires.

- Aspirine car le risque d'ulcère de l'estomac est augmenté.

vous prenez **ARIXIB®**, comprimé pelliculé :

- Aspirine en prévention d'un accident vasculaire cérébral.

- **ARIXIB®**, comprimé pelliculé à faibles doses. Si vous prenez des faibles doses pour la prévention d'un accident vasculaire cérébral, interrompez le traitement pendant la prise de **ARIXIB®**.

- Aspirine et autres médicaments stéroïdiens (AINS) :

- Ne prenez pas d'autres médicaments à fortes doses pendant le traitement par **ARIXIB®**.

ARIXIB®, comprimé pelliculé

Le début de l'effet d'**ARIXIB®**, comprimé pelliculé est rapide si la prise se fait sans interruption.

Grossesse, allaitement et fertilité

Les comprimés pelliculés d'**ARIXIB®** pendant la grossesse. Si vous êtes enceinte ou en cas de désir de grossesse, ne prenez pas de comprimés.

Consultez votre médecin si vous avez besoin de plus de conseils.

Allaitement

Le passage de l'etoricoxib dans le lait maternel n'a pas été étudié.

Si vous allaitez ou envisagez de le faire, consultez votre médecin avant de prendre **ARIXIB®**, comprimé pelliculé.

Fertilité

ARIXIB®, comprimé pelliculé, peut affecter la fertilité chez les hommes qui essaient de concevoir.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Après la prise de comprimés d'**ARIXIB®**, comprimé pelliculé, vous pouvez ressentir des effets secondaires et une somnolence. Ne conduisez pas si vous ressentez ces effets.

Si vous ressentez ces effets, ne conduisez pas et ne manipulez pas de machines.

Si vous ressentez ces effets, ne conduisez pas et ne manipulez pas de machines.

Si vous ressentez ces effets, ne conduisez pas et ne manipulez pas de machines.

Si vous ressentez ces effets, ne conduisez pas et ne manipulez pas de machines.

Si vous ressentez ces effets, ne conduisez pas et ne manipulez pas de machines.

Si vous ressentez ces effets, ne conduisez pas et ne manipulez pas de machines.

Si vous ressentez ces effets, ne conduisez pas et ne manipulez pas de machines.

Si vous ressentez ces effets, ne conduisez pas et ne manipulez pas de machines.

LOT : 221185

EXP : 09/2025

PPV : 76,60DH

ARTIFLEX®

Les gènes articulaires de nos jours sont de plus en plus fréquentes, et ceci est dû à l'usure des cartilages, qui une fois installée, évolue de façon progressive et irrémédiable jusqu'à disparition du tissu cartilagineux, ainsi l'os ne bénéficie plus de la protection optimale pour effectuer les mouvements sans douleurs.

1. Forme & présentation :

- . Boite de 45 gélules.
- . Boite de 30 gélules.

2. Composition :

Poudre de carapace de Crustacés (Glucosamine), Poudre de cartilage de poisson (Chondroïtine), Harpagophytum racine poudre, Reine des Prés, Prêle, vitamine B12 (0,66µg/2gélules), essengel (gingembre, inuline), enveloppe de la gélule : Hydroxy-Propyl-Methyl-Cellulose.
Gélules végétales.

Composition :

Matière Première	Actif	Teneur en actif par 2 gélules	A.J.R.* /2 gélules
Poudre de carapace de Crustacés	Glucosamine	500 mg	-
Poudre de cartilage de poisson	Chondroïtine	150 mg	-
Harpagophytum		150 mg	-
Reine des Prés poudre		90 mg	-
Prêle poudre		90 mg	-
Vitamine B12	Cyanocobalamine	0,66 µg	66,66 %

* Apport Journalier Recommandé

3. Propriétés :

ARTIFLEX® contient des substances naturelles qui contribuent à ralentir l'usure des cartilages et entretenir le confort et la souplesse articulaire.

ARTIFLEX® contient :

- La glucosamine (poudre de carapace de crustacés) et la chondroïtine (poudre de cartilage de poisson), constituants des substances cartilagineuses qui agissent en synergie pour une protection optimale des articulations.
- L'harpagophytum et la reine de prés possèdent des propriétés anti-inflammatoires et antalgiques naturelles.
- La prêle, riche en silice, possède des propriétés reminéralisantes.
- La vitamine B12 reconnue pour ses propriétés antiarthritique et antiostéoporotique.

Pris chaque jour, ARTIFLEX® permet de soulager progressivement ces symptômes.

4. Posologie :


Se référer à la prescription médicale
A prendre au milieu des repas.

5. Précautions d'emploi

Contre-indiqué en cas d'allergie à l'un des composants.
Ne peut être utilisé par la femme enceinte et allaitante.

Fabriqué par Laboratoire FCV
Exploitant RAMO-PHARM

Complément Alimentaire n'est pas un médicament



ARTIFLEX®

Les gènes articulaires de nos jours sont de plus en plus fréquentes, et ceci est dû à l'usure des cartilages, qui une fois installée, évolue de façon progressive et irrémédiable jusqu'à disparition du tissu cartilagineux, ainsi l'os ne bénéficie plus de la protection optimale pour effectuer les mouvements sans douleurs.

1. Forme & présentation :

- . Boite de 45 gélules.
- . Boite de 30 gélules.

2. Composition :

Poudre de carapace de Crustacés (Glucosamine), Poudre de cartilage de poisson (Chondroïtine), Harpagophytum racine poudre, Reine des Prés, Prêle, vitamine B12 (0,66µg/2gélules), essengel (gingembre, inuline), enveloppe de la gélule : Hydroxy-Propyl-Methyl-Cellulose.
Gélules végétales.

Composition :

Matière Première	Actif	Teneur en actif par 2 gélules	A.J.R.* /2 gélules
Poudre de carapace de Crustacés	Glucosamine	500 mg	-
Poudre de cartilage de poisson	Chondroïtine	150 mg	-
Harpagophytum		150 mg	-
Reine des Prés poudre		90 mg	-
Prêle poudre		90 mg	-
Vitamine B12	Cyanocobalamine	0,66 µg	66,66 %

* Apport Journalier Recommandé

3. Propriétés :

ARTIFLEX® contient des substances naturelles qui contribuent à ralentir l'usure des cartilages et entretenir le confort et la souplesse articulaire.

ARTIFLEX® contient :

- La glucosamine (poudre de carapace de crustacés) et la chondroïtine (poudre de cartilage de poisson), constituants des substances cartilagineuses qui agissent en synergie pour une protection optimale des articulations.
- L'harpagophytum et la reine de prés possèdent des propriétés anti-inflammatoires et antalgiques naturelles.
- La prêle, riche en silice, possède des propriétés reminéralisantes.
- La vitamine B12 reconnue pour ses propriétés antiarthritique et antiostéoporotique.

Pris chaque jour, ARTIFLEX® permet de soulager progressivement ces symptômes.

4. Posologie :


Se référer à la prescription médicale
A prendre au milieu des repas.

5. Précautions d'emploi

Contre-indiqué en cas d'allergie à l'un des composants.
Ne peut être utilisé par la femme enceinte et allaitante.

Fabriqué par Laboratoire FCV
Exploitant RAMO-PHARM

Complément Alimentaire n'est pas un médicament



ARTIFLEX®

Les **gènes articulaires** de nos jours sont de plus en plus fréquentes, et ceci est dû à l'usure des cartilages, qui une fois installée, évolue de façon progressive et irrémédiable jusqu'à disparition du tissu cartilagineux, ainsi l'os ne bénéficie plus de la protection optimale pour effectuer les mouvements sans douleurs.

1. Forme & présentation :

- . Boite de 45 gélules.
- . Boite de 30 gélules.

2. Composition :

Poudre de carapace de Crustacés (Glucosamine), Poudre de cartilage de poisson (Chondroïtine), Harpagophytum racine poudre, Reine des Prés, Prêle, vitamine B12 (0.66µg/2gélules), essangel (gingembre, inuline), enveloppe de la gélule : Hydroxy-Propyl-Methyl-Cellulose.
Gélules végétales.

Composition :

Matière Première	Actif	Teneur en actif par 2 gélules	A.J.R.* /2 gélules
Poudre de carapace de Crustacés	Glucosamine	500 mg	-
Poudre de cartilage de poisson	Chondroïtine	150 mg	-
Harpagophytum		150 mg	-
Reine des Prés poudre		90 mg	-
Prêle poudre		90 mg	-
Vitamine B12	Cyanocobalamine	0,66 µg	66,66 %

* Apport Journalier Recommandé

3. Propriétés :

ARTIFLEX® contient des substances naturelles qui contribuent à ralentir l'usure des cartilages et entretenir le confort et la souplesse articulaire.

ARTIFLEX® contient :

- La glucosamine (poudre de carapace de crustacés) et la chondroïtine (poudre de cartilage de poisson), constituants des substances cartilagineuses qui agissent en synergie pour une protection optimale des articulations.
- L'harpagophytum et la reine de prés possèdent des propriétés anti-inflammatoires et antalgiques naturelles.
- La prêle, riche en silice, possède des propriétés reminéralisantes.
- La vitamine B12 reconnue pour ses propriétés antiarthritique et antiostéoporotique.

Pris chaque jour, ARTIFLEX® permet de soulager progressivement ces symptômes.

4. Posologie :


Se référer à la prescription médicale
A prendre au milieu des repas.

5. Précautions d'emploi

Contre-indiqué en cas d'allergie à l'un des composants.
Ne peut être utilisé par la femme enceinte et allaitante.

Fabriqué par Laboratoire FCV
Exploitant RAMO-PHARM

Complément Alimentaire n'est pas un médicament



ARTIFLEX®

Les **gènes articulaires** de nos jours sont de plus en plus fréquentes, et ceci est dû à l'usure des cartilages, qui une fois installée, évolue de façon progressive et irrémédiable jusqu'à disparition du tissu cartilagineux, ainsi l'os ne bénéficie plus de la protection optimale pour effectuer les mouvements sans douleurs.

1. Forme & présentation :

- . Boite de 45 gélules.
- . Boite de 30 gélules.

2. Composition :

Poudre de carapace de Crustacés (Glucosamine), Poudre de cartilage de poisson (Chondroïtine), Harpagophytum racine poudre, Reine des Prés, Prêle, vitamine B12 (0.66µg/2gélules), essangel (gingembre, inuline), enveloppe de la gélule : Hydroxy-Propyl-Methyl-Cellulose.
Gélules végétales.

Composition :

Matière Première	Actif	Teneur en actif par 2 gélules	A.J.R.* /2 gélules
Poudre de carapace de Crustacés	Glucosamine	500 mg	-
Poudre de cartilage de poisson	Chondroïtine	150 mg	-
Harpagophytum		150 mg	-
Reine des Prés poudre		90 mg	-
Prêle poudre		90 mg	-
Vitamine B12	Cyanocobalamine	0,66 µg	66,66 %

* Apport Journalier Recommandé

3. Propriétés :

ARTIFLEX® contient des substances naturelles qui contribuent à ralentir l'usure des cartilages et entretenir le confort et la souplesse articulaire.

ARTIFLEX® contient :

- La glucosamine (poudre de carapace de crustacés) et la chondroïtine (poudre de cartilage de poisson), constituants des substances cartilagineuses qui agissent en synergie pour une protection optimale des articulations.
- L'harpagophytum et la reine de prés possèdent des propriétés anti-inflammatoires et antalgiques naturelles.
- La prêle, riche en silice, possède des propriétés reminéralisantes.
- La vitamine B12 reconnue pour ses propriétés antiarthritique et antiostéoporotique.

Pris chaque jour, ARTIFLEX® permet de soulager progressivement ces symptômes.

4. Posologie :

Se référer à la prescription médicale
A prendre au milieu des repas.

5. Précautions d'emploi

Contre-indiqué en cas d'allergie à l'un des composants.
Ne peut être utilisé par la femme enceinte et allaitante.

Fabriqué par Laboratoire FCV
Exploitant RAMO-PHARM

Complément Alimentaire n'est pas un médicament

