

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS :Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° W19-453776

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent(e) : 1537 Société : RAM

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : HOUARAN MOHAMED

Date de naissance : 16.06.50

Adresse : NADOR

Tél. : 06 61 08 91 17

Total des frais engagés : 425,90 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Dr Hassan ROBIO
Medecine Generale
AV. F.A.R. Rue Moscou N°4 Nador
Tel: 0526 60 00 32

Cachet du médecin : 02/12/22

Date de consultation : 02/12/22

Nom et prénom du malade : AMROUSSI YAMNA Age: 68 ans

Lien de parenté : Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie : Lombalgie - genou

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : NADOR

Le : 02 DEC 2022

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
02/08/2010	Consultation + examen	1	(200) FC	INP : 08109927140 Dr Hassan ROBAI Medecine Generale 15 Moscou N°4 Nador 60 08 32

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<i>Pharmacie Babel Bd. Tahar Hacen, N°65 - NADOR TPE: 082013558 - Tel: 05.36.60.55.44</i>	02.12.22	225,90

ANALYSES - RADIOPHARMACIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP : <input type="text"/>														
				COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>														
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>														
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>														
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>														
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>														
	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">H</td> <td style="text-align: center;">G</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">25533412</td> <td style="text-align: center;">21433552</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">00000000</td> <td style="text-align: center;">00000000</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><hr/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">00000000</td> <td style="text-align: center;">00000000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">35533411</td> <td style="text-align: center;">11433553</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: center;">D</td> </tr> </table>			H	G	25533412	21433552	00000000	00000000	<hr/>		00000000	00000000	35533411	11433553	B	D	MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
H	G																	
25533412	21433552																	
00000000	00000000																	
<hr/>																		
00000000	00000000																	
35533411	11433553																	
B	D																	
				DATE DU DEVIS <input type="text"/>														
				DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>														

Docteur Hassan ROBIO

Médecin Général

Diplôme d'Échographie

Diplôme d'expertise & Réparation du dommage Corporel

Ex- Médecin à l'hôpital AL HASSANI - NADOR

Vite médicale pour obtention du permis de conduire

الدكتور الحسن روبيو

الطب العام

دبلوم الفحص بالصدى

دبلوم الخبرة الطبية وتقدير الضرر الجسدي

طبيب سابق بالمستشفى الحسني بالناظور

الفحص الطبي لتأهيل رخصة السيارة

Nador le :

02 DEC 2022

AN ROUBIO
YOUNES

16900

21 Dolilox 90 cp
141; 2140 caps

39700

Dr nkol cp

305 210 caps

31

I DOL 500.00

18000; 210 caps

1990

22500

Dr Hassan ROBIO
Medecine Generale
Av FAR Rue Mouscou N°4 Nador
Tel: 0536 60 00 32

Pharmacie Babel
Bd. Tahia Hcien, N°65 - NADOR
INPE: 082013558 - Tel: 05.36.60.55.77

Veuillez lire attentivement l'intégralité* de cette notice avant de prendre ce médicament:
 - Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
 - Si vous avez des questions quelconques ou avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
 - Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques; cela pourrait lui être nocif.
 - Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Composition du médicament :

- Composition qualitative et quantitative en substance active par unité de prise :	
Etoricoxib	60 mg
90 mg comprimé pelliculé :	
- Composition qualitative et quantitative en substance active par unité de prise :	
Etoricoxib	90 mg
120 mg comprimé pelliculé :	
- Composition qualitative et quantitative en substance active par unité de prise :	
Etoricoxib	120 mg

Excepté à effet notoire : Lactose monohydrate.

Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

DOLICOX® 60mg, 90mg et 120mg, comprimé pelliculé est l'un des médicaments de la classe des inhibiteurs sélectifs de la cyclo-oxygénase 2 (COX-2).

La classe pharmaco-thérapeutique : anti-inflammatoires anti-humains, non stéroïdiens,coxie.

Indications thérapeutiques :

DOLICOX® 60mg, comprimé pelliculé contribue à réduire la douleur et le gonflement (inflammation) des articulations et des muscles chez les patients atteints d'arthrose. DOLICOX® 90mg, comprimé pelliculé contribue à réduire la douleur et le gonflement (inflammation) des articulations et des muscles chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde et de spondylarthrite ankylosante.

DOLICOX® 90mg, comprimé pelliculé est également utilisé pour le traitement de courte durée de la douleur modérée après chirurgie dentaire.

DOLICOX® 120 mg, comprimé pelliculé contribue à réduire la douleur et le gonflement (inflammation) des articulations et des muscles chez les patients atteints de goutte.

Possible(s) usage(s) :
 Les comprimés pelliculés DOLICOX® 60mg, 90mg & 120mg, ne doivent être pris ni par les enfants, ni par les adolescents de moins de 16 ans.

Ne dépasser la dose recommandée pour le traitement de votre maladie. Il est important d'utiliser la dose la plus faible qui soulage votre douleur et ne pas prendre DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, comprimé pelliculé plus longtemps que prescrit.

Avertissements :
 La dose recommandée est de 30 mg une fois par jour, augmentée à 60 mg maximum une fois par jour si nécessaire.

Patients avec problèmes hépatiques.

La dose recommandée est de 90 mg une fois par jour.

Douleur aiguë :
 L'etoricoxib ne doit être utilisé que pendant la période de douleur aiguë.

Douleur post-opératoire après chirurgie dentaire :
 La dose recommandée est de 90 mg une fois par jour, traitement limité à 3 jours au maximum.

Patients avec problèmes hépatiques

Goutte
 La dose recommandée est de 120 mg une fois par jour qui ne doit être utilisée que pendant la période aigüe de la douleur, limitée à 8 jours au maximum.

Patients avec problèmes hépatiques
 En cas d'insuffisance hépatique légère (maladie du foie), vous ne devez pas prendre plus de 60 mg par jour.

Si vous avez une forme modérée d'insuffisance hépatique, la dose maximale recommandée est de 60 mg un jour sur deux, ou de 30 mg par jour.

Mode d'administration :
 Vous devez prendre le comprimé.

Le ou les comprimés pelliculés DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, doivent être avalés en une prise par jour. DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, comprimé pelliculé peut être pris au cours ou en dehors des repas.

Periode de traitement
 Ne prenez jamais DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, comprimé pelliculé dans les cas suivants:

- Allergie (hypersensibilité) à l'etoricoxib ou à l'un des autres composants contenus dans DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, comprimé pelliculé.

- Allergie aux anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), y compris l'aspirine et les inhibiteurs sélectifs de la COX-2.

- Ulcère, fêture, saignement ou saignement gastro-intestinal,

- Maladie grave du foie,

- Maladie grave des reins,

- Grossesse et allaitement ou prévision de grossesse (voir Rubrique « Grossesse et allaitement »),

- Enfants et adolescents de moins de 16 ans.

- Maladie inflammatoire de l'intestin, telle que maladie de Crohn, rectocolite hémorragique ou colite.

- Diagnostic de maladie cardiaque à type d'insuffisance cardiaque (modérée ou sévère), d'angine de poitrine, antécédents de crise cardiaque, pontage coronaire, maladie des artères périphériques, ou toute sorte d'accident vasculaire cérébral y compris un accident ischémique transitoire. L'etoricoxib pourrait légèrement augmenter le risque de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral, c'est la raison pour laquelle il ne doit pas être utilisé chez les patients ayant déjà eu des problèmes cardiaques ou un accident vasculaire cérébral.

- Hypertension artérielle non contrôlée par un traitement (vérifiez avec votre médecin ou votre infirmière si vous n'êtes pas sûr que votre pression artérielle soit bien contrôlée). Si vous pensez que l'un de ces points vous concerne, ne prenez pas les comprimés sans avoir consulté votre médecin ou le préalable.

Effets indésirables :

Description des effets indésirables
 Comme tous les médicaments, DOLICOX® 60mg, 90mg & 120mg, comprimé pelliculé peuvent provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Si vous présentez un ou ces symptômes, vous devez immédiatement arrêter DOLICOX® 60mg, 90mg & 120mg, comprimé pelliculé et contacter votre médecin.

- Apparition ou aggravation d'un essoufflement, de douleurs thoraciques ou d'âmeilleur des cheveux.

Colore jaune de la peau et des yeux [jaunisse] : cela peut être le signe évocateur de troubles hépatiques.

Douleur d'estomac importante ou permanente ou coloration noire des selles, - Réaction allergique pouvant inclure des problèmes cutanés tels qu'apparition d'ulcérations ou de vésicules, ou difficultés du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge pouvant entraîner une difficulté à respirer;

Fréquence : surviennent chez plus de 1 patient sur 10] Fréquents [surviennent chez 1 à 10 patients sur 100] Très fréquents [surviennent chez 1 à 10 patients sur 1 000] Rares [surviennent chez moins de 1 patient sur 1 000] Très rares [surviennent chez moins de 1 patient sur 10 000]

Les effets indésirables suivants peuvent survenir pendant le traitement par DOLICOX® 60mg, 90mg & 120mg, comprimé pelliculé :

- Troubles digestifs : Douleur à l'estomac;

Fréquents :

- Alvéolite, Gonflement des jambes et/ou des pieds dû à une rétention d'eau;

- Étourdissements, maux de tête; Palpitations, rythme cardiaque irrégulier ; élévation de la pression artérielle; Sifflements ou difficultés respiratoires; Constipation, flatulence, gastrite, brûlures d'estomac, diarrhée, indigestion / gêne à l'estomac, nausées, vomissements, difficultés de l'œsophage, ulcérations de la bouche; Modifications des examens sanguins évaluant le fonctionnement du foie; Hématoxème; Faiblesse et fatigue, syndrome pseudo-grippe;

Pas Fréquents :

- Gastro-entérite, réaction des voies respiratoires hautes, infection urinaire, diminution du nombre de globules rouges, diminution du nombre de globules blancs, diminution des plaquettes, hypersensibilité, augmentation ou diminution de l'aptitude, prise de poids, difficultés digestives, diminution du discernement, voir, ressentir ou entendre des choses qui n'existent pas, altération du fonctionnement sensoriel, sensation d'engourdissement ou picotement, somnolence, vision trouble, irritation et rougeur de l'œil, hypersecretion d'œufs, vertiges, anomalie du rythme cardiaque, fréquence cardiaque rapide, insuffisance cardiaque, sensation d'oppression, de pression ou de poids dans la poitrine, crise cardiaque, bouffées de chaleur, accident vasculaire cérébral, mini-AVC, éruption sévère de la pression artérielle, inflammation des vaisseaux sanguins, toux, essoufflement, saignements de nez, ballonnement de l'estomac ou de l'intestin, modification du transit intestinal, sécheresse de la bouche, ulcère à l'estomac, inflammation de la paroi de l'estomac pouvant devenir grave et aller jusqu'à l'hémorragie, syndrome du côlon irritable, inflammation du pénis, gonflement du visage, éruption cutanée ou crise d'urticaire, rash, éruption urticarielle, douleur abdominale, modification des examens sanguins ou urinaires, troubles rénaux graves, douleur thoracique.

Pas Fréquents pour DOLICOX® 120mg : Anxiété, voies respiratoires hautes, Ulcérations de la bouche

Rares :

- Angio-édème (réaction allergique sévère qui nécessite l'hospitalisation);
- Confusion, agitation; Problèmes hépatiques; Troubles de l'humeur;
- Insuffisance hépatique, jaunissement de la peau;
- Diminution du taux de sodium dans le sang; nou;

Très rares pour DOLICOX® 120mg : (survenant dans moins de 1 patient sur 10 000)

Si vous ressentez un ou ces symptômes, vous devez immédiatement arrêter le traitement et consulter votre médecin ou le préalable.

Fréquence indéterminée (ne pouvant être estimée à moins de 1 patient sur 10 000) : Jaunissement de la peau et des yeux [jaunisse], info-

rmation cardiaque, ulcérations de la bouche, ulcère de l'estomac ou ulcère de l'intestin.

Troubles digestifs : Si vous ressentez un ou ces effets mentionnés comme étant grave ou si vous présentez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi :

Adresssez-vous à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, comprimé pelliculé si :

- Vous avez des antécédents de saignement ou d'ulcère de l'estomac;

- Vous êtes déshydraté(e);

* Veuillez lire des adresses dès une rétention de liquide, vous avez des antécédents d'insuffisance cardiaque ou de toute autre forme de maladie cardiaque;

- Vous avez des antécédents d'hypertension artérielle DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, comprimé pelliculé peut augmenter la pression artérielle chez certains patients, en particulier lorsqu'il est utilisé à hautes doses;

- Vous avez des antécédents de maladie du foie ou des reins;

- Vous êtes une femme enceinte et souhaitez concevoir un enfant;

- Vous êtes âgée(e);

- Vous avez du diabète, le cholestérol élevé ou vous êtes fumeur. Cela peut augmenter votre risque de maladie cardiaque;

L'usage de ce médicament est déconseillé chez les patients présentant une intolérance ou galactose déficit en lactose de Lapp ou le syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares);

Si vous n'êtes pas sûr que l'un des points ci-dessus vous concerne, contactez votre médecin avant de prendre DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, comprimé pelliculé.

Enfants et adolescents

Ne donnez pas ce médicament aux enfants et adolescents de moins de 16 ans.

Autres médicaments et DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, comprimé pelliculé

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avec récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance.

Très rapidement après le début du traitement par DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, comprimé pelliculé, votre médecin peut faire amener à vérifier, que vos médicaments agissent correctement, si vous prenez l'un des médicaments suivants :

- Médicaments qui fluidifient votre sang (anticoagulants) tels que la warfarine, rifampicine (un antibiotique), méthotrexate (un médicament immunosuppresseur, souvent utilisé dans la polyarthrite rhumatoïde), médicaments pour aider à contrôler l'hypertension artérielle et l'insuffisance cardiaque, appartenant également à l'enzymé de conversion (par exemple l'enalapril et le ramipril) et antagonistes des récepteurs de l'angiotensine (comme le losartan et le valsartan), lithium (médicament pour traiter certains types de dépressions), diurétiques (pour traiter l'hypertension artérielle), digoxine (médicament pour traiter l'insuffisance cardiaque et le rythme cardiaque), minoxidil (médicament pour traiter l'hypertension artérielle), subbutamol en combinaison ou en solution bivalve (médicament pour traiter l'asthme), pilule contraceptive, traitement hormonal substitutif de la ménopause, aspirine car le risque d'ulcère de l'estomac est plus élevé si vous prenez DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, comprimé pelliculé avec de l'aspirine.

DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, comprimé pelliculé peut être pris avec de l'aspirine à faibles doses, lorsque prescrit actuellement de l'aspirine à faibles doses pour la prévention d'une crise cardiaque ou d'un accident vasculaire cérébral, vous ne devez pas interrompre le traitement par l'aspirine sans l'avis de votre médecin.

Interactions avec les aliments et les boissons :

L'efficacité de DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, comprimé pelliculé peut être plus rapide si la prise se fait sans aliments.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives :

Sous réserve de l'avis de votre médecin.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement :

Le comprimé pelliculé DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, ne doivent pas être pris pendant la grossesse. Si vous êtes enceinte ou suspecte de l'être ou en cas de désir de grossesse, ne prenez pas les comprimés. Si vous découvrez que vous êtes enceinte, arrêtez immédiatement le traitement et consultez votre médecin. Consultez votre pharmacien si vous n'êtes pas sûr si vous avez besoin de plus de conseils.

Le passage de l'etoricoxib dans le lait maternel n'est pas connu. Si vous allaitez ou envisagez d'allaiter, consultez votre médecin avant de prendre DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, comprimé pelliculé. Si vous prenez DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, comprimé pelliculé, vous devrez arrêter d'allaiter.

Précautions d'utilisation :

Il est recommandé de prendre DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, comprimé pelliculé avec de l'eau.

Si vous avez des difficultés pour avaler les comprimés, vous pouvez les broyer ou les dissoudre dans de l'eau.

Si vous avez des difficultés pour avaler les comprimés, vous pouvez les broyer ou les dissoudre dans de l'eau.

Si vous avez des difficultés pour avaler les comprimés, vous pouvez les broyer ou les dissoudre dans de l'eau.

Si vous avez des difficultés pour avaler les comprimés, vous pouvez les broyer ou les dissoudre dans de l'eau.

Si vous avez des difficultés pour avaler les comprimés, vous pouvez les broyer ou les dissoudre dans de l'eau.

Si vous avez des difficultés pour avaler les comprimés, vous pouvez les broyer ou les dissoudre dans de l'eau.

Si vous avez des difficultés pour avaler les comprimés, vous pouvez les broyer ou les dissoudre dans de l'eau.

Si vous avez des difficultés pour avaler les comprimés, vous pouvez les broyer ou les dissoudre dans de l'eau.

Si vous avez des difficultés pour avaler les comprimés, vous pouvez les broyer ou les dissoudre dans de l'eau.

Si vous avez des difficultés pour avaler les comprimés, vous pouvez les broyer ou les dissoudre dans de l'eau.

Si vous avez des difficultés pour avaler les comprimés, vous pouvez les broyer ou les dissoudre dans de l'eau.

Si vous avez des difficultés pour avaler les comprimés, vous pouvez les broyer ou les dissoudre dans de l'eau.

Si vous avez des difficultés pour avaler les comprimés, vous pouvez les broyer ou les dissoudre dans de l'eau.

Si vous avez des difficultés pour avaler les comprimés, vous pouvez les broyer ou les dissoudre dans de l'eau.

Si vous avez des difficultés pour avaler les comprimés, vous pouvez les broyer ou les dissoudre dans de l'eau.

Si vous avez des difficultés pour avaler les comprimés, vous pouvez les broyer ou les dissoudre dans de l'eau.

Si vous avez des difficultés pour avaler les comprimés, vous pouvez les broyer ou les dissoudre dans de l'eau.

Si vous avez des difficultés pour avaler les comprimés, vous pouvez les broyer ou les dissoudre dans de l'eau.

Si vous avez des difficultés pour avaler les comprimés, vous pouvez les broyer ou les dissoudre dans de l'eau.

Si vous avez des difficultés pour avaler les comprimés, vous pouvez les broyer ou les dissoudre dans de l'eau.



bottu®
82, Allée des Casuarinas - Ain Seba - Casablanca
S. Bachouchi - Pharmacien Responsable

IDEMCO-1019-009

DUOXOL® 500 mg/2 mg
Comprimé
Boîte de 20
Paracétamol - Thiocolchicoside

- Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

COMPOSITION :

Paracétamol..... 500 mg
Thiocolchicoside..... 2 mg
Excipients : q.s.p. 1 comprimé

Excipients à effet notoire : Amidon de blé, lactose.

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament est préconisé dans :

- Traitements symptomatiques de la douleur d'origine rhumatismale ou musculaire en traumatologie et gynécologie.
- Traitements d'appoint des contractures douloureuses au cours :
 - des affections vertébrales dégénératives et des troubles statiques vertébraux : torticolis, dorsalgies, lombalgies.
 - des affections traumatologiques et neurologiques (avec spasticité).

ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas :

- d'hypersensibilité au thiocolchicoside ou au paracétamol,
- de grossesse,
- d'allaitement,
- d'insuffisance hépatocellulaire,
- d'hypersensibilité à l'un des excipients du produit,
- chez l'enfant de moins de 15 ans.

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Chez les patients souffrant d'insuffisance hépatique et/ou rénale, d'affections cardiaques ou pulmonaires, éviter les traitements prolongés.
 - Pour éviter le risque de surdosage au paracétamol, vérifier l'absence de paracétamol dans la composition d'autres médicaments.
 - Le thiocolchicoside doit être administré avec prudence chez les personnes souffrant de maladie coeliaque.
 - En cas de diarrhée, prévenez votre médecin qui pourra éventuellement, ingérer les comprimés avec un pansement gazeux.
 - Ne pas dépasser la dose prescrite.
 - Il est conseillé de consulter un médecin pour des traitements en cas de doute.
- EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER**

En raison de la présence de lactose, ce médicament est contre-indiqué pour les personnes souffrant de maladie coeliaque.


INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS.
DUOXOL® peut augmenter la toxicité du chloramphénicol.

En cas de traitement avec des anticoagulants oraux, on peut l'administrer occasionnellement comme alternative d'élection.

Examens paracliniques :

La prise de paracétamol peut fausser le dosage de l'acide urique sanguin par la méthode à l'acide phosphotungstique et le dosage de la glycémie par la méthode à la glucose oxydase-peroxydase.



37,00

EN.

de

nez

ALER

CIEN.