

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com  
 Prise en charge : pec@mupras.com  
 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

### Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1056

Société : 141113

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : EL MANJRA SOAD

Date de naissance : 06.03.1947

Adresse : Rte Azzemour Rond Joyau d'Anfa

IMM : A2

App : 1

Cettoleur

Tél. : 0661389354 Total des frais engagés : \_\_\_\_\_ Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 28 SEP 2022

Nom et prénom du malade : EL MANJRA SOAD

Age : 1967

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie : RHEUMATOLOGIQUE

En cas d'accident préciser les causes et circonstances : \_\_\_\_\_

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca

Le : 28/09/2022

Signature de l'adhérent(e) : Kewi

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes 28 SEP 2022	Natures des Actes <i>C</i>	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires <i>Gte</i>	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes  DR. ASPIRANTOLOGIE PHYSIOTHERAPEUTE - NATUROPATHIE MÉDECINE FONCTIONNELLE - MÉDECINE DU SPORT MICRO-NUTRITION Antre Bd. de la Marne 10 (bd du Phare) et Av. de Nice Residence Normandie 22ème étage N° Casablanca 06 62 37 80 50 tel.: 03 22 36 31 80 fax: 03 22 36 31 81
--------------------------------	-------------------------------	-----------------------	---	--

### EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur 	Date 28/09/22	Montant de la Facture <i>128010</i>
--	------------------	--

### ANALYSES - RADIographies

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

### AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

#### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				Coefficient DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H 25533412 00000000 00000000 35533411	D 21433552 00000000 00000000 11433553	G B	Coefficient DES TRAVAUX
	(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS				VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

## ⑥ Laxoxyl goutte


01 goutte au coucher

5

pendant 05 jours.


puis 02 gouttes au coucher  
à 05 jours.

puis 03 gouttes au coucher  
à 03 jours



## ⑦ Coltran 75

1cp le soir pendant



Dr. Asmaa YACOUBI HESSISSEN  
الدكتورة أسماء يعقوبي الحسيسن

Casablanca, le : 28 SEP. 2022

# La MANTRA SOAD -

## ① EXTRAMAG :

Icp de matin

15

390L

99,00 × 2

GRANDE PHARMACIE DU MAROC  
Mme DEBBAGH BENNIS Naïma  
Place Bandoeng Casablanca  
Tél 05 22 30 42 28

## ② Reflexine B6 375

Igel le soir pendant

10

390L

GRANDE PHARMACIE DU MAROC  
Mme DEBBAGH BENNIS Naïma  
Place Bandoeng Casablanca  
Tél 05 22 30 42 28

## ③ HONART FORTE

Igel x 315 au milieu

15

390L

des repas

2

GRANDE PHARMACIE DU MAROC  
Mme DEBBAGH BENNIS Naïma  
Place Bandoeng Casablanca  
Tél 05 22 30 42 28

## ④ Vitacueil fort

Icp x 215 au milieu

15

390L

des repas

2

390L

GRANDE PHARMACIE DU MAROC  
Mme DEBBAGH BENNIS Naïma  
Place Bandoeng Casablanca  
Tél 05 22 30 42 28

## ⑤ D CURE FORTE

lampelle (selon allo  
pdlt 03 700)

# VITANEVRIL FORT 100 mg

## 1. DENOMINATION DU MEDICAMENT

VITANEVRIL FORT 100 mg. Comprimé pelliculé, boîte de 30.  
(DCI) Benfotiamine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.  
Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la re lire.  
Si vous avez toutes autres questions, si vous avez un doute ou plus d'informations à poser au médecin ou à votre pharmacien.  
Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques.  
Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre pharmacien.

## 2. COMPOSITION DU MEDICAMENT

Composition qualitative et quantitative en substance(s) active(s) par unité de prise  
Benfotiamine ..... 100 mg

### Composition qualitative en excipients

Excipients : Amidon de riz ; Lactose monohydrate ; Stéarate de magnésium ; Saccharose ; Talc ; Hypromellose ; Dioxyde de titane ; gélule comprimée ; Macrogol 400 ; et l'eau pure.

Exipient à effet notable : Saccharose ; Lactose monohydrate.

### 3. CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE OU LE TYPE D'ACTIVITE

Antiasthénique (A : appétit digestif et métabolisme).

### 4. INDICATIONS THERAPEUTIQUES

- traitement du bœuf-bœuf.
- prophylaxie des états de carence vitaminoïque dus à une diminution des apports alimentaires (par exemple : malabsorption, régimes restrictifs riches en protéines ou suppléments, nutrition parentérale), en association avec les autres vitamines du groupe b.
- proposé chez l'alcoolique, notamment en cas de polynévrites.
- proposé dans d'autres polynévrites supposées d'origine toxicitaire.
- utilisée, à forte dose, dans certains syndromes douloureux.

### 5. POSOLOGIE

- Mode et voies d'administration :

voie orale.

- Durée du traitement : se conformer à l'ordonnance de votre médecin.

- Fréquence d'administration :

2 à 4 comprimés par jour, à avaler sans croquer.  
DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A  
L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

### 6. CONTRE-INDICATIONS

ATTENTION !

DANS QUELQUIS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- intolérance connue à la vitamine B1.

- Ne pas administrer aux enfants de moins de 8 ans.

EN CAS DE DOUBTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS

DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### 7. EFFETS INDESIRABLES

Sans objet.

NHESitez PAS À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE

VOtre PHARMACIEN ET A SIGNALER TOUT EFFET NON SOUHAITE

ET GENANT.

PPV

LOT

PER

28,80

## CAUTIONS PARTICULIERES

du Lactose monohydrate, ce  
tolérance au fructose, de  
la galactose ou de déicit en

À DEMANDER L'AVIS DE  
ACIEN.

une intolérance au fructose.  
À DEMANDER L'AVIS DE  
ACIEN.

its ;  
oissons ;  
phytothérapie ou thérapie

### AUTRE TRAITEMENT EN COURS

SYSTEMATIQUEMENT TOUT  
DURS VOTRE MEDECIN OU VOTRE  
PHARMACIEN.

### 10. UTILISATIONS EN CAS

Par mesure de précaution,  
médicamente pendant la grossesse  
Allaitement : ce médicament

D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, il convient au cours de la  
GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER  
L'AVIS DE VOTRE MEDECIN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT  
D'UTILISER UN MEDICAMENT.

### 11. LES EFFETS POSSIBLES

A CONDUIRE UN VEHICULE OU A UTILISER CERTAINES  
MACHINES

Sans objet.

### 12. SYMPTOMES ET CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSSAGE

Sans objet.

### 13. CONDUITE A TENIR EN CAS D'OMISSION D'UNE OU PLUSIEURS DOSES

Sans objet.

### 14. MENTION, SI NÉCESSAIRE, D'UN RISQUE DE SYNDROME DE SEVRAGE

- Conditions de prescription et de délivrance  
- Précautions particulières de conservation

- Tenir hors de la portée des enfants  
- Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte  
FAMM au Maroc

Sans objet

- Nom et adresse de l'EPI Titulaire de l'AMM au Maroc

SYNTHEMEDIC  
20-22, Rue Zoubeir Ibnou Ali Aouan  
Roches Noires  
20300 Casablanca  
Maroc

- la dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le : 03/2015

# VITANEVRIL FORT 100 mg

## 1. DENOMINATION DU MEDICAMENT

VITANEVRIL FORT 100 mg. Comprimé pelliculé, boîte de 30.  
(DCI) Benfotiamine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.  
Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la re lire.  
Si vous avez toutes autres questions, si vous avez un doute ou plus d'informations à poser au médecin ou à votre pharmacien.  
Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques.  
Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre pharmacien.

## 2. COMPOSITION DU MEDICAMENT

Composition qualitative et quantitative en substance (s) active (s) par unité de prise  
Benfotiamine ..... 100 mg

### Composition qualitative en excipients

Excipients : Amidon de riz ; Lactose monohydrate ; Stéarate de magnésium ; Saccharose ; Talc ; Hypromellose ; Dioxyde de titane ; gélule comprimée ; Macrogol 400 ; et l'eau pure.

Exipient à effet notable : Saccharose ; Lactose monohydrate.

### 3. CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE OU LE TYPE D'ACTIVITE

Antithiométi (A : appétit digestif et métabolisme).

### 4. INDICATIONS THERAPEUTIQUES

- traitement du bœuf-bœuf.
- prophylaxie des états de carence vitaminoïque dus à une diminution des apports alimentaires (par exemple : malabsorption, régimes restrictifs riches en protéines ou suppléments, nutrition parentérale), en association avec les autres vitamines du groupe b.
- proposé chez l'alcoolique, notamment en cas de polynévrites.
- proposé dans d'autres polynévrites supposées d'origine toxicienne.
- utilisée, à forte dose, dans certains syndromes douloureux.

### 5. POSOLOGIE

- Mode et voies d'administration :

voie orale.

- Durée du traitement : se conformer à l'ordonnance de votre médecin.

- Fréquence d'administration : 2 à 4 comprimés par jour, à avaler sans croquer.

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

### 6. CONTRE-INDICATIONS

ATTENTION ! DANS QUELQUIS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

DANS QUELQUIS CAS NE DOIT PAS ETRE UTILISE DANS LES CAS suivants :

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE à la vitamine B1.

- Intolérance connue à la vitamine B1.

- Ne pas administrer aux enfants de moins de 8 ans.

EN CAS DE DOUBTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### 7. EFFETS INDESIRABLES

Sans objet.  
N'HESitez PAS à DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET A SIGNALER TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT.

PPV

LOT

PER

28,80

## CAUTIONS PARTICULIERES

du Lactose monohydrate, ce  
tolérance au fructose, de  
la galactose ou de déicit en

À DEMANDER L'AVIS DE  
ACIEN.

une intolérance au fructose.  
À DEMANDER L'AVIS DE  
ACIEN.

its ;  
oissons ;  
phytothérapie ou thérapie

### AUTRE TRAITEMENT EN CAS

FRACTIONS ENTRE PLUSieurs  
ALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT  
URS VOTRE MEDECIN OU VOTRE  
PHARMACIEN.

### 10. UTILISATIONS EN CAS

Par mesure de précaution,  
médicamente pendant la grossesse  
Allaitement : ce médicament

D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, il convient au cours de la  
GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER  
L'AVIS DE VOTRE MEDECIN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT  
D'UTILISER UN MEDICAMENT.

11. LES EFFETS POSSIBLES  
A CONDUIRE UN VEHICULE OU A UTILISER CERTAINES  
MACHINES

Sans objet.

12. SYMPTOMES ET CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSSAGE  
Sans objet.

13. CONDUITE A TENIR EN CAS D'OMISSION D'UNE OU PLUSIEURS  
DOSES  
Sans objet.

14. MENTION, SI NÉCESSAIRE, D'UN RISQUE DE SYNDROME DE  
SEVRAGE

- Conditions de prescription et de délivrance
- Précautions particulières de conservation
- Tenir hors de la portée des enfants
- Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte FAMM au Maroc
- Nom et adresse de l'EPI Titulaire de l'AMM au Maroc  
SYNTHEMEDIC  
20-22, Rue Zoubeir Ibnou Ali Aouan  
Roches Noires  
20300 Casablanca  
Maroc
- Sans objet

- Non et adresse de l'EPI Titulaire de l'AMM au Maroc

SYNTHEMEDIC  
20-22, Rue Zoubeir Ibnou Ali Aouan  
Roches Noires  
20300 Casablanca  
Maroc

- la dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le : 03/2015

# VITANEVRIL FORT 100 mg,

## 1. DENOMINATION DU MEDICAMENT

VITANEVRIL FORT 100 mg. Comprimé pelliculé, boîte de 30.  
(DCI) Benfotiamine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.  
Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la re lire.  
Si vous avez toutes autres questions, si vous avez un doute ou plus d'informations à poser au médecin ou à votre pharmacien.  
Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques.  
Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre pharmacien.

## 2. COMPOSITION DU MEDICAMENT

Composition qualitative et quantitative en substance(s) active(s) par unité de prise  
Benfotiamine ..... 100 mg

### Composition qualitative en excipients

Excipients : Amidon de riz ; Lactose monohydrate ; Stéarate de magnésium ; Saccharose ; Talc ; Hypromellose ; Dioxyde de titane ; gélule comprimée ; Macrogol 400 ; et l'eau pure.

Exipient à effet notable : Saccharose ; Lactose monohydrate.

### 3. CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE OU LE TYPE D'ACTIVITE

Antiasthénique (A : appétit digestif et métabolisme).

### 4. INDICATIONS THERAPEUTIQUES

- traitement du bœuf-bœuf.
- prophylaxie des états de carence vitaminoïque dus à une diminution des apports alimentaires (par exemple : malabsorption, régimes restrictifs riches en protéines ou suppléments, nutrition parentérale), en association avec les autres vitamines du groupe b.
- proposé chez l'alcoolique, notamment en cas de polynévrites.
- proposé dans d'autres polynévrites supposées d'origine toxicitaire.
- utilisée, à forte dose, dans certains syndromes douloureux.

### 5. POSOLOGIE

- Mode et voies d'administration :

voie orale.

- Durée du traitement : se conformer à l'ordonnance de votre médecin.

- Fréquence d'administration :

2 à 4 comprimés par jour, à avaler sans croquer.  
DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A  
L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

### 6. CONTRE-INDICATIONS

ATTENTION !

DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- intolérance connue à la vitamine B1.

- Ne pas administrer aux enfants de moins de 8 ans.

EN CAS DE DOUBTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### 7. EFFETS INDESIRABLES

Sans objet.  
N'HESitez PAS à DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET A SIGNALER TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT.

PPV

LOT

PER

28,80

## CAUTIONS PARTICULIERES

du Lactose monohydrate, ce  
tolérance au fructose, de  
la galactose ou de déicit en

À DEMANDER L'AVIS DE  
ACIEN.

une intolérance au fructose.  
À DEMANDER L'AVIS DE  
ACIEN.

its ;  
oissons ;  
phytothérapie ou thérapie

### AUTRE TRAITEMENT EN COURS

DEFRACCTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS SYSTEMATIQUEMENT TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE

### 10. UTILISATIONS EN CAS

Par mesure de précaution, médicamente pendant la grossesse et à éviter pendant l'allaitement.

D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT.

11. LES EFFETS POSSIBLES  
A CONDUIRE UN VEHICULE OU A UTILISER CERTAINES MACHINES

Sans objet.

12. SYMPTOMES ET CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSSAGE Sans objet.

13. CONDUITE A TENIR EN CAS D'OMISSION D'UNE OU PLUSIEURS DOSES Sans objet.

14. MENTION, SI NÉCESSAIRE, D'UN RISQUE DE SYNDROME DE SEVRAGE

- Conditions de prescription et de délivrance
- Précautions particulières de conservation
- Tenir hors de la portée des enfants
- Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte FAMM au Maroc
- Nom et adresse de l'EPI Titulaire de l'AMM au Maroc
- Nom et adresse du fabricant quant celui-ci n'est pas le titulaire de l'AMM au Maroc
- Sans objet

- Non et adresse de l'EPI Titulaire de l'AMM au Maroc  
SYNTHEMEDIC  
20-22, Rue Zoubeir Ibnou Ali Aouan  
Roches Noires  
20300 Casablanca  
Maroc

- la dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le : 03/2015

352125-06

# VITANEVRIL FORT 100 mg,

## 1. DENOMINATION DU MEDICAMENT

VITANEVRIL FORT 100 mg. Comprimé pelliculé, boîte de 30.  
(DCI) Benfotiamine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.  
Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la re lire.  
Si vous avez toutes autres questions, si vous avez un doute ou plus d'informations à poser au médecin ou à votre pharmacien.  
Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques.  
Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre pharmacien.

## 2. COMPOSITION DU MEDICAMENT

Composition qualitative et quantitative en substance (s) active (s) par unité de prise  
Benfotiamine ..... 100 mg

### Composition qualitative en excipients

Excipients : Amidon de riz ; Lactose monohydrate ; Stéarate de magnésium ; Saccharose ; Talc ; Hypromellose ; Dioxyde de titane ; gélule comprimée ; Macrogol 400 ; et l'eau pure.

Exipient à effet notable : Saccharose ; Lactose monohydrate.

### 3. CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE OU LE TYPE D'ACTIVITE

Antithiométi (A : appétit digestif et métabolisme).

### 4. INDICATIONS THERAPEUTIQUES

- traitement du bœuf-bœuf.
- prophylaxie des états de carence vitaminoïque dus à une diminution des apports alimentaires (par exemple : malabsorption, régimes restrictifs riches en protéines (ou suppléments, nutrition parentérale), en association avec les autres vitamines du groupe b.
- proposé chez l'alcoolique, notamment en cas de polynévrites.
- proposé dans d'autres polynévrites supposées d'origine toxicitaire.
- utilisée, à forte dose, dans certains syndromes douloureux.

### 5. POSOLOGIE

- Mode et voies d'administration :

voie orale.

- Durée du traitement : se conformer à l'ordonnance de votre médecin.

- Fréquence d'administration : 2 à 4 comprimés par jour, à avaler sans croquer.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

### 6. CONTRE-INDICATIONS

ATTENTION ! DANS QUELQUIS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

DANS QUELQUIS CAS NE DOIT PAS ETRE UTILISE DANS LES CAS suivants :

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE à la vitamine B1.

- Intolérance connue à la vitamine B1.

- Ne pas administrer aux enfants de moins de 8 ans.

EN CAS DE DOUBTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### 7. EFFETS INDESIRABLES

Sans objet.  
N'HESitez PAS à DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET A SIGNALER TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT.

PPV

LOT

PER

28,80

## CAUTIONS PARTICULIERES

du Lactose monohydrate, ce  
tolérance au fructose, de  
la galactose ou de déicit en

À DEMANDER L'AVIS DE  
ACIEN.

une intolérance au fructose.  
À DEMANDER L'AVIS DE  
ACIEN.

its ;  
oissons ;  
phytothérapie ou thérapie

### AUTRE TRAITEMENT EN CAS

FRACTIONS ENTRE PLUSIEURS  
ALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT  
URS VOTRE MEDECIN OU VOTRE  
PHARMACIEN.

### 10. UTILISATIONS EN CAS

Par mesure de précaution,  
médicamente pendant la grossesse et à éviter pendant l'allaitement.

D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, il convient au cours de la  
GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER  
L'AVIS DE VOTRE MEDECIN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT  
D'UTILISER UN MEDICAMENT.

11. LES EFFETS POSSIBLES  
A CONDUIRE UN VEHICULE OU A UTILISER CERTAINES  
MACHINES

Sans objet.

12. SYMPTOMES ET CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSSAGE  
Sans objet.

13. CONDUITE A TENIR EN CAS D'OMISSION D'UNE OU PLUSIEURS  
DOSES  
Sans objet.

14. MENTION, SI NÉCESSAIRE, D'UN RISQUE DE SYNDROME DE  
SEVRAGE

- Conditions de prescription et de délivrance
- Précautions particulières de conservation
- Tenir hors de la portée des enfants
- Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte FAMM au Maroc
- Nom et adresse de l'EPI Titulaire de l'AMM au Maroc  
SYNTHEMEDIC  
20-22, Rue Zoubeir Ibnou Ali Aouan  
Roches Noires  
20300 Casablanca  
Maroc
- Sans objet

- Non et adresse de l'EPI Titulaire de l'AMM au Maroc

SYNTHEMEDIC  
20-22, Rue Zoubeir Ibnou Ali Aouan  
Roches Noires  
20300 Casablanca  
Maroc

- la dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le : 03/2015

## 6. مواطن الاستعمال:

- لا يجب استعمال هذا الدواء في الحالات التالية:
  - الأطفال أقل من 8 سنوات.
  - أشخاص دوسي الحساسية لبنتغوتريامين.

على العموم لا يجب استعمال هذا الدواء خلال الرضاعة باستثناء إذا ارتأى طبيبك غير ذلك في حالة المشك من الضروري استشارة طبيبك أو صيدليكم

## 7. الآثار الغير مرغوب فيها:

لا تترددوا في استشارة طبيبك أو صيدليكم والإشارة إلى أي آثر غير مرغوب فيه خاصة الآثار التي لا تتضمنها هذه النشرة.

## 8. احتياطات خاصة:

يسبب تواجد لكتوز و السكرور لا ينصح بأخذ هذا الدواء في حالة حساسية للفركتوز و تواجد الغالاكتوز بكثرة في الدم ناتج عن مرض خلقي أو أعراض عدم امتصاص الغالاكتوز والفالاكتوز أو نقص في لكتاز (أمراض أيضية نادرة). قائمة السواع الذي من الواجب معرفته لاستعمال بدون خطر عند بعض المرضى:  
اللاكتوز و السكرور

## . احتياطات الاستعمال:

في حالة الشك، لا تترددوا في استشارة طبيبك أو صيدليكم  
9. التفاعلات الدوائية:

لغير تفادي تفاعلات بين الأدوية يتعين إطلاع طبيبك أو صيدليكم على أي علاج آخر تأخذونه

## 10. العمل-الرضاعة:

ينصح بعدم أخذ فيتاتنفرين <sup>®</sup> قوي عند المرأة المرضعة و الحامل ، في حالة اكتشاف الحمل أثناء العلاج بفيتاتنفرين قوي أطلعوا طبيبك على العموم يتعين خلال الحمل أو الرضاعة استشارة طبيبك أو صيدليكم قبل استعمال أي دواء.

## 11. السائقون ومستعملو الآلات:

12. ما يجب القيام به في حالة الإفراط في الجرعة:

13. ما يجب القيام به في حالة نسيان أو الإفراط في الجرعة:

## 14. الحفظ:

لا تتجاوزوا التاريخ المبين على الغلاف الخارجي

لا يترك في متناول الأطفال

تاريخ المراجعة: مارس 2015

مخابر سانتكيمديك

20-22 زنقة الزبير بن العوام

الصخور السوداء، الدار البيضاء

PPV

LOT

PER

28,80

## 1. الشكل والـ

علبة تحتوى

الرجاء قراءة

احتفظ بهذه

إذا كانت لدى

الطبيب أو الصيدلاني

لقد وصف هذا

للآخرين فقط يزددهم

## 2. التركيب الفعلى

بنفوتيندين:

السواغ

قائمة السواغ الذي

عند بعض المرضي

3. الصنف الصيدلاني

يتسبى بنفوتيامين

الجهاز الهضمى و

4. المؤمن:

- علاج البرىء ببرىء

- الوابية من نقراض

الاستهلاك الغذائي

الحمى الغذائية الغئينة

بالاشتراك مع غيرها من الفيتامينات.

- ينصح به الأشخاص الذين يشتكون من التهاب الأعصاب

و يتعاطون للمشروبات الكحولية.

- ينصح به في حالة التهاب الأعصاب.

- يستخدم مترizzرات عالية في بعض متلازمات الألم.

## 5. المقدار/ طريقة الاستعمال:

المقدار:

2 إلى 4 أقراص خلال 24 ساعة.

في جميع الحالات يتعين التقيد بوصفة طبيبك

طريقة الاستعمال:

عن طريق الفم

مدة العلاج:

تقيدوا بوصفة طبيبك

Honart<sup>®</sup>  
FORTE

Honart®  
Curcumine  
de Bambou

LOT : CA232  
EXP : 07/25  
PPC : 146,90 DH

Honart®  
Curcumine  
de Bambou

LOT : CA232  
EXP : 07/25  
PPC : 146,90 DH

Honart®  
Curcumin  
et de Bambou FORTE

LOT : CA232  
EXP : 07/25  
PPC : 146.90 PL

Honart®  
Curcumine  
et de Bambou

LOT : CA232  
EXP : 07/25  
PPC : 146,90 DH

**COLTRAX® 4mg**Comprimés,  
Boîtes de 12**COLTRAX® 4ml/2ml**Ampoules,  
Boîtes de 6 ampoules de :**THIOCOLCHICOSIDE**

- Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice de prendre ce médicament.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un demandez plus d'informations à votre médecin ou à pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

**IDENTIFICATION DU MEDICAMENT****Composition qualitative et quantitative.**

Comprimés	p cp
THIOCOLCHICOSIDE (DCI)	4 mg
Excipients .....Q.S.P.....	1 Comprimé

**EXCIPIENTS A EFFET NOTOIRE**

Lactose et saccharose (pour la forme comprimé)

Solution injectable IM	p ampoule
THIOCOLCHICOSIDE (DCI)	4 mg
Excipients .....Q.S.P.....	2 ml

**EXCIPIENTS A EFFET NOTOIRE**

Sodium (IM)

**Classe pharmacothérapeutique**

Classe pharmacothérapeutique : MYORELAXANT.

**DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?**

Traitement d'appoint des contractures musculaires douloureuses en pathologie rachidienne aiguë chez les adultes et les adolescents à partir de 16 ans.

**COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?****POSOLOGIE :****Comprimés :**

La dose recommandée et maximale est de 8 mg toutes les 12 heures (soit 16 mg par jour). La durée du traitement est limitée à 7 jours consécutifs.

**Solution injectable IM :**

La dose recommandée et maximale est de 4 mg toutes les 12 heures (soit 8 mg par jour). La durée du traitement est limitée à 5 jours consécutifs.

Ne dépasser pas la dose recommandée ni la durée du traitement. Ce médicament ne doit pas être utilisé pour un traitement à long terme.

**Utilisation chez les enfants et les adolescents**

N'administrez pas ce médicament à des enfants ou des adolescents âgés de moins de 16 ans pour des raisons de sécurité.

**MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION :**

COLTRAX® Comprimés : Voie orale.

COLTRAX® Ampoules : Voie intramusculaire.

**DUREE DE TRAITEMENT :**

NE DEPASSEZ PAS LA POSOLOGIE NI LA DUREE DE TRAITEMENT PRESCRITES PAR VOTRE MEDECIN.

NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

tolérance à prendre ce

45,70

ooolchicosite,  
ants contenus  
ntre ou pensez  
bir des enfantssi vous suivez un  
ion liée à la voie  
intramusculaire) pour la voie

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

**EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS**

COMME TOUS LES MEDICAMENTS, COLTRAX EST SUSCEPTIBLE D'AVOIR DES EFFETS INDESIRABLES, MAIS ILS NE SURVIENNENT PAS SYSTEMATIQUEMENT CHEZ TOUT LE MONDE.

**Les effets indésirables suivants surviennent fréquemment :**

- Des troubles digestifs tels que diarrhée et douleurs à l'estomac. Si ces effets surviennent, vous devez prévenir votre médecin.
- De la somnolence.

**Les effets indésirables suivants surviennent peu fréquemment :**

- Des troubles digestifs tels que nausées et vomissements. Si ces effets surviennent, vous devez prévenir votre médecin.
- Des réactions sur la peau telles que des démangeaisons, des rougeurs, des boutons, des vésicules ou des bulles sur la peau.

**Les effets indésirables suivants surviennent rarement :**

- Ce médicament peut provoquer une réaction allergique telle que de l'urticaire.
- Une excitation ou une obnubilation passagère pour la forme ampoules.

**Les effets indésirables suivants sont de fréquence indéterminée :**

- Ce médicament peut provoquer une réaction allergique telle qu'un œdème de Quincke (brusque gonflement du cou et du visage pouvant entraîner une difficulté à respirer). Il peut provoquer également un choc anaphylactique (réaction allergique grave mettant le patient en danger avec malaise brutal et baisse importante de la tension artérielle, pouvant être précédée d'une éruption de boutons, de démangeaisons, de rougeurs sur la peau, d'une difficulté à respirer, d'un gonflement du visage et/ou du cou).

- Des convulsions ou des récidives de crises chez les patients épileptiques.

- Une atteinte du foie (hépatites)
- Un malaise de type vagal rapporté quasi exclusivement dans les minutes suivant une administration IM pour la forme ampoules.

Si l'un de ces effets survient, arrêtez le médicament et contactez immédiatement votre médecin.