

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Matricule : Société :

Actif Pensionné(e) Autre :

Nom & Prénom : MAKHLOUKI MUSTAPHA

Date de naissance : 23-1-1953

Adresse : 31 Rue Fathia Ben Hocine Selvester

CASABLANCA

Tél. : 06.26.87.55.60 Total des frais engagés : 964,62 Dhs

Cachet du médecin :



Date de consultation : 16/12/2022 Nom et prénom du malade : MAKHLOUKI Mustapha Age :

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : Diabète


En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASABLANCA Le : 16/12/2022

Signature de l'adhérent(e) :



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
16/07/2022	C	1	1500HT	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE AYAD 11, Rue Rahai Ben Mme BENMOUSSA 54 Tél: 05 22 21 85 44 Fax: 05 22 21 85 44 000760	16/12/22	814,60

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODP.

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
D	
00000000	00000000
35533411	11433553

The diagram shows a 12-rib thoracic cage with numbered vertebrae (1-12) and arrows indicating directionality. The vertical axis is labeled H (Head) at the top and B (Body) at the bottom. The horizontal axis is labeled D (Dorsum) on the left and G (Gaster) on the right. The numbered vertebrae are arranged in a curved pattern, with the first two vertebrae at the top, followed by a series of 10 vertebrae, and the last two vertebrae at the bottom. Arrows point from the numbers to the corresponding vertebrae.

[Création, remont, adjonction]

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur SANDAOUI Mostafa

Omnipraticien

Ancien Médecin à L'hôpital AL Hassani
Nador

356, Av. Chouhada (en Face Cinéma Saâda)
Hay Mohammadi - Casablanca
Tél : 05 22 60 20 20

الدكتور سنداوي مصطفى

الطب العام

طبيب سابق بمستشفى الحسني
الناظور

356, مح الشهداء (مقابل سينما السعادة)
الحي المحمدى - الدار البيضاء
الهاتف : 05 22 60 20 20

16 DEC 2022

AKHOUKI Mostaphé

78,00x3

21 Dammag 

98,00x6

21 Dammag

68,90x3

21 Dammag 


10,60x3

31 Phieux 

60,00x6

21 Dely 

814,18

170lg 

PHARMACIE
51, Rue Rihab Ben Ahmed
Dr. Mme BEN MOUSSA Oufaâ
Tél : 05 22 24 80 54
Fax : 05 22 24 85 44

NPE : 09200781

Dr. SANDAOUI Mostafa
356, Av. Chouhada
Hay Mohammadi - Casablanca
Tél : 05 22 60 20 20

FLUDEX® LP

INDAPAMIDE 1,5 MG

30 comprimés pelliculés à Libération Prolongée

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique «Quels sont les effets indésirables éventuels ?».

Quel contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée ?
3. Comment prendre FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. QU'EST-CE QUE FLUDEX 1,5 MG COMPRIMÉ PELLICULÉ À LIBÉRATION PROLONGÉE, ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : antihypertenseur diurétique - code ATC : C03BA11 (C : Système cardiovasculaire)

FLUDEX 1,5 mg est un comprimé pelliculé à libération prolongée et contient de l'indapamide comme principe actif.

Ce médicament est indiqué pour réduire la pression artérielle élevée (hypertension) chez l'adulte.

L'indapamide est un diurétique. La plupart des diurétiques augmentent la quantité d'urine produite par les reins. Toutefois, l'indapamide est différent des autres diurétiques car il n'entraîne qu'une légère augmentation de la quantité d'urine produite.

De plus, l'indapamide dilate les vaisseaux sanguins, ce qui permet au sang de circuler plus facilement. Cela contribue à diminuer la tension artérielle.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE FLUDEX 1,5 MG COMPRIMÉ PELLICULÉ À LIBÉRATION PROLONGÉE ?

Ne prenez jamais FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée :

- si vous êtes allergique (hypersensible) à l'indapamide ou à tout autre sulfamide ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous avez une maladie grave du rein,
- si vous avez une maladie grave du foie ou si vous souffrez d'une encéphalopathie hépatique (maladie dégénérative du cerveau),
- si vous avez un taux bas de potassium dans le sang.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre FLUDEX 1,5 mg comprimé pelliculé à libération prolongée :

- si vous avez une maladie du foie,
- si vous êtes diabétique,
- si vous souffrez de goutte,
- si vous avez des troubles du rythme cardiaque ou des problèmes rénaux,
- si vous ressentez une diminution de la vision ou des douleurs oculaires. Il peut s'agir de symptômes d'accumulation de fluide dans la couche vasculaire de l'œil (épanchement choroidien), ou d'une augmentation de la pression dans l'œil, et peuvent survenir dans les heures ou les semaines suivant la prise de FLUDEX 1,5 mg. Cela peut entraîner une perte de la vision, si elle n'est pas traitée. Si vous avez déjà une allergie à la pénicilline ou aux sulfamides, vous pouvez être plus à risque de développer cela,
- si vous avez des troubles musculaires, notamment des douleurs, une sensibilité, une faiblesse ou des crampes,
- si vous devez faire un examen de votre glande parathyroïde.

Vous devez informer votre médecin si vous avez eu des réactions de photosensibilité.

Votre médecin peut être amené à vous prescrire des examens biologiques afin de surveiller des taux faibles de sodium ou de potassium ou des taux élevés de calcium dans le sang.

Si vous pensez être concernés par ces situations ou si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Sportifs, attention, cette spécialité contient un principe actif pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopage.

Enfants et adolescents

Sans objet

Autres médicaments et FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée
Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourrez prendre tout autre médicament.

Evitez de prendre FLUDEX 1,5 mg avec du lithium (utilisé pour traiter la dépression), en raison du risque d'augmentation des taux de lithium dans le sang.

Si vous prenez l'un des médicaments suivants, parlez-en à votre médecin, certaines précautions d'emploi particulières peuvent être nécessaires :

- médicaments utilisés pour des troubles du rythme cardiaque (ex : quinidine, hydroquinidine, disopyramide, amiocarone, sotalol, ibutilide, dofetilide, digitaline, bretylium),
- médicaments utilisés pour traiter des troubles mentaux tels que dépression, anxiété, schizophrénie... (ex : antidépresseurs tricycliques, antipsychotiques, neuroleptiques (tels que amisulpride, sulpiride, sultopride, tiapride, halopéridol, droperidol)),
- bêpêridol (utilisé pour traiter l'angine de poitrine, maladie provoquant des douleurs dans la poitrine),
- cispapride, dipéphémanil (utilisés pour traiter les troubles gastro-intestinaux),
- antibiotiques utilisés pour traiter des infections bactériennes (ex : sparfloxacine, moxifloxacine, érythromycine par injection,
- vincamine par injection (utilisé pour traiter des troubles cognitifs symptomatiques chez les patients âgés, y compris la perte de mémoire),
- halofantrine (antiparasitaire utilisé pour traiter certains types de paludisme),
- pentamidine (utilisée pour traiter certains types de pneumonie),
- antihistaminiques utilisés pour traiter les réactions allergiques, telles que le rhume des foins (ex : mizolastine, astérmazole, terfenadine),
- anti-inflammatoires non stéroïdiens pour soulager la douleur (ex : ibuprofène) ou fortes doses d'acide acétylsalicylique,
- inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC) (utilisés pour traiter l'hypertension artérielle et l'insuffisance cardiaque),
- amphotéricine B par injection (médicaments anti-fongiques),
- corticostéroïdes oraux utilisés pour traiter divers troubles : asthme sévère et arthrite rhumatoïde,
- laxatifs stimulants,
- baclofène (pour traiter la raideur musculaire survenant lors de maladie comme la sclérose en plaque),
- allopurinol (pour le traitement de la goutte),
- diurétiques épargneurs de potassium (ex : amiloride, spironolactone, triamtétrène),
- metformine (pour traiter le diabète),
- produits de contrastes iodés (utilisés pour les examens aux rayons X),
- comprimés de calcium ou autres suppléments calciques,
- ciclosporine, tacrolimus ou autres immunosupresseurs utilisés suite à une transplantation d'organe, pour le traitement de maladies auto-immunes ou de maladies rhumatismales ou dermatologiques graves,
- tétracosactide (pour traiter la maladie de Crohn),
- méthadone (utilisé pour traiter la toxicomanie).

FLUDEX 1,5 mg comprimé pelliculé à libération prolongée avec des aliments et boissons

Sans objet

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que

une grossesse, demandez à votre

pharmacien ou à votre médecin

de prendre ce médicament.

L'utilisation de ce médicament

pendant la grossesse est planifiée

comme possible.

Prévenez votre médecin.

(50 X 20 X 114) mm

68,90

FLUDEX® LP

INDAPAMIDE 1,5 MG

30 comprimés pelliculés à Libération Prolongée

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique «Quels sont les effets indésirables éventuels ?».

Quel contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée ?
3. Comment prendre FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. QU'EST-CE QUE FLUDEX 1,5 MG COMPRIMÉ PELLICULÉ À LIBÉRATION PROLONGÉE, ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : antihypertenseur diurétique - code ATC : C03BA11 (C : Système cardiovasculaire)

FLUDEX 1,5 mg est un comprimé pelliculé à libération prolongée et contient de l'indapamide comme principe actif.

Ce médicament est indiqué pour réduire la pression artérielle élevée (hypertension) chez l'adulte.

L'indapamide est un diurétique. La plupart des diurétiques augmentent la quantité d'urine produite par les reins. Toutefois, l'indapamide est différent des autres diurétiques car il n'entraîne qu'une légère augmentation de la quantité d'urine produite.

De plus, l'indapamide dilate les vaisseaux sanguins, ce qui permet au sang de circuler plus facilement. Cela contribue à diminuer la tension artérielle.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE FLUDEX 1,5 MG COMPRIMÉ PELLICULÉ À LIBÉRATION PROLONGÉE ?

Ne prenez jamais FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée :

- si vous êtes allergique (hypersensible) à l'indapamide ou à tout autre sulfamide ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous avez une maladie grave du rein,
- si vous avez une maladie grave du foie ou si vous souffrez d'une encéphalopathie hépatique (maladie dégénérative du cerveau),
- si vous avez un taux bas de potassium dans le sang.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre FLUDEX 1,5 mg comprimé pelliculé à libération prolongée :

- si vous avez une maladie du foie,
- si vous êtes diabétique,
- si vous souffrez de goutte,
- si vous avez des troubles du rythme cardiaque ou des problèmes rénaux,
- si vous ressentez une diminution de la vision ou des douleurs oculaires. Il peut s'agir de symptômes d'accumulation de fluide dans la couche vasculaire de l'œil (épanchement choroidien), ou d'une augmentation de la pression dans l'œil, et peuvent survenir dans les heures ou les semaines suivant la prise de FLUDEX 1,5 mg. Cela peut entraîner une perte de la vision, si elle n'est pas traitée. Si vous avez déjà une allergie à la pénicilline ou aux sulfamides, vous pouvez être plus à risque de développer cela,
- si vous avez des troubles musculaires, notamment des douleurs, une sensibilité, une faiblesse ou des crampes,
- si vous devez faire un examen de votre glande parathyroïde.

Vous devez informer votre médecin si vous avez eu des réactions de photosensibilité.

Votre médecin peut être amené à vous prescrire des examens biologiques afin de surveiller des taux faibles de sodium ou de potassium ou des taux élevés de calcium dans le sang.

Si vous pensez être concernés par ces situations ou si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Sportifs, attention, cette spécialité contient un principe actif pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopage.

Enfants et adolescents

Sans objet

Autres médicaments et FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée
Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourrez prendre tout autre médicament.

Evitez de prendre FLUDEX 1,5 mg avec du lithium (utilisé pour traiter la dépression), en raison du risque d'augmentation des taux de lithium dans le sang.

Si vous prenez l'un des médicaments suivants, parlez-en à votre médecin, certaines précautions d'emploi particulières peuvent être nécessaires :

- médicaments utilisés pour des troubles du rythme cardiaque (ex : quinidine, hydroquinidine, disopyramide, amiocarone, sotalol, ibutilide, dofetilide, digitaline, bretylium),
- médicaments utilisés pour traiter des troubles mentaux tels que dépression, anxiété, schizophrénie... (ex : antidépresseurs tricycliques, antipsychotiques, neuroleptiques (tels que amisulpride, sulpiride, sultopride, tiapride, halopéridol, droperidol)),
- bêpêridol (utilisé pour traiter l'angine de poitrine, maladie provoquant des douleurs dans la poitrine),
- cispapride, dipéphémanil (utilisés pour traiter les troubles gastro-intestinaux),
- antibiotiques utilisés pour traiter des infections bactériennes (ex : sparfloxacine, moxifloxacine, érythromycine par injection,
- vincamine par injection (utilisé pour traiter des troubles cognitifs symptomatiques chez les patients âgés, y compris la perte de mémoire),
- halofantrine (antiparasitaire utilisé pour traiter certains types de paludisme),
- pentamidine (utilisée pour traiter certains types de pneumonie),
- antihistaminiques utilisés pour traiter les réactions allergiques, telles que le rhume des foins (ex : mizolastine, astérimazole, terfenadine),
- anti-inflammatoires non stéroïdiens pour soulager la douleur (ex : ibuprofène) ou fortes doses d'acide acétylsalicylique,
- inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC) (utilisés pour traiter l'hypertension artérielle et l'insuffisance cardiaque),
- amphotéricine B par injection (médicaments anti-fongiques),
- corticostéroïdes oraux utilisés pour traiter divers troubles : asthme sévère et arthrite rhumatoïde,
- laxatifs stimulants,
- baclofène (pour traiter la raideur musculaire survenant lors de maladie comme la sclérose en plaque),
- allopurinol (pour le traitement de la goutte),
- diurétiques épargneurs de potassium (ex : amiloride, spironolactone, triamtétrène),
- metformine (pour traiter le diabète),
- produits de contrastes iodés (utilisés pour les examens aux rayons X),
- comprimés de calcium ou autres suppléments calciques,
- ciclosporine, tacrolimus ou autres immunosupresseurs utilisés suite à une transplantation d'organe, pour le traitement de maladies auto-immunes ou de maladies rhumatismales ou dermatologiques graves,
- tétracosactide (pour traiter la maladie de Crohn),
- méthadone (utilisé pour traiter la toxicomanie).

FLUDEX 1,5 mg comprimé pelliculé à libération prolongée avec des aliments et boissons

Sans objet

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que

une grossesse, demandez à votre

pharmacien ou à votre médecin de

prendre ce médicament.

L'utilisation de ce médicament

pendant la grossesse est planifiée

comme possible.

Prévenez votre médecin.

(50 X 20 X 114) mm

68,90

FLUDEX® LP

INDAPAMIDE 1,5 MG

30 comprimés pelliculés à Libération Prolongée

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique «Quels sont les effets indésirables éventuels ?».

Quel contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée ?
3. Comment prendre FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. QU'EST-CE QUE FLUDEX 1,5 MG COMPRIMÉ PELLICULÉ À LIBÉRATION PROLONGÉE, ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : antihypertenseur diurétique - code ATC : C03BA11 (C : Système cardiovasculaire)

FLUDEX 1,5 mg est un comprimé pelliculé à libération prolongée et contient de l'indapamide comme principe actif.

Ce médicament est indiqué pour réduire la pression artérielle élevée (hypertension) chez l'adulte.

L'indapamide est un diurétique. La plupart des diurétiques augmentent la quantité d'urine produite par les reins. Toutefois, l'indapamide est différent des autres diurétiques car il n'entraîne qu'une légère augmentation de la quantité d'urine produite.

De plus, l'indapamide dilate les vaisseaux sanguins, ce qui permet au sang de circuler plus facilement. Cela contribue à diminuer la tension artérielle.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE FLUDEX 1,5 MG COMPRIMÉ PELLICULÉ À LIBÉRATION PROLONGÉE ?

Ne prenez jamais FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée :

- si vous êtes allergique (hypersensible) à l'indapamide ou à tout autre sulfamide ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous avez une maladie grave du rein,
- si vous avez une maladie grave du foie ou si vous souffrez d'une encéphalopathie hépatique (maladie dégénérative du cerveau),
- si vous avez un taux bas de potassium dans le sang.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre FLUDEX 1,5 mg comprimé pelliculé à libération prolongée :

- si vous avez une maladie du foie,
- si vous êtes diabétique,
- si vous souffrez de goutte,
- si vous avez des troubles du rythme cardiaque ou des problèmes rénaux,
- si vous ressentez une diminution de la vision ou des douleurs oculaires. Il peut s'agir de symptômes d'accumulation de fluide dans la couche vasculaire de l'œil (épanchement choroidien), ou d'une augmentation de la pression dans l'œil, et peuvent survenir dans les heures ou les semaines suivant la prise de FLUDEX 1,5 mg. Cela peut entraîner une perte de la vision, si elle n'est pas traitée. Si vous avez déjà une allergie à la pénicilline ou aux sulfamides, vous pouvez être plus à risque de développer cela,
- si vous avez des troubles musculaires, notamment des douleurs, une sensibilité, une faiblesse ou des crampes,
- si vous devez faire un examen de votre glande parathyroïde.

Vous devez informer votre médecin si vous avez eu des réactions de photosensibilité.

Votre médecin peut être amené à vous prescrire des examens biologiques afin de surveiller des taux faibles de sodium ou de potassium ou des taux élevés de calcium dans le sang.

Si vous pensez être concernés par ces situations ou si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Sportifs, attention, cette spécialité contient un principe actif pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopage.

Enfants et adolescents

Sans objet

Autres médicaments et FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée
Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourrez prendre tout autre médicament.

Evitez de prendre FLUDEX 1,5 mg avec du lithium (utilisé pour traiter la dépression), en raison du risque d'augmentation des taux de lithium dans le sang.

Si vous prenez l'un des médicaments suivants, parlez-en à votre médecin, certaines précautions d'emploi particulières peuvent être nécessaires :

- médicaments utilisés pour des troubles du rythme cardiaque (ex : quinidine, hydroquinidine, disopyramide, amiocarone, sotalol, ibutilide, dofetilide, digitaline, bretylium),
- médicaments utilisés pour traiter des troubles mentaux tels que dépression, anxiété, schizophrénie... (ex : antidépresseurs tricycliques, antipsychotiques, neuroleptiques (tels que amisulpride, sulpiride, sultopride, tiapride, halopéridol, droperidol)),
- bêpêridol (utilisé pour traiter l'angine de poitrine, maladie provoquant des douleurs dans la poitrine),
- cispapride, dipéphémanil (utilisés pour traiter les troubles gastro-intestinaux),
- antibiotiques utilisés pour traiter des infections bactériennes (ex : sparfloxacine, moxifloxacine, érythromycine par injection,
- vincamine par injection (utilisé pour traiter des troubles cognitifs symptomatiques chez les patients âgés, y compris la perte de mémoire),
- halofantrine (antiparasitaire utilisé pour traiter certains types de paludisme),
- pentamidine (utilisée pour traiter certains types de pneumonie),
- antihistaminiques utilisés pour traiter les réactions allergiques, telles que le rhume des foins (ex : mizolastine, astérmazole, terfenadine),
- anti-inflammatoires non stéroïdiens pour soulager la douleur (ex : ibuprofène) ou fortes doses d'acide acétylsalicylique,
- inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC) (utilisés pour traiter l'hypertension artérielle et l'insuffisance cardiaque),
- amphotéricine B par injection (médicaments anti-fongiques),
- corticostéroïdes oraux utilisés pour traiter divers troubles : asthme sévère et arthrite rhumatoïde,
- laxatifs stimulants,
- baclofène (pour traiter la raideur musculaire survenant lors de maladie comme la sclérose en plaque),
- allopurinol (pour le traitement de la goutte),
- diurétiques épargneurs de potassium (ex : amiloride, spironolactone, triamtétrène),
- metformine (pour traiter le diabète),
- produits de contrastes iodés (utilisés pour les examens aux rayons X),
- comprimés de calcium ou autres suppléments calciques,
- ciclosporine, tacrolimus ou autres immunosupresseurs utilisés suite à une transplantation d'organe, pour le traitement de maladies auto-immunes ou de maladies rhumatismales ou dermatologiques graves,
- tétracosactide (pour traiter la maladie de Crohn),
- méthadone (utilisé pour traiter la toxicomanie).

FLUDEX 1,5 mg comprimé pelliculé à libération prolongée avec des aliments et boissons

Sans objet

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que

une grossesse, demandez

à prendre ce médicament.

L'utilisation de ce médicament

pendant la grossesse est planifiée

comme possible.

Prévenez votre médecin.

(50 X 20 X 114) mm

68,90

GLUCOPHAGE 500 mg, comprimé pelliculé

GLUCOPHAGE 850 mg, comprimé pelliculé

GLUCOPHAGE 1000 mg, comprimé pelliculé

Chlorhydrate de metformine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la ressortir.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'information à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Qu'a-t-il dans cette notice ?

1. Qu'est-ce que GLUCOPHAGE, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre GLUCOPHAGE, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre GLUCOPHAGE, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver GLUCOPHAGE, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE GLUCOPHAGE, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : code ATC : A10AA02.

Indications thérapeutiques :

Glucophage contient de la metformine. C'est un médicament utilisé pour traiter le diabète. Il appartient à la classe de médicaments appelés les biguanides.

L'insuline est une hormone produite par le pancréas et permettant à votre corps de récupérer le glucose (sucre) qui est dans le sang. Votre corps utilise le glucose pour produire de l'énergie ou le stocke pour l'utiliser plus tard.

Lorsque vous avez du diabète, votre pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline ou votre corps n'est pas capable d'utiliser correctement l'insuline qu'il produit. Ceci aboutit à un taux de glucose élevé dans votre sang. Glucophage aide à faire baisser votre taux de glucose sanguin jusqu'à un niveau aussi normal que possible.

Si vous êtes un adulte en surpoids, la prise de Glucophage à long terme permet également d'aider à limiter les risques de complications associées au diabète. Glucophage est associé à une stabilité pondérale ou une moindre perte de poids.

Glucophage est utilisé pour traiter le diabète de type 2 (aussi appelé « diabète non insulino-dépendant ») lorsque le régime alimentaire et l'exercice physique seuls n'ont pas suffi à contrôler le taux de glucose sanguin. Il est particulièrement utilisé chez les patients en surpoids. Les patients adultes pourront prendre Glucophage seul ou avec d'autres médicaments contre le diabète (des médicaments à avancer ou de l'insuline).

Les enfants de 10 ans et plus et les adolescents pourront prendre Glucophage seul ou avec l'insuline.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE GLUCOPHAGE, comprimé pelliculé ?

Contre indications :

Ne prenez jamais GLUCOPHAGE, comprimé pelliculé :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la metformine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous avez des problèmes hépatiques.
- Si vous souffrez d'une détérioration sévère de la fonction rénale.
- Si vous avez un diabète non contrôlé avec, par exemple, une hyperglycémie sévère (taux élevé de glucose dans le sang), des nausées, des vomissements, une diarrhée, une perte de poids rapide, une acidose lactique (voir « Risque d'acidose lactique » ci-dessous) ou une acidocétose. En cas d'acidocétose, les substances appelées « corps cétoniques » s'accumulent dans le sang ce qui peut conduire à un pré-coma diabétique. Les symptômes comprennent des douleurs à l'estomac, une respiration rapide et profonde, une somnolence ou si votre haleine présente une odeur fruitée inhabituelle.
- Si vous avez perdu trop d'eau (déshydratation), par exemple suite à une diarrhée persistante ou sévère, ou si vous avez vomi plusieurs fois d'affilée. La déshydratation peut entraîner des problèmes de reins qui peuvent vous mettre en danger d'acidose lactique (voir « Avertissements et précautions »).
- Si vous avez une infection grave, par exemple une infection des poumons ou des bronches, ou une infection des reins. Des infections sévères peuvent entraîner des problèmes de reins qui peuvent vous mettre en danger d'acidose lactique (voir « Avertissements et précautions »).
- Si vous prenez un traitement contre l'insuffisance cardiaque aiguë ou si vous avez récemment eu une crise cardiaque, si vous souffrez de graves problèmes de circulation sanguine (tel un choc) ou vous avez des difficultés respiratoires. Ceci peut entraîner un manque d'apport en oxygène des tissus, qui peut vous mettre en danger d'acidose lactique (voir « Avertissements et précautions »).
- Si vous consommez beaucoup d'alcool.

Si l'un des cas ci-dessus s'applique à vous, parlez-en à votre médecin avant de commencer à prendre ce médicament.

Veuillez à demander conseil à votre médecin si :

- Vous devez passer un examen radiographique ou un scanner qui pourrait nécessiter l'injection d'un produit de contraste à base d'iode dans votre circulation sanguine
- Vous devez subir une intervention chirurgicale majeure

Vous devez arrêter de prendre Glucophage un certain temps avant et après de tels examens.

interventions chirurgicales. Votre médecin décidera si vous avez besoin ou non d'un traitement de remplacement pendant cette période. Il est important que vous suivez précisément les instructions de votre médecin.

Mises en garde spéciales et précautions d'emploi :

Avertissements et précautions

Risque d'acidose lactique

Glucophage peut provoquer un effet indésirable rare, mais très grave, appelé « acidose lactique », en particulier si vos reins ne fonctionnent pas correctement. Le risque de développer une acidose lactique augmente également en cas de diabète mal contrôlé, d'infections graves, de jeûne prolongé ou de consommation d'alcool, de déshydratation (voir informations complémentaires ci-dessous), de problèmes au foie et toutes autres affections médicales pour lesquelles une partie du corps reçoit un apport réduit en oxygène (les maladies cardiaques aiguës sévères, par exemple).

Si l'une de ces situations s'applique à vous, adressez-vous à votre médecin pour recevoir des instructions supplémentaires.

Arrêtez de prendre Glucophage pendant une courte période si vous souffrez d'une affection susceptible d'être associée à une déshydratation (petre importante de liquides corporels) tels que les vomissements sévères, de la diarrhée, de la fièvre, une exposition à la chaleur ou si vous buvez moins de liquides que d'habitude. Adressez-vous à votre médecin pour obtenir des instructions supplémentaires.

Arrêtez de prendre Glucophage et contactez immédiatement un médecin ou l'hôpital le plus proche si vous présentez les symptômes d'une acidose lactique, car cette affection peut entraîner un coma.

Les symptômes de l'acidose lactique comprennent :

- vomissements
- maux d'estomac (douleurs abdominales)
- crampes musculaires
- sensation générale de malaise associée à une grande fatigue
- difficultés à respirer
- diminution de la température corporelle et du rythme cardiaque

L'acidose lactique est une urgence médicale qui doit être traitée à l'hôpital. Si vous devez subir une opération chirurgicale importante, arrêtez de prendre Glucophage au moment de l'opération et pendant un certain temps après l'intervention. Votre médecin décidera du moment où vous devrez arrêter et reprendre votre traitement par Glucophage.

Glucophage à lui seul ne provoque pas d'hypoglycémie (taux de sucre dans le sang trop faible). Cependant, si vous prenez Glucophage en même temps que d'autres médicaments pour traiter le diabète qui peuvent engendrer une hypoglycémie (comme les sulfamides hypoglycémiants, l'insuline, les méglitinides), il y a un risque d'hypoglycémie. Si vous ressentez des symptômes d'hypoglycémie, tels que des faiblesses, des vertiges, une augmentation de la transpiration, des battements de cœur rapides, des troubles de la vision ou des difficultés à vous concentrer, boire ou manger quelque chose contenant du sucre devrait vous aider à vous sentir mieux.

Pendant votre traitement par Glucophage, votre médecin contrôlera votre fonction rénale au moins une fois par an ou plus fréquemment si vous êtes âgé(e) et/ou si votre fonction rénale s'est détériorée.

Enfants : Sans objet.

Liste des excipients à effet notable : Sans objet.

Interactions :

Autres médicaments et GLUCOPHAGE, comprimé pelliculé :

Si vous devez recevoir une injection d'un produit de contraste contenant de l'iode, par exemple, pour une radiographie ou un scanner, vous devrez arrêter de prendre Glucophage avant ou au moment de l'injection. Votre médecin décidera du moment où vous devrez arrêter et reprendre la prise de votre traitement par Glucophage.

Informez votre médecin si vous prenez, avec récurrence pris ou pourrez prendre tout autre médicament. Vous devrez peut-être passer plus fréquemment des tests de la glycémie ou de la fonction rénale ou votre médecin devra peut-être ajuster la posologie de Glucophage. Il est particulièrement important de signaler les médicaments suivants :

- Les médicaments qui augmentent la production d'urine (diurétiques).
- Des médicaments utilisés pour traiter la douleur et l'inflammation (AINS ou inhibiteurs de la COX-2, tels que l'ibuprofène et le céclocoxib).
- Certains médicaments utilisés pour traiter l'hypertension artérielle (inhibiteurs de l'ECA et antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II).
- Agonistes des récepteurs bêta-2-adrénergiques comme le salbutamol ou la terbutaline (utilisés pour traiter l'asthme).
- Corticostéroïdes (utilisés pour traiter diverses affections, notamment des inflammations sévères de la peau ou l'asthme).
- Les médicaments qui peuvent modifier la quantité de Glucophage dans le sang, en particulier si les antagomistes des récepteurs de l'angiotensine II.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin

GLUCOPHAGE 500 mg, comprimé pelliculé

GLUCOPHAGE 850 mg, comprimé pelliculé

GLUCOPHAGE 1000 mg, comprimé pelliculé

Chlorhydrate de metformine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la ressortir.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'information à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Qu'a-t-il dans cette notice ?

1. Qu'est-ce que GLUCOPHAGE, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre GLUCOPHAGE, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre GLUCOPHAGE, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver GLUCOPHAGE, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE GLUCOPHAGE, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : code ATC : A10AA02.

Indications thérapeutiques :

Glucophage contient de la metformine. C'est un médicament utilisé pour traiter le diabète. Il appartient à la classe de médicaments appelés les biguanides.

L'insuline est une hormone produite par le pancréas et permettant à votre corps de récupérer le glucose (sucre) qui est dans le sang. Votre corps utilise le glucose pour produire de l'énergie ou le stocke pour l'utiliser plus tard.

Lorsque vous avez du diabète, votre pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline ou votre corps n'est pas capable d'utiliser correctement l'insuline qu'il produit. Ceci aboutit à un taux de glucose élevé dans votre sang. Glucophage aide à faire baisser votre taux de glucose sanguin jusqu'à un niveau aussi normal que possible.

Si vous êtes un adulte en surpoids, la prise de Glucophage à long terme permet également d'aider à limiter les risques de complications associées au diabète. Glucophage est associé à une stabilité pondérale ou une moindre perte de poids.

Glucophage est utilisé pour traiter le diabète de type 2 (aussi appelé « diabète non insulino-dépendant ») lorsque le régime alimentaire et l'exercice physique seuls n'ont pas suffi à contrôler le taux de glucose sanguin. Il est particulièrement utilisé chez les patients en surpoids. Les patients adultes pourront prendre Glucophage seul ou avec d'autres médicaments contre le diabète (des médicaments à avancer ou de l'insuline).

Les enfants de 10 ans et plus et les adolescents pourront prendre Glucophage seul ou avec l'insuline.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE GLUCOPHAGE, comprimé pelliculé ?

Contre indications :

Ne prenez jamais GLUCOPHAGE, comprimé pelliculé :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la metformine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous avez des problèmes hépatiques.
- Si vous souffrez d'une détérioration sévère de la fonction rénale.
- Si vous avez un diabète non contrôlé avec, par exemple, une hyperglycémie sévère (taux élevé de glucose dans le sang), des nausées, des vomissements, une diarrhée, une perte de poids rapide, une acidose lactique (voir « Risque d'acidose lactique » ci-dessous) ou une acidocétose. En cas d'acidocétose, les substances appelées « corps cétoniques » s'accumulent dans le sang ce qui peut conduire à un pré-coma diabétique. Les symptômes comprennent des douleurs à l'estomac, une respiration rapide et profonde, une somnolence ou si votre haleine présente une odeur fruitée inhabituelle.
- Si vous avez perdu trop d'eau (déshydratation), par exemple suite à une diarrhée persistante ou sévère, ou si vous avez vomi plusieurs fois d'affilée. La déshydratation peut entraîner des problèmes de reins qui peuvent vous mettre en danger d'acidose lactique (voir « Avertissements et précautions »).
- Si vous avez une infection grave, par exemple une infection des poumons ou des bronches, ou une infection des reins. Des infections sévères peuvent entraîner des problèmes de reins qui peuvent vous mettre en danger d'acidose lactique (voir « Avertissements et précautions »).
- Si vous prenez un traitement contre l'insuffisance cardiaque aiguë ou si vous avez récemment eu une crise cardiaque, si vous souffrez de graves problèmes de circulation sanguine (tel un choc) ou vous avez des difficultés respiratoires. Ceci peut entraîner un manque d'apport en oxygène des tissus, qui peut vous mettre en danger d'acidose lactique (voir « Avertissements et précautions »).
- Si vous consommez beaucoup d'alcool.

Si l'un des cas ci-dessus s'applique à vous, parlez-en à votre médecin avant de commencer à prendre ce médicament.

Veuillez à demander conseil à votre médecin si :

- Vous devez passer un examen radiographique ou un scanner qui pourrait nécessiter l'injection d'un produit de contraste à base d'iode dans votre circulation sanguine
- Vous devez subir une intervention chirurgicale majeure

Vous devez arrêter de prendre Glucophage un certain temps avant et après de tels examens.

interventions chirurgicales. Votre médecin décidera si vous avez besoin ou non d'un traitement de remplacement pendant cette période. Il est important que vous suivez précisément les instructions de votre médecin.

Mises en garde spéciales et précautions d'emploi :

Avertissements et précautions

Risque d'acidose lactique :

Glucophage peut provoquer un effet indésirable rare, mais très grave, appelé « acidose lactique », en particulier si vos reins ne fonctionnent pas correctement. Le risque de développer une acidose lactique augmente également en cas de diabète mal contrôlé, d'infections graves, de jeûne prolongé ou de consommation d'alcool, de déshydratation (voir informations complémentaires ci-dessous), de problèmes au foie et toutes autres affections médicales pour lesquelles une partie du corps reçoit un apport réduit en oxygène (les maladies cardiaques aiguës sévères, par exemple).

Si l'une de ces situations s'applique à vous, adressez-vous à votre médecin pour recevoir des instructions supplémentaires.

Arrêtez de prendre Glucophage pendant une courte période si vous souffrez d'une affection susceptible d'être associée à une déshydratation (petre importante de liquides corporels) tels que les vomissements sévères, de la diarrhée, de la fièvre, une exposition à la chaleur ou si vous buvez moins de liquides que d'habitude. Adressez-vous à votre médecin pour obtenir des instructions supplémentaires.

Arrêtez de prendre Glucophage et contactez immédiatement un médecin ou l'hôpital le plus proche si vous présentez les symptômes d'une acidose lactique, car cette affection peut entraîner un coma.

Les symptômes de l'acidose lactique comprennent :

- vomissements
- maux d'estomac (douleurs abdominales)
- crampes musculaires
- sensation générale de malaise associée à une grande fatigue
- difficultés à respirer
- diminution de la température corporelle et du rythme cardiaque

L'acidose lactique est une urgence médicale qui doit être traitée à l'hôpital. Si vous devez subir une opération chirurgicale importante, arrêtez de prendre Glucophage au moment de l'opération et pendant un certain temps après l'intervention. Votre médecin décidera du moment où vous devrez arrêter et reprendre votre traitement par Glucophage.

Glucophage à lui seul ne provoque pas d'hypoglycémie (taux de sucre dans le sang trop faible). Cependant, si vous prenez Glucophage en même temps que d'autres médicaments pour traiter le diabète qui peuvent engendrer une hypoglycémie (comme les sulfamides hypoglycémiants, l'insuline, les méglitinides), il y a un risque d'hypoglycémie. Si vous ressentez des symptômes d'hypoglycémie, tels que des faiblesses, des vertiges, une augmentation de la transpiration, des battements de cœur rapides, des troubles de la vision ou des difficultés à vous concentrer, boire ou manger quelque chose contenant du sucre devrait vous aider à vous sentir mieux.

Pendant votre traitement par Glucophage, votre médecin contrôlera votre fonction rénale au moins une fois par an ou plus fréquemment si vous êtes âgé(e) et/ou si votre fonction rénale s'est détériorée.

Enfants : Sans objet.

Liste des excipients à effet notable : Sans objet.

Interactions :

Autres médicaments et GLUCOPHAGE, comprimé pelliculé :

Si vous devez recevoir une injection d'un produit de contraste contenant de l'iode, par exemple, pour une radiographie ou un scanner, vous devrez arrêter de prendre Glucophage avant ou au moment de l'injection. Votre médecin décidera du moment où vous devrez arrêter et reprendre la prise de votre traitement par Glucophage.

Informez votre médecin si vous prenez, avec récurrence pris ou pourrez prendre tout autre médicament. Vous devrez peut-être passer plus fréquemment des tests de la glycémie ou de la fonction rénale ou votre médecin devra peut-être ajuster la posologie de Glucophage. Il est particulièrement important de signaler les médicaments suivants :

- Les médicaments qui augmentent la production d'urine (diurétiques).
- Des médicaments utilisés pour traiter la douleur et l'inflammation (AINS ou inhibiteurs de la COX-2, tels que l'ibuprofène et le céclocoxib).
- Certains médicaments utilisés pour traiter l'hypertension artérielle (inhibiteurs de l'ECA et antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II).
- Agonistes des récepteurs bêta-2-adrénergiques comme le salbutamol ou la terbutaline (utilisés pour traiter l'asthme).
- Corticostéroïdes (utilisés pour traiter diverses affections, notamment des inflammations sévères de la peau ou l'asthme).
- Les médicaments qui peuvent modifier la quantité de Glucophage dans le sang, en particulier si les antagomistes des récepteurs de l'angiotensine II.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin

GLUCOPHAGE 500 mg, comprimé pelliculé

GLUCOPHAGE 850 mg, comprimé pelliculé

GLUCOPHAGE 1000 mg, comprimé pelliculé

Chlorhydrate de metformine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la ressortir.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'information à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Qu'a-t-il dans cette notice ?

1. Qu'est-ce que GLUCOPHAGE, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre GLUCOPHAGE, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre GLUCOPHAGE, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver GLUCOPHAGE, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE GLUCOPHAGE, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : code ATC : A10AA02.

Indications thérapeutiques :

Glucophage contient de la metformine. C'est un médicament utilisé pour traiter le diabète. Il appartient à la classe de médicaments appelés les biguanides.

L'insuline est une hormone produite par le pancréas et permettant à votre corps de récupérer le glucose (sucre) qui est dans le sang. Votre corps utilise le glucose pour produire de l'énergie ou le stocke pour l'utiliser plus tard.

Lorsque vous avez du diabète, votre pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline ou votre corps n'est pas capable d'utiliser correctement l'insuline qu'il produit. Ceci aboutit à un taux de glucose élevé dans votre sang. Glucophage aide à faire baisser votre taux de glucose sanguin jusqu'à un niveau aussi normal que possible.

Si vous êtes un adulte en surpoids, la prise de Glucophage à long terme permet également d'aider à limiter les risques de complications associées au diabète. Glucophage est associé à une stabilité pondérale ou une moindre perte de poids.

Glucophage est utilisé pour traiter le diabète de type 2 (aussi appelé « diabète non insulino-dépendant ») lorsque le régime alimentaire et l'exercice physique seuls n'ont pas suffi à contrôler le taux de glucose sanguin. Il est particulièrement utilisé chez les patients en surpoids. Les patients adultes pourront prendre Glucophage seul ou avec d'autres médicaments contre le diabète (des médicaments à avancer ou de l'insuline).

Les enfants de 10 ans et plus et les adolescents pourront prendre Glucophage seul ou avec l'insuline.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE GLUCOPHAGE, comprimé pelliculé ?

Contre indications :

Ne prenez jamais GLUCOPHAGE, comprimé pelliculé :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la metformine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous avez des problèmes hépatiques.
- Si vous souffrez d'une détérioration sévère de la fonction rénale.
- Si vous avez un diabète non contrôlé avec, par exemple, une hyperglycémie sévère (taux élevé de glucose dans le sang), des nausées, des vomissements, une diarrhée, une perte de poids rapide, une acidose lactique (voir « Risque d'acidose lactique » ci-dessous) ou une acidocétose. En cas d'acidocétose, les substances appelées « corps cétoniques » s'accumulent dans le sang ce qui peut conduire à un pré-coma diabétique. Les symptômes comprennent des douleurs à l'estomac, une respiration rapide et profonde, une somnolence ou si votre haleine présente une odeur fruitée inhabituelle.
- Si vous avez perdu trop d'eau (déshydratation), par exemple suite à une diarrhée persistante ou sévère, ou si vous avez vomi plusieurs fois d'affilée. La déshydratation peut entraîner des problèmes de reins qui peuvent vous mettre en danger d'acidose lactique (voir « Avertissements et précautions »).
- Si vous avez une infection grave, par exemple une infection des poumons ou des bronches, ou une infection des reins. Des infections sévères peuvent entraîner des problèmes de reins qui peuvent vous mettre en danger d'acidose lactique (voir « Avertissements et précautions »).
- Si vous prenez un traitement contre l'insuffisance cardiaque aiguë ou si vous avez récemment eu une crise cardiaque, si vous souffrez de graves problèmes de circulation sanguine (tel un choc) ou vous avez des difficultés respiratoires. Ceci peut entraîner un manque d'apport en oxygène des tissus, qui peut vous mettre en danger d'acidose lactique (voir « Avertissements et précautions »).
- Si vous consommez beaucoup d'alcool.

Si l'un des cas ci-dessus s'applique à vous, parlez-en à votre médecin avant de commencer à prendre ce médicament.

Veuillez à demander conseil à votre médecin si :

- Vous devez passer un examen radiographique ou un scanner qui pourrait nécessiter l'injection d'un produit de contraste à base d'iode dans votre circulation sanguine
- Vous devez subir une intervention chirurgicale majeure

Vous devez arrêter de prendre Glucophage un certain temps avant et après de tels examens.

interventions chirurgicales. Votre médecin décidera si vous avez besoin ou non d'un traitement de remplacement pendant cette période. Il est important que vous suiviez précisément les instructions de votre médecin.

Mises en garde spéciales et précautions d'emploi :

Avertissements et précautions

Risque d'acidose lactique

Glucophage peut provoquer un effet indésirable rare, mais très grave, appelé « acidose lactique », en particulier si vos reins ne fonctionnent pas correctement. Le risque de développer une acidose lactique augmente également en cas de diabète mal contrôlé, d'infections graves, de jeûne prolongé ou de consommation d'alcool, de déshydratation (voir informations complémentaires ci-dessous), de problèmes au foie et toutes autres affections médicales pour lesquelles une partie du corps reçoit un apport réduit en oxygène (les maladies cardiaques aiguës sévères, par exemple).

Si l'une de ces situations s'applique à vous, adressez-vous à votre médecin pour recevoir des instructions supplémentaires.

Arrêtez de prendre Glucophage pendant une courte période si vous souffrez d'une affection susceptible d'être associée à une déshydratation (perte importante de liquides corporels) tels que les vomissements sévères, de la diarrhée, de la fièvre, une exposition à la chaleur ou si vous buvez moins de liquides que d'habitude. Adressez-vous à votre médecin pour obtenir des instructions supplémentaires.

Arrêtez de prendre Glucophage et contactez immédiatement un médecin ou l'hôpital le plus proche si vous présentez les symptômes d'une acidose lactique, car cette affection peut entraîner un coma.

Les symptômes de l'acidose lactique comprennent :

- vomissements
- maux d'estomac (douleurs abdominales)
- crampes musculaires
- sensation générale de malaise associée à une grande fatigue
- difficultés à respirer
- diminution de la température corporelle et du rythme cardiaque

L'acidose lactique est une urgence médicale qui doit être traitée à l'hôpital. Si vous devez subir une opération chirurgicale importante, arrêtez de prendre Glucophage au moment de l'opération et pendant un certain temps après l'intervention. Votre médecin décidera du moment où vous devrez arrêter et reprendre votre traitement par Glucophage.

Glucophage à lui seul ne provoque pas d'hypoglycémie (taux de sucre dans le sang trop faible). Cependant, si vous prenez Glucophage en même temps que d'autres médicaments pour traiter le diabète qui peuvent engendrer une hypoglycémie (comme les sulfamides hypoglycémiants, l'insuline, les méglitinides), il y a un risque d'hypoglycémie. Si vous ressentez des symptômes d'hypoglycémie, tels que des faiblesses, des vertiges, une augmentation de la transpiration, des battements de cœur rapides, des troubles de la vision ou des difficultés à vous concentrer, boire ou manger quelque chose contenant du sucre devrait vous aider à vous sentir mieux.

Pendant votre traitement par Glucophage, votre médecin contrôlera votre fonction rénale au moins une fois par an ou plus fréquemment si vous êtes âgé(e) et/ou si votre fonction rénale s'est détériorée.

Enfants : Sans objet.

Liste des excipients à effet notable : Sans objet.

Interactions :

Autres médicaments et GLUCOPHAGE, comprimé pelliculé :

Si vous devez recevoir une injection d'un produit de contraste contenant de l'iode, par exemple, pour une radiographie ou un scanner, vous devrez arrêter de prendre Glucophage avant ou au moment de l'injection. Votre médecin décidera du moment où vous devrez arrêter et reprendre la prise de votre traitement par Glucophage.

Informez votre médecin si vous prenez, avec récurrence pris ou pourrez prendre tout autre médicament. Vous devrez peut-être passer plus fréquemment des tests de la glycémie ou de la fonction rénale ou votre médecin devra peut-être ajuster la posologie de Glucophage. Il est particulièrement important de signaler les médicaments suivants :

- Les médicaments qui augmentent la production d'urine (diurétiques).
- Des médicaments utilisés pour traiter la douleur et l'inflammation (AINS ou inhibiteurs de la COX-2, tels que l'ibuprofène et le céclocoxib).
- Certains médicaments utilisés pour traiter l'hypertension artérielle (inhibiteurs de l'ECA et antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II).
- Agonistes des récepteurs bêta-2-adrénergiques comme le salbutamol ou la terbutaline (utilisés pour traiter l'asthme).
- Corticostéroïdes (utilisés pour traiter diverses affections, notamment des inflammations sévères de la peau ou l'asthme).
- Les médicaments qui peuvent modifier la quantité de Glucophage dans le sang, en particulier si les récepteurs de l'angiotensine II sont bloqués.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obten

GLUCOPHAGE 500 mg, comprimé pelliculé

GLUCOPHAGE 850 mg, comprimé pelliculé

GLUCOPHAGE 1000 mg, comprimé pelliculé

Chlorhydrate de metformine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la ressortir.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'information à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Qu'a-t-il dans cette notice ?

1. Qu'est-ce que GLUCOPHAGE, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre GLUCOPHAGE, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre GLUCOPHAGE, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver GLUCOPHAGE, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE GLUCOPHAGE, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : code ATC : A10AA02.

Indications thérapeutiques :

Glucophage contient de la metformine. C'est un médicament utilisé pour traiter le diabète. Il appartient à la classe de médicaments appelés les biguanides.

L'insuline est une hormone produite par le pancréas et permettant à votre corps de récupérer le glucose (sucre) qui est dans le sang. Votre corps utilise le glucose pour produire de l'énergie ou le stocke pour l'utiliser plus tard.

Lorsque vous avez du diabète, votre pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline ou votre corps n'est pas capable d'utiliser correctement l'insuline qu'il produit. Ceci aboutit à un taux de glucose élevé dans votre sang. Glucophage aide à faire baisser votre taux de glucose sanguin jusqu'à un niveau aussi normal que possible.

Si vous êtes un adulte en surpoids, la prise de Glucophage à long terme permet également d'aider à limiter les risques de complications associées au diabète. Glucophage est associé à une stabilité pondérale ou une moindre perte de poids.

Glucophage est utilisé pour traiter le diabète de type 2 (aussi appelé « diabète non insulino-dépendant ») lorsque le régime alimentaire et l'exercice physique seuls n'ont pas suffi à contrôler le taux de glucose sanguin. Il est particulièrement utilisé chez les patients en surpoids. Les patients adultes pourront prendre Glucophage seul ou avec d'autres médicaments contre le diabète (des médicaments à avancer ou de l'insuline).

Les enfants de 10 ans et plus et les adolescents pourront prendre Glucophage seul ou avec l'insuline.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE GLUCOPHAGE, comprimé pelliculé ?

Contre indications :

Ne prenez jamais GLUCOPHAGE, comprimé pelliculé :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la metformine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
 - Si vous avez des problèmes hépatiques.
 - Si vous souffrez d'une détérioration sévère de la fonction rénale.
 - Si vous avez un diabète non contrôlé avec, par exemple, une hyperglycémie sévère (taux élevé de glucose dans le sang), des nausées, des vomissements, une diarrhée, une perte de poids rapide, une acidose lactique (voir « Risque d'acidose lactique » ci-dessous) ou une acidocétose. En cas d'acidocétose, les substances appelées « corps cétoniques » s'accumulent dans le sang ce qui peut conduire à un pré-coma diabétique. Les symptômes comprennent des douleurs à l'estomac, une respiration rapide et profonde, une somnolence ou si votre haleine présente une odeur fruitée inhabituelle.
 - Si vous avez perdu trop d'eau (déshydratation), par exemple suite à une diarrhée persistante ou sévère, ou si vous avez vomi plusieurs fois d'affilée. La déshydratation peut entraîner des problèmes de reins qui peuvent vous mettre en danger d'acidose lactique (voir « Avertissements et précautions »).
 - Si vous avez une infection grave, par exemple une infection des poumons ou des bronches, ou une infection des reins. Des infections sévères peuvent entraîner des problèmes de reins qui peuvent vous mettre en danger d'acidose lactique (voir « Avertissements et précautions »).
 - Si vous prenez un traitement contre l'insuffisance cardiaque aiguë ou si vous avez récemment eu une crise cardiaque, si vous souffrez de graves problèmes de circulation sanguine (tel un choc) ou vous avez des difficultés respiratoires. Ceci peut entraîner un manque d'apport en oxygène des tissus, qui peut vous mettre en danger d'acidose lactique (voir « Avertissements et précautions »).
 - Si vous consommez beaucoup d'alcool.
- Si l'un des cas ci-dessus s'applique à vous, parlez-en à votre médecin avant de commencer à prendre ce médicament.
- Veuillez à demander conseil à votre médecin si :
- Vous devez passer un examen radiographique ou un scanner qui pourrait nécessiter l'injection d'un produit de contraste à base d'iode dans votre circulation sanguine
 - Vous devez subir une intervention chirurgicale majeure
- Vous devez arrêter de prendre Glucophage un certain temps avant et après de tels examens.

interventions chirurgicales. Votre médecin décidera si vous avez besoin ou non d'un traitement de remplacement pendant cette période. Il est important que vous suiviez précisément les instructions de votre médecin.

Mises en garde spéciales et précautions d'emploi :

Avertissements et précautions

Risque d'acidose lactique

Glucophage peut provoquer un effet indésirable rare, mais très grave, appelé « acidose lactique », en particulier si vos reins ne fonctionnent pas correctement. Le risque de développer une acidose lactique augmente également en cas de diabète mal contrôlé, d'infections graves, de jeûne prolongé ou de consommation d'alcool, de déshydratation (voir informations complémentaires ci-dessous), de problèmes au foie et toutes autres affections médicales pour lesquelles une partie du corps reçoit un apport réduit en oxygène (les maladies cardiaques aiguës sévères, par exemple).

Si l'une de ces situations s'applique à vous, adressez-vous à votre médecin pour recevoir des instructions supplémentaires.

Arrêtez de prendre Glucophage pendant une courte période si vous souffrez d'une affection susceptible d'être associée à une déshydratation (perte importante de liquides corporels) telle que les vomissements sévères, de la diarrhée, de la fièvre, une exposition à la chaleur ou si vous buvez moins de liquides que d'habitude. Adressez-vous à votre médecin pour obtenir des instructions supplémentaires.

Arrêtez de prendre Glucophage et contactez immédiatement un médecin ou l'hôpital le plus proche si vous présentez les symptômes d'une acidose lactique, car cette affection peut entraîner un coma.

Les symptômes de l'acidose lactique comprennent :

- vomissements
- maux d'estomac (douleurs abdominales)
- crampes musculaires
- sensation générale de malaise associée à une grande fatigue
- difficultés à respirer
- diminution de la température corporelle et du rythme cardiaque

L'acidose lactique est une urgence médicale qui doit être traitée à l'hôpital. Si vous devez subir une opération chirurgicale importante, arrêtez de prendre Glucophage au moment de l'opération et pendant un certain temps après l'intervention. Votre médecin décidera du moment où vous devrez arrêter et reprendre votre traitement par Glucophage.

Glucophage à lui seul ne provoque pas d'hypoglycémie (taux de sucre dans le sang trop faible). Cependant, si vous prenez Glucophage en même temps que d'autres médicaments pour traiter le diabète qui peuvent engendrer une hypoglycémie (comme les sulfamides hypoglycémiants, l'insuline, les méglitinides), il y a un risque d'hypoglycémie. Si vous ressentez des symptômes d'hypoglycémie, tels que des faiblesses, des vertiges, une augmentation de la transpiration, des battements de cœur rapides, des troubles de la vision ou des difficultés à vous concentrer, boire ou manger quelque chose contenant du sucre devrait vous aider à vous sentir mieux.

Pendant votre traitement par Glucophage, votre médecin contrôlera votre fonction rénale au moins une fois par an ou plus fréquemment si vous êtes âgé(e) et/ou si votre fonction rénale s'est détériorée.

Enfants : Sans objet.

Liste des excipients à effet notable : Sans objet.

Interactions :

Autres médicaments et GLUCOPHAGE, comprimé pelliculé :

Si vous devez recevoir une injection d'un produit de contraste contenant de l'iode, par exemple, pour une radiographie ou un scanner, vous devrez arrêter de prendre Glucophage avant ou au moment de l'injection. Votre médecin décidera du moment où vous devrez arrêter et reprendre la prise de votre traitement par Glucophage.

Informez votre médecin si vous prenez, avec récurrence pris ou pourrez prendre tout autre médicament. Vous devrez peut-être passer plus fréquemment des tests de la glycémie ou de la fonction rénale ou votre médecin devra peut-être ajuster la posologie de Glucophage. Il est particulièrement important de signaler les médicaments suivants :

- Les médicaments qui augmentent la production d'urine (diurétiques).
- Des médicaments utilisés pour traiter la douleur et l'inflammation (AINS ou inhibiteurs de la COX-2, tels que l'ibuprofène et le céclocoxib).
- Certains médicaments utilisés pour traiter l'hypertension artérielle (inhibiteurs de l'ECA et antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II).
- Agonistes des récepteurs bêta-2-adrénergiques comme le salbutamol ou la terbutaline (utilisés pour traiter l'asthme).
- Corticostéroïdes (utilisés pour traiter diverses affections, notamment des inflammations sévères de la peau ou l'asthme).
- Les médicaments qui peuvent modifier la quantité de Glucophage dans le sang, en particulier si

26,00

GLUCOPHAGE 500 mg, comprimé pelliculé

GLUCOPHAGE 850 mg, comprimé pelliculé

GLUCOPHAGE 1000 mg, comprimé pelliculé

Chlorhydrate de metformine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la ressortir.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'information à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Qu'a-t-il dans cette notice ?

1. Qu'est-ce que GLUCOPHAGE, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre GLUCOPHAGE, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre GLUCOPHAGE, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver GLUCOPHAGE, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE GLUCOPHAGE, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : code ATC : A10AA02.

Indications thérapeutiques :

Glucophage contient de la metformine. C'est un médicament utilisé pour traiter le diabète. Il appartient à la classe de médicaments appelés les biguanides.

L'insuline est une hormone produite par le pancréas et permettant à votre corps de récupérer le glucose (sucre) qui est dans le sang. Votre corps utilise le glucose pour produire de l'énergie ou le stocke pour l'utiliser plus tard.

Lorsque vous avez du diabète, votre pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline ou votre corps n'est pas capable d'utiliser correctement l'insuline qu'il produit. Ceci aboutit à un taux de glucose élevé dans votre sang. Glucophage aide à faire baisser votre taux de glucose sanguin jusqu'à un niveau aussi normal que possible.

Si vous êtes un adulte en surpoids, la prise de Glucophage à long terme permet également d'aider à limiter les risques de complications associées au diabète. Glucophage est associé à une stabilité pondérale ou une moindre perte de poids.

Glucophage est utilisé pour traiter le diabète de type 2 (aussi appelé « diabète non insulino-dépendant ») lorsque le régime alimentaire et l'exercice physique seuls n'ont pas suffi à contrôler le taux de glucose sanguin. Il est particulièrement utilisé chez les patients en surpoids. Les patients adultes pourront prendre Glucophage seul ou avec d'autres médicaments contre le diabète (des médicaments à avancer ou de l'insuline).

Les enfants de 10 ans et plus et les adolescents pourront prendre Glucophage seul ou avec l'insuline.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE GLUCOPHAGE, comprimé pelliculé ?

Contre indications :

Ne prenez jamais GLUCOPHAGE, comprimé pelliculé :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la metformine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous avez des problèmes hépatiques.
- Si vous souffrez d'une détérioration sévère de la fonction rénale.
- Si vous avez un diabète non contrôlé avec, par exemple, une hyperglycémie sévère (taux élevé de glucose dans le sang), des nausées, des vomissements, une diarrhée, une perte de poids rapide, une acidose lactique (voir « Risque d'acidose lactique » ci-dessous) ou une acidocétose. En cas d'acidocétose, les substances appelées « corps cétoniques » s'accumulent dans le sang ce qui peut conduire à un pré-coma diabétique. Les symptômes comprennent des douleurs à l'estomac, une respiration rapide et profonde, une somnolence ou si votre haleine présente une odeur fruitée inhabituelle.
- Si vous avez perdu trop d'eau (déshydratation), par exemple suite à une diarrhée persistante ou sévère, ou si vous avez vomi plusieurs fois d'affilée. La déshydratation peut entraîner des problèmes de reins qui peuvent vous mettre en danger d'acidose lactique (voir « Avertissements et précautions »).
- Si vous avez une infection grave, par exemple une infection des poumons ou des bronches, ou une infection des reins. Des infections sévères peuvent entraîner des problèmes de reins qui peuvent vous mettre en danger d'acidose lactique (voir « Avertissements et précautions »).
- Si vous prenez un traitement contre l'insuffisance cardiaque aiguë ou si vous avez récemment eu une crise cardiaque, si vous souffrez de graves problèmes de circulation sanguine (tel un choc) ou vous avez des difficultés respiratoires. Ceci peut entraîner un manque d'apport en oxygène des tissus, qui peut vous mettre en danger d'acidose lactique (voir « Avertissements et précautions »).
- Si vous consommez beaucoup d'alcool.
- Si l'un des cas ci-dessus s'applique à vous, parlez-en à votre médecin avant de commencer à prendre ce médicament.

Veuillez à demander conseil à votre médecin si :

- Vous devez passer un examen radiographique ou un scanner qui pourrait nécessiter l'injection d'un produit de contraste à base d'iode dans votre circulation sanguine
- Vous devez subir une intervention chirurgicale majeure

Vous devez arrêter de prendre Glucophage un certain temps avant et après de tels examens.

interventions chirurgicales. Votre médecin décidera si vous avez besoin ou non d'un traitement de remplacement pendant cette période. Il est important que vous suiviez précisément les instructions de votre médecin.

Mises en garde spéciales et précautions d'emploi :

Avertissements et précautions

Risque d'acidose lactique

Glucophage peut provoquer un effet indésirable rare, mais très grave, appelé « acidose lactique », en particulier si vos reins ne fonctionnent pas correctement. Le risque de développer une acidose lactique augmente également en cas de diabète mal contrôlé, d'infections graves, de jeûne prolongé ou de consommation d'alcool, de déshydratation (voir informations complémentaires ci-dessous), de problèmes au foie et toutes autres affections médicales pour lesquelles une partie du corps reçoit un apport réduit en oxygène (les maladies cardiaques aiguës sévères, par exemple).

Si l'une de ces situations s'applique à vous, adressez-vous à votre médecin pour recevoir des instructions supplémentaires.

Arrêtez de prendre Glucophage pendant une courte période si vous souffrez d'une affection susceptible d'être associée à une déshydratation (petre importante de liquides corporels) tels que les vomissements sévères, de la diarrhée, de la fièvre, une exposition à la chaleur ou si vous buvez moins de liquides que d'habitude. Adressez-vous à votre médecin pour obtenir des instructions supplémentaires.

Arrêtez de prendre Glucophage et contactez immédiatement un médecin ou l'hôpital le plus proche si vous présentez les symptômes d'une acidose lactique, car cette affection peut entraîner un coma.

Les symptômes de l'acidose lactique comprennent :

- vomissements
- maux d'estomac (douleurs abdominales)
- crampes musculaires
- sensation générale de malaise associée à une grande fatigue
- difficultés à respirer
- diminution de la température corporelle et du rythme cardiaque

L'acidose lactique est une urgence médicale qui doit être traitée à l'hôpital. Si vous devez subir une opération chirurgicale importante, arrêtez de prendre Glucophage au moment de l'opération et pendant un certain temps après l'intervention. Votre médecin décidera du moment où vous devrez arrêter et reprendre votre traitement par Glucophage.

Glucophage à lui seul ne provoque pas d'hypoglycémie (taux de sucre dans le sang trop faible). Cependant, si vous prenez Glucophage en même temps que d'autres médicaments pour traiter le diabète qui peuvent engendrer une hypoglycémie (comme les sulfamides hypoglycémiants, l'insuline, les méglitinides), il y a un risque d'hypoglycémie. Si vous ressentez des symptômes d'hypoglycémie, tels que des faiblesses, des vertiges, une augmentation de la transpiration, des battements de cœur rapides, des troubles de la vision ou des difficultés à vous concentrer, boire ou manger quelque chose contenant du sucre devrait vous aider à vous sentir mieux.

Pendant votre traitement par Glucophage, votre médecin contrôlera votre fonction rénale au moins une fois par an ou plus fréquemment si vous êtes âgé(e) et/ou si votre fonction rénale s'est détériorée.

Enfants : Sans objet.

Liste des excipients à effet notable : Sans objet.

Interactions :

Autres médicaments et GLUCOPHAGE, comprimé pelliculé :

Si vous devez recevoir une injection d'un produit de contraste contenant de l'iode, par exemple, pour une radiographie ou un scanner, vous devrez arrêter de prendre Glucophage avant ou au moment de l'injection. Votre médecin décidera du moment où vous devrez arrêter et reprendre la prise de votre traitement par Glucophage.

Informez votre médecin si vous prenez, avec récurrence pris ou pourrez prendre tout autre médicament. Vous devrez peut-être passer plus fréquemment des tests de la glycémie ou de la fonction rénale ou votre médecin devra peut-être ajuster la posologie de Glucophage. Il est particulièrement important de signaler les médicaments suivants :

- Les médicaments qui augmentent la production d'urine (diurétiques).
- Des médicaments utilisés pour traiter la douleur et l'inflammation (AINS ou inhibiteurs de la COX-2, tels que l'ibuprofène et le céclocoxib).
- Certains médicaments utilisés pour traiter l'hypertension artérielle (inhibiteurs de l'ECA et antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II).
- Agonistes des récepteurs bêta-2-adrénergiques comme le salbutamol ou la terbutaline (utilisés pour traiter l'asthme).
- Corticostéroïdes (utilisés pour traiter diverses affections, notamment des inflammations sévères de la peau ou l'asthme).
- Les médicaments qui peuvent modifier la quantité de Glucophage dans le sang, en particulier si les récepteurs de l'angiotensine II sont bloqués.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

Il est recommandé de consulter votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir plus d'informations.

GLUCOPHAGE 500 mg, comprimé pelliculé

GLUCOPHAGE 850 mg, comprimé pelliculé

GLUCOPHAGE 1000 mg, comprimé pelliculé

Chlorhydrate de metformine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la ressortir.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'information à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Qu'a-t-il dans cette notice ?

1. Qu'est-ce que GLUCOPHAGE, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre GLUCOPHAGE, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre GLUCOPHAGE, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver GLUCOPHAGE, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE GLUCOPHAGE, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : code ATC : A10AA02.

Indications thérapeutiques :

Glucophage contient de la metformine. C'est un médicament utilisé pour traiter le diabète. Il appartient à la classe de médicaments appelés les biguanides.

L'insuline est une hormone produite par le pancréas et permettant à votre corps de récupérer le glucose (sucre) qui est dans le sang. Votre corps utilise le glucose pour produire de l'énergie ou le stocke pour l'utiliser plus tard.

Lorsque vous avez du diabète, votre pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline ou votre corps n'est pas capable d'utiliser correctement l'insuline qu'il produit. Ceci aboutit à un taux de glucose élevé dans votre sang. Glucophage aide à faire baisser votre taux de glucose sanguin jusqu'à un niveau aussi normal que possible.

Si vous êtes un adulte en surpoids, la prise de Glucophage à long terme permet également d'aider à limiter les risques de complications associées au diabète. Glucophage est associé à une stabilité pondérale ou une moindre perte de poids.

Glucophage est utilisé pour traiter le diabète de type 2 (aussi appelé « diabète non insulino-dépendant ») lorsque le régime alimentaire et l'exercice physique seuls n'ont pas suffi à contrôler le taux de glucose sanguin. Il est particulièrement utilisé chez les patients en surpoids. Les patients adultes pourront prendre Glucophage seul ou avec d'autres médicaments contre le diabète (des médicaments à avancer ou de l'insuline).

Les enfants de 10 ans et plus et les adolescents pourront prendre Glucophage seul ou avec l'insuline.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE GLUCOPHAGE, comprimé pelliculé ?

Contre indications :

Ne prenez jamais GLUCOPHAGE, comprimé pelliculé :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la metformine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous avez des problèmes hépatiques.
- Si vous souffrez d'une détérioration sévère de la fonction rénale.
- Si vous avez un diabète non contrôlé avec, par exemple, une hyperglycémie sévère (taux élevé de glucose dans le sang), des nausées, des vomissements, une diarrhée, une perte de poids rapide, une acidose lactique (voir « Risque d'acidose lactique » ci-dessous) ou une acidocétose. En cas d'acidocétose, les substances appelées « corps cétoniques » s'accumulent dans le sang ce qui peut conduire à un pré-coma diabétique. Les symptômes comprennent des douleurs à l'estomac, une respiration rapide et profonde, une somnolence ou si votre haleine présente une odeur fruitée inhabituelle.
- Si vous avez perdu trop d'eau (déshydratation), par exemple suite à une diarrhée persistante ou sévère, ou si vous avez vomi plusieurs fois d'affilée. La déshydratation peut entraîner des problèmes de reins qui peuvent vous mettre en danger d'acidose lactique (voir « Avertissements et précautions »).
- Si vous avez une infection grave, par exemple une infection des poumons ou des bronches, ou une infection des reins. Des infections sévères peuvent entraîner des problèmes de reins qui peuvent vous mettre en danger d'acidose lactique (voir « Avertissements et précautions »).
- Si vous prenez un traitement contre l'insuffisance cardiaque aiguë ou si vous avez récemment eu une crise cardiaque, si vous souffrez de graves problèmes de circulation sanguine (tel un choc) ou vous avez des difficultés respiratoires. Ceci peut entraîner un manque d'apport en oxygène des tissus, qui peut vous mettre en danger d'acidose lactique (voir « Avertissements et précautions »).
- Si vous consommez beaucoup d'alcool.
- Si l'un des cas ci-dessus s'applique à vous, parlez-en à votre médecin avant de commencer à prendre ce médicament.

Veuillez à demander conseil à votre médecin si :

- Vous devez passer un examen radiographique ou un scanner qui pourrait nécessiter l'injection d'un produit de contraste à base d'iode dans votre circulation sanguine
- Vous devez subir une intervention chirurgicale majeure

Vous devez arrêter de prendre Glucophage un certain temps avant et après de tels examens.

interventions chirurgicales. Votre médecin décidera si vous avez besoin ou non d'un traitement de remplacement pendant cette période. Il est important que vous suivez précisément les instructions de votre médecin.

Mises en garde spéciales et précautions d'emploi :

Avertissements et précautions

Risque d'acidose lactique

Glucophage peut provoquer un effet indésirable rare, mais très grave, appelé « acidose lactique », en particulier si vos reins ne fonctionnent pas correctement. Le risque de développer une acidose lactique augmente également en cas de diabète mal contrôlé, d'infections graves, de jeûne prolongé ou de consommation d'alcool, de déshydratation (voir informations complémentaires ci-dessous), de problèmes au foie et toutes autres affections médicales pour lesquelles une partie du corps reçoit un apport réduit en oxygène (les maladies cardiaques aiguës sévères, par exemple).

Si l'une de ces situations s'applique à vous, adressez-vous à votre médecin pour recevoir des instructions supplémentaires.

Arrêtez de prendre Glucophage pendant une courte période si vous souffrez d'une affection susceptible d'être associée à une déshydratation (petre importante de liquides corporels) tels que les vomissements sévères, de la diarrhée, de la fièvre, une exposition à la chaleur ou si vous buvez moins de liquides que d'habitude. Adressez-vous à votre médecin pour obtenir des instructions supplémentaires.

Arrêtez de prendre Glucophage et contactez immédiatement un médecin ou l'hôpital le plus proche si vous présentez les symptômes d'une acidose lactique, car cette affection peut entraîner un coma.

Les symptômes de l'acidose lactique comprennent :

- vomissements
- maux d'estomac (douleurs abdominales)
- crampes musculaires
- sensation générale de malaise associée à une grande fatigue
- difficultés à respirer
- diminution de la température corporelle et du rythme cardiaque

L'acidose lactique est une urgence médicale qui doit être traitée à l'hôpital. Si vous devez subir une opération chirurgicale importante, arrêtez de prendre Glucophage au moment de l'opération et pendant un certain temps après l'intervention. Votre médecin décidera du moment où vous devrez arrêter et reprendre votre traitement par Glucophage.

Glucophage à lui seul ne provoque pas d'hypoglycémie (taux de sucre dans le sang trop faible). Cependant, si vous prenez Glucophage en même temps que d'autres médicaments pour traiter le diabète qui peuvent engendrer une hypoglycémie (comme les sulfamides hypoglycémiants, l'insuline, les méglitinides), il y a un risque d'hypoglycémie. Si vous ressentez des symptômes d'hypoglycémie, tels que des faiblesses, des vertiges, une augmentation de la transpiration, des battements de cœur rapides, des troubles de la vision ou des difficultés à vous concentrer, boire ou manger quelque chose contenant du sucre devrait vous aider à vous sentir mieux.

Pendant votre traitement par Glucophage, votre médecin contrôlera votre fonction rénale au moins une fois par an ou plus fréquemment si vous êtes âgé(e) et/ou si votre fonction rénale s'est détériorée.

Enfants : Sans objet.

Liste des excipients à effet notable : Sans objet.

Interactions :

Autres médicaments et GLUCOPHAGE, comprimé pelliculé :

Si vous devez recevoir une injection d'un produit de contraste contenant de l'iode, par exemple, pour une radiographie ou un scanner, vous devrez arrêter de prendre Glucophage avant ou au moment de l'injection. Votre médecin décidera du moment où vous devrez arrêter et reprendre la prise de votre traitement par Glucophage.

Informez votre médecin si vous prenez, avec récurrence pris ou pourrez prendre tout autre médicament. Vous devrez peut-être passer plus fréquemment des tests de la glycémie ou de la fonction rénale ou votre médecin devra peut-être ajuster la posologie de Glucophage. Il est particulièrement important de signaler les médicaments suivants :

- Les médicaments qui augmentent la production d'urine (diurétiques).
- Des médicaments utilisés pour traiter la douleur et l'inflammation (AINS ou inhibiteurs de la COX-2, tels que l'ibuprofène et le céclocoxib).
- Certains médicaments utilisés pour traiter l'hypertension artérielle (inhibiteurs de l'ECA et antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II).
- Agonistes des récepteurs bêta-2-adrénergiques comme le salbutamol ou la terbutaline (utilisés pour traiter l'asthme).
- Corticostéroïdes (utilisés pour traiter diverses affections, notamment des inflammations sévères de la peau ou l'asthme).
- Les médicaments qui peuvent modifier la quantité de Glucophage dans le sang, en particulier si

26,00

MOLGAM®

Acide tiaprofénique

Composition :

Molgam® 100 mg

Acide tiaprofénique

100 mg

Excipients q.s.p.....

1 comprimé

Molgam® 200 mg

Acide tiaprofénique

200 mg

Excipients q.s.p.....

1 comprimé

Propriétés :

Anti-inflammatoire non stéroïdien, appartenant au groupe des propioniques, dérivé de l'acide aryl-carboxylique.

Indications :

Elles sont limitées chez l'adulte et l'enfant à partir de 15 kg soit environ 4 ans au :

- Traitement symptomatique au long cours :

- des rhumatismes inflammatoires chroniques ; notamment polyarthrite rhumatoïde,
- de certaines arthroses douloureuses et invalidantes.

- Traitement symptomatique de courte durée :

- des poussées aiguës d'arthrose, de lombalgies,
- des affections aiguës post-traumatiques bénignes de l'appareil locomoteur,
- dysménorrhées après recherche étiologique,
- traitement des douleurs inflammatoires dans les domaines ORL (bouche, gorge, nez, oreille) et stomatologique.

Contre indications :

Absolues :

Antécédents d'allergie ou d'asthme déclenchés par la prise d'acide tiaprofénique ou de substances d'activité proche telles que autres AINS, aspirine.

Ulcère gastroduodénal en évolution.

Insuffisance hépatocellulaire sévère.

Insuffisance rénale sévère.

Enfant de moins de 15 kg.

Femme enceinte (4 derniers mois).

Relatives :

Autres AINS y compris les salicylés à fortes doses, anticoagulants oraux, héparine par voie parentérale, lithium, méthotréxate utilisé à des doses > 15 mg/semaine, ticlopidine, femme enceinte (5 premiers mois) ou qui allaita.

Mises en garde et précautions d'emploi :

Interrompre le traitement en cas d'hémorragie gastro-intestinale

Prévenir le médecin en cas de :

Antécédents digestifs, insuffisance rénale chronique, insuffisance hépatique

Insuffisance respiratoire, Asthme...

LOT : 2525

PER : 08-25

P.P.V : 40 DH00

MOLGAM®

Acide tiaprofénique

Composition :

Molgam® 100 mg

Acide tiaprofénique

100 mg

Excipients q.s.p.....

1 comprimé

Molgam® 200 mg

Acide tiaprofénique

200 mg

Excipients q.s.p.....

1 comprimé

Propriétés :

Anti-inflammatoire non stéroïdien, appartenant au groupe des propioniques, dérivé de l'acide aryl-carboxylique.

Indications :

Elles sont limitées chez l'adulte et l'enfant à partir de 15 kg soit environ 4 ans au :

- Traitement symptomatique au long cours :

- des rhumatismes inflammatoires chroniques ; notamment polyarthrite rhumatoïde,
- de certaines arthroses douloureuses et invalidantes.

- Traitement symptomatique de courte durée :

- des poussées aiguës d'arthrose, de lombalgies,
- des affections aiguës post-traumatiques bénignes de l'appareil locomoteur,
- dysménorrhées après recherche étiologique,
- traitement des douleurs inflammatoires dans les domaines ORL (bouche, gorge, nez, oreille) et stomatologique.

Contre indications :

Absolues :

Antécédents d'allergie ou d'asthme déclenchés par la prise d'acide tiaprofénique ou de substances d'activité proche telles que autres AINS, aspirine.

Ulcère gastroduodénal en évolution.

Insuffisance hépatocellulaire sévère.

Insuffisance rénale sévère.

Enfant de moins de 15 kg.

Femme enceinte (4 derniers mois).

Relatives :

Autres AINS y compris les salicylés à fortes doses, anticoagulants oraux, héparine par voie parentérale, lithium, méthotréxate utilisé à des doses > 15 mg/semaine, ticlopidine, femme enceinte (5 premiers mois) ou qui allaita.

Mises en garde et précautions d'emploi :

Interrompre le traitement en cas d'hémorragie gastro-intestinale

Prévenir le médecin en cas de :

Antécédents digestifs, insuffisance rénale chronique, insuffisance hépatique

Insuffisance respiratoire, Asthme...

LOT : 2525

PER : 08-25

P.P.V : 40 DH00

MOLGAM®

Acide tiaprofénique

Composition :

Molgam® 100 mg

Acide tiaprofénique

100 mg

Excipients q.s.p.....

1 comprimé

Molgam® 200 mg

Acide tiaprofénique

200 mg

Excipients q.s.p.....

1 comprimé

Propriétés :

Anti-inflammatoire non stéroïdien, appartenant au groupe des propioniques, dérivé de l'acide aryl-carboxylique.

Indications :

Elles sont limitées chez l'adulte et l'enfant à partir de 15 kg soit environ 4 ans au :

- Traitement symptomatique au long cours :

- des rhumatismes inflammatoires chroniques ; notamment polyarthrite rhumatoïde,
- de certaines arthroses douloureuses et invalidantes.

- Traitement symptomatique de courte durée :

- des poussées aiguës d'arthrose, de lombalgies,
- des affections aiguës post-traumatiques bénignes de l'appareil locomoteur,
- dysménorrhées après recherche étiologique,
- traitement des douleurs inflammatoires dans les domaines ORL (bouche, gorge, nez, oreille) et stomatologique.

Contre indications :

Absolues :

Antécédents d'allergie ou d'asthme déclenchés par la prise d'acide tiaprofénique ou de substances d'activité proche telles que autres AINS, aspirine.

Ulcère gastroduodénal en évolution.

Insuffisance hépatocellulaire sévère.

Insuffisance rénale sévère.

Enfant de moins de 15 kg.

Femme enceinte (4 derniers mois).

Relatives :

Autres AINS y compris les salicylés à fortes doses, anticoagulants oraux, héparine par voie parentérale, lithium, méthotréxate utilisé à des doses > 15 mg/semaine, ticlopidine, femme enceinte (5 premiers mois) ou qui allaita.

Mises en garde et précautions d'emploi :

Interrompre le traitement en cas d'hémorragie gastro-intestinale

Prévenir le médecin en cas de :

Antécédents digestifs, insuffisance rénale chronique, insuffisance hépatique

Insuffisance respiratoire, Asthme...

LOT : 2525

PER : 08-25

P.P.V : 40 DH00

MOLGAM®

Acide tiaprofénique

Composition :

Molgam® 100 mg

Acide tiaprofénique

100 mg

Excipients q.s.p.....

1 comprimé

Molgam® 200 mg

Acide tiaprofénique

200 mg

Excipients q.s.p.....

1 comprimé

Propriétés :

Anti-inflammatoire non stéroïdien, appartenant au groupe des propioniques, dérivé de l'acide aryl-carboxylique.

Indications :

Elles sont limitées chez l'adulte et l'enfant à partir de 15 kg soit environ 4 ans au :

- Traitement symptomatique au long cours :

- des rhumatismes inflammatoires chroniques ; notamment polyarthrite rhumatoïde,
- de certaines arthroses douloureuses et invalidantes.

- Traitement symptomatique de courte durée :

- des poussées aiguës d'arthrose, de lombalgies,
- des affections aiguës post-traumatiques bénignes de l'appareil locomoteur,
- dysménorrhées après recherche étiologique,
- traitement des douleurs inflammatoires dans les domaines ORL (bouche, gorge, nez, oreille) et stomatologique.

Contre indications :

Absolues :

Antécédents d'allergie ou d'asthme déclenchés par la prise d'acide tiaprofénique ou de substances d'activité proche telles que autres AINS, aspirine.

Ulcère gastroduodénal en évolution.

Insuffisance hépatocellulaire sévère.

Insuffisance rénale sévère.

Enfant de moins de 15 kg.

Femme enceinte (4 derniers mois).

Relatives :

Autres AINS y compris les salicylés à fortes doses, anticoagulants oraux, héparine par voie parentérale, lithium, méthotréxate utilisé à des doses > 15 mg/semaine, ticlopidine, femme enceinte (5 premiers mois) ou qui allaita.

Mises en garde et précautions d'emploi :

Interrompre le traitement en cas d'hémorragie gastro-intestinale

Prévenir le médecin en cas de :

Antécédents digestifs, insuffisance rénale chronique, insuffisance hépatique

Insuffisance respiratoire, Asthme...

LOT : 2525

PER : 08-25

P.P.V : 40 DH00

Doliprane®

1000 mg comprimé effervescent sécable
PARACÉTAMOL

Veuillez lire attentivement cette notice car elle contient des informations importantes pour vous. Ce médicament est disponible sans ordonnance et vous permet donc de soigner des maladies bénignes sans l'aide d'un médecin. Néanmoins, vous devez utiliser Doliprane 1000 mg, comprimé effervescent avec précaution afin d'en obtenir le meilleur résultat. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau. Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien. Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 5 jours, consultez un médecin.

La substance active est : paracétamol 1000 mg pour un comprimé effervescent sécable. Les autres composants sont : acide citrique anhydre, mannitol, saccharine sodique, laurylsulfate de sodium, povidone K90, bicarbonate de sodium, carbonate de sodium anhydre, leucine, arôme orange.

Teneur en sodium : 408 mg par comprimé.

QU'EST-CE QUE DOLIPRANE 1000 mg, COMPRIMÉ EFFERVESCENT ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament contient du paracétamol.

Il est indiqué en cas de douleurs et/ou fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures, règles douloureuses.

Il peut également être prescrit par votre médecin dans les douleurs de l'arthrose.

Cette présentation est réservée à l'adulte (à partir de 15 ans) :

Lire attentivement la rubrique "Posologie".

Pour les enfants de moins de 15 ans, il existe d'autres présentations de paracétamol : demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT DE PRENDRE DOLIPRANE 1000 mg, COMPRIMÉ EFFERVESCENT.

Contre-indications

Ne pas prendre DOLIPRANE 1000 mg, comprimé effervescent dans les cas suivants :

- allergie connue au paracétamol,
- maladie grave du foie,
- enfants de moins de 15 ans.

PRENDRE DES PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES AVEC DOLIPRANE 1000 mg, COMPRIMÉ EFFERVESCENT

Précautions particulières

- Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours, ou en cas d'efficacité insuffisante ou de survenue de tout autre signe, ne pas continuer le traitement sans l'avis de votre médecin.

- En cas de régime sans sel ou pauvre en sel, tenir compte dans la ration journalière de la présence de sodium : 408 mg par comprimé.

- En cas de maladie grave du foie ou des reins, il est nécessaire de consulter votre médecin avant de prendre du paracétamol.

Mises en garde

En cas de surdosage ou de prise par erreur d'une dose trop élevée, consulter immédiatement votre médecin.

Ce médicament contient du paracétamol. D'autres médicaments, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée, doivent être pris avec précaution.

Grossesse et allaitement

Le paracétamol, dans les conditions normales d'utilisation, peut être utilisé en cas d'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

P P V 1 4 D H 6 0
P E R 0 2 / 2 5
L O T L 5 3 5
D 2



Doliprane®

1000 mg comprimé effervescent sécable
PARACÉTAMOL

Veuillez lire attentivement cette notice car elle contient des informations importantes pour vous. Ce médicament est disponible sans ordonnance et vous permet donc de soigner des maladies bénignes sans l'aide d'un médecin. Néanmoins, vous devez utiliser Doliprane 1000 mg, comprimé effervescent avec précaution afin d'en obtenir le meilleur résultat. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau. Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien. Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 5 jours, consultez un médecin.

La substance active est : paracétamol 1000 mg pour un comprimé effervescent sécable. Les autres composants sont : acide citrique anhydre, mannitol, saccharine sodique, laurylsulfate de sodium, povidone K90, bicarbonate de sodium, carbonate de sodium anhydre, leucine, arôme orange.

Teneur en sodium : 408 mg par comprimé.

QU'EST-CE QUE DOLIPRANE 1000 mg, COMPRIMÉ EFFERVESCENT ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament contient du paracétamol.

Il est indiqué en cas de douleurs et/ou fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures, règles douloureuses.

Il peut également être prescrit par votre médecin dans les douleurs de l'arthrose.

Cette présentation est réservée à l'adulte (à partir de 15 ans) :

Lire attentivement la rubrique "Posologie".

Pour les enfants de moins de 15 ans, il existe d'autres présentations de paracétamol : demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT DE PRENDRE DOLIPRANE 1000 mg, COMPRIMÉ EFFERVESCENT.

Contre-indications

Ne pas prendre DOLIPRANE 1000 mg, comprimé effervescent dans les cas suivants :

- allergie connue au paracétamol,
- maladie grave du foie,
- enfants de moins de 15 ans.

PRENDRE DES PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES AVEC DOLIPRANE 1000 mg, COMPRIMÉ EFFERVESCENT

Précautions particulières

- Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours, ou en cas d'efficacité insuffisante ou de survenue de tout autre signe, ne pas continuer le traitement sans l'avis de votre médecin.

- En cas de régime sans sel ou pauvre en sel, tenir compte dans la ration journalière de la présence de sodium : 408 mg par comprimé.

- En cas de maladie grave du foie ou des reins, il est nécessaire de consulter votre médecin avant de prendre du paracétamol.

Mises en garde

En cas de surdosage ou de prise par erreur d'une dose trop élevée, consulter immédiatement votre médecin.

Ce médicament contient du paracétamol. D'autres médicaments, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée, doivent être pris avec précaution.

Grossesse et allaitement

Le paracétamol, dans les conditions normales d'utilisation, peut être utilisé en cas d'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

P P V 1 4 D H 6 0
P E R 0 2 / 2 5
L O T L 5 3 5
D 2



Doliprane®

1000 mg comprimé effervescent sécable
PARACÉTAMOL

Veuillez lire attentivement cette notice car elle contient des informations importantes pour vous. Ce médicament est disponible sans ordonnance et vous permet donc de soigner des maladies bénignes sans l'aide d'un médecin. Néanmoins, vous devez utiliser Doliprane 1000 mg, comprimé effervescent avec précaution afin d'en obtenir le meilleur résultat. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau. Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien. Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 5 jours, consultez un médecin.

La substance active est : paracétamol 1000 mg pour un comprimé effervescent sécable. Les autres composants sont : acide citrique anhydre, mannitol, saccharine sodique, laurylsulfate de sodium, povidone K90, bicarbonate de sodium, carbonate de sodium anhydre, leucine, arôme orange.

Teneur en sodium : 408 mg par comprimé.

QU'EST-CE QUE DOLIPRANE 1000 mg, COMPRIMÉ EFFERVESCENT ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament contient du paracétamol.

Il est indiqué en cas de douleurs et/ou fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures, règles douloureuses.

Il peut également être prescrit par votre médecin dans les douleurs de l'arthrose.

Cette présentation est réservée à l'adulte (à partir de 15 ans) :

Lire attentivement la rubrique "Posologie".

Pour les enfants de moins de 15 ans, il existe d'autres présentations de paracétamol : demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT DE PRENDRE DOLIPRANE 1000 mg, COMPRIMÉ EFFERVESCENT.

Contre-indications

Ne pas prendre DOLIPRANE 1000 mg, comprimé effervescent dans les cas suivants :

- allergie connue au paracétamol,
- maladie grave du foie,
- enfants de moins de 15 ans.

PRENDRE DES PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES AVEC DOLIPRANE 1000 mg, COMPRIMÉ EFFERVESCENT

Précautions particulières

- Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours, ou en cas d'efficacité insuffisante ou de survenue de tout autre signe, ne pas continuer le traitement sans l'avis de votre médecin.

- En cas de régime sans sel ou pauvre en sel, tenir compte dans la ration journalière de la présence de sodium : 408 mg par comprimé.

- En cas de maladie grave du foie ou des reins, il est nécessaire de consulter votre médecin avant de prendre du paracétamol.

Mises en garde

En cas de surdosage ou de prise par erreur d'une dose trop élevée, consulter immédiatement votre médecin.

Ce médicament contient du paracétamol. D'autres médicaments, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée, doivent être pris avec précaution.

Grossesse et allaitement

Le paracétamol, dans les conditions normales d'utilisation, peut être utilisé en cas d'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

P P V 1 4 D H 6 0
P E R 0 2 / 2 5
L O T L 5 3 5
D 2



DIAMICRON® 60 mg

Gliclazide

Comprimés sécables à Libération Modifiée

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice, voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée ?
3. Comment prendre DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE DIAMICRON 60 MG, COMPRIMÉ SÉCABLE À LIBÉRATION MODIFIÉE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : sulfamide hypoglycémiant - dérivé de l'urée - code ATC : A10BB09

DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée est un médicament qui réduit le taux de sucre dans le sang (antidiabétique oral appartenant à la classe des sulfonylurées).

DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée est indiqué dans certaines formes de diabète (diabète de type 2 non insulino-dépendant) chez l'adulte, lorsque le régime alimentaire, l'exercice physique et la perte de poids seuls ne sont pas suffisants pour obtenir une glycémie (taux de sucre dans le sang) normale.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE DIAMICRON 60 MG, COMPRIMÉ SÉCABLE À LIBÉRATION MODIFIÉE ?

Ne prenez jamais DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée :

- si vous êtes allergique au gliclazide ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6, ou à d'autres médicaments de la même classe (sulfonylurées), ou à d'autres médicaments apparentés (sulfamides hypoglycémiants) ;
- si vous avez un diabète insulino-dépendant (de type 1) ;
- si vous avez des corps cétoniques et du sucre dans vos urines (ce qui peut signifier que vous avez une acidocétose diabétique), un pré-coma ou un coma diabétiques ;
- si vous souffrez d'insuffisances rénale ou hépatique sévères ;
- si vous prenez des médicaments pour traiter des infections fongiques (miconazole) (voir rubrique «Autres médicaments et DIAMICRON 60mg, comprimé sécable à libération modifiée») ;
- si vous allez (voir rubrique «Grossesse, allaitement et fertilité»).

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée.

Vous devez respecter le traitement prescrit par votre médecin pour atteindre une glycémie normale. Cela signifie qu'à part la prise régulière du traitement, vous respectez un régime alimentaire, faites de l'exercice physique et, quand cela est nécessaire, perdez du poids.

Durant le traitement par gliclazide, un contrôle régulier de votre taux de sucre dans le sang (et éventuellement dans les urines), et également de votre héoglobine glyquée (HbA1c), est nécessaire.

Dans les premières semaines de traitement, le risque d'hypoglycémie (faible taux de sucre dans le sang) peut être augmenté. Dans ce cas, un contrôle médical rigoureux est nécessaire.

Une hypoglycémie peut survenir :

- si vous prenez vos repas de manière irrégulière ou si vous sautez un repas,
- si vous jeûnez,
- si vous êtes malnutri,
- si vous changez de régime alimentaire,
- si vous augmentez votre activité physique et que votre apport en hydrates de carbone ne compense pas cette augmentation,
- si vous buvez de l'alcool, en particulier si vous sautez des repas,
- si vous prenez d'autres médicaments ou des remèdes naturels en même temps,
- si vous prenez de trop fortes doses de gliclazide.

Si vous souffrez de troubles hormonaux particuliers (troubles fonctionnels de la glande pineale, de la glande hypophysaire ou du cortex surrénalien),

• si votre fonction rénale ou hépatique est sévèrement diminuée. Si vous avez une hypoglycémie, vous pouvez présenter les symptômes suivants : Maux de tête, faim intense, nausées, vomissements, fatigue, troubles du sommeil, agitation, agressivité, manque de concentration, vigilance et temps de réactions diminués, dépression, confusion, troubles de la parole ou de la vision, tremblements, troubles sensoriels, vertiges et sensation d'impulsion.

Les signes et symptômes suivants peuvent aussi survenir : transpiration, peau moite, anxiété, battements du cœur rapides ou irréguliers, augmentation de la pression artérielle, forte douleur subite dans la poitrine qui peut irradier dans les zones proches (angine de poitrine).

Si le taux de sucre dans le sang continue à baisser, vous pouvez souffrir d'une confusion importante (délire), présenter des convulsions, perdre votre sang froid, votre respiration peut être superficielle et les battements de votre cœur ralentis, vous pouvez perdre conscience.

Dans la plupart des cas, les symptômes d'une hypoglycémie disparaissent très rapidement si vous consommez du sucre, par exemple des comprimés de glucose, morceaux de sucre, jus de fruits, thé sucré.

Vous devez donc toujours avoir sur vous du sucre (comprimés de glucose, morceaux de sucre). Souvenez-vous que les édulcorants ne sont pas efficaces. Veuillez contacter votre médecin ou l'hôpital le plus proche si la prise de sucre n'est pas efficace ou si les symptômes réapparaissent.

Les symptômes d'une hypoglycémie peuvent être absents, être moins évidents ou se développer très lentement ou vous pouvez ne pas vous rendre compte à temps que votre taux de sucre dans le sang a baissé. Ceci peut se produire chez les personnes âgées qui prennent certains médicaments (par exemple les médicaments agissant sur le système nerveux central et les bêta-bloquants).

Si vous êtes en situation de stress (par exemple accidents, opération chirurgicale, fièvre, ...), votre médecin peut temporairement faire un relais par un traitement par insuline.

Les symptômes d'une hyperglycémie (fort taux de sucre dans le sang) peuvent survenir lorsque le traitement par gliclazide n'a pas encore suffisamment réduit la glycémie, lorsque vous n'avez pas respecté le traitement prescrit par votre médecin si vous prenez des préparations à base de Milperpetus (Hypericum perforatum) (voir rubrique «Autres médicaments et DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée») ou dans des situations particulières de stress. Ces derniers peuvent inclure soif, envie fréquente d'uriner, bouche sèche, peau sèche qui démarre, infections de la peau et performances réduites.

Si ces symptômes surviennent, vous devez contacter votre médecin ou votre pharmacien. Une perturbation de la glycémie (faible ou fort taux de sucre dans le sang) peut survenir lorsque le gliclazide est prescrit en même temps que des médicaments de la classe des antibiotiques appelés fluoroquinolones, en particulier chez les patients âgés. Dans ce cas, votre médecin vous rappellera l'importance de surveiller votre glycémie.

Si vous avez des antécédents familiaux ou si vous êtes atteint d'un déficit en Glucose-6-Phosphate-Déshydrogénase (G6PD) (anomalie des globules rouges), une baisse du taux d'hémoglobine et une destruction des globules rouges (anémie hémolytique) peuvent survenir.

Des cas de porphirie aiguë ont été décrits avec d'autres médicaments de la classe des sulfonylurées chez les patients atteints de porphirie (maladies génétiques héréditaires provoquant une accumulation dans l'organisme de porphyrines ou de précurseurs de porphyrines).

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

Enfants

DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée, n'est pas recommandé chez l'enfant en raison d'un manque de données.

Autres médicaments et DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

L'effet hypoglycémiant du gliclazide peut être renforcé et les signes d'une hypoglycémie peuvent survenir lorsque vous prenez l'un des médicaments suivants :

- autres médicaments utilisés pour traiter une hyperglycémie (antidiabétiques oraux, agonistes des récepteurs GLP-1 ou insuline),
 - antibiotiques (par exemple sulfamides, clarithromycine),
 - médicaments pour traiter l'hypertension ou l'insuffisance cardiaque (bêta-bloquants, inhibiteurs de l'enzyme de conversion tels que captopril ou enalapril),
 - médicaments pour traiter les infections fongiques (miconazole, fluconazole),
 - médicaments pour traiter les ulcères de l'estomac ou du duodénum (antagonistes des récepteurs H2);
 - médicaments pour traiter la dépression (inhibiteurs de la monoamine oxydase),
 - analgésiques ou antirhumatisants,
 - médicaments contenant l'effet hypoglycémiant du gliclazide.
- lorsque vous prenez l'un de :
- médicaments pour traiter le diabète (insuline),
 - médicaments réduisant le taux de sucre dans le sang (sulfonylurées, ritodrine et terbutaline),
 - médicaments pour traiter l'endométriose (danazol),
 - Préparations à base de N.
- Une perturbation de la glycémie peut survenir lorsque DIAMICRON 60 mg est pris avec :
- classe des antibiotiques app

DIAMICRON® 60 mg

Gliclazide

Comprimés sécables à Libération Modifiée

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice, voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée ?
3. Comment prendre DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE DIAMICRON 60 MG, COMPRIMÉ SÉCABLE À LIBÉRATION MODIFIÉE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : sulfamide hypoglycémiant - dérivé de l'urée - code ATC : A10BB09

DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée est un médicament qui réduit le taux de sucre dans le sang (antidiabétique oral appartenant à la classe des sulfonylurées).

DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée est indiqué dans certaines formes de diabète (diabète de type 2 non insulino-dépendant) chez l'adulte, lorsque le régime alimentaire, l'exercice physique et la perte de poids seuls ne sont pas suffisants pour obtenir une glycémie (taux de sucre dans le sang) normale.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE DIAMICRON 60 MG, COMPRIMÉ SÉCABLE À LIBÉRATION MODIFIÉE ?

Ne prenez jamais DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée :

- si vous êtes allergique au gliclazide ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6, ou à d'autres médicaments de la même classe (sulfonylurées), ou à d'autres médicaments apparentés (sulfamides hypoglycémiants) ;
- si vous avez un diabète insulino-dépendant (de type 1) ;
- si vous avez des corps cétoniques et du sucre dans vos urines (ce qui peut signifier que vous avez une acidocétose diabétique), un pré-coma ou un coma diabétiques ;
- si vous souffrez d'insuffisances rénale ou hépatique sévères ;
- si vous prenez des médicaments pour traiter des infections fongiques (miconazole) (voir rubrique «Autres médicaments et DIAMICRON 60mg, comprimé sécable à libération modifiée») ;
- si vous allez (voir rubrique «Grossesse, allaitement et fertilité»).

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée.

Vous devez respecter le traitement prescrit par votre médecin pour atteindre une glycémie normale. Cela signifie qu'à part la prise régulière du traitement, vous respectez un régime alimentaire, faites de l'exercice physique et, quand cela est nécessaire, perdez du poids.

Durant le traitement par gliclazide, un contrôle régulier de votre taux de sucre dans le sang (et éventuellement dans les urines), et également de votre héoglobine glyquée (HbA1c), est nécessaire.

Dans les premières semaines de traitement, le risque d'hypoglycémie (faible taux de sucre dans le sang) peut être augmenté. Dans ce cas, un contrôle médical rigoureux est nécessaire.

Une hypoglycémie peut survenir :

- si vous prenez vos repas de manière irrégulière ou si vous sautez un repas,
- si vous jeûnez,
- si vous êtes malnutri,
- si vous changez de régime alimentaire,
- si vous augmentez votre activité physique et que votre apport en hydrates de carbone ne compense pas cette augmentation,
- si vous buvez de l'alcool, en particulier si vous sautez des repas,
- si vous prenez d'autres médicaments ou des remèdes naturels en même temps,
- si vous prenez de trop fortes doses de gliclazide,

• si vous souffrez de troubles hormonaux particuliers (troubles fonctionnels de la glande pineale, de la glande hypophysaire ou du cortex surrénalien),

• si votre fonction rénale ou hépatique est sévèrement diminuée. Si vous avez une hypoglycémie, vous pouvez présenter les symptômes suivants : Maux de tête, faim intense, nausées, vomissements, fatigue, troubles du sommeil, agitation, agressivité, manque de concentration, vigilance et temps de réactions diminués, dépression, confusion, troubles de la parole ou de la vision, tremblements, troubles sensoriels, vertiges et sensation d'impulsion.

Les signes et symptômes suivants peuvent aussi survenir : transpiration, peau moite, anxiété, battements du cœur rapides ou irréguliers, augmentation de la pression artérielle, forte douleur subite dans la poitrine qui peut irradier dans les zones proches (angine de poitrine).

Si le taux de sucre dans le sang continue à baisser, vous pouvez souffrir d'une confusion importante (délire), présenter des convulsions, perdre votre sang froid, votre respiration peut être superficielle et les battements de votre cœur ralentis, vous pouvez perdre conscience.

Dans la plupart des cas, les symptômes d'une hypoglycémie disparaissent très rapidement si vous consommez du sucre, par exemple des comprimés de glucose, morceaux de sucre, jus de fruits, thé sucré.

Vous devez donc toujours avoir sur vous du sucre (comprimés de glucose, morceaux de sucre). Souvenez-vous que les édulcorants ne sont pas efficaces. Veuillez contacter votre médecin ou l'hôpital le plus proche si la prise de sucre n'est pas efficace ou si les symptômes réapparaissent.

Les symptômes d'une hypoglycémie peuvent être absents, être moins évidents ou se développer très lentement ou vous pouvez ne pas vous rendre compte à temps que votre taux de sucre dans le sang a baissé. Ceci peut se produire chez les personnes âgées qui prennent certains médicaments (par exemple les médicaments agissant sur le système nerveux central et les bêta-bloquants).

Si vous êtes en situation de stress (par exemple accidents, opération chirurgicale, fièvre, ...), votre médecin peut temporairement faire un relais par un traitement par insuline.

Les symptômes d'une hyperglycémie (fort taux de sucre dans le sang) peuvent survenir lorsque le traitement par gliclazide n'a pas encore suffisamment réduit la glycémie, lorsque vous n'avez pas respecté le traitement prescrit par votre médecin si vous prenez des préparations à base de Millepertuis (Hypericum perforatum) (voir rubrique «Autres médicaments et DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée») ou dans des situations particulières de stress. Ces derniers peuvent inclure soif, envie fréquente d'uriner, bouche sèche, peau sèche qui démarre, infections de la peau et performances réduites.

Si ces symptômes surviennent, vous devez contacter votre médecin ou votre pharmacien. Une perturbation de la glycémie (faible ou fort taux de sucre dans le sang) peut survenir lorsque le gliclazide est prescrit en même temps que des médicaments de la classe des antibiotiques appelés fluoroquinolones, en particulier chez les patients âgés. Dans ce cas, votre médecin vous rappellera l'importance de surveiller votre glycémie.

Si vous avez des antécédents familiaux ou si vous êtes atteint d'un déficit en Glucose-6-Phosphate-Déshydrogénase (G6PD) (anomalie des globules rouges), une baisse du taux d'hémoglobine et une destruction des globules rouges (anémie hémolytique) peuvent survenir.

Des cas de porphirie aiguë ont été décrits avec d'autres médicaments de la classe des sulfonylurées chez les patients atteints de porphirie (maladies génétiques héréditaires provoquant une accumulation dans l'organisme de porphyrines ou de précurseurs de porphyrines).

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

Enfants

DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée, n'est pas recommandé chez l'enfant en raison d'un manque de données.

Autres médicaments et DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

L'effet hypoglycémiant du gliclazide peut être renforcé et les signes d'une hypoglycémie peuvent survenir lorsque vous prenez l'un des médicaments suivants :

- autres médicaments utilisés pour traiter une hyperglycémie (antidiabétiques oraux, agonistes des récepteurs GLP-1 ou insuline),
- antibiotiques (par exemple sulfamides, clarithromycine),
- médicaments pour traiter l'hypertension ou l'insuffisance cardiaque (bêta-bloquants, inhibiteurs de l'enzyme de conversion tels que captopril ou enalapril),
- médicaments pour traiter les infections fongiques (miconazole, fluconazole),
- médicaments pour traiter les ulcères de l'estomac ou du duodénum (antagonistes des récepteurs H2);
- médicaments pour traiter la dépression (inhibiteurs de la monoamine oxydase),
- analgésiques ou antirhumatisants,
- médicaments contenant l'effet hypoglycémiant du gliclazide.

lorsque vous prenez l'un de :

- médicaments pour traiter le diabète (insuline),

• médicaments réduisant le taux de sucre dans le sang (sulfonylurées),

• médicaments pour traiter l'asthme (ritodiméthine et terbutaline),

• médicaments pour traiter l'endométriose (danazol),

• Préparations à base de N.

Une perturbation de la glycémie peut survenir lorsque DIAMICRON 60 mg est pris avec :

• classe des antibiotiques appartenant à la

DIAMICRON® 60 mg

Gliclazide

Comprimés sécables à Libération Modifiée

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice, voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée ?
3. Comment prendre DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE DIAMICRON 60 MG, COMPRIMÉ SÉCABLE À LIBÉRATION MODIFIÉE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : sulfamide hypoglycémiant - dérivé de l'urée - code ATC : A10BB09

DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée est un médicament qui réduit le taux de sucre dans le sang (antidiabétique oral appartenant à la classe des sulfonylurées).

DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée est indiqué dans certaines formes de diabète (diabète de type 2 non insulino-dépendant) chez l'adulte, lorsque le régime alimentaire, l'exercice physique et la perte de poids seuls ne sont pas suffisants pour obtenir une glycémie (taux de sucre dans le sang) normale.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE DIAMICRON 60 MG, COMPRIMÉ SÉCABLE À LIBÉRATION MODIFIÉE ?

Ne prenez jamais DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée :

- si vous êtes allergique au gliclazide ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6, ou à d'autres médicaments de la même classe (sulfonylurées), ou à d'autres médicaments apparentés (sulfamides hypoglycémiants) ;
- si vous avez un diabète insulino-dépendant (de type 1) ;
- si vous avez des corps cétoniques et du sucre dans vos urines (ce qui peut signifier que vous avez une acidocétose diabétique), un pré-coma ou un coma diabétiques ;
- si vous souffrez d'insuffisances rénale ou hépatique sévères ;
- si vous prenez des médicaments pour traiter des infections fongiques (miconazole) (voir rubrique «Autres médicaments et DIAMICRON 60mg, comprimé sécable à libération modifiée») ;
- si vous allez (voir rubrique «Grossesse, allaitement et fertilité»).

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée.

Vous devez respecter le traitement prescrit par votre médecin pour atteindre une glycémie normale. Cela signifie qu'à part la prise régulière du traitement, vous respectez un régime alimentaire, faites de l'exercice physique et, quand cela est nécessaire, perdez du poids.

Durant le traitement par gliclazide, un contrôle régulier de votre taux de sucre dans le sang (et éventuellement dans les urines), et également de votre héoglobine glyquée (HbA1c), est nécessaire.

Dans les premières semaines de traitement, le risque d'hypoglycémie (faible taux de sucre dans le sang) peut être augmenté. Dans ce cas, un contrôle médical rigoureux est nécessaire.

Une hypoglycémie peut survenir :

- si vous prenez vos repas de manière irrégulière ou si vous sautez un repas,
- si vous jeûnez,
- si vous êtes malnutri,
- si vous changez de régime alimentaire,
- si vous augmentez votre activité physique et que votre apport en hydrates de carbone ne compense pas cette augmentation,
- si vous buvez de l'alcool, en particulier si vous sautez des repas,
- si vous prenez d'autres médicaments ou des remèdes naturels en même temps,
- si vous prenez de trop fortes doses de gliclazide.

Si vous souffrez de troubles hormonaux particuliers (troubles fonctionnels de la glande pineale, de la glande hypophysaire ou du cortex surrénalien),

• si votre fonction rénale ou hépatique est sévèrement diminuée. Si vous avez une hypoglycémie, vous pouvez présenter les symptômes suivants : Maux de tête, faim intense, nausées, vomissements, fatigue, troubles du sommeil, agitation, agressivité, manque de concentration, vigilance et temps de réactions diminués, dépression, confusion, troubles de la parole ou de la vision, tremblements, troubles sensoriels, vertiges et sensation d'impulsion.

Les signes et symptômes suivants peuvent aussi survenir : transpiration, peau moite, anxiété, battements du cœur rapides ou irréguliers, augmentation de la pression artérielle, forte douleur subite dans la poitrine qui peut irradier dans les zones proches (angine de poitrine).

Si le taux de sucre dans le sang continue à baisser, vous pouvez souffrir d'une confusion importante (délire), présenter des convulsions, perdre votre sang froid, votre respiration peut être superficielle et les battements de votre cœur ralentis, vous pouvez perdre conscience.

Dans la plupart des cas, les symptômes d'une hypoglycémie disparaissent très rapidement si vous consommez du sucre, par exemple des comprimés de glucose, morceaux de sucre, jus de fruits, thé sucré.

Vous devez donc toujours avoir sur vous du sucre (comprimés de glucose, morceaux de sucre). Souvenez-vous que les édulcorants ne sont pas efficaces. Veuillez contacter votre médecin ou l'hôpital le plus proche si la prise de sucre n'est pas efficace ou si les symptômes réapparaissent.

Les symptômes d'une hypoglycémie peuvent être absents, être moins évidents ou se développer très lentement ou vous pouvez ne pas vous rendre compte à temps que votre taux de sucre dans le sang a baissé. Ceci peut se produire chez les personnes âgées qui prennent certains médicaments (par exemple les médicaments agissant sur le système nerveux central et les bêta-bloquants).

Si vous êtes en situation de stress (par exemple accidents, opération chirurgicale, fièvre, ...), votre médecin peut temporairement faire un relais par un traitement par insuline.

Les symptômes d'une hyperglycémie (fort taux de sucre dans le sang) peuvent survenir lorsque le traitement par gliclazide n'a pas encore suffisamment réduit la glycémie, lorsque vous n'avez pas respecté le traitement prescrit par votre médecin si vous prenez des préparations à base de Milperpetus (Hypericum perforatum) (voir rubrique «Autres médicaments et DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée») ou dans des situations particulières de stress. Ces derniers peuvent inclure soif, envie fréquente d'uriner, bouche sèche, peau sèche qui démarre, infections de la peau et performances réduites.

Si ces symptômes surviennent, vous devez contacter votre médecin ou votre pharmacien. Une perturbation de la glycémie (faible ou fort taux de sucre dans le sang) peut survenir lorsque le gliclazide est prescrit en même temps que des médicaments de la classe des antibiotiques appelés fluoroquinolones, en particulier chez les patients âgés. Dans ce cas, votre médecin vous rappellera l'importance de surveiller votre glycémie.

Si vous avez des antécédents familiaux ou si vous êtes atteint d'un déficit en Glucose-6-Phosphate-Déshydrogénase (G6PD) (anomalie des globules rouges), une baisse du taux d'hémoglobine et une destruction des globules rouges (anémie hémolytique) peuvent survenir.

Des cas de porphirie aiguë ont été décrits avec d'autres médicaments de la classe des sulfonylurées chez les patients atteints de porphirie (maladies génétiques héréditaires provoquant une accumulation dans l'organisme de porphyrines ou de précurseurs de porphyrines).

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

Enfants

DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée, n'est pas recommandé chez l'enfant en raison d'un manque de données.

Autres médicaments et DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

L'effet hypoglycémiant du gliclazide peut être renforcé et les signes d'une hypoglycémie peuvent survenir lorsque vous prenez l'un des médicaments suivants :

- autres médicaments utilisés pour traiter une hyperglycémie (antidiabétiques oraux, agonistes des récepteurs GLP-1 ou insuline),
 - antibiotiques (par exemple sulfamides, clarithromycine),
 - médicaments pour traiter l'hypertension ou l'insuffisance cardiaque (bêta-bloquants, inhibiteurs de l'enzyme de conversion tels que captopril ou enalapril),
 - médicaments pour traiter les infections fongiques (miconazole, fluconazole),
 - médicaments pour traiter les ulcères de l'estomac ou du duodénum (antagonistes des récepteurs H2);
 - médicaments pour traiter la dépression (inhibiteurs de la monoamine oxydase),
 - analgésiques ou antirhumatisants,
 - médicaments contenant l'effet hypoglycémiant du gliclazide.
- lorsque vous prenez l'un des médicaments pour traiter le diabète (bêta-bloquants, médicaments réduisant le taux de sucre dans le sang, médicaments pour traiter ritodrine et terbutaline),
- médicaments pour traiter l'endométriose (danazol),
- Préparations à base de N.

Une perturbation de la glycémie lorsque DIAMICRON 60 mg est pris avec certains médicaments appartenant à la classe des antibiotiques appartenant à la classe des sulfonylurées.

valable 3 mois

Le **16 DEC 2022** /20.....

DECLARATION DE MALADIE CHRONIQUE <input type="checkbox"/>	
(À adresser au médecin conseil de la MUPRAS sous pli confidentiel)	
Je soussigné :
Certifie que Mlle, Mme, M. :	Dr SANDEE, M. MAKHLOUKI Mustapha
Présente Diabète
Nécessitant un traitement d'une durée de : et médical à long court.
Dont ci-joint ordonnance :
(à défaut noter le traitement prescrit)

site : www.mupras.com // mail : pec@mupras.com // tel : 0522-20-45-45 ou 0522-22-78-15 / fax : 0522-22-78-18
Adresse : Center d'affaire Allal Ben Abdellah. 49, Angle Rue Allal Ben Abdellah et Rue Mohammed Fakir
6ème Etage. Casablanca