

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 0000691

Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

Moulay Ali

SAADIL

Date de naissance :

Adresse :

Tél. : 0659692944

Total des frais engagés :

Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation :

19 DEC 2022

Nom et prénom du malade :

Moulay Ali

Age :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :


Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : 20 DEC 2022 / /

Signature de l'adhérent(e) :



8

9

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
18 DEZ 2022	C	1	150,-	DR. SANDAQI Moustapha Né à Dakar - Généraliste Médecin à la Force - Jamia Sabancı Mohammedi - Tél. 66-20-20 SABLANCA

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<i>Pharmacie de Benlamia Nassim Binc 2000</i>	19/12/2022	327,50

ANALYSES - RADIOPHARMACIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Cœfficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

Docteur SANDAOUI Mostafa

الدكتور سنداوي مصطفى

Omnipraticien

Ancien Médecin à L'hôpital AL Hassani Nador

356, Av. Chouhada (en Face Cinéma Saâda)
Hay Mohammadi - Casablanca
Tél : 05 22 60 20 20

الطب العام

طبيب سابق بمستشفى الحسني الناطور

356، ملح الشهداء (مقابل سينما السعادة)

الحي المحمدي - الدار البيضاء

الهاتف : 0522602020

19 DEC 2022

19.02.2017
Natalia Mi ES-8AAD/17

$$98,110 + 3 = 294,30$$

4 Cosmopolitan

57,80+2 imply it +3 7

11560 CD Mar 10

Mib, 8^o + 2 nearly due +⁵
2336° SV Mipentys also

285⁰⁰ in my home + 3
in Promont

by Promod

928.5

14011057

6 118001 130269

COSYREL 5mg/5mg-○
30 comprimés pelliculés sécables
PPV : 98,10 DH
Servier Maroc - Casablanca

14011057

6 118001 130269

COSYREL 5mg/5mg-○
30 comprimés pelliculés sécables
PPV : 98,10 DH
Servier Maroc - Casablanca

14011057

6 118001 130269

COSYREL 5mg/5mg-○
30 comprimés pelliculés sécables
PPV : 98,10 DH
Servier Maroc - Casablanca

ESPECTER LES DOSES PRESCRIPTIONS
احترم الدoses الموصى بها
1. لا يصرف إلا بوصيب وصفة طبية
ste - UNIQUEMENT SUR ORDONNANCE

LOT : 221191
EXP : 09/2025
PPV : 57,80 DH

LOT : 221191
EXP : 09/2025
PPV : 57,80 DH

PROMENOL®

Cimicifuga Racemosa 6.5mg

PROMENOL®

Cimicifuga Racemosa 6.5mg

A consommer de préférence avant fin :

Lot n° :

285,00 DH
Lot : A2204801
Per : 12-2024

NOPM 030

COMPOSITION PAR 1 COMPRIMÉ

Extrait de cimicifuga racemosa (7 : 1) 6,5mg

Excipients : cellulose microcristalline, lactose, croscarmellose de sodium, talc, stéarate de magnésium, dioxyde de silice.

Sans Hormones - Sans Soja

CONSEILS D'UTILISATION

Troubles liés à la ménopause tels que :

- Bouffées de chaleur, accès de sueurs.
- Troubles du sommeil, nervosité et sautes d'humeur.
- Troubles climatériques.

- 1 comprimé 1 fois par jour à prendre avec un grand verre d'eau (matin ou soir, idéalement le soir).

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Tenir hors de la portée des enfants.
- Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
- Conserver dans un endroit sec à l'abri de la lumière et d'humidité.

PRÉSENTATIONS

Boîtes de 30 et de 90 comprimés sous blisters.

*Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts d'un régime alimentaire varié.
COMPLÉMENT ALIMENTAIRE, CE N'EST PAS UN MÉDICAMENT*

N'ONISSA : CAPV 7.270.19 - N° d'enregistrement : DA20181810739DMP/201ICA/v1

Sans Hormones • Sans Soja

Fabriqué par **ISIO LABORATOIRES**, Z.I. Dar Bouazza lot°104-20220-Casablanca-Maroc
Distribué par **ESNAPHARM**, 7 rue abdelmajid benjelloun Maarif extension-Casablanca-Maroc



LIPANTHYL® 160 mg, comprimé pelliculé

Fénofibrate

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

• 69
• 0070809
• A

maphar

ZI Zenata Aïn Sébâa, Casablanca, Maroc
LIPANTHYL® 160 mg CP PEL B30

P.P.V. : 116,80 DH



6 118001 181636

• Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

- Qu'est-ce que LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé ?
- Comment prendre LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé ?
- Contenu de l'emballage et autres informations.
- QU'EST-CE QUE LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

Classe pharmacothérapeutique :

LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé appartient à un groupe de médicaments, appelés fibrates. Ces médicaments sont utilisés pour diminuer les taux de graisses (lipides) dans le sang, comme par exemple les graisses appelées les triglycérides.

LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé est utilisé en complément d'un régime alimentaire pauvre en graisses et d'autres traitements non médicamenteux tels que l'exercice physique et la perte de poids afin de faire baisser les taux de graisses dans le sang.

LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé peut être utilisé en association avec d'autres médicaments [statines] dans le cas où le niveau de graisses dans le sang n'est pas contrôlé avec l'utilisation d'une statine en monothérapie.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé ?

Ne prenez jamais LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé si :

- Vous avez une allergie connue au fénofibrate, ou à l'un des excipients de ce médicament (mentionnés en rubrique 6 « Autres informations »).
- Vous êtes allergique à la cacahuète, à l'huile d'arachide, à la lécithine de soja ou tout produit apparenté.
- Vous avez déjà eu des réactions allergiques ou des lésions cutanées lors d'une exposition au soleil ou à la lumière artificielle UV pendant un traitement médicamenteux (incluant fibrates et un médicament anti-inflammatoire, appelé le cétoprofène).
- Vous avez de graves problèmes de foie, des reins ou de la vésicule biliaire.

de la relire.

médecin ou votre

script. Ne le donnez
nocif, même si les
es.

- Vous avez une pancréatite (inflammation de la glande pancréatique) qui peut conduire à des douleurs abdominales. Cela peut être due à un niveau élevé de certains lipides dans le sang.

Ne prenez pas LIPANTHYL 160 mg si vous avez l'un des cas mentionnés ci-dessus ou si vous avez une réaction allergique à ce médicament. Consultez votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce comprimé pelliculé.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé.

- Vous avez des problèmes hépatiques (problèmes du foie).
- Vous avez une inflammation du foie (jaunisse) avec une coloration jaune de la peau et des yeux, ou une élévation des enzymes du foie (transaminases) dans le sang.
- Vous avez une glande thyroïde pathologique (goitre).

Si l'un des cas mentionnés ci-dessus ou si vous avez une réaction allergique à ce médicament, parlez-en à votre médecin ou pharmacien avant de prendre LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé.

Effets sur les muscles :

Arrêtez de prendre LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé immédiatement votre médecin en cas de :

- de crampes musculaires non explications
- de douleurs de sensibilité ou d'irritation de la peau

Ce médicament peut provoquer des réactions allergiques qui peuvent être graves. Ces réactions peuvent inclure une inflammation et une dégradation musculaire, des problèmes rénaux graves et éventuellement la mort. Votre médecin réalisera un test musculaire avant et après initiation du traitement. Le risque de problèmes musculaires est plus élevé chez les patients. Prévenez votre médecin dans ce cas.

- Vous avez plus de 70 ans,
- Vous avez des problèmes rénaux,
- Vous avez des problèmes thyroïdiens,
- Vous ou un membre proche avez des problèmes musculaires qui sont familiaux,
- Vous consommez de grandes quantités d'alcool,
- Vous prenez des médicaments pour le cholestérol appelés « statines » tels que pravastatine, rosuvastatine ou fluvastatine,
- Vous avez déjà eu des problèmes de foie causés par statines ou fibrates, tels que gemfibrozil.

Si l'un des cas mentionnés ci-dessus ou si vous avez une réaction allergique à ce médicament, parlez-en à votre médecin ou pharmacien avant de prendre LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé.

Enfants

Sans objet.

Autres médicaments et LIPANTHYL 160 mg

Informez votre médecin ou pharmacien si vous avez pris récemment ou pourriez prendre



LIPANTHYL® 160 mg, comprimé pelliculé

Fénofibrate

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

• 6
• 0070809
• A

maphar
ZI Zenata Aïn Sébâa, Casablanca, Maroc
LIPANTHYL® 160 mg CP PEL B30

P.P.V. : 116,80 DH



6 118001 181636

• Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

- Qu'est-ce que LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé ?
- Comment prendre LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé ?
- Contenu de l'emballage et autres informations.
- QU'EST-CE QUE LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

Classe pharmacothérapeutique :

LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé appartient à un groupe de médicaments, appelés fibrates. Ces médicaments sont utilisés pour diminuer les taux de graisses (lipides) dans le sang, comme par exemple les graisses appelées les triglycérides.

LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé est utilisé en complément d'un régime alimentaire pauvre en graisses et d'autres traitements non médicamenteux tels que l'exercice physique et la perte de poids afin de faire baisser les taux de graisses dans le sang.

LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé peut être utilisé en association avec d'autres médicaments [statines] dans le cas où le niveau de graisses dans le sang n'est pas contrôlé avec l'utilisation d'une statine en monothérapie.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé ?

Ne prenez jamais LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé si :

- Vous avez une allergie connue au fénofibrate, ou à l'un des excipients de ce médicament (mentionnés en rubrique 6 « Autres informations »).
- Vous êtes allergique à la cacahuète, à l'huile d'arachide, à la lécithine de soja ou tout produit apparenté.
- Vous avez déjà eu des réactions allergiques ou des lésions cutanées lors d'une exposition au soleil ou à la lumière artificielle UV pendant un traitement médicamenteux (incluant fibrates et un médicament anti-inflammatoire, appelé le cétoprofène).
- Vous avez de graves problèmes de foie, des reins ou de la vésicule biliaire.

de la relire.

médecin ou votre

script. Ne le donnez
nocif, même si les
es.

- Vous avez une pancréatite (inflammation de la glande pancréatique) qui peut conduire à des douleurs abdominales. Cela peut être due à un niveau élevé de certains lipides dans le sang.

Ne prenez pas LIPANTHYL 160 mg si vous avez l'un des cas mentionnés ci-dessus ou si vous avez une réaction allergique à ce médicament. Consultez votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce comprimé pelliculé.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé.

- Vous avez des problèmes hépatiques (problèmes du foie).
- Vous avez une inflammation du foie (jaunisse) avec une coloration jaune de la peau et des yeux, ou une élévation des enzymes du foie (transaminases) dans le sang.
- Vous avez une glande thyroïde (glande située dans le cou) qui fonctionne trop activement (thyroïdite).

Si l'un des cas mentionnés ci-dessus ou si vous avez une réaction allergique à ce médicament, parlez-en à votre médecin ou pharmacien avant de prendre LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé.

Effets sur les muscles :

Arrêtez de prendre LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé immédiatement votre médecin en cas de :

- de crampes musculaires non explications
- de douleurs de sensibilité ou d'irritation dans les muscles

Ce médicament peut provoquer des réactions allergiques qui peuvent être graves. Ces réactions peuvent inclure une inflammation et une dégradation musculaire, des problèmes rénaux graves et éventuellement la mort. Votre médecin réalisera un test musculaire avant et après initiation du traitement. Le risque de problèmes musculaires est plus élevé chez les patients. Prévenez votre médecin dans ce cas.

- Vous avez plus de 70 ans,
- Vous avez des problèmes rénaux,
- Vous avez des problèmes thyroïdiens,
- Vous ou un membre proche de votre famille avez des problèmes musculaires qui sont familiaux,
- Vous consommez de grandes quantités d'alcool,
- Vous prenez des médicaments pour le cholestérol appelés « statines » tels que pravastatine, rosuvastatine ou fluvastatine,
- Vous avez déjà eu des problèmes de foie causés par statines ou fibrates, tels que gemfibrozil.

Si l'un des cas mentionnés ci-dessus ou si vous avez une réaction allergique à ce médicament, parlez-en à votre médecin ou pharmacien avant de prendre LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé.

Enfants

Sans objet.

Autres médicaments et LIPANTHYL 160 mg

Informez votre médecin ou pharmacien avant de prendre LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé si vous avez pris récemment ou pourriez prendre