

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : **0002154** Société :

Actif Pensionné(e) Autre :

Nom & Prénom : **GAJJA OUTI Rachida V^{er} Massami N^o Baneck**

Date de naissance : **Le 13/8/1960**

Adresse : **Rue 127 N^o 56 ouffa Casablanca**

Tél. **06.17.46.57.96** Total des frais engagés : **833,70** Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

**Docteur Amina LATIFI EP. HALLA
Dermatologue - Vénérologue
102, Bd. Oum Errabbi Hay Mazola
Résidence Selina 1^{er} Etage - Casablanca
Tél. : 05 22 89 76 52**

Date de consultation : **08/11/2022**

Nom et prénom du malade : **Présidente** **Présidente** Age :

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : **admission**

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent(e) : **9/11/2022**

Docteur Amina LATIFI EP HALLI

DERMATOLOGIE VENEROLOGIE

Ex. Médecin chef de l'hôpital Aïn Chock

- Maladies de la Peau, Cheveux, Ongles
- Maladies Sexuellement Transmissibles
- Cosmétologie
- Allergologie
- Chirurgie de la peau
- laser



الدكتورة أمينة لطيفي حرم هلي

اختصاصية في الأمراض الجلدية والتالسلية
طبيبة رئيسية سابقاً بمستشفى عين الشق

- أمراض الجلد والشعر والأظافر
- الأمراض التالسلية
- التجميل
- العلاج بالليزر
- جراحات الجلد والأظافر

Casablanca le : 108-11-21

نارسان. رومان
220 x 3
- differente oily skin



290 x 100 mg
- cutacnyl 215 sep



جاف لايك مع بوريليز ميج

- tendance Hydro acne



100 mg

- eau UV Block معك من 50

69,00 x 3 مع سعر 6,50

- ترايلريل 300 mg

لليلي 600 mg

15375

CUTACNYL 2,5 %
Gel pour application locale tube de 40 g
AMM N° 58 DMP/21/NCI
PPV: 29,20 DH
Distribué par SOTHEMA
B.P. N° 1,27182 Bouskoura-Maroc
6 118001 071234

PHARMACIE ELLOTE
NARRE BEUVELLOUN NEAM
313, Rue Oued Tiznit, Casablanca
Tél: 05 22 89 76 52

DIFFERINE 0,1 %
crème, tube de 30 g
AMM N° 291 DMP/21/NCV
PPV : 72,50 DH
Distribué par SOTHEMA
B.P.N° 1,27182 Bouskoura-Maroc
6 118001 070206

DIFFERINE 0,1 %
crème, tube de 30 g
AMM N° 291 DMP/21/NCV
PPV : 72,50 DH
Distribué par SOTHEMA
B.P.N° 1,27182 Bouskoura-Maroc
6 118001 070206

دكتور أمينة لطيفي حرم هلي
Dermatologue - Vénérologie
102, Bd. Oum Errabbi Hay Mazola
Résidence Selma 1er étage - Casablanca
Tél: 05 22 89 76 52

• endocrin radiologie
• gynéco obstétrique

0614790743

Docteur Amina LATIFI Ep. HALLI
Dermatologue - Vénérologue
102, Bd. Oum Errabin Hay Mazola
Résidence Scima 1^{er} Etage - Casablanca
Tél.: 05 22 89 76 52

PHARMACIE EN VENTE
A Mme BENELLA
Dra. LATIFI
Oulfa
Casablanca
05 22 89 76 52

Tetralysal® 300mg



lymécycline

GELULE

TETRALYSAL 300 mg
Boîte de 16 gélules
AMM N°26 DMP/21/NCV
P.P.V : 69.00 DH
Distribué par SOTHEMA
B.P N°1, 27182 Bouskoura-Maroc



6 118001 070800



NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

TETRALYSAL 300 mg, gélule

Lymécycline

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE TETRALYSAL 300 mg, gélule ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TETRALYSAL 300 mg, gélule ?
3. COMMENT PRENDRE TETRALYSAL 300 mg, gélule ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELLES ?
5. COMMENT CONSERVER TETRALYSAL 300 mg, gélule, ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES.

1. QU'EST-CE QUE TETRALYSAL 300 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament est un antibiotique de la famille des tétracyclines.

Ce médicament est indiqué dans le traitement de certaines formes d'acné.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TETRALYSAL 300 mg, gélule ?

Ne prenez jamais TETRALYSAL 300 mg, gélule dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la lymécycline, à l'un des autres composants contenus dans TETRALYSAL 300 mg, gélule ou aux antibiotiques de la famille des tétracyclines.
- Chez l'enfant de moins de 8 ans en raison du risque de coloration permanente des dents de l'enfant et de développement incomplet de l'émail dentaire.
- En association avec les rétinoides administrés par voie orale (médicaments utilisés dans certaines maladies de la peau).

- Diminution des plaquettes (éléments du sang importants dans la coagulation sanguine) (*thrombopénie*).
- Troubles de la vue.
- Inflammation de la langue, inflammation de l'intestin.
- Vomissements.
- Douleur de l'estomac (*épigastralgie*).
- Fièvre.
- Jaunisse.
- Réactions allergiques : urticaire, œdème de Quincke (brusque gonflement du visage et du cou), réaction allergique pouvant être généralisée (œdème, chute de la tension artérielle, gêne respiratoire).
- Augmentations dans le sang des taux de transaminases, phosphatases alcalines et de bilirubine (enzymes du foie).
- Hypertension intracrânienne, sensation de malaise.
- Eruptions cutanées avec rougeur, réactions de photosensibilité (réaction cutanée lors d'une exposition au soleil ou aux UV), démangeaisons, décollement de la peau pouvant rapidement s'étendre de façon très grave à tout le corps (*syndrome de Stevens Johnson*).

D'autres effets indésirables ont été décrits lors de traitement par des tétracyclines :

- En cas d'administration chez l'enfant de moins de 8 ans, coloration anormale et permanente des dents et développement insuffisant de l'émail dentaire.
- Modifications du bilan sanguin (dont la diminution des globules rouges, augmentation de certains globules blancs (*éosinophile*)).
- Augmentation du taux d'urée dans le sang qui peut être intensifiée par l'association avec des médicaments diurétiques.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER TETRALYSAL 300 mg, gélule ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser TETRALYSAL 300 mg, gélule après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

Pas de précautions particulières de conservation.


Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

Tetralysal® 300mg

lymécycline

GELULE

TETRALYSAL 300 mg
Boîte de 16 gélules
AMM N°26 DMP/21/NCV
P.P.V : 69.00 DH
Distribué par SOTHEMA
B.P N°1, 27182 Bouskoura-Maroc



NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

TETRALYSAL 300 mg, gélule

Lymécycline

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE TETRALYSAL 300 mg, gélule ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TETRALYSAL 300 mg, gélule ?
3. COMMENT PRENDRE TETRALYSAL 300 mg, gélule ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELLES ?
5. COMMENT CONSERVER TETRALYSAL 300 mg, gélule ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES.

1. QU'EST-CE QUE TETRALYSAL 300 mg, gélule ET DANS QUELLES CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament est un antibiotique de la famille des tétracyclines.

Ce médicament est indiqué dans le traitement de certaines formes d'acné.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TETRALYSAL 300 mg, gélule ?

Ne prenez jamais TETRALYSAL 300 mg, gélule dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la lymécycline, à l'un des autres composants contenus dans TETRALYSAL 300 mg, gélule ou aux antibiotiques de la famille des tétracyclines.
- Chez l'enfant de moins de 8 ans en raison du risque de coloration permanente des dents de l'enfant et de développement incomplet de l'émail dentaire.
- En association avec les rétinoides administrés par voie orale (médicaments utilisés dans certaines maladies de la peau).

- Diminution des plaquettes (éléments du sang importants dans la coagulation sanguine) (thrombopénie).
- Troubles de la vue.
- Inflammation de la langue, inflammation de l'intestin.
- Vomissements.
- Douleur de l'estomac (épigastralgie).
- Fièvre.
- Jaunisse.
- Réactions allergiques : urticaire, œdème de Quincke (brusque gonflement du visage et du cou), réaction allergique pouvant être généralisée (œdème, chute de la tension artérielle, gêne respiratoire).
- Augmentations dans le sang des taux de transaminases, phosphatases alcalines et de bilirubine (enzymes du foie).
- Hypertension intracrânienne, sensation de malaise.
- Eruptions cutanées avec rougeur, réactions de photosensibilité (réaction cutanée lors d'une exposition au soleil ou aux UV), démangeaisons, décollement de la peau pouvant rapidement s'étendre de façon très grave à tout le corps (*syndrome de Stevens Johnson*).

D'autres effets indésirables ont été décrits lors de traitement par des tétracyclines :

- En cas d'administration chez l'enfant de moins de 8 ans, coloration anormale et permanente des dents et développement insuffisant de l'émail dentaire.
- Modifications du bilan sanguin (dont la diminution des globules rouges, augmentation de certains globules blancs (éosinophile)).
- Augmentation du taux d'urée dans le sang qui peut être intensifiée par l'association avec des médicaments diurétiques.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER TETRALYSAL 300 mg, gélule ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser TETRALYSAL 300 mg, gélule après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

Pas de précautions particulières de conservation.


Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

Tetralysal® 300mg

lymécycline

GELULE

TETRALYSAL 300 mg
Boîte de 16 gélules
AMM N°26 DMP/21/NCV
P.P.V : 69.00 DH
Distribué par SOTHEMA
B.P N°1, 27182 Bouskoura-Maroc



NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

TETRALYSAL 300 mg, gélule

Lymécycline

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE TETRALYSAL 300 mg, gélule ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TETRALYSAL 300 mg, gélule ?
3. COMMENT PRENDRE TETRALYSAL 300 mg, gélule ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELLES ?
5. COMMENT CONSERVER TETRALYSAL 300 mg, gélule ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES.

1. QU'EST-CE QUE TETRALYSAL 300 mg, gélule ET DANS QUELLES CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament est un antibiotique de la famille des tétracyclines.

Ce médicament est indiqué dans le traitement de certaines formes d'acné.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TETRALYSAL 300 mg, gélule ?

Ne prenez jamais TETRALYSAL 300 mg, gélule dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la lymécycline, à l'un des autres composants contenus dans TETRALYSAL 300 mg, gélule ou aux antibiotiques de la famille des tétracyclines.
- Chez l'enfant de moins de 8 ans en raison du risque de coloration permanente des dents de l'enfant et de développement incomplet de l'émail dentaire.
- En association avec les rétinoides administrés par voie orale (médicaments utilisés dans certaines maladies de la peau).

- Diminution des plaquettes (éléments du sang importants dans la coagulation sanguine) (thrombopénie).
- Troubles de la vue.
- Inflammation de la langue, inflammation de l'intestin.
- Vomissements.
- Douleur de l'estomac (épigastralgie).
- Fièvre.
- Jaunisse.
- Réactions allergiques : urticaire, œdème de Quincke (brusque gonflement du visage et du cou), réaction allergique pouvant être généralisée (œdème, chute de la tension artérielle, gêne respiratoire).
- Augmentations dans le sang des taux de transaminases, phosphatases alcalines et de bilirubine (enzymes du foie).
- Hypertension intracrânienne, sensation de malaise.
- Eruptions cutanées avec rougeur, réactions de photosensibilité (réaction cutanée lors d'une exposition au soleil ou aux UV), démangeaisons, décollement de la peau pouvant rapidement s'étendre de façon très grave à tout le corps (*syndrome de Stevens Johnson*).

D'autres effets indésirables ont été décrits lors de traitement par des tétracyclines :

- En cas d'administration chez l'enfant de moins de 8 ans, coloration anormale et permanente des dents et développement insuffisant de l'émail dentaire.
- Modifications du bilan sanguin (dont la diminution des globules rouges, augmentation de certains globules blancs (éosinophile)).
- Augmentation du taux d'urée dans le sang qui peut être intensifiée par l'association avec des médicaments diurétiques.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER TETRALYSAL 300 mg, gélule ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser TETRALYSAL 300 mg, gélule après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

Pas de précautions particulières de conservation.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

Différine

Adapalène

CREME

DIFFERINE 0,1 %
crème, tube de 30 g
AMM N° 291 DMP/21/NCV
PPV: 72,50 DH
Distribué par SOTHEMA
B.P N° 1,27182 Bouskoura - Maroc



6 118001 070206



NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

DIFFERINE 0,1 POUR CENT, crème Adapalène

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE DIFFERINE 0,1 POUR CENT, crème ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER DIFFERINE 0,1 POUR CENT, crème ?
3. COMMENT UTILISER DIFFERINE 0,1 POUR CENT, crème ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER DIFFERINE 0,1 POUR CENT, crème ?
6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES.

1. QU'EST-CE QUE DIFFERINE 0,1 POUR CENT, crème ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

ANTIACNEIQUE LOCAL.

(D. Dermatologie)

Ce médicament est indiqué dans le traitement de l'acné de sévérité moyenne.

QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER DIFFERINE 0,1 POUR CENT ?

Avant d'utiliser DIFFERINE 0,1 POUR CENT, crème en cas d'allergie à l'un des constitutants.

Docteur Amina LATIFI EP HALLI

DERMATOLOGIE VENEROLOGIE

Ex. Médecin chef de l'hôpital Aïn Chock

- Maladies de la Peau, Cheveux, Ongles
- Maladies Sexuellement Transmissibles
- Cosmétologie
- Chirurgie de la peau
- Allergologie
- laser



الدكتورة أمينة لطيفي حرم هلي

اختصاصية في الأمراض الجلدية والت涔سلية

طبيبة رئيسية سابقاً بمستشفي عين الشق

- أمراض الجلد والشعر والأظافر
- التجميل
- الأمراض التناسلية
- العلاج بالليزر
- جراحة الجلد والأظافر

Casablanca le : 22/11/27 الدار البيضاء في :

Demas Nokhaem

- Woodop orix uree

3000 1 ml 100 200
100 200

PHARMACIE EL LOTE
Mme BENZELLOUN NEAMA
373 Bd. Oum Errabii Hay Mazola
Casablanca - Tél. 05 22 89 76 52

Ref 700 m



Ref 700 m

Docteur Amina LATIFI EP. HALLI
Dermatologie - Vénérologie
102, Bd. Oum Errabii Hay Mazola
Résidence Selma 1^{er} Etage - Casablanca
Tél. 05 22 89 76 52

3000

LOCATOP®

Désonide 0,1%

Crème Usage local

LOT : 22E018
PER : 06/2025

LOCATOP 0,1%
CREME T30G

P.P.V : 30DH00



■ IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

Dénomination : LOCATOP® 0,1 %, crème

Composition qualitative / composition quantitative :

Désonide 0,1000 g
Vaseline, paraffine liquide, alcool cétylstéarylique et
éther cétostéarylique de macrogol 1000
(EMULGADE 1000 NI), gallate de propyle, édétate
de sodium, acide sorbique, eau purifiée.

Pour 100 g.

Forme pharmaceutique : Crème, tube de 30 g.

Classe pharmaco-thérapeutique :

GLUCOCORTICOIDE TOPIQUE (D: Dermatologie)

■ DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT :

Ce médicament est préconisé dans certaines maladies de peau comme l'eczéma de contact, la dermatite atopique, le psoriasis, mais votre médecin peut le prescrire dans d'autres cas.

■ ATTENTION !

Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament :

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas