

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 0 Réclamation | : contact@mupras.com |
| 0 Prise en charge | : pec@mupras.com |
| 0 Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

N° W21-653114

MARS

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1103 Société : RAM

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

BENTALMA FATIMA

Date de naissance :

Adresse : 3270636 complexe M&I m'aïn extérieur case

Tél. : 0676 097300

Total des frais engagés : 442,40 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation :

Nom et prénom du malade :

Lien de parenté :

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : 04/11/2022

Signature de l'adhérent(e) :

Le : 04/11/2022

Lui-même

Conjoint

Enfant



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
04.11. 2002	CF		CS	INP : 031140871 Dr A. ZAROURY Ophtalmologiste Ophtalmo Clinique de Casablanca 13, Rue des Papillons - Casablanca - Maroc Tél : 0522 25 11 15 Fax : 0522 25 11 15

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Podologue	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE Bis Rue de Angle 15 Casablanca Maroc Tél : 05 22 88 11 11 Fax : 05 22 88 11 12 E-mail : pharmacie@casablanca.com	04/11/12 08/11/12	384 LL 5800

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

AUXILIAIRES MEDICAUX						
Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.


Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODDF.

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

	H
25533412	21433552
00000000	00000000
D	C
00000000	00000000
35533411	11433553



[Création, remont, adjonction]

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



ORDONNANCE MEDICALE

Casablanca le : 06.11.22

CONCERNANT M.....

- TOBRADEX (collyre)

1 goutte 4 fois par jour

- DICLOCED(collyre)

1goutte 3 fois par jour

- CILOXAN (collyre)

1goutte 4 fois par jour

- TOBRADEX (POMMADE)

1 App . le soir

- PHYLARM

1 RIN le matin et le soir

- SPECTRUM 250MG

1 CP .2fois par jour

- COMPRESSES OPHT SERILES AUTO-
ADHESIF



PHARMACIE LM V
28, Bis Rue Salonique
Angle Rue de Rome - Casa
Tél : 05 22 85 43 95
Fax : 05 22 81 53 31
RC : 318383 - I.F : 15221045
E-mail : lmeds@hotmail.com

Dr A. ZAROURY
Ophthalmo Clinique de Casablanca
13, Rue des Papillons - Oasis - Casablanca
Tél : 0522.25.71.71 - Fax : 0522.25.71.71
Urgence 24/24

Traitement oeil
dit

A/ donner à opticien

Urgence 24/24

NOTICE: INFORMATION DE L'UTILISATEUR

TOBRADEX

Collyre en suspension

Tobramycine/Dexaméthasone

0,3/0,1%

Flacon de 5 ml



6 118001 070176

CILOXAN 0,3% Collyre, flacon de 5 ml

A.M.M. N° 151 DMP/21/NRQ

Laboratoires Sothema

PPV : 45,90 DHS

Remboursable AMO

406434

é de cette notice avant de prendre ce médicament.
avoir besoin de la relire.
ous avez un doute, demandez plus d'informations à votre

meilleur prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, cela
signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin, ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

- 1- Qu'est-ce que **TOBRADEX, collyre en suspension** et dans quels cas est-il utilisé ?
- 2- Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser **TOBRADEX, collyre en suspension** ?
- 3- Comment utiliser **TOBRADEX, collyre en suspension** ?
- 4- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5- Comment conserver **TOBRADEX, collyre en suspension** ?
- 6- Informations supplémentaires.

1- QU'EST-CE QUE TOBRADEX, COLLYRE EN SUSPENSION ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

La suspension ophtalmique TOBRADEX contient les principes actifs tobramycine (antibiotique) et dexaméthasone (glucocorticoïde à action anti-inflammatoire) et s'utilise pour le traitement de certaines inflammations de l'œil accompagnées d'une infection oculaire bactérienne.

La suspension ophtalmique TOBRADEX n'est délivrée que sur ordonnance et doit être utilisée uniquement sur prescription du médecin.

2- QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER TOBRADEX COLLYRE EN SUSPENSION ?

N'utilisez jamais la suspension ophtalmique **TOBRADEX** en présence :

- d'une hypersensibilité (allergie) connue ou supposée à l'une ou l'autre des substances du médicament ;
- d'un glaucome ;
- d'une infection oculaire qui ne peut pas être traitée avec un antibiotique (par ex. certaines affections virales de la cornée ou de la conjonctive) ;
- d'une tuberculose de l'œil ;
- d'un ulcère ou d'une lésion de la cornée (y compris après l'extraction d'un corps étranger sans complications) ;
- d'une mycose oculaire ou d'une parasitose oculaire non traitée.

SPECTRUM® 250 & 500 mg B/10 & B/20 SPECTRUM® 750 mg B/10

Comprimés pelliculés
(Ciprofloxacine)

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.
Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toutes autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'information à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. COMPOSITION DU MEDICAMENT

Substance active :

Ciprofloxacine

Pour 1 comprimé pelliculé

250, 500 ou 750 mg

Excipients communs : croscarmellose sodique, cellulose microcristalline, povidone, stearate de magnésium, silice colloïdale, hypromellose, oxyde de titane, talc, propylène glycol, PEG 6000.

2. CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

Classe pharmaco-thérapeutique : Fluorquinolone - code ATC : J01MA02

SPECTRUM contient une substance active, la ciprofloxacine.

3. INDICATIONS THERAPEUTIQUES

La ciprofloxacine est un antibiotique appartenant à la famille des fluorquinolones. Elle agit en tuant les bactéries responsables des infections. Elle est active uniquement sur certaines souches spécifiques de bactéries.

- Chez l'adulte

SPECTRUM, est utilisé chez l'adulte pour traiter les infections bactériennes suivantes :

- Infections des voies respiratoires
- Infections persistantes ou récurrentes de l'oreille ou des sinus
- Infections urinaires
- Infections de l'appareil génital chez l'homme et chez la femme
- Infections gastro-intestinales et infections intra-abdominales
- Infections de la peau et des tissus mous
- Infections des os et des articulations
- Prévention des infections dues à la bactérie *Neisseria meningitidis*
- Exposition à la maladie du charbon

SPECTRUM, peut être utilisé dans le traitement de patients présentant un faible taux de globules blancs (neutropénie), et ayant de la fièvre, dont on suppose qu'une bactérie en est la cause.

Si vous présentez une infection sévère ou une infection due à différents types de bactéries, un traitement antibiotique additionnel pourra vous être prescrit en complément de SPECTRUM.

- Chez l'enfant et l'adolescent

SPECTRUM, est utilisé chez l'enfant et l'adolescent, sous le contrôle d'un spécialiste, pour traiter les infections bactériennes suivantes :

- Infections des poumons et des bronches chez l'enfant et l'adolescent atteint de mucoviscidose
- Infections urinaires compliquées, y compris les infections ayant atteint les reins (pyélonéphrite)
- Exposition à la maladie du charbon.

SPECTRUM, peut également être utilisé pour traiter d'autres infections sévères spécifiques de l'enfant et de l'adolescent si votre médecin le juge nécessaire.

4. POSOLOGIE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Votre médecin vous expliquera précisément quelle quantité de SPECTRUM vous devez prendre, à quelle fréquence et pendant combien de temps. Ceci dépendra du type d'infection et de sa sévérité.

Prévenez votre médecin si vous avez des problèmes rénaux car la dose de médicament à prendre devra éventuellement être adaptée.

Le traitement dure généralement de 5 à 21 jours mais peut être plus long en cas d'infection sévère. Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. Vérifiez avec votre médecin ou votre pharmacien si vous avez des doutes sur le nombre de comprimés de SPECTRUM, à prendre ou la façon de les prendre.

a. Avez les comprimés avec une grande quantité de boisson. Ne croquez pas les comprimés car ils ont mauvais goût.

b. Essayez de prendre les comprimés à peu près à la même heure chaque jour.

c. Vous pouvez prendre les comprimés au cours ou en dehors des repas. Le calcium présent dans un repas n'a pas d'incidence grave sur l'effet du médicament. Cependant, ne prenez pas les comprimés de SPECTRUM, avec des produits laitiers de type lait ou yaourt ou des jus de fruit enrichis (par ex. jus d'orange enrichi en calcium).

Prenez à boire abondamment pendant le traitement par ce médicament.

5. CONTRE-INDICATIONS

Ne prenez jamais SPECTRUM comprimé pelliculé :

- Si vous êtes allergique à la substance active, aux autres quinolones ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (voir rubrique 1)
- Si vous prenez de la tizanidine (voir rubrique 8)

51,40

• Réaction allergique sévère et soutenue se manifestant par des symptômes tels qu'une oppression de la poitrine, des sensations vertigineuses, une sensation de malaise ou de faiblesse, ou la survenue de sensations vertigineuses lors du passage en position debout (réaction anaphylactique) (voir rubrique 7)

• Faiblesse musculaire, inflammation des tendons qui peut conduire à une rupture des tendons particulier du gros tendon situé à l'arrière de la cheville (tendon d'Achille) (voir rubrique 7)

• Enroulement cutané souvent mettant votre vie en danger, apparaissant généralement sous forme de cloques ou d'ulcérations dans la bouche, la gorge, le nez, les yeux et les autres muqueuses ou les organes génitaux, et pouvant évoluer vers l'apparition de cloques ou d'un décollement de la peau du corps (syndrome de Stevens-Johnson, syndrome de Lyell)

Fréquence Indéterminée (la fréquence ne peut être estimée sur la base des données disponibles)

• Sensations inhabituelles de douleurs, de brûlures, de picotements, d'engourdissement ou de perte de sensation dans les extrémités [neuropathie] (voir rubrique 7)

• Effet indésirable qui entraîne des éruptions cutanées, de la fièvre, une inflammation d'organes et des anomalies hématologiques et une maladie systémique (syndrome d'hypersensibilité médicamenteuse) accompagné d'une eosinophilie et de symptômes systémiques appelé syndrome DRESS [Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptom], PEAG : Pustulose Exanthémato-Genétérique)

D'autres effets indésirables qui ont été observés au cours d'un traitement par SPECTRUM sont ci-dessous, selon leur fréquence de survenue :

Effets indésirables fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 10)

• Nausées, diarrhée

• Douleurs dans les articulations et inflammation des articulations chez l'enfant.

Effets indésirables peu fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 100)

• Douleurs dans les articulations chez l'adulte

• Surinfections longues (dûs à des champignons)

• Taux élevé d'un type de globules blancs (eosinophiles)

• Diminution de l'appétit

• Hyperactivité, agitation

• Maux de tête, sensations vertigineuses, troubles du sommeil, troubles du goût

• Vomissements, douleurs abdominales, problèmes digestifs tels que des problèmes d'indigestion/irritations d'estomac ou flatulences

• Augmentation de la quantité de certaines substances dans le sang (transaminases et/ou bilirubine)

• Enroulement cutané, démangeaison, urticaire

• Altération de la fonction rénale

• Douleurs dans les muscles et les os, sensation de fatigue générale (asthénie), fièvre

• Élevation du taux d'une substance présente dans le sang (phosphatases alcalines).

Effets indésirables rares (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 1000)

• Douleurs musculaires, inflammation des articulations, augmentation du tonus musculaire et crampes

• Inflammation des intestins (colite) liée à l'utilisation d'antibiotiques (peut être fatale dans certains cas) (voir rubrique 7)

• Modification du nombre de certains globules blancs ou des globules rouges (leucopénie, neutropénie, anémie), augmentation ou diminution de la quantité de facteurs présents dans le sang servant à la coagulation sanguine (plaquettes)

• Réaction allergique, gonflement (œdème) ou gonflement rapide de la peau et des muqueuses (urticaire) (voir rubrique 7)

• Augmentation du taux de sucre dans le sang (hyperglycémie)

• Diminution du taux de sucre dans le sang (hypoglycémie) (voir rubrique 7)

• Confusion, désorientation, réactions d'ansieté, rêves étranges, dépression (pouvant conduire à des tentatives de suicide ou à un suicide) (voir rubrique 7), hallucinations

• Fourmillements, sensibilité inhabituelle aux stimuli sensoriels, diminution de la sensibilité (tremblements, vertiges)

• Troubles de la vision, incluant une vision double (voir rubrique 7).

• Bourdonnements d'oreilles, troubles ou perte de l'audition

• Accélération des battements cardiaques (tachycardie)

• Dilatation des vaisseaux sanguins (vasodilatation), baisse de la pression artérielle, évanouissement

• Essoufflement, y compris symptômes asthmatiques

• Troubles hépatiques, jaunisse (clerc cholestéatique), hépatite

• Sensibilité à la lumière (voir rubrique 7)

• Insuffisance rénale, présence de sang ou de cristaux dans les urines, inflammation des voies urinaires

• Rétention d'eau, transpiration excessive

• Augmentation de la concentration dans le sang d'une enzyme issue du pancréas (amylase)

Effets indésirables très rares (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 10 000)

• Type particulier de baisse du nombre de globules rouges dans le sang (anémie hémolytique)

Dicloced 1 mg/ml

Collyre en solution

Diclofénac sodique

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que DICLOCED 1 mg/ml, collyre en solution et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser DICLOCED 1 mg/ml, collyre en solution ?
3. Comment utiliser DICLOCED 1 mg/ml, collyre en solution ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver DICLOCED 1 mg/ml, collyre en solution ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

QU'EST-CE QUE DICLOCED 1 mg/ml, collyre en solution ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique: Anti-inflammatoire non stéroïdiens (AINS) - Code ATC : S01BC03.

Ce médicament contient un anti-inflammatoire non stéroïdiens (AINS) pour la voie ophthalmique.

Il est indiqué au cours de certaines interventions chirurgicales de l'œil et de leurs suites opératoires:

- inhibition du myosis (rétrécissement de la pupille) dans la chirurgie de la cataracte;
- prévention des manifestations postopératoires de la chirurgie de la cataracte;
- l'ostéosynthèse de la tête de l'humerus.

Instructions précédant l'intervention.

Chi

l'oe

DICLOCED 1 mg/ml
Collyre, Flacon de 10 ml - P.P.V : 68,00 DH



6 118001 101948

Distribué par COOPER PHARMA
41, rue Mohamed Diouri, Casablanca

Pharmacien Responsable : Amina DAOUDI

Ma
kér
la

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

les propriétés optimales TOBRADEX contribuent à prévenir certains effets indésirables.

EST-ELLE UTILE ?

OPTHALMIQUE ET DANS QUELS CAS

1- QU'EST-CE QUE TOBRADEX, POMMADÉ

6- Informations supplémentaires.

5- Comment consérer TOBRADEX, Pomma

4- Quels sont les effets indésirables éventuels ?

3- Comment utiliser TOBRADEX, Pomma

2- Utilisez-vous ces informations à connaitre avant

1- Quel est le rôle de TOBRADEX, Pomma ophthallique ?

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin, ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a-t-il causé des signes de leur maladie soit identiques aux vôtres.

Si le dommage jamaïs a déclenché un autre, cela pourrait démarquer plus d'informations à votre pharmacien, ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, rappelez cette notice. Vous pourrez avoir besoin de la utiliser de manière intégrale de cette notice.

Utilisez cette attention pour intégrer l'information de cette notice dans votre pharmacien.

TOBRADEX® est un médicament à base de pomme ophthallique.

Si vous souffrez d'autres maladies ou si vous prenez d'autres médicaments ou si vous utilisez des dispositifs médicaux, informez votre pharmacien.

TOBRADEX® est une pomme ophthallique qui aide à prévenir certains effets indésirables.

TOBRADEX® est une pomme ophthallique qui aide à prévenir certains effets indésirables.

TOBRADEX® est une pomme ophthallique qui aide à prévenir certains effets indésirables.

TOBRADEX® est une pomme ophthallique qui aide à prévenir certains effets indésirables.

TOBRADEX® est une pomme ophthallique qui aide à prévenir certains effets indésirables.

TOBRADEX® est une pomme ophthallique qui aide à prévenir certains effets indésirables.

TOBRADEX® est une pomme ophthallique qui aide à prévenir certains effets indésirables.

TOBRADEX® est une pomme ophthallique qui aide à prévenir certains effets indésirables.

TOBRADEX® est une pomme ophthallique qui aide à prévenir certains effets indésirables.

TOBRADEX® est une pomme ophthallique qui aide à prévenir certains effets indésirables.

TOBRADEX® est une pomme ophthallique qui aide à prévenir certains effets indésirables.

TOBRADEX® est une pomme ophthallique qui aide à prévenir certains effets indésirables.

TOBRADEX® est une pomme ophthallique qui aide à prévenir certains effets indésirables.

TOBRADEX® est une pomme ophthallique qui aide à prévenir certains effets indésirables.

TOBRADEX® est une pomme ophthallique qui aide à prévenir certains effets indésirables.

TOBRADEX® est une pomme ophthallique qui aide à prévenir certains effets indésirables.

TOBRADEX® est une pomme ophthallique qui aide à prévenir certains effets indésirables.

TOBRADEX® est une pomme ophthallique qui aide à prévenir certains effets indésirables.

TOBRADEX® est une pomme ophthallique qui aide à prévenir certains effets indésirables.

TOBRADEX® est une pomme ophthallique qui aide à prévenir certains effets indésirables.

TOBRADEX® est une pomme ophthallique qui aide à prévenir certains effets indésirables.

TOBRADEX® est une pomme ophthallique qui aide à prévenir certains effets indésirables.

TOBRADEX® est une pomme ophthallique qui aide à prévenir certains effets indésirables.

TOBRADEX® est une pomme ophthallique qui aide à prévenir certains effets indésirables.

TOBRADEX® est une pomme ophthallique qui aide à prévenir certains effets indésirables.

TOBRADEX® est une pomme ophthallique qui aide à prévenir certains effets indésirables.

TOBRADEX® est une pomme ophthallique qui aide à prévenir certains effets indésirables.

TOBRADEX® est une pomme ophthallique qui aide à prévenir certains effets indésirables.

TOBRADEX® est une pomme ophthallique qui aide à prévenir certains effets indésirables.

TOBRADEX® est une pomme ophthallique qui aide à prévenir certains effets indésirables.

TOBRADEX® est une pomme ophthallique qui aide à prévenir certains effets indésirables.

TOBRADEX® est une pomme ophthallique qui aide à prévenir certains effets indésirables.

TOBRADEX® est une pomme ophthallique qui aide à prévenir certains effets indésirables.

TOBRADEX® est une pomme ophthallique qui aide à prévenir certains effets indésirables.

TOBRADEX® est une pomme ophthallique qui aide à prévenir certains effets indésirables.

TOBRADEX® est une pomme ophthallique qui aide à prévenir certains effets indésirables.

TOBRADEX® est une pomme ophthallique qui aide à prévenir certains effets indésirables.

TOBRADEX® est une pomme ophthallique qui aide à prévenir certains effets indésirables.

TOBRADEX® est une pomme ophthallique qui aide à prévenir certains effets indésirables.

TOBRADEX® est une pomme ophthallique qui aide à prévenir certains effets indésirables.

TOBRADEX® est une pomme ophthallique qui aide à prévenir certains effets indésirables.

TOBRADEX® est une pomme ophthallique qui aide à prévenir certains effets indésirables.

TOBRADEX® est une pomme ophthallique qui aide à prévenir certains effets indésirables.

TOBRADEX® est une pomme ophthallique qui aide à prévenir certains effets indésirables.

TOBRADEX® est une pomme ophthallique qui aide à prévenir certains effets indésirables.

Tube de 3,5 g

0,3/0,1%


Tobramycine/Dexaméthasone

Pommade ophthalmique

TOBRADEX®

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

NOVARTIS



690206 MA
118001 070690206
9





Maladies et Chirurgie des yeux - Laser - Angiographie - Lentilles de Contact



PT221025124311

Casablanca le :
08 novembre 2022

BEN TALHA FATIMA

52,00

INDOCOLLYRE 0.1 %



1 goutte 3 fois par jour, dans les deux yeux, pendant 1 Mois

PHARMACIE NAPOLEON
Angle Rue d'Oradour sur Glane
et Rue des Papillotes N° 1
Oasis Casablanca
Tél. : 0522.25.02.84

INDOCOLLYRE 0,1% O LOT/ عقار
Collyre 5ml صنع في المغرب
ZENITH PHARMA EXP/ انتهاء الصلاحية
AMN N°155/19/DMP/21/NRQDNM
Barcode
611801270088 PPV : 58,00 DHS
H8041
01-2022
06-2023

Dr A. ZAROURY
Ophtalmologiste
Ophtalmo Clinique de Casablanca
13, Rue des Papillons Oasis - Casablanca
Tél. : 0522.25.11.15 (LG) - Fax : 0522.25.11.15

Urgence 24/24

Sarl au Capital de 1 200 000,00 MAD - 13, Rue des Papillons - Oasis - Casablanca

Tél. (LG) : 05.22.25.71.71 - Fax : 05.22.25.11.15 - Web : www.oct.ma

RC : 416933 - I.F : 1051442 - T.P : 34788018 - C.N.S.S. : 6448395 - I.C.E. : 002077199000057