

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 7673

Société : Royal Air Maroc

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : BENBIRI TAJANI

112347

Date de naissance : 13.03.1946


Adresse : BP 213

Tél. : 0661316261

Total des frais engagés : 965,40 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Dr. Talbi Ahmed
DOCTEUR
GENERALISTE
شارع الحسن الثاني
36
الحاج
All. Hassan II - EL HAJEB
05 35 54 30 88

Date de consultation : 12/12/2022

Nom et prénom du malade : H.T.A

Age :

Lien de parenté : Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie : H.T.A

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC

Pathologie : H.T.A

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : 12/12/2022

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien et du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Pharmacie Nouvelle Mme DOUNYA MOHATTANE 42, Avenue Hassan II <u>El Hajeb</u> Tél. : 05 35 54 31 78	12/12/2022	815,40

INPE 132045738

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
D	
00000000	00000000
35533411	11433553

[Création, remont, adjonction]

Fonctionnel. Thérapeutique nécessaire à la profession

A diagram of a dental arch (maxilla) with numbered teeth (1 through 8) on both the upper and lower arches. The teeth are arranged in a curve, with 1 at the anterior midline and 8 at the posterior molars. A coordinate system is overlaid on the arch, with the vertical axis labeled 'H' at the top, the horizontal axis labeled 'D' on the left, and the diagonal axis labeled 'B' at the bottom. The teeth are also labeled with their respective numbers (1-8) on both the upper and lower arches.

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISAS ET SACHETS DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXÉCUTION

Docteur TALBI Ahmed

Médecine Générale

DIPLOME DE LA FACULTE

DE MEDECINE DE RABAT

DIPLOME D'UNIVERSITE

D'ASTHMOLOGIE

36, Av. Hassan II - EL-HAJEB

Tél. { C. 05.35.54.30.88
D. 05.35.54.34.26

الدكتور طالبي أحمد

الطب العام

خريج كلية الطب بالرباط

وبليوم جامعي في الربو

36, شارع الحسن الثاني - الحاجب

05.35.54.30.88. ع
05.35.54.34.26. م

EL Hajeb, le 12/12/2022 الحاجب في

م. بن بني تبانى

97,60x3 Civartia q 27g - 135€, 195 - 13mois



31,30x3 Zyberic q 20g 135€, 195 - 13mois



122,10x3 Triatec q 8mg (30) 195 - 13mois



20,80x3 Zephage 50g (36) 195 - 13mois



815,40 195 - 13mois

الدكتور طالبي أحمد
الطب العام
نباشي، الحاجب
36, Av. Hassan II
05 35 54 30 88

Pharmacie Nouvelle

Mme DOUNYA MOHATTANE

42, Avenue Hassan II

El Hajeb

Tél. : 05 35 54 30 38

Ramipril

Comprimé

sanofi aventis

Cette notice étant régulièrement remise à jour, il convient de la lire attentivement avant d'utiliser une nouvelle boîte. Pour toute question ne pas hésiter à contacter votre médecin ou pharmacien.

COMPOSITION

TRIATEC® 1,25 mg : Ram

TRIATEC® 2,5 mg : Ramip

TRIATEC® 5 mg : Ramipril

TRIATEC® Protect 10 mg :

Excipients (communs) :

prégélatinisé, cellulose microcristalline, stearylumarate de sodium, oxyde de fer jaune (pour TRIATEC® 2,5 mg), oxyde de fer rouge (pour TRIATEC® 5 mg).

122,10

FORME PHARMACEUTIQUE ET PRÉSENTATIONS

TRIATEC® 1,25 mg : comprimés dosés à 1,25 mg, boîte de 30.

TRIATEC® 2,5 mg : comprimés dosés à 2,5 mg, boîte de 30.

TRIATEC® 5 mg : comprimés dosés à 5 mg, boîtes de 15 et 30.

TRIATEC® Protect 10 mg : comprimés dosés à 10 mg, boîtes de 15 et 30.

INDICATIONS

- Hypertension artérielle.
- Insuffisance cardiaque.
- Réduction de la mortalité en cas d'insuffisance cardiaque après la phase aiguë d'un infarctus du myocarde.
- Néphropathie glomérulaire manifeste avec ou sans diabète.
- Début de néphropathie diabétique chez les patients souffrant de diabète du type II et d'hypertension artérielle.
- Maladie vasculaire avec athérosclérose établie (avec ou sans diabète de type II) : prévention de l'infarctus du myocarde, de l'accident vasculaire cérébral ou des décès cardiovasculaires.

CONTRE-INDICATIONS

- Hypersensibilité au ramipril, à un autre inhibiteur de l'enzyme de

Ramipril

Comprimé

sanofi aventis

Cette notice étant régulièrement remise à jour, il convient de la lire attentivement avant d'utiliser une nouvelle boîte. Pour toute question ne pas hésiter à contacter votre médecin ou pharmacien.

COMPOSITION

TRIATEC® 1,25 mg : Ram

TRIATEC® 2,5 mg : Ramip

TRIATEC® 5 mg : Ramipril

TRIATEC® Protect 10 mg :

Excipients (communs) :

prégélatinisé, cellulose microcristalline, stearylumarate de sodium, oxyde de fer jaune (pour TRIATEC® 2,5 mg), oxyde de fer rouge (pour TRIATEC® 5 mg).

122,10

FORME PHARMACEUTIQUE ET PRÉSENTATIONS

TRIATEC® 1,25 mg : comprimés dosés à 1,25 mg, boîte de 30.

TRIATEC® 2,5 mg : comprimés dosés à 2,5 mg, boîte de 30.

TRIATEC® 5 mg : comprimés dosés à 5 mg, boîtes de 15 et 30.

TRIATEC® Protect 10 mg : comprimés dosés à 10 mg, boîtes de 15 et 30.

INDICATIONS

- Hypertension artérielle.
- Insuffisance cardiaque.
- Réduction de la mortalité en cas d'insuffisance cardiaque après la phase aiguë d'un infarctus du myocarde.
- Néphropathie glomérulaire manifeste avec ou sans diabète.
- Début de néphropathie diabétique chez les patients souffrant de diabète du type II et d'hypertension artérielle.
- Maladie vasculaire avec athérosclérose établie (avec ou sans diabète de type II) : prévention de l'infarctus du myocarde, de l'accident vasculaire cérébral ou des décès cardiovasculaires.

CONTRE-INDICATIONS

- Hypersensibilité au ramipril, à un autre inhibiteur de l'enzyme de

Ramipril

Comprimé

sanofi aventis

Cette notice étant régulièrement remise à jour, il convient de la lire attentivement avant d'utiliser une nouvelle boîte. Pour toute question ne pas hésiter à contacter votre médecin ou pharmacien.

COMPOSITION

TRIATEC® 1,25 mg : Ram

TRIATEC® 2,5 mg : Ramip

TRIATEC® 5 mg : Ramipril

TRIATEC® Protect 10 mg :

Excipients (communs) :

prégélatinisé, cellulose microcristalline, stearylumarate de sodium, oxyde de fer jaune (pour TRIATEC® 2,5 mg), oxyde de fer rouge (pour TRIATEC® 5 mg).

122,10

FORME PHARMACEUTIQUE ET PRÉSENTATIONS

TRIATEC® 1,25 mg : comprimés dosés à 1,25 mg, boîte de 30.

TRIATEC® 2,5 mg : comprimés dosés à 2,5 mg, boîte de 30.

TRIATEC® 5 mg : comprimés dosés à 5 mg, boîtes de 15 et 30.

TRIATEC® Protect 10 mg : comprimés dosés à 10 mg, boîtes de 15 et 30.

INDICATIONS

- Hypertension artérielle.
- Insuffisance cardiaque.
- Réduction de la mortalité en cas d'insuffisance cardiaque après la phase aiguë d'un infarctus du myocarde.
- Néphropathie glomérulaire manifeste avec ou sans diabète.
- Début de néphropathie diabétique chez les patients souffrant de diabète du type II et d'hypertension artérielle.
- Maladie vasculaire avec athérosclérose établie (avec ou sans diabète de type II) : prévention de l'infarctus du myocarde, de l'accident vasculaire cérébral ou des décès cardiovasculaires.

CONTRE-INDICATIONS

- Hypersensibilité au ramipril, à un autre inhibiteur de l'enzyme de

CIVASTINE®

Simvastatine

Comprimé pelliculé

PPV : 97DH60

PER : 11/23

LOT : K3127-2

ce avant d'utiliser ce médicament.

es d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien, mais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes

lat indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en

à votre médecin ou à votre pharmacien.

Forme pharmaceutique et contenu :

CIVASTINE® 10 mg comprimé pelliculé Boîte de 28.

CIVASTINE® 20 mg comprimé pelliculé Boîte de 15 et 30.

CIVASTINE® 40 mg comprimé pelliculé Boîte de 30.

Composition du médicament :

Composition qualitative et quantitative en substance active par unité de prise.

Simvastatine 10 mg

Simvastatine 20 mg

Simvastatine 40 mg

Les autres composants sont :

Excipients : lactose anhydre, cellulose microcristalline, amidon prégalatinisé, crospovidone, butylhydroxyanisole, acide ascorbique, acide citrique anhydre, stéarate de magnésium, éthanol éthylique 96%, opadry blanc.

Liste des excipients à effet notable : lactose, butylhydroxyanisole, éthanol éthylique.

Classe pharmacothérapeutique :

Ce médicament est un hypolipémiant.

Indications thérapeutiques :

CIVASTINE® est un médicament utilisé pour faire baisser les taux de cholestérol total, du mauvais cholestérol (cholestérol LDL), et des substances grasses appelées triglycérides dans le sang. De plus, CIVASTINE® augmente les niveaux de bon cholestérol (cholestérol HDL). CIVASTINE® fait partie de la classe des médicaments appelés statines.

Le cholestérol est une des nombreuses substances grasses trouvées dans le système sanguin. Votre cholestérol total est composé principalement de cholestérol LDL et de cholestérol HDL.

La LDL cholestérol est souvent appelé le « mauvais » cholestérol parce qu'il peut s'agglomérer sur les parois de vos artères en formant une plaque. Finalement, la création de cette plaque peut mener à un rétrécissement des artères. Ce rétrécissement peut entraîner ou bloquer le flux sanguin vers les organes vitaux comme le cœur et le cerveau. Ce blocage du flux sanguin peut entraîner une crise cardiaque ou une attaque cérébrale.

Le HDL cholestérol est souvent appelé le « bon » cholestérol parce qu'il aide à empêcher le mauvais cholestérol de s'agglomérer dans les artères et protège contre les maladies cardiaques.

Les triglycérides sont une autre forme de graisse dans votre sang qui peuvent augmenter votre risque de maladie cardiaque.

Vous devez pourvoir un régime hypocholestérolématique pendant la prise de ce médicament.

CIVASTINE® est utilisé en complément d'un régime hypocholestérolématique, si vous avez :

- Un taux élevé de cholestérol dans votre sang (hypercholestérolémie primaire) ou des niveaux élevés de graisse dans votre sang (diabète sucré mixte),
- Une maladie héréditaire (hypercholestérolémie familiale homozygote) qui augmente le taux de cholestérol dans le sang. Vous pouvez également recevoir d'autres traitements,

- Une insuffisance coronarienne ou un risque élevé d'insuffisance coronarienne (parce que vous avez un diabète, un antécédent d'accident vasculaire cérébral ou une maladie vasculaire de l'origine athéroscléroseuse). CIVASTINE® peut prolonger votre vie en réduisant le risque de problèmes cardiaques, indépendamment de la quantité de votre cholestérol sanguin.

Chez la plupart des gens, il n'y a pas de symptôme immédiat dû à un taux élevé de cholestérol. Votre médecin peut mesurer votre cholestérol à l'aide d'un simple test sanguin. Consultez votre médecin régulièrement, vérifiez votre cholestérol, et discutez avec votre médecin des résultats à atteindre.

Posologie :

Votre médecin déterminera la posologie en fonction de votre état de santé, de votre traitement en cours tout en tenant compte de vos facteurs de risque. Toujours prendre ce médicament comme votre médecin vous l'a indiqué. Vérifiez avec votre médecin ou votre pharmacien si vous n'êtes pas sûr.

Vous devez suivre un régime faisant baisser le cholestérol pendant le traitement par CIVASTINE®.

Mode et voie d'administration :

Prenez CIVASTINE® en prise unique le soir. Vous pouvez le prendre avec ou sans aliments.

Durée du traitement :

Continuez à prendre CIVASTINE®, à moins que votre médecin ne vous demande d'arrêter.

Si votre médecin vous a prescrit CIVASTINE® avec un autre médicament qui fait baisser le cholestérol contenant un chélateur de l'acide biliaire, vous devez prendre CIVASTINE® au moins 2 heures avant ou 4 heures après avoir pris le chélateur de l'acide biliaire.

Dosage :

La dose recommandée est de 1 comprimé de CIVASTINE® 10 mg, 20 mg, 40 mg, par voie orale, par jour.

Adultes :

La dose habituelle de départ est de 10, 20 mg ou dans quelques cas 40 mg par jour. Votre médecin pourra ajuster la posologie après au moins 4 semaines de traitement à une dose maximum de 80 mg/jour. Ne prenez pas plus de 80 mg par jour.

Votre médecin peut vous prescrire un plus faible dosage, surtout si vous prenez certains des médicaments listés ci-dessus, ou si vous avez des problèmes rénaux.

La dose de 80 mg est uniquement recommandée aux patients adultes à très haut taux de cholestérol et à fort risque de problèmes cardiaques et qui n'ont pas atteint le taux de cholestérol souhaité à de faibles doses.

Enfants :

Pour les enfants (âgés de 10 à 17 ans), la dose usuelle recommandée pour débuter le traitement est de 10 mg par jour à prendre le soir. La dose maximale recommandée est de 40mg par jour.

Contre-indications :

- Ne prenez jamais CIVASTINE® dans les cas suivants :
 - Si vous êtes allergique (hypersensibilité) à la simvastatine ou à l'un des ingrédients.
 - Si vous avez actuellement des problèmes hépatiques.
 - Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.
 - Si vous prenez un (des) médicament(s) avec un ou plus d'un des principaux de l'itraconazole, du ketoconazole, du posaconazole ou du voriconazole (de l'érythromycine, de la clarithromycine ou de la tétracycline (utilisés pour traiter les infections par le VIH tels qu'indinavir, nelfinavir, ritonavir, etc.).
 - Si vous prenez ou avez pris, dans les 7 derniers jours, ou si vous avez les infections bactériennes),
 - Si vous prenez ou avez pris, dans le traitement des infections par la néfazodone (utilisé dans le traitement de la dépression), dû à l'azéthioprine (utilisé pour bloquer le cholestérol), de la ciclosporine (utilisé chez les patients transplantés), du dompérol (une hormone de synthèse, utilisée pour traiter l'endométriose).
 - Si vous prenez ou avez pris, dans les 7 derniers jours, ou si vous avez les infections bactériennes),
- Demandez à votre médecin si vous n'êtes pas certain que votre médicament.

Effets Indésirables :

Comme tous les médicaments, CIVASTINE® est susceptible d'avoir des effets indésirables. Les termes suivants sont utilisés pour décrire la fréquence à laquelle les effets suivants sont observés :

- Rares (peuvent affecter jusqu'à 1 patient sur 1 000).
- Très rares (peuvent affecter jusqu'à 1 patient sur 10 000).
- Indéterminées (fréquence ne peut être estimée à partir des données des effets suivants ont été rarement rapportés :).

Si l'un de ces effets graves survient, arrêtez de prendre ce médicament ou rendez-vous au service des urgences.

- Douleurs musculaires, sensibilité musculaire, faiblesse musculaire ou y compris une atteinte musculaire provoquant des problèmes rénaux et/ou cardiaques.
- Réactions d'hypersensibilité (allergie) incluant :
 - Gonflement du visage, de la langue et/ou de la gorge pouvant provoquer une asphyxie.
 - Douleurs musculaires graves, généralement dans les épaules et les hanches.
 - Éruption accompagnée d'une faiblesse des membres et des muscles.
 - Douleur ou inflammation des articulations (arthrite inflammatoire).
 - Inflammation des vaisseaux sanguins (vasculite).
 - Bleus exceptionnels, éruptions cutanées et gonflement (dermatomyosite).
 - Essoufflements (dyspnée) et malaises.
 - Syndrome lupique (incluant éruption, troubles des articulations, et malaises).
 - Troubles du foie avec les symptômes suivants : jaunissement de la peau, sensation de fatigue ou faiblesse perte d'appétit, défaillance hépatique (telle que la douleur dans le bas de l'estomac).
 - Inflammation du pancréas souvent avec douleur abdominale sévère.
 - Diminution des globules rouges (anémie).
 - Engourdissement et faiblesse des bras et jambes.
 - Maux de tête, sensation de fourmillement, étourdissement.
 - Problèmes digestifs (douleur abdominale, constipation, flatulence, éruption, démagogies), perte de cheveux,
 - Faiblesse,
 - Sommeil agité (très rare),
 - Mauvaise mémoire (très rare), perte de mémoire, confusion.

Les effets indésirables suivants ont également été rapportés mais la fréquence ne peut être estimée à partir des données des effets suivants :

- Troubles de l'érection,
- Dépression,
- Inflammation des poumons causant des problèmes de respiration dont la toux et la fièvre.
- Problèmes de tendon, parfois compliqués par une rupture du tendon.
- D'autres effets indésirables possibles ont été rapportés avec certains statines.
- Troubles du sommeil, y compris cauchemars,
- Troubles sexuels,
- Diabète. Vous pouvez débuter un diabète si vous avez un taux de sucre (glycémie) élevé avec une pression artérielle (tension) élevée. Vous serez suivis attentivement pour ces tests biologiques :

L'augmentation de certains tests hépatiques et d'une enzyme musculaire.

Mises en garde spéciales et Précautions particulières :

Avertissements et précautions :

Informez votre médecin :

- Si tout problème médical que vous avez ou avez eu et de toute allergie.
- Si vous consommez d'importantes quantités d'alcool.
- Si vous avez ou avez eu une maladie du foie. CIVASTINE® peut ne pas être tolérée.
- Si vous devez subir une opération. Vous pouvez être amené à arrêter ce médicament.
- Si vous êtes asthmatique, parce qu'un dosage différent peut être adapté.
- Votre médecin devra vous prescrire un bilan sanguin avant de commencer le traitement par CIVASTINE®. Ceci pour vérifier le bon fonctionnement du foie.
- Votre médecin peut également vous prescrire un bilan sanguin hépatique pendant par CIVASTINE®.

Au cours de votre traitement avec ce médicament, si vous êtes diabétique suivez attentivement par votre médecin. Vous pouvez débuter un diabète de sucre, si vous êtes en surpoids et si vous avez une pression artérielle (tension) élevée. Informez votre médecin si vous avez une insuffisance respiratoire grave.



ZYLORIC® 100 mg, 200 mg et 300 mg, comprimés

ALLOPURINOL

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que ZYLORIC comprimés, et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ZYLORIC, comprimés ?
3. Comment prendre ZYLORIC comprimés ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ZYLORIC comprimés ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE ZYLORIC comprimés, ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Les comprimés de ZYLORIC contiennent un principe actif appelé l'allopurinol qui agit en ralentissant la vitesse de certaines réactions chimiques dans l'organisme afin de diminuer le taux d'acide urique dans le sang et les urines. ZYLORIC, comprimé est utilisé pour réduire ou prévenir la formation d'urate d'acide urique lorsque votre organisme produit en trop grande quantité une substance appelée l'acide urique. Ces dépôts sont responsables de certains types de calculs rénaux ou de certains autres types de maladies rénales.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ZYLORIC comprimés ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains médicaments, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais ZYLORIC, comprimé :

- En cas d'allergie connue à l'allopurinol ou à l'un des constituants du produit mentionnés dans la rubrique 6.
- Chez l'enfant de moins de 6 ans (contre-indication liée à la forme pharmaceutique).

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Avertissements et précautions :

Adresssez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère avant de prendre ZYLORIC mg, comprimé si vous :

- Avez des problèmes au niveau de votre foie ou de vos reins.
- Souffrez de problèmes cardiaques ou d'une hypertension artérielle et si vous prenez des diurétiques et/ou un médicament appelé un IEC (inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine).
- Souffrez actuellement d'une crise de goutte.
- Êtes d'origine chinoise, ethnie Han, africaine ou indienne.
- Avez des problèmes de thyroïde.

Faites particulièrement attention avec ZYLORIC, comprimé :

- Des éruptions cutanées ont été signalées chez des patients prenant de l'allopurinol. Fréquemment, l'éruption cutanée peut entraîner des ulcères au niveau de la bouche, de la gorge, du nez, des organes génitaux et une conjonctivite (yeux rouges et gonflés). Ces éruptions cutanées graves sont souvent précédées par des symptômes pseudo-grippaux, fièvre, maux de tête, courbatures (symptômes ressemblant à la grippe). L'éruption peut évoluer vers une apparition de vésicules sur tout le corps et une desquamation de la peau. En cas d'éruption cutanée ou de symptômes cutanés, arrêtez de prendre

l'allopurinol et contactez votre médecin.

- Si vous souffrez de crises d'asthme, n'allez pas dans les voies urinaires.
- Autres médicaments et ZYLORIC : Informez votre médecin ou pharmacien pourriez prendre l'un des médicaments suivants :
 - Aspirine
 - Théophylline, utilisée pour des maladies respiratoires
 - Médicaments utilisés pour des maladies cardiaques
 - Vidarabine (anti-viral), utilisée pour les infections virales
 - Didanosine, utilisée pour traiter les infections virales
 - Antibiotiques (ampicilline ou amoxicilline)
 - Médicaments utilisés pour traiter les infections bactériennes
 - Médicaments utilisés pour réduire la pression artérielle, par exemple azatoprine
 - Médicaments utilisés pour traiter les maladies cardiaques
 - Médicaments pour les problèmes de la prostate comme les IEC (inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine)
 - Diurétiques (pour éliminer l'eau)
 - Médicaments utilisés pour fluidifier le sang
 - Warfarine
 - Tout autre médicament utilisé pour traiter une autre maladie

Veuillez aviser votre médecin ou pharmacien de tout autre médicament que vous prenez, y compris des médicaments de vente libre.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.



ZYLORIC® 100 mg, 200 mg et 300 mg, comprimés

ALLOPURINOL

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que ZYLORIC comprimés, et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ZYLORIC, comprimés ?
3. Comment prendre ZYLORIC comprimés ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ZYLORIC comprimés ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE ZYLORIC comprimés, ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Les comprimés de ZYLORIC contiennent un principe actif appelé l'allopurinol qui agit en ralentissant la vitesse de certaines réactions chimiques dans l'organisme afin de diminuer le taux d'acide urique dans le sang et les urines. ZYLORIC, comprimé est utilisé pour réduire ou prévenir la formation d'urate d'acide urique lorsque votre organisme produit en trop grande quantité une substance appelée l'acide urique. Ces dépôts sont responsables de certains types de calculs rénaux ou de certains autres types de maladies rénales.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ZYLORIC comprimés ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains médicaments, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais ZYLORIC, comprimé :

- En cas d'allergie connue à l'allopurinol ou à l'un des constituants du produit mentionnés dans la rubrique 6.
- Chez l'enfant de moins de 6 ans (contre-indication liée à la forme pharmaceutique).

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Avertissements et précautions :

Adresssez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère avant de prendre ZYLORIC mg, comprimé si vous :

- Avez des problèmes au niveau de votre foie ou de vos reins.
- Souffrez de problèmes cardiaques ou d'une hypertension artérielle et si vous prenez des diurétiques et/ou un médicament appelé un IEC (inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine).
- Souffrez actuellement d'une crise de goutte.
- Êtes d'origine chinoise, ethnie Han, africaine ou indienne.
- Avez des problèmes de thyroïde.

Faites particulièrement attention avec ZYLORIC, comprimé :

- Des éruptions cutanées ont été signalées chez des patients prenant de l'allopurinol. Fréquemment, l'éruption cutanée peut entraîner des ulcères au niveau de la bouche, de la gorge, du nez, des organes génitaux et une conjonctivite (yeux rouges et gonflés). Ces éruptions cutanées graves sont souvent précédées par des symptômes pseudo-grippaux, fièvre, maux de tête, courbatures (symptômes ressemblant à la grippe). L'éruption peut évoluer vers une apparition de vésicules sur tout le corps et une desquamation de la peau. En cas d'éruption cutanée ou de symptômes cutanés, arrêtez de prendre

l'allopurinol et contactez votre médecin.

- Si vous souffrez de crises d'asthme, n'allez pas dans les voies urinaires.
- Autres médicaments et ZYLORIC : Informez votre médecin ou pharmacien pourriez prendre l'un des médicaments suivants :
 - Aspirine
 - Théophylline, utilisée pour des maladies respiratoires
 - Médicaments utilisés pour des maladies cardiaques
 - Vidarabine (anti-viral), utilisée pour les infections virales
 - Didanosine, utilisée pour traiter les infections virales
 - Antibiotiques (ampicilline ou amoxicilline)
 - Médicaments utilisés pour traiter les infections bactériennes
 - Médicaments utilisés pour réduire la pression artérielle, par exemple azatoprine
 - Médicaments utilisés pour traiter les maladies cardiaques
 - Médicaments pour les problèmes de la prostate comme les IEC (inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine)
 - Diurétiques (pour éliminer l'eau)
 - Médicaments utilisés pour fluidifier le sang
 - Warfarine
 - Tout autre médicament utilisé pour traiter une autre maladie

Veuillez aviser votre médecin ou pharmacien de tout autre médicament que vous prenez, y compris des médicaments de vente libre.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament.



ZYLORIC® 100 mg, 200 mg et 300 mg, comprimés

ALLOPURINOL

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que ZYLORIC comprimés, et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ZYLORIC, comprimés ?
3. Comment prendre ZYLORIC comprimés ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ZYLORIC comprimés ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE ZYLORIC comprimés, ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Les comprimés de ZYLORIC contiennent un principe actif appelé l'allopurinol qui agit en ralentissant la vitesse de certaines réactions chimiques dans l'organisme afin de diminuer le taux d'acide urique dans le sang et les urines. ZYLORIC, comprimé est utilisé pour réduire ou prévenir la formation d'urate d'acide urique lorsque votre organisme produit en trop grande quantité une substance appelée l'acide urique. Ces dépôts sont responsables de certains types de calculs rénaux ou de certains autres types de maladies rénales.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ZYLORIC comprimés ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains médicaments, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais ZYLORIC, comprimé :

- En cas d'allergie connue à l'allopurinol ou à l'un des constituants du produit mentionnés dans la rubrique 6.
- Chez l'enfant de moins de 6 ans (contre-indication liée à la forme pharmaceutique).

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Avertissements et précautions :

Adresssez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère avant de prendre ZYLORIC mg, comprimé si vous :

- Avez des problèmes au niveau de votre foie ou de vos reins.
- Souffrez de problèmes cardiaques ou d'une hypertension artérielle et si vous prenez des diurétiques et/ou un médicament appelé un IEC (inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine).
- Souffrez actuellement d'une crise de goutte.
- Êtes d'origine chinoise, ethnie Han, africaine ou indienne.
- Avez des problèmes de thyroïde.

Faites particulièrement attention avec ZYLORIC, comprimé :

- Des éruptions cutanées ont été signalées chez des patients prenant de l'allopurinol. Fréquemment, l'éruption cutanée peut entraîner des ulcères au niveau de la bouche, de la gorge, du nez, des organes génitaux et une conjonctivite (yeux rouges et gonflés). Ces éruptions cutanées graves sont souvent précédées par des symptômes pseudo-grippaux, fièvre, maux de tête, courbatures (symptômes ressemblant à la grippe). L'éruption peut évoluer vers une apparition de vésicules sur tout le corps et une desquamation de la peau. En cas d'éruption cutanée ou de symptômes cutanés, arrêtez de prendre

l'allopurinol et contactez votre médecin.

- Si vous souffrez de crises d'asthme, n'allez pas dans les voies urinaires.
- Autres médicaments et ZYLORIC : Informez votre médecin ou pharmacien pourriez prendre l'un des médicaments suivants :
 - Aspirine
 - Théophylline, utilisée pour des maladies respiratoires
 - Médicaments utilisés pour des maladies cardiaques
 - Vidarabine (anti-viral), utilisée pour les infections virales
 - Didanosine, utilisée pour traiter les infections virales
 - Antibiotiques (ampicilline ou amoxicilline)
 - Médicaments utilisés pour traiter les infections bactériennes
 - Médicaments utilisés pour réduire la pression artérielle, par exemple azatoprine
 - Médicaments utilisés pour traiter les maladies de l'appareil digestif
 - Médicaments pour les problèmes de la prostate comme les IEC (inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine)
 - Diurétiques (pour éliminer l'eau)
 - Médicaments utilisés pour fluidifier le sang
 - Warfarine
 - Tout autre médicament utilisé pour traiter une autre maladie

Veuillez aviser votre médecin ou pharmacien de tout autre médicament que vous prenez, y compris des médicaments de vente libre.

ou que vous prenez, demandez à votre pharmacien de ce médicament est sûr pour vous.

La grossesse : le passage de ce médicament à l'embryon ou au fœtus n'a pas été étudié.

Le passage de ce médicament à l'embryon ou au fœtus n'a pas été étudié.

La grossesse : le passage de ce médicament à l'embryon ou au fœtus n'a pas été étudié.

Le passage de ce médicament à l'embryon ou au fœtus n'a pas été étudié.

Le passage de ce médicament à l'embryon ou au fœtus n'a pas été étudié.

Le passage de ce médicament à l'embryon ou au fœtus n'a pas été étudié.

Le passage de ce médicament à l'embryon ou au fœtus n'a pas été étudié.

Le passage de ce médicament à l'embryon ou au fœtus n'a pas été étudié.

Le passage de ce médicament à l'embryon ou au fœtus n'a pas été étudié.

Le passage de ce médicament à l'embryon ou au fœtus n'a pas été étudié.

Le passage de ce médicament à l'embryon ou au fœtus n'a pas été étudié.

Le passage de ce médicament à l'embryon ou au fœtus n'a pas été étudié.

Le passage de ce médicament à l'embryon ou au fœtus n'a pas été étudié.

Le passage de ce médicament à l'embryon ou au fœtus n'a pas été étudié.

Le passage de ce médicament à l'embryon ou au fœtus n'a pas été étudié.

Le passage de ce médicament à l'embryon ou au fœtus n'a pas été étudié.

Le passage de ce médicament à l'embryon ou au fœtus n'a pas été étudié.

Le passage de ce médicament à l'embryon ou au fœtus n'a pas été étudié.

Le passage de ce médicament à l'embryon ou au fœtus n'a pas été étudié.

Le passage de ce médicament à l'embryon ou au fœtus n'a pas été étudié.

Le passage de ce médicament à l'embryon ou au fœtus n'a pas été étudié.

Le passage de ce médicament à l'embryon ou au fœtus n'a pas été étudié.

Le passage de ce médicament à l'embryon ou au fœtus n'a pas été étudié.

Le passage de ce médicament à l'embryon ou au fœtus n'a pas été étudié.

Le passage de ce médicament à l'embryon ou au fœtus n'a pas été étudié.

Le passage de ce médicament à l'embryon ou au fœtus n'a pas été étudié.

Le passage de ce médicament à l'embryon ou au fœtus n'a pas été étudié.

Le passage de ce médicament à l'embryon ou au fœtus n'a pas été étudié.

Le passage de ce médicament à l'embryon ou au fœtus n'a pas été étudié.

Le passage de ce médicament à l'embryon ou au fœtus n'a pas été étudié.

Le passage de ce médicament à l'embryon ou au fœtus n'a pas été étudié.

Le passage de ce médicament à l'embryon ou au fœtus n'a pas été étudié.

Le passage de ce médicament à l'embryon ou au fœtus n'a pas été étudié.

Le passage de ce médicament à l'embryon ou au fœtus n'a pas été étudié.

Le passage de ce médicament à l'embryon ou au fœtus n'a pas été étudié.

Le passage de ce médicament à l'embryon ou au fœtus n'a pas été étudié.

Le passage de ce médicament à l'embryon ou au fœtus n'a pas été étudié.

Le passage de ce médicament à l'embryon ou au fœtus n'a pas été étudié.

Le passage de ce médicament à l'embryon ou au fœtus n'a pas été étudié.

Le passage de ce médicament à l'embryon ou au fœtus n'a pas été étudié.

Le passage de ce médicament à l'embryon ou au fœtus n'a pas été étudié.

Le passage de ce médicament à l'embryon ou au fœtus n'a pas été étudié.

Le passage de ce médicament à l'embryon ou au fœtus n'a pas été étudié.

Le passage de ce médicament à l'embryon ou au fœtus n'a pas été étudié.

Le passage de ce médicament à l'embryon ou au fœtus n'a pas été étudié.

يجيب قراءة هذه النشرة بأكملها باستثناء قليل تناول هذا الدواء.
وتحتاج بهذه النشرة، مقدمة تناوله، حفظ تناوله في المرة الأولى.
إذا كانت لديك أيام متعددة أخرى، إذا كان لديك شيك، اطلب المزيد
أو المصيلين.
ويعتبر هذه الدواء لك شخصياً. لا تعطيه أبداً لأحد سواك،
إلا الأعراض التي لديك، لأن ذلك قد يسبب له الفضول.
تفاقم أحد الأعراض غير المرغوبية أو إذا لاحظت تأثيراً غير
المحض، عليك إيقاف تناوله.

- إذا كنت تستولك بذكرة شربات الكحولية.

إذا اذتلت علي أحدي هذه الحالات، عليك مراجعة الطبيب قبل البدء بتناول هذا الدواء.

إذا استثناء الطبيب في حالة:

إذا كنت مغلياً على الخصوص بذكرة الشعاعي أو السكانر الذي قد يقتضي حفظ مادة ملبة تمهي على اليد في دورت المغيرة.

إذا كنت مغلياً على المخصوص لعملية جراحية كبيرة.

إذا اذتلت على التوقف عن تناول ملقيفونا عصعص الورقة قبل وبعد هذه العمليات أو العمليات الجراحية. سفريرون الطبيب إذا اذتلت بذكرة أم لا إلى علاج بديل خلال هذه الفترة. من المهم أن تتبع تعليمات الطبيب.

إذا اذتلت على المخصوص لعملية فجأة.

خطر الحاضر اللبناني
 خطير الحاضر اللبناني مسماة نادرة لكن خطيرة تسمى الحاضر اللبناني، خاصة اذا كانت
 مكتباتنا لا تعلمنا على غير مكتوم بصورة سريعة. كما ان خطير الحاضر اللبناني يزداد في حال وجود
 مسكنري غير مكتوم به او والتآليات شديدة او انقطاع طويل عن الطعام او اسهامها
 في انتشار الشروط الميكولوجية والبيئية او انتشار الملوثات او انتشار الملوثات او انتشار الملوثات او
 من الحالات الطبية حيث تؤدي الى الوفيات، اعراض اقبال الحياة .

اذا كان اي من هذه الحالات تطبق عليك، اتصل بطببك للحصول على مزيد من المعلومات.

موقف عن تناول غلوكونفا فقرة صغيرة اذا كانت تعانى من مرض من المحتوى ان يكن مرتبطا
 بالجهاز الهضمي، فقدان اهتمامات الجسم مثل القيء الشديد، والإسهال، والحمى، والمعانش
 والحرار، او شرب ماء أقل من المعتاد. تحدث عن طبتك للحصول على مزيد من المعلومات.

موقف عن تناول غلوكونفا وعلي الفور اتصل بالطبيب او باقرب مستشفى اذا كنت تعانى
 من اعراض الحاضر اللبناني لا تؤدى بقى الى غيبوبة.

تشتمل اعراض الحاضر اللبناني:

الأدوية المستخدمة لعلاج الالم والآلام مثل مضادات الالتهاب غير المضادات الالتهابية أو مضادات الالتهاب الكبيرة، أيوبوفيرن و سيلوكوبين، بعض الأدوية المستخدمة لعلاج ضغط الدم (مضادات ECA و مضادات مستقبلات الأدرينالين)، كورتيكosteroides (مثل سالوباتامول أو تيروپاتيل (التي تستخدم لعلاج الاريد)، مضادات المغصات مثل الباراسيتامول (التي تستخدم لعلاج الاريد)، كورتيكosteroides (المستخدمة لعلاج مرض المفاصل خاصة الاصابات العادة للجلد أو الاريد)، الأدوية التي قد تؤثر على كمية الجلوكوفاج في الدم، وخاصة إذا كانت وظائف الكلى مختلقة (مثل تريازيمات، باراسيتامول، ميتامين، تولوازين، باراسيتامول، تريزيمات)، تريزيمات (

مِنْ إِلَى فَنْةِ الْأَدْوِيَةِ

الأنسواني هرون يधג: **الفلوكوز (السكر)** الفلوكوز (السكر)

الناتج في الماء يستخدم الجسم الفلوكوز لانتاج الطاقة او يحرزه لاستخدامه لاحقاً.

يمكن تناوله مرتاحاً باسليكيّاً، لا ينفع المكرونة لانك الانسواني بكمية كافية

ويمكن تناوله في الماء، باسليكيّاً على استخدامة الانسوين الذي يتبع ب بشكل مصحّح، يوّلي ذلك الى ارتفاع معدل الفلوكوز في الماء، باسليكيّاً يمكن تناول الفلوكوز في ماء حتى يصبح المستوى المنشود في الماء.

اذا كنت بالغاً وتعاني من وزن زائد، يسمح لك تناول الفلوكوز على الذي الماء

المساعدة على انتظام امراضك المصاحبة للسكرى. يشرب كلوكوا في الماء على الريق او في النون او يغدقان قليلاً من اون.

ما هي الحالات التي يستعمل فيها كلوكوا؟

استعمل كلوكوا في علاج السكري لدى النساء اللواتي **السكري غير المتوقف على** النساء اللواتي **السكري** عندما لا يسمح النظام الغذائي والتعرين المبني وعدهما بالتحكم بمعدل

الفلوكوز في الماء، ويستخدم بشكل خاص لدى المرضى الذين يعانون من زيادة الوزن.

استعمل كلوكوا في العلاج المائي للحالات التي تناول كلوكوا وده و مع او ده اخرى ضد السكري (الدوية

قابلة للنفخ او الانسوين).

استعمل كلوكوا في سن المراهقة و الماء في العاشرة وما فوق والمرأة تناول كلوكوا وده و مع او

الأنسوين.

2- ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول الـ كليوكوفاج، قرص مقاومة؟

2- ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول الـ كليوكوفاج في الحالات التالية:

- إذا كانت تعانى من الأرجية المرضية المفرطة تجاه المكورمين أو أحد المكونات الأخرى
- إذا كانت تعانى من الـ نادرة المذكورة في المقالة 6.
- إذا كانت تعانى من مشاكل في الكبد
- إذا كانت تعانى من تهور حاد في الماء و ظرف الكل
- إذا كانت تعانى من سكري مزمن غير متحكم به، و صاحبة مثلاً فرط سكر الدم (ارتفاع حاد لعدل السكر في الدم) أو مرض مزمن (الدم) مصورة صارمة، غثيان، قيء، إسهال، فقدان سرير للوزن.
- (اظفر) خطر خاص ينتهي أسلفة (أو حاضن) كيتويني، حاضن الكيتويني إصابة تكمن في ترك حاد في الماء، تسمى "جسم كيتويني" والذي من شأنه تسبب بسيمات سكري في الماء، وأعراضه في تشمل الماء، تنفس سريع وعميق، الرغبة في التبول، نفس ذو رائحة فاكهة غير معهودة.
- إذا كانت تعانى كهبة كبيرة من الماء (احتقان)، خلا على آخر إسهال مستمر أو حاد، أو إذا تعانى تقييدات شديدة مرات على التوالي، قد يؤدي الاحتفاظ إلى مشاكل كثيرة من شأنها أن تعرض الرئتين للخطر
- الرئتين للخطر
- إذا كانت تعانى من احتقان، خلا، مثلاً اهاب الرئتين أو الصبيات، أو اهاب الكلينين، قد تؤدي إلى احتقان الرئتين إلى إنشاء مشاكل في تنفس الماء، تعرف بـ "احتقان الرئتين أو احتقان الرئتين بسبب كليوكوفاج" (ادنا).
- إذا كانت تتناول علاجاً ضد المكورين الـ كليوكوفاج أو إذا كانت تعانى من وقت قرب من نوبة قلبية، أو إذا كانت تعانى من مشاكل حادة في ماضي الدورة المومية (مثل صدمة)، أو إذا كانت تعانى من سعوبات في التنفس، ذلك من شأنه أن يؤدي إلى احتقان في إمداد الرئتين بالـ الأكسجين، مما يعرض الرئتين للخطر
- إذا كانت تعانى من احتقان الرئتين بسبب كليوكوفاج، قد تؤدي إلى احتقان، أو احتقانات (ادنا).

