

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

**MUPRAS** : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - [www.mupras.com](http://www.mupras.com)

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 8372

Société : RAN

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : ATBIB Fouzia

Date de naissance : 01/03/1966


Adresse : 7 Rue NASSIR ADDINE Res Aljouma RA

INA APP 17 Raam

Tél. : 06684666446 Total des frais engagés : 368,800 Dhs

## Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 09 DEC. 2022

Nom et prénom du malade : Dr. ATBIB Fouzia Age :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :



Ben Zerh

Affection longue durée ou chronique :  ALD  ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : ..... / ..... / .....

Signature de l'adhérent(e) :



## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
09 DEC 2022	N		250,00 D	DR ZEMMAMA O LOTFI 45, Bd Bir Anzarane C 05 22 25 03 73 GSM 06 61 14 99 86 E 05 22 25 13 00 zol2@live.fr

## EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Mme. Amal EL QABBAJ BAIDI Docteur en Pharmacie PHARMACIE DANTON 47, Boulevard Bir Anzarane Tél : 0522 25 09 78 - Casablanca	20/12/22	161 - 0522 25 09 78 - Casablanca 47, Boulevard Bir Anzarane PHARMACIE DANTON Docteur en Pharmacie Mme. Amal EL QABBAJ BAIDI 168,00

## ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Cœfficients	Montant des Honoraires

## AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	
	.....					.....
	.....					.....
	.....					.....
	.....					.....
	.....					.....

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

O.D.F  
PROTHESES DENTAIRES

## DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
D	
00000000	00000000
35533411	11433553

## **[Création, remont, adjonction]**

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



Casablanca, Le 09 DEC. 2022

الدار البيضاء في

Place AT BIB Fouzqa

89,00 ⚡ Vibra 200  
30,00 ⚡ 1 gel (500 mg)  
20 ⚡ Neopred 20  
18,00 ⚡ 3 cap de lait en poudre au prix de 3 ⚡  
94,00 ⚡ Pulmo Sels 3x  
40 ⚡ Coquilles edal Paee  
168,00 ⚡ 1 syro 2x5

DR. AMAL EL QABBAJ BAERI  
Docteur en PHARMACIE  
45 Bd Bir Anzarane  
PHARMACIE EL QABBAJ BAERI  
Casablanca  
Tel: 0522 25 03 73  
Fax: 0522 25 03 73  
E-mail: zol2@live.fr

DR. ZEMMAMA O. LOTFI  
45 Bd Bir Anzarane  
C 05 22 25 03 73  
GSM 06 61 14 99 86  
Fax 06 22 25 13 00  
E-mail: zol2@live.fr

45, Bd. Bir Anzarane - Casablanca  
TEL : 05 22 25 03 73  
Fax : 05 22 25 13 00  
GSM : 06 61 14 99 86  
E-mail : zol2@live.fr

RAPPORTER L'ORDONNANCE

45, شارع بتر أنزاران الدار البيضاء  
الهاتف : 05 22 25 03 73  
الفاكس : 05 22 25 13 00  
المحمول : 06 61 14 99 86  
البريد الإلكتروني : zol2@live.fr

## PPV (DH) :

- en cas d'expectoration gr
- si vous êtes atteint d'une
- Ce traitement doit toujours
- destiné à calmer la toux et
- Ne pas prendre de médicament
- Cette spécialité contient de
- chez le nourrisson et chez

Ce médicament contient un agent colorant azoïque : jaune orangé 5 (E12) et peut provoquer des réactions allergiques.

### Précautions d'emploi :

Ce médicament contient 2 mmol (ou 48 mg) de sodium par dose. A prendre en compte chez les patients contrôlant leur apport alimentaire en sodium.

Ce médicament contient 3,6 g de saccharose par dose. Ceci doit être pris en compte chez les patients diabétiques.

En cas d'épilepsie ancienne ou récente, DEMANDER CONSEIL A VOTRE MEDECIN.

En cas de doute, ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

### Enfants :

Sans objet.

### 8. Interactions

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS notamment avec les médicaments (disulfirame, certains antibactériens, certains antifongiques) entraînant une réaction antiause avec l'alcool (chaleur, rougeur, vomissement, palpitations), les dépresseurs du système nerveux central (antidépresseurs, antihistaminiques, anxiolytiques, neuroleptiques, morphiniques, certains antihypertenseurs), les médicaments destinés au traitement du diabète (chlорpropamide, glibenclamide, glipizide, insulin, metformine, sulfaamides hypoglycémiant), IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

### 9. Utilisation en cas de grossesse et d'allaitement :

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Il est préférable de ne pas administrer ce médicament pendant la grossesse. Cependant, aucun effet indésirable n'a été rapporté au cours de la grossesse.

Par prudence, évitez l'administration de ce médicament pendant l'allaitement. En cas d'allaitement, il est préférable de ne pas utiliser ce médicament.

### 10. Les effets possibles du traitement sur la capacité à conduire un véhicule ou à utiliser certaines machines :

L'altération de la vigilance liée à la présence d'alcool peut rendre dangereuse la conduite de véhicules ou l'utilisation de machines.

### 11. Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage :

Arrêtez le traitement et consultez rapidement votre médecin.

### 12. Conduite à tenir en cas d'omission d'une ou plusieurs doses :

Sans objet.

### 13. Mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de sevrage :

Sans objet.

### - Conditions de prescription et de délivrance :

Médicament non soumis à prescription médicale.

### - Précaution particulières de conservation

Sans objet.

Après la première ouverture du flacon : 15 jours

### - Tenir hors de la portée des enfants

- Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte

- La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le : 07/2018

CECI EST UN MEDICAMENT.  
UN MEDICAMENT N'EST PAS UN PRODUIT COMME LES AUTRES.

Il vous concerne, vous et votre santé.

Le médicament est un produit actif.

Une longue recherche a permis de découvrir son activité, mais son absorption n'est pas toujours sans danger.

Il ne faut jamais abuser des médicaments.

Il ne faut utiliser les médicaments qu'à bon escient.

Utiliser les médicaments prescrits comme vous le conseille votre médecin.

Il sait quels sont les médicaments dont vous avez besoin.

Exécuter exactement les prescriptions de son ordonnance : suivez le traitement prescrit, ne l'interrompez pas, ne le reprenez pas de votre propre initiative.

VOTRE PHARMACIEN CONNAIT LES MEDICAMENTS : suivez ses conseils.

Il ne s'agit pas pour vous de prendre des médicaments en quantité importante.

Il s'agit pour vous de prendre les médicaments dont vous avez besoin.

Fabriqué par:



COOPER  
PHARMA

774.045.11.20

النثرة

معلومات مخصصة للمرضى

يرجى قراءة نشرة المعرفة العامة قبل تناول الدواء.

تم صرف هذا الدواء للكائنات الحية طبيعية. لا تعلمه إذا أشخاص في

الواقع، قد يصر هذا الدواء بمحظوظ.

يمكن أن قراها فيما بعد تناول الدواء.

ما هو فيبراميسين / فيبرا ومتى يستخدم؟

فيبراميسين / فيبرا هو مضاد حيوي من مجموعة التتراسين.

يعلم هذه العامل المضيبي للأمراض، وأكثريها التي تسبب الأمراض.

يستخدم فيبراميسين / فيبرا لعلاج العدوى مثل:

عدوى المucus النسبي

عدوى الأنف، والحلق، والاذن

عدوى المucus الورلي

عدوى الأعضاء التناسلية

عدوى الجلد والأنسجة الدخورة

عدوى المعدة المعاوية

عدوى الولادة والجهاز التنفسي للنساء

عدوى الدم (عدوى فموية)

عدوى في العين

بعض الأمراض التي تنتقل عن طريق الفم

يوصى فيبراميسين / فيبرا لولادة من الصابة بالأمراض التالية:

إيهال الماسيرات

المalaria في بعض المناطق العالم.

لا يمكن أخذ فيبراميسين / فيبرا إلا بناء على وصفة طبية.

ما الذي يجب أخذة في الأعتبر خارج المرض؟

لا تنسى هذا الدواء قد وصفه لك طبيبك كعلاج للمرض الذي تعانى منه حالياً. ويجب عدم استعماله مع الأدوية المعاوية ألا خرى أو أشخاص

آخرين.

الكتانس الجيوي الذي يحتوي فيبراميسين / فيبرا غير فعال ضد كل

الكتانسات المضيبي للأمراض العدوى إن تناول مضاد حيوي تم

الختبار بشكال سوء أو بجرعة غير مناسبة يمكن أن يسبب حدوث

مضاعفات. وبالتالي لا تستخدمنه من قبل، فنصل فعالية أمراض أخرى

أو أشخاص آخرين. في حالة الصابة بالكتانس، يجب

عليك عدم إعادة تناول فيبراميسين / فيبرا دون وصفة طبية جديدة.

متن لا ينفي استعمال فيبراميسين / فيبرا!

يجب عدم تناول فيبراميسين / فيبرا إذا كان لديك حساسية لل المادة الفعالة

في فيبراميسين / فيبرا، أو إنك مريض مكتانس، أو لأحد مكونات الدواء

أو لا يزيد مقدار حيوي من مثيلة التتراسين، أخرين طبيبك إذا كنت قد

عانيت من سبعة من الأعراض الجلدية للكتانسات الجيوي أو إذا لم تتحمل

جيدياً علاج ساق فيبراميسين / فيبرا.

يظهر علاج المضيبي للأكتانس على هذه شبيق في التنس.

صعوبة في التنس (رد)، مثل الشكل تتعلق بالدوران التورم،

تورم أو انتفاخ في الجلد (على سطح العضلات ارتكاريا) وفي الحاليا

المخططة، حكة أو فطح جلدي.

لا يجب تناول فيبراميسين / فيبرا في حالة الأمراض الكبدية الحادة.

ما هي الاحتياطات التي يجب ملاحظتها أثناء استعمال فيبراميسين /

فيبرا؟

يمكن أن يسبب اعطاء فيبراميسين / فيبرا للسيدات الحامل منذ أكثر

من شهر شهرين (خلال النصف الثاني من الحمل) أو أطفال صغار أو

اللأسنان، أو تكون غير مكتمل لمكونها الأصلية (تنفس المينا). لا تتناول هذه

المربيضات ولا هولاء المربيض فيبراميسين / فيبرا إلا إذا أمر الطبيب

بتلك صراحة.

إذا كنت تعانى من مرض في الكبد، فلا يجب عليك متناول فيبراميسين

/ فيبرا إلا وصفه لك الطبيب معاوية وأن تظل تحت رقابة طبية

دقيقة.

في حالة ردة فعل للجلد (مثل طفح جلدي أو حكة) يجب عليك أن توقف

ن الحين وتخبر طبيبك في الحال.  
من المباشر للشمس أو الأشعة فوق البنفسجية لأن  
هذا يمكن أن يسبب رد فعل فرط الحساسية تجاه الضوء.  
من المباشر الشمس أو الأشعة فوق البنفسجية تسبب ظهور  
حمرار على الجلد، يحب عليك وقف العلاج واستشارة الطبيب على  
القول.

من أجل تقليل خطر التهيج أو فرحة المريء، يجب تخفيف أقراص  
فيبراميسين / فيبرا في مقدار 50 مل من الماء تقريباً وابتلاعه مع  
كمية كافية من الماء.

يمكن أن تحدث اضطرابات خاصة في الجهاز الهضمي عند تناول  
أقراص فيبراميسين / فيبرا. في حالة الاضطرابات المعدية، المعوية  
الشديدة المصحوبة بقيء، وأسهال، يجب عليك وقف العلاج وإخبار  
الطبيب على الفور.

لا يجب تناول الأدوية التي تمنع الحركة المعاوية (حركة الأمعاء) في  
حالة الإسهال.  
المرضى الذين يستخدمون أدوية مضادة للمعوية أو ملائج الريهوموت  
يسبب وجود اضطرابات معوية، أو المرض المزمن يتراولون  
مستحضرات تجفيف على الجيد ويفهم عدم تناول هذه الأدوية  
في نفس وقت تناول فيبراميسين / فيبرا، لأن لها تأثير سلبي على  
امتصاص فيبراميسين / فيبرا (أي على انتقاله إلى الدم)، ويسرى هذا  
 ايضاً على الكربون المنشط والأدوية الماخوذة من الكربونات، وهما  
 لا يزيد من تناول فيبراميسين / فيبرا إما قبل ساعتين من تناول هذه  
المستحضرات أو بعدها بـ4 ساعات.

الجمع بين مضادات حموضة، يجب عدم تناول ماء حموض آخر  
مع فيبراميسين / فيبرا إلا إذا وصف الطبيب ذلك صراحة.

يجب أن تخبر طبيبك إذا كنت تتناول دواء لخفقان القلب (دواء لخفقان القلب)  
الدم، أو دواء لمرض السكري عن طريق الماء (دواء لخفقان القلب)  
الصرع (مضاد التشنج)، أو دواء ملتوياً، أو ملتوياً لمنع العمل تأخذ عن  
طريق الدم (جروب منع الدم). إذا كنت تتناولون دواء لمنع العمل  
يأخذ عن طريق الدم (جروب منع العمل)، لاحظ أن فعاليتك يمكن  
أن تختفي أثناء العلاج بالمضادات الجيوي، يمكن حينئذ أن تتحسن  
الطبيب أو المسؤول الطبيبي إذا سمعت طريقة لك تخبر قريباً في الواقع،  
استخدام المترامن تجفيف الماء (ميكوكسي فلوران) يمكن أن يسبب

ضرر كلوبي مهم.  
لا تتحمّل الكحول أثناء تناول ماء حموض آخر فيبراميسين / فيبرا.

استخدام المترامن للتوكين، سيلكان، والسيكلوسيرين (A).  
من الأثر الشامل لتطهير الماء (سيكلوكوكسيكوسيرين) يمكن أن يزيد من خطر

الآثار غير المرغوب فيها على مستوى الجهاز المخاطي.  
إن الاستخدام للتوكين، بما في ذلك دوكوكسيكوكسيكين، يمكن أن يسبب  
زيادة ممدوحة في الضغط داخل المجمجمة عند الأطفال ما يكون قابلاً للعكن.  
ضغط الدم داخل المجمجمة عند العلاج بتراتاسيكين، بما في ذلك دوكوكسيكوكسيكين.  
في الروية أثناء العلاج.

انصح أن أسيوتريپينون، المادة النشطة، المستخدمة لعلاج حب  
الشيب، يمكن أن يسبب، في حالات نادرة، ارتفاع حمدة في ضغط الدم  
في المجمجمة، وبناء عليه،تجنب الاستخدام المترامن للأسيوتريپينون  
و دوكوكسيكوكسيكين.

يمكن أن يزيد تركيز الميثوكريستات عن طريق الإعطاء المترامن  
الميثوكريستات و دوكوكسيكوكسيكين.  
إذا كنت تناوله ينعكس بقياس نسبة السكر الخاصة بك في البول (بليمة  
سكرية)، يرجى إبلاغ الطبيب.

يمكن أن تؤثر هذا الدواء على رود الأفعال وعلى القدرة على قيادة  
السيارات واستعمال الأدوات أو الألات.  
يرجى أن تخبر طبيبك أو الصيدلي إذا

كنت تعاني من مرض آخر (مثل على سبيل المثال مرض في الكبد)  
كنت تتناول بالفعل أدوية أخرى أو تستخدم أدوية  
للاستعمال الخارجي (حتى تلك التي تستعمل بدون

# NEOPRED®

20 mg et 5 mg  
comprimé effervescent  
Prednisolone

NEOPRED®  
Prednisolone 20 mg  
20 comprimés effervescents  
PPV : 37,40 DH  
  
6 118 000 191919

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE NEOPRED®, comprimé effervescent ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE NEOPRED®, comprimé effervescent ?
3. COMMENT PRENDRE NEOPRED®, comprimé effervescent ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER NEOPRED®, comprimé effervescent ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

## 1. QU'EST-CE QUE NEOPRED®, comprimé effervescent ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique :

GLUCOCORTICOÏDES - USAGE SYSTEMIQUE.

(H: Hormones systémiques non sexuelles).

Indications thérapeutiques :

Ce médicament est un corticoïde.

Il est indiqué dans certaines maladies, où il est utilisé pour son effet anti-inflammatoire.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE NEOPRED®, comprimé effervescent ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre-indications :

*N'utilisez jamais NEOPRED®, comprimé effervescent dans les cas suivants :*

- la plupart des infections,
- certaines maladies virales en évolution (hépatites virales, herpès, varicelle, zona),
- certains troubles mentaux non traités,
- vaccination par des vaccins vivants,
- si vous êtes allergique à la prednisolone ou à l'un des autres composants.

## EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Précautions d'emploi : mises en garde spéciales :

Faites attention avec NEOPRED®, comprimé effervescent :

Mises en garde spéciales

Ce médicament doit être pris sous stricte surveillance médicale.

AVANT LE TRAITEMENT

Instructions pour un bon usage : Sans objet.

sologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée

d'traitement :

sologie

OPRED® 20 mg est adapté aux traitements d'attaque ou aux traitements de courte durée nécessitant des doses moyennes ou fortes chez l'adulte et l'enfant de 6 kg.

OPRED® 5mg est indiqué pour les traitements d'entretien.

La dose à utiliser est déterminée par votre médecin, en fonction de votre poids et de la maladie traitée.

Elle est strictement individuelle.

Il est très important de suivre régulièrement le traitement et de ne pas le modifier, ni l'arrêter brutalement sans l'avis de votre médecin.

Mode et voie d'administration :

Voie orale.

En général, dissoudre les comprimés dans un verre d'eau en une prise le matin, au cours du repas. Respecter la prescription de votre médecin.

Durée du traitement :

Elle est déterminée par votre médecin.

En cas de traitement prolongé, ne pas arrêter brutalement le traitement mais suivre les recommandations de votre médecin pour la diminution des doses.

Symptômes et instructions en cas de surdosage : Sans objet.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses :

*Si vous oubliez de prendre NEOPRED®, comprimé effervescent :*

Pour être efficace, ce médicament doit être utilisé régulièrement. Cependant, si vous omettez de prendre une dose, continuez le traitement normalement.

Risque de syndrome de sevrage : Sans objet.

## 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Description des effets indésirables :

Comme tous les médicaments, NEOPRED®, comprimé effervescent est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Ce médicament, indispensable à votre santé, est le plus souvent bien toléré lorsque l'on suit les recommandations et notamment le régime pauvre en sel, en sucre et riche en protéines.

Il peut néanmoins entraîner, selon la dose et la durée du traitement, des effets plus ou moins gênants.

Les plus fréquemment rencontrés sont :

- Modification de certains paramètres biochimiques (sel, sucre, potassium) pouvant nécessiter un régime ou un traitement complémentaire.
- Apparition de bleus.
- Élevation de la tension artérielle, rétention d'eau et de sel pouvant entraîner une insuffisance cardiaque.
- Troubles de l'humeur: excitation, euphorie, troubles du sommeil.
- Syndrome de Cushing: une prise de corticoïdes peut se manifester par une prise de poids, un gonflement et une rougeur du visage, une poussée excessive des poils.
- Fragilité osseuse: ostéoporose, fractures.
- Atteintes douloureuses des os au niveau de l'articulation de la hanche (ostéonécrose).

D'autres effets beaucoup plus rares, ont été observés :

- Risque d'insuffisance de sécrétion de la glande surrenale.
- Retard de croissance chez l'enfant.
- Troubles des règles.
- Faiblesses musculaire, rupture des tendons surtout en association avec les fluoroquinolones (antibiotiques).
- Troubles digestifs : ulcère digestif, hémorragies et perforations digestives, pancréatites surtout chez l'enfant.
- Fragilisation de la peau, retard de cicatrisation, acné.
- Confusion, convulsion, état dépressif à l'arrêt du traitement.

COQUELUSEDAL PARACETAMOL 100 mg, suppos  
COQUELUSEDAL PARACETAMOL 250 mg, suppos  
COQUELUSEDAL PARACETAMOL 500 mg, suppos

LOT 221218  
EXP 04/2025  
PPV 24.40 DH

**Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Ce médicament peut être utilisé en automédication c'est-à-dire sans consultation ni prescription d'un médecin.
- Si les symptômes persistent, s'ils s'aggravent ou si de nouveaux symptômes apparaissent, demandez l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin.
- Cette notice est faite pour vous aider à bien utiliser ce médicament. Gardez-la, vous pourriez avoir besoin de la relire.

**NE LAISSEZ PAS CE MEDICAMENT A LA PORTEE DES ENFANTS.**

**Dans cette notice :**

1. QU'EST-CE QUE COQUELUSEDAL PARACETAMOL, suppositoire ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER COQUELUSEDAL PARACETAMOL, suppositoire ?
3. COMMENT UTILISER COQUELUSEDAL PARACETAMOL, suppositoire ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER COQUELUSEDAL PARACETAMOL, suppositoire ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

**1. QU'EST-CE QUE COQUELUSEDAL PARACETAMOL, suppositoire ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?**

Ce médicament est un antipyrrétique, antalgique et antitussif.

Il est indiqué dans :

- le traitement de la douleur et/ou fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures,

le traitement de la fièvre au cours des affections bronchiques aigües bénignes telles que la toux.

COQUELUSEDAL PARACETAMOL 100 mg est réservé à l'enfant de 5 à 8 kg (soit environ 2 à 9 mois).

COQUELUSEDAL PARACETAMOL 250 mg est réservé à l'enfant de 30 mois à 7 ans (soit environ 15 à 20 kg).

COQUELUSEDAL PARACETAMOL 500 mg est réservé à l'adulte et à l'enfant à partir de 25 kg (soit environ à partir de 8 ans). Lire attentivement la rubrique "Posologie".

Pour les enfants ayant un poids différent, il existe d'autres présentations de paracétamol à associer au COQUELUSEDAL NOURRISSONS : demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

**2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER COQUELUSEDAL PARACETAMOL, suppositoire ?**