



## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
22/11/22	C S 1	1	100.00	Dr. Soumaya S. A. T Médecin généraliste 1er étage - Boulgogne 1, rue Casablanca 75007 Paris Téléphone : 01 47 13 00

## EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<b>Pharmacie</b> <del>Nezha El Aoud</del> Docteur en Pharmacie Tel. : 05 23 49 21 71 / 72 - Fax : 05 22 28 18 18 106, bd. Bourdouze - Casablanca	<u>22</u> <u>11</u> <u>2022</u>	<u>528,90</u>

## ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

## AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

O.D.F  
PROTHESES DENTAIRES

## DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

	H
25533412	21433552
00000000	00000000
D	
00000000	00000000
25533411	11433553

The diagram shows a dental arch with 28 numbered teeth. The teeth are arranged in four quadrants: upper right (1-12), upper left (13-24), lower left (25-36), and lower right (37-48). Directional markers are present: 'D' on the left horizontal axis, 'G' on the right horizontal axis, 'H' at the top apex, and 'P' at the bottom apex.

### **[Création, remont, adjonction]**

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

**Dr. SAATI SOUMYA**  
*Medecine Générale*  
ECHOGRAPHIE

# الدكتورة سهلا سمية

## *Casablanca , Le*

8M188

Mr. DARRAS Farzad



Pharmacie  
F. LAMBERT

222, 30 x 1  
12930 x 1  
- Ségurant Ag St  
Rahn 85  
Ulrich le 19  
m 19  
Hilpert Spez. Ros  
47800  
Daserin x 21  
m 81

RG  
ASV  
E  
3

RG  
ASV  
E  
3

RG  
ASV  
E  
3

RG  
ASV  
E  
3

Mr. NOKI

ابن اميين

14,00



14,00 x 1



528,90



Dr. Soumaya SIDI  
Médecin Généraliste  
65, Bd. Zerktouni, Bourgogne  
28eme Etage, 75175 Paris  
Tel: 01 52 22 13 00

Al-Saied's Relais  
Mr. NOKI  
Biafine ne  
midrin  
Dakto Re  
midrin  
Cassis ac  
m. 21/10  
Deltix ready  
m. 21/10  
Myoactin 100 mg  
m. 21/10



PPU: 222,00 DH  
LOT: 649776  
PER: 03/24

gsk

**AUGMENTIN** 1 g/125 mg, ADULTES, poudre pour suspension buvable en sachet-dose

**AUGMENTIN** 500 mg/62,5 mg ADULTES, comprimé pelliculé  
Amoxicilline/acide clavulanique

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'information au médecin ou au pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit (ou a été prescrit à votre enfant). Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourra leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en au médecin ou au pharmacien.

#### Quoi contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que AUGMENTIN et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre AUGMENTIN ?
3. Comment prendre AUGMENTIN ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver AUGMENTIN ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

#### 1. QU'EST-CE QUE AUGMENTIN ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Association de pénicillines, y compris inhibiteurs de la bêta-lactamase

- code ATC : J01CR02.

AUGMENTIN est un antibiotique qui tue les bactéries responsables des infections. Il contient deux molécules différentes, appelées amoxicilline et acide clavulanique. L'amoxicilline appartient à un groupe de médicaments appelés « pénicillines », qui peuvent parfois arrêter d'être efficaces (être inactives). L'autre constituant actif (l'acide clavulanique) empêche cette inactivation.

AUGMENTIN est utilisé chez l'adulte et chez l'enfant pour traiter les infections suivantes :

- infections de l'oreille moyenne et des sinus,
- infections des voies respiratoires,
- infections des voies urinaires,
- infections de la peau et des tissus mous, incluant les infections dentaires,
- infections des os et des articulations.

#### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE AUGMENTIN ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucrels, contactez-le avant de prendre AUGMENTIN 1g/125mg. Adultes, poudre pour suspension buvable en sachet-dose.

#### Ne prenez jamais AUGMENTIN :

- si vous êtes allergique à l'amoxicilline, à l'acide clavulanique, à la pénicilline ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6,
- si vous avez déjà présenté une réaction allergique grave (d'hypersensibilité) à un autre antibiotique. Ceci peut inclure une éruption cutanée ou un gonflement du visage ou du cou,
- si vous avez déjà eu des problèmes au foie ou développé un ictere (jaunissement de la peau) lors de la prise d'un antibiotique.

→ Ne prenez pas AUGMENTIN si vous êtes dans l'une des situations mentionnées ci-dessus.

En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AUGMENTIN.

#### Avertissements et précautions

Adresser-vous à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AUGMENTIN si vous :

- souffrez de mononucléose infectieuse,
- êtes traité(e) pour des problèmes au foie ou aux reins,
- n'urinez pas régulièrement.

En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AUGMENTIN.

Dans certains cas, votre médecin pourra rechercher le type de bactérie responsable de l'infection. Selon les résultats, il pourra vous prescrire un dosage différent d'AUGMENTIN ou un autre médicament.

#### Réactions nécessitant une attention particulière

AUGMENTIN peut aggraver certaines maladies ou engendrer des effets secondaires graves, notamment des réactions allergiques, des convulsions et une inflammation du gros intestin. Lorsque vous prenez AUGMENTIN, vous devez surveiller certains symptômes afin de réduire les risques. Voir « Réactions nécessitant une attention particulière », à la rubrique 4.

#### Tests sanguins et urinaires

Si vous effectuez des analyses de sang (nombre de globules rouges ou explorations fonctionnelles hépatiques) ou des analyses d'urine (dosage du glucose), vous devez informer le médecin ou l'infirmier(e) qui vous prenez AUGMENTIN. En effet, AUGMENTIN peut influer sur les résultats de ces types de tests.

#### Autres médicaments et AUGMENTIN :

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Si vous prenez de l'allopurinol (en traitement de la goutte) avec AUGMENTIN, le risque de réaction cutanée allergique est plus élevé.

Si vous prenez du probénécide (en traitement de la goutte), votre médecin peut décider d'ajuster votre dose d'AUGMENTIN.

Si des médicaments destinés à empêcher la coagulation du sang (tels que la warfarine) sont pris avec AUGMENTIN, des analyses sanguines supplémentaires peuvent être requises. AUGMENTIN peut influer sur l'action du méthotrexate (un médicament utilisé pour traiter le cancer ou les maladies rhumatismales).

AUGMENTIN peut interagir sur l'action du mycophénolate moféti (traitement pour prévenir le rejet de greffe d'organes).

**Grossesse et allaitement**  
Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

#### Conduite de véhicules et utilisation de machines

AUGMENTIN peut provoquer des effets indésirables susceptibles de réduire la capacité à conduire.

Ne conduisez pas et n'utilisez pas de machines si vous ne vous sentez pas bien.

**AUGMENTIN 1 g/125 mg, ADULTES, poudre pour suspension buvable en sachet-dose (Rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1) contient de l'aspartam (E951), de l'alcool benzyllique, de la matodextrine (glucose) et du sodium :**

- Ce médicament contient 30 mg d'aspartam par sachet. L'aspartam contient une source de phénylalanine. Peut être dangereux pour les personnes atteintes de phénylénétionurie (PCU), une maladie génétique rare caractérisée par l'accumulation de phénylalanine ne pouvant être éliminée correctement.
- Ce médicament contient 0,00001176 mg d'alcool benzyllique par sachet. L'alcool benzyllique peut provoquer des réactions allergiques. AUGMENTIN contient de la matodextrine (glucose). Si votre médecin vous a dit que vous avez une intolérance à certains sucrels, contactez-le avant de prendre ce médicament.
- Ce médicament contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par sachet, c.-à-d. qu'il est essentiellement « sans sodium ».

#### 3. COMMENT PRENDRE AUGMENTIN ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

#### Posologie

Adultes et enfants de 40 kg et plus

- Dose habituelle : 1 sachet de 1g/125mg ou 2 comprimés de 500mg/62,5mg trois fois par jour.
- Dose inférieure : 1 sachet de 1g/125mg ou 2 comprimés de 500mg/62,5mg deux fois par jour.

#### Enfants pesant moins de 40 kg

Les sachets AUGMENTIN 1g/125 mg ne sont pas recommandés.

Les enfants âgés de 6 ans ou moins doivent de préférence être traités avec AUGMENTIN en suspension buvable ou en sachet 500mg/62,5mg.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien si vous devez donner des comprimés de AUGMENTIN à des enfants pesant moins de 40 kg.

#### Patients souffrant de problèmes rénaux et hépatiques

- En cas de problèmes rénaux, une adaptation de la posologie peut être nécessaire. Le médecin pourra prescrire un dosage différent ou un autre médicament.
- En cas de problèmes au foie, des analyses de sang plus fréquentes pourront être nécessaires afin de vérifier le fonctionnement de votre foie.

#### Mode d'administration

- Répartissez les prises de manière régulière au cours de la journée ; elles doivent être espacées d'au moins 4 heures. Ne prenez pas 2 doses en 1 heure.
- Ne prenez pas AUGMENTIN pendant plus de 2 semaines. Si vos symptômes persistent, consultez de nouveau un médecin.

#### AUGMENTIN 1g/125mg sachets :

- Juste avant la prise d'AUGMENTIN, ouvrez le sachet et mélangez son contenu dans un demi-verre d'eau.
- Avez le mélange au début d'un repas ou un peu avant.
- Avez les comprimés entiers avec un verre d'eau au début d'un repas ou un peu avant.

**Si vous avez pris plus d'AUGMENTIN que vous n'en aviez dû :**

La prise d'une quantité excessive d'AUGMENTIN peut entraîner des maux de ventre (nausées, vomissements ou diarrhée) ou des convulsions. Parlez-en à votre médecin le plus tôt possible. Montrez la boîte du médicament au médecin.

#### Si vous oubliez de prendre AUGMENTIN :

Si vous avez oublié une dose, prenez-la dès que vous y pensez. Attendez ensuite environ 4 heures avant de prendre la dose suivante.

#### Si vous arrêtez de prendre AUGMENTIN :

Vous devez continuer de prendre AUGMENTIN jusqu'à la fin du traitement, même si vous vous sentez mieux. Toutes les doses sont importantes pour combattre l'infection. Si certaines bactéries devaient survivre, elles pourraient être à l'origine d'une réapparition de l'infection. Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.

## الأثر الجانبية الشائعة هنا:

عن شخص واحد من أصل 10:

شخص واحد من أصل 10:  
الcataractes التي تسمى المبيضات، وتظهر على مستوى  
هرعات مرتفعة.  
لذلك هذه الأثار الجانبية، فاعمل على أخذ أو غسلان.

PPU: 126,30 DH  
LOT: 650549  
PER: 03/24

TIN 1 g/125 mg, ADULTES, pour  
het-dose  
TIN 500 mg/62.5 mg ADULTES,  
acide clavulanique

### • الإسهال ( لدى الأطفال).

### • الأثار الجانبية قليلة الشعور:

يمكن أن تظهر لدى أقل من شخص واحد من أصل 100:

- مفع جدي، حكة.
- مفع جدي يارز مع حكة (شري).
- عسر الهضم.
- دوار.
- صداع الرأس.

### • الأثار الجانبية قليلة الشعور التي يمكن أن تظهر عند إجراء تحاليل الدم:

- ارتفاع معدل بعض المواد (الأنزيمات) التي يتوجهها الكبد.

### • الأثار الجانبية النادرة:

يمكن أن تظهر لدى أقل من شخص واحد من أصل 1000:

- مفع جدي، يمكن أن تكون منه تجاعيد تتشبه بقاعة صغيرة (نقط سوداء مرکز وحولها حلقة داكنة: حمامي عديمة الأشكال).

← إذا ظهرت عليك هذه الأعراض، فاتصل بطبيبك على وجه الاستعمال.

### • الأثار الجانبية النادرة التي يمكن أن تظهر عند إجراء تحاليل الدم:

- انخفاض عدد الخلايا التي تساهم في تثبيط الدم (الصفائحات).
- انخفاض عدد الكريات البيضاء.

### • أثار جانبية أخرى:

يمكن أن تظهر أثار جانبية أخرى لدى عدد ضئيل من الأشخاص (إن ترددتها غرب

- ردود فعل تحسسية (نقر أعلاه).

• التهاب الأمعاء الغليظة (نقر أعلاه).

• التهاب الشأن العصبي الذي يربط بالدماغ (التهاب السحايا العقدي).

• ردود الفعل الجلدية الحادة.

• مفع منتشر يصاحبه تجاعيد وتوسعة الجلد، لاسيما حول الفم والأنف والعينين متبقية (ما في ذلك زبادة خلايا الدم البيضاء (فقر الدم المحيضات) وإنزيمات الكبد).

← إذا ظهرت عليك أحد هذه الأعراض، فاتصل بطبيبك على الفور.

• التهاب الكبد.

• البرقان، الذي ينتج عن ارتفاع معدل البرقانين في الدم (وهي مادة يتوجهها الكبد للبشرة وفي المنطقة البيضاء من العين).

• التهاب الكلي.

• استقلالية مدة تثبيط الدم.

• فرط التشنج.

• تشنجات ( لدى الأشخاص الذين يتلقاون جرعات مرتفعة من أو غسلان أو يعالون).

• اللسان الأسود (الشرار اللسان).

• ثوران الأسنان ( لدى الأطفال)، وبختفي عموما عند فرش الأسنان.

### • الأثار الجانبية التي يمكن أن تظهر عند إجراء تحاليل الدم أو البول:

- انخفاض مهمن في عدد الكريات البيضاء.

• انخفاض عدد الكريات الحمراء (فقر الدم الانحلالي).

• بلورات في البول.

### • التصريح بالآثار الجانبية:

إن شعرت بأثر غير متسبب، المرجو إخبار الطبيب أو الصيدلي. يلطف ذلك على ذكره بهذه النشرة، يمكنك أيضا الإبلاغ عن الأثار الجانبية مباشرة عبر نظام الإبلاغ

GlaxoSmithKline Maroc 42-44

بناية بوليفارد الرشيدى وشارع أبو حماد 42-44

العنوان: 50000. أو على البريد الإلكتروني: vigilance.na@gsk.com

5. كيف يمكن حفظ أو ضمانه

يحفظ بعيدا عن مرأى ومتناول

### • تاريخ التهاب الصالحة:

لا ينفي استخدام أو غسلان بعد

على العلبة.

### • شروط الحفظ:

يحفظ بعيدا عن الرطوبة، في در

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice.

Le médicament car elle contient des informations importantes.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la re

- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'inform

- Ce médicament vous a été personnellement prescrit (ou le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être maladie sont identiques aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous mentionné dans cette notice, parlez-en au médecin ou

### Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que AUGMENTIN et dans quels cas est-il uti

2. Quelles sont les informations à connaître avant de pre

3. Comment prendre AUGMENTIN?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver AUGMENTIN?

6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE AUGMENTIN ET DANS QUELS CAS E

Classe pharmacothérapeutique : Association de pénicilline

béta-lactamase

- code ATC : J01CR02.

AUGMENTIN est un antibiotique qui tue les bactéries respons

deux molécules différentes, appelées amoxicilline et acide

appartient à un groupe de médicaments appelés « pénicilline » d'être efficaces (être inactivés). L'autre constituant actif (l'inactivation.

AUGMENTIN est utilisé chez l'adulte et chez l'enfant pour t

• infections de l'oreille moyenne et des sinus,

• infections des voies respiratoires,

• infections des voies urinaires,

• infections de la peau et des tissus mous, incluant l

• infections des os et des articulations.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CON

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à prendre Augmentin 1g/125mg, Adultes, poudre

Ne prenez jamais AUGMENTIN :

• si vous êtes allergique à l'amoxicilline, ou à d'autres composants contenus dans ce

• si vous avez déjà présenté une réaction à un antibiotique. Ceci peut inclure une

• si vous avez déjà eu des problèmes de peau lors de la prise d'un antibiotique.

→ Ne prenez pas AUGMENTIN si vous êtes allergique à l'amoxicilline ou à d'autres composants contenus dans ce médicament.

En cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

3. Avertissements et précautions:

Adressez-vous à votre pharmacien si :

• souffrez de maladie de l'appareil digestif,

• êtes traité(e) pour une infection urinaire,

• n'urinez pas ou n'avez pas envie d'uriner.

En cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

4. Informations pratiques sur AUGMENTIN:

Des informations pratiques sur AUGMENTIN :

• AUGMENTIN est un médicament à prendre par voie orale.

• AUGMENTIN est un médicament à prendre par voie orale.

• AUGMENTIN est un médicament à prendre par voie orale.

• AUGMENTIN est un médicament à prendre par voie orale.

• AUGMENTIN est un médicament à prendre par voie orale.

• AUGMENTIN est un médicament à prendre par voie orale.

• AUGMENTIN est un médicament à prendre par voie orale.

• AUGMENTIN est un médicament à prendre par voie orale.

• AUGMENTIN est un médicament à prendre par voie orale.

• AUGMENTIN est un médicament à prendre par voie orale.

• AUGMENTIN est un médicament à prendre par voie orale.



# DASEN® 10.000 UI

## IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

### DENOMINATION

DASEN®10 000 UI, comprimé en

### COMPOSITION QUALITATIVE

SERRAPEPTASE .....

Excipients : stéarate de magne

cellulose, jaune orangé S (E110)

Pour un comprimé enrobé gastro-ré

\*1 unité correspond au nombre

en 1 minute à partir de 1 mg de serrapeptase.

PPV:

EXP:

Lot N°:

47,80

10 000 unités\*

acétophtalate de

caséine)

### FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimé enrobé gastro-réistant, boîte de 40 .

### CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

ENZYMOTHERAPIE à visée anticédématrice et fluidifiante

(M : Système locomoteur)

(M : Système respiratoire)

### Exploitant/Fabricant :

Laboratoires SYNTHEMEDIC

20-22, Rue Zoubeir Bnou Al aouam. Roches Noires - Casablanca

### DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament, modificateur des sécrétions bronchiques, est indiqué en cas d'affection respiratoire récente avec difficulté d'évacuer les crachats.

Il est également utilisé pour traiter les œdèmes consécutifs à un traumatisme ou une intervention chirurgicale.

### ATTENTION !

### DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE en cas d'allergie connue à l'un des constituants notamment à la serrapeptase (enzyme).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### MISES EN GARDE SPÉCIALES

En cas de réaction allergique, le traitement doit être arrêté immédiatement et définitivement.

Un avis médical est nécessaire :

- en cas de fièvre, de crachats gras ou purulents,

- si vous êtes atteint d'une maladie chronique (au long cours) des bronches et des poumons.

Ce traitement doit toujours être accompagné d'efforts volontaires de toux permettant de cracher. La prise simultanée d'un médicament destiné à calmer la toux est donc illogique.

Ne pas prendre de médicament asséchant les sécrétions bronchiques durant la période de traitement.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS,

الحالات التي تستدعي استعمال هذا الدواء؟

- علاج احمرار الجلد الملووح من جراء العلاج بالأشعة.
- علاج حروق الدرجة الأولى والثانية وأي جرح نظيف غير مُثُن.

(2) ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل استعمال بيبافين، مستحلب للمسح على الجلد

- ممنوع ابداً استعمال بيبافين، مستحلب للمسح على الجلد، في الحالات التالية :
- اذا كان لدى المصاب حساسية معروفة لاحدي المواد الداخلة في تركيبة الدواء.
  - على الجرح الدامي (الذى يسيل منه دم).
  - على جرح غير نظيف مُثُن.

في حال الشك، لا بد من استشارة الطبيب أو الصيدلاني.

تبيهات في شأن استعمال بيبافين، مستحلب للمسح على الجلد :

#### تحذيرات خصوصية:

في حال الإصابة بحرق أدى إلى نشوء فقاوة على الجلد أو بحرق متيد أو بحرق عميق أو متيد، لا بد من استشارة الطبيب قبل وضع أي دواء على هذا الحرق أو الجرح.

في حال الشك، لا بد من استشارة الطبيب أو الصيدلاني.

حرق أو جرح).

أه حصلت

6 118000 050247

44,00 DHS

Prix Public de Vente  
AMM 121/17DMP/21/NRQ

Pharmacie  
Maroc

377676

medicamenteux.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout

Grossesse - Allaitement.

\* Parahydroxybenzoate de méthyle sodé (E 211)

\*\* Parabéne de parabenium

# daflon® 500 mg.

comprimé pelliculé

Fraction flavonoïque purifiée micronisée

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice par votre pharmacien.

Ref 38V

## QUE CONTIENT CETTE NOTICE ?

1. Qu'est-ce que DAFLON 500 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre DAFLON 500 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre DAFLON 500 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver DAFLON 500 mg, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

## 1. QU'EST-CE QUE DAFLON 500 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : VASCULOPROTECTEURS/MÉDICAMENTS AGISSANT SUR LES CAPILLAIRES/BIOFLAVONOÏDES-code ATC : C05CA53 : système cardiovasculaire

Ce médicament est un veinotonique (il augmente le tonus des veines) et un vaso-protecteur (il augmente la résistance des petits vaisseaux sanguins).

Il est préconisé dans le traitement des troubles de la circulation veineuse (jambes lourdes, douleurs, impatiences du primo-débutus) et dans le traitement des signes fonctionnels liés à la crise hémorroïdaire.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE DAFLON 500 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ?

Ne prenez jamais DAFLON 500 mg, comprimé pelliculé :

Si vous êtes allergique à la fraction flavonoïque purifiée micronisée ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

### Avertissements et précautions

#### Crise hémorroïdaire

Si les troubles hémorroïdaires ne cèdent pas en 15 jours, il est indispensable de consulter votre médecin.

#### Troubles de la circulation veineuse

Ce traitement a toute son efficacité lorsqu'il est associé à une bonne hygiène de vie.

- Evitez l'exposition au soleil, la chaleur, la station debout prolongée, l'excès de poids.

- La marche à pied et éventuellement le port de bas adaptés favorisent la circulation sanguine.

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Daflon 500 mg, comprimé pelliculé.

#### Enfants

Sans objet

## AUTRES MÉDICAMENTS ET DAFLON 500 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourrez prendre tout autre médicament.

## DAFLON 500 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ AVEC DES ALIMENTS ET BOISSONS

Sans objet

## GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Si vous êtes enceinte ou que vous allez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

#### Grossesse

Par mesure de précaution, il est préférable d'éviter l'utilisation de DAFLON pendant la grossesse.

#### Allaitemment

En l'absence de données sur le passage du médicament dans le lait maternel, l'allaitement est déconseillé pendant la durée de traitement.

## Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet

## DAFLON 500 mg, comprimé pelliculé contient

Sans objet

## 3. COMMENT PRENDRE DAFLON 500 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ?

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

**Insuffisance veineuse** : La dose recommandée est de 2 comprimés par jour : soit 1 comprimé à midi et 1 comprimé le soir, au moment des repas.

**Crise hémorroïdaire** : la dose recommandée est de 6 comprimés par jour pendant 4 jours, puis 4 comprimés par jour pendant les 3 jours suivants au moment des repas.

Si vous avez pris plus de DAFLON 500 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Les données concernant le surdosage avec Daflon sont limitées mais les symptômes rapportés incluent diarrhée, nausée, douleur abdominale, prurit et rash.

Si vous oubliez de prendre DAFLON 500 mg, comprimé pelliculé

Sans objet

Si vous arrêtez de prendre DAFLON 500 mg, comprimé pelliculé

Sans objet

## 4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

La fréquence des effets indésirables possibles listés ci-dessous est définie en utilisant le système suivant :

- très fréquent (affecte plus de 1 utilisateur sur 10)
- fréquent (affecte 1 à 10 utilisateurs sur 100)
- peu fréquent (affecte 1 à 10 utilisateurs sur 1 000)
- rare (affecte 1 à 10 utilisateurs sur 10 000)
- très rare (affecte moins de 1 utilisateur sur 10 000)
- fréquence inconnue (les données disponibles ne permettent pas d'estimer la fréquence)

Ils peuvent inclure :

- Fréquent : diarrhée, dyspepsie, nausée, vomissement.
- Peu fréquent : colite.
- Rare : sensations vertigineuses, céphalées, malaise, rash, prurit, urticaire.
- Fréquence inconnue : douleur abdominale, œdème isolé du visage, des paupières, des lèvres. Exceptionnellement, œdème de Quincke.

### Declarer des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

## 5. COMMENT CONSERVER DAFLON 500 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Pas de conditions particulières de conservation.

Ne jetez aucun médicament au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

## 6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

### CE QUE CONTIENT DAFLON 500 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ?

- Les substances actives sont :

Fraction flavonoïque purifiée micronisée ..... 500,000 mg

Correspondant à :

Diosmine 90 pour cent ..... 450,000 mg

Flavonoïdes exprimés en hesperidine 10 pour cent ..... 50,000 mg

Humidité moyenne ..... 20,000 mg

### Pour un comprimé pelliculé

- Les autres composants sont :

Carboxyméthylamidon sodique, cellulose microcristalline, gélatine, stéarate de magnésium, talc.

Pellucide : dioxyde de titane (E171), glycérol, laurylsulfate de sodium, macrogol 6000, hypromellose, oxyde de fer jaune (E172), oxyde de fer rouge (E172), stéarate de magnésium.

## QU'EST-CE QUE DAFLON 500 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ET CONTENU DE L'EMBALLAGE EXTERIEUR ?

Ce médicament se présente sous forme de comprimé pelliculé. Boîte de 30 comprimés pelliculés.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est : janvier 2019



SERVIER MAROC

Imm. ZEVACO, Lot FATH 4

Bd Abdelhadi BOUTALEB

20180 Casablanca

### Conseil d'éducation sanitaire :

#### Troubles de la circulation

Evitez de rester assis ou debout trop longtemps, surélevez légèrement les pieds de votre lit.

Evitez l'exposition au soleil et à la chaleur.

Veillez à avoir une alimentation saine et équilibrée et à pratiquer une activité physique régulière (marche à pied, vélo...), évitez l'excès de poids.

Evitez les vêtements trop serrés, le port de chaussettes ou de bas de contention ainsi que doucher ses jambes avec de l'eau favorisent la circulation sanguine.

#### Hémorroïdes

Buvez 1,5 à 2 L d'eau par jour, consommez des aliments à forte teneur en fibres afin d'éviter la constipation (Fruits, légumes verts, céréales complètes)

Evitez les graisses, le café, l'alcool et les aliments épicés.

Faites de l'exercice régulièrement pour stimuler le flux sanguin, évitez de porter des objets trop lourds.