

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

**MUPRAS** : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

### Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 3188

Société : AFM

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : AZENNoud MeTHAYE

Date de naissance : 01/01/51

Adresse : ZAHRAI MOU.BARAK 9 n° 23 ZouAGHA

FES

Tél. : 07.62.09.87.50

Total des frais engagés : 40.6,400 Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr. KHAZAZA Mohamed  
Médecin  
CSU1 ALLA SOUKAINA

Date de consultation : 13.12.2022

Nom et prénom du malade : HIA + gente Age : 72

Lien de parenté :  Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie : Azennoud Mohamed RDT

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : 13/12/2022

Le : 13/12/2022

Signature de l'adhérent(e) : HIA

# RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires Cachet et signature du Médecin des Honoraires attestant le Paiement des Actes
18/12/22	CSU1 Lalla Soukaina		

## EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fourisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE ZOUAGIA Dr. MEZZOUR Route Bensouda Zouaga Tunis. Tel : 05.35.60.11 INPE 142058650	18/12/22	406,40

## ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

## AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

# RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	COEFFICIENT DES TRAVAUX
				
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			COEFFICIENT DES TRAVAUX
	H	25533412 00000000 35533411	G	
	D	21433552 00000000 00000000	B	
		11433553		MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

[Création, remont, adjonction]  
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS      VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

# ORDONNANCE

Dr. KHAZAZA Mohamed  
Médecin  
CSULLALLA SOUKAINA

Fr., le 13/12/2021


Mr/Mme Abzenn ouad Mohamed

$$(31,30) \times 4 = 125,20$$

q1

Zylon Z 200

1cp S.V.  
x2



3 mois

$$(13,40) \times 2 = 26,80$$

q1

Colchicine 1mg

1cp S.V.

S.V.

$$(84,80) \times 3 = 254,40$$

406,40

q1. Preges 50 mg



Dr. KHAZAZA Mohamed  
Médecin  
CSULLALLA SOUKAINA  
T.N.P.C.  
031298821

# PREZAD<sup>®</sup>

Losartan

Comprimé

PPV: 8 4DH80

PER: 04/25

LOT: L1576

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais pourraut lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet négatif, parlez-en à votre pharmacien.

Si vous avez des questions dans cette notice, parlez-en à votre

## Composition du médicament :

La substance active est :

LOSARTAN POTASSIQUE

Les autres composants sont :

Lactose monohydraté, cellulose microcristalline, emidon de maïs prégalatinisé, stéarate de magnésium, croscarmellose sodique type A, opadry II OY-5/28908 (white).

Liste des excipients à effet notable : Lactose.

Classe pharmaco-thérapeutique :

Le losartan (PREZAD<sup>®</sup>) appartient à un groupe de médicaments appelés antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II. L'angiotensine est une substance produite par votre organisme qui se lie aux récepteurs de la parole des vaisseaux sanguins entraînant leur contraction. Cela induit une augmentation de la pression artérielle. Le losartan empêche la liaison de l'angiotensine II à ces récepteurs entraînant la dilatation des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle. Le losartan ralentit la dégradation de la fonction rénale chez les patients ayant une pression artérielle élevée et un diabète de type 2.

## Indications thérapeutiques :

PREZAD<sup>®</sup> 50 mg, comprimé pelliculé sécable est utilisé :

- Pour traiter les adultes ayant une pression artérielle élevée (hypertension).
- Pour préserver la fonction rénale des patients hypertendus diabétiques de type 2 présentant une insuffisance rénale et une protéinurie ≥ 0,5g/jour (présence d'une quantité anormale de protéines dans les urines) confirmées par des examens biologiques.
- Pour traiter les patients insuffisants cardiaques lorsque le médecin juge qu'un traitement par les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC, médicaments antihypertenseurs) ne convient pas. Si l'insuffisance cardiaque a été stabilisée par un IEC, le traitement ne doit pas être modifié pour le losartan.
- Chez les patients présentant une hypertension et un épaissement du ventricule gauche. PREZAD<sup>®</sup> 50 mg, comprimé pelliculé sécable réduit le risque d'accident vasculaire cérébral (étude LIFE).

## Posologie, Mode et voie(s) d'administration, Durée du traitement et Fréquence d'administration:

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou de votre pharmacien en cas de doute.

Les comprimés doivent être avalés avec un verre d'eau. Essayez de prendre votre traitement quotidien à la même heure chaque jour. Il est important de ne pas arrêter le traitement par PREZAD<sup>®</sup> 50 mg, comprimé pelliculé sécable sans l'avis de votre médecin.

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou votre pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou votre pharmacien en cas de doute. Votre médecin décidera de la dose appropriée de PREZAD<sup>®</sup> 50 mg, comprimé pelliculé sécable en fonction de votre état et si vous prenez d'autres médicaments. Il est important de continuer à prendre PREZAD<sup>®</sup> 50 mg, comprimé pelliculé sécable aussi longtemps que votre médecin vous le prescrit, afin de permettre un contrôle régulier de votre pression artérielle.

Patients adultes hypertendus

La dose habituelle d'initiation est de 50 mg de losartan une fois par jour (1 comprimé de PREZAD<sup>®</sup> 50 mg, comprimé pelliculé sécable). L'effet sur la diminution de la pression artérielle atteint son maximum 3 à 6 semaines après le début du traitement. Chez certains patients la dose peut, plus tard, être augmentée à 100 mg de losartan une fois par jour (2 comprimés de PREZAD<sup>®</sup> 50 mg, comprimé pelliculé sécable ou 1 comprimé de PREZAD<sup>®</sup> 100 mg, comprimé pelliculé).

Si vous avez l'impression que l'effet de PREZAD<sup>®</sup> 50 mg, comprimé pelliculé sécable est trop fort ou trop faible, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Patients adultes hypertendus diabétiques de type 2

La dose habituelle d'initiation est 50 mg de losartan une fois par jour (1 comprimé de PREZAD<sup>®</sup> 50 mg, comprimé pelliculé sécable). La dose peut ensuite, être augmentée à 100 mg de losartan une fois par jour (2 comprimés de PREZAD<sup>®</sup> 50 mg, comprimé pelliculé sécable ou 1 comprimé de PREZAD<sup>®</sup> 100 mg, comprimé pelliculé) en fonction de la réponse tensionnelle.

Les comprimés de losartan peuvent être pris avec d'autres médicaments antihypertenseurs (tels que les diurétiques, les inhibiteurs calciques, les alpha et bêtabloquants et les antihypertenseurs d'action centrale) ainsi qu'avec l'insuline et les autres médicaments antidiabétiques couramment utilisés (par exemple, sulfamides hypoglycémiants, glicazones et inhibiteurs alpha glucosidases).

Patients adultes insuffisants cardiaques

La dose habituelle d'initiation est de 12,5 mg de losartan une fois par jour. Habituellement, la dose doit être augmentée par paliers chaque semaine (c'est-à-dire 12,5 mg par jour la première semaine, 25 mg par jour la deuxième semaine, 50 mg par jour la troisième semaine, 100 mg par jour la quatrième semaine, 150 mg par jour la cinquième semaine) jusqu'à la dose d'entretien établie par votre médecin. Une dose maximale de 150 mg de losartan une fois par jour peut être utilisée (par exemple, 3 comprimés de PREZAD<sup>®</sup> 50 mg, comprimé pelliculé sécable ou 1 comprimé de PREZAD<sup>®</sup> 100 mg, comprimé pelliculé et 1 comprimé de PREZAD<sup>®</sup> 50 mg, comprimé pelliculé sécable).

Dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, le losartan est habituellement associé à un diurétique (médicament qui augmente le passage de l'eau à travers le rein) et/ou un digitalique (médicament qui aide le cœur à fonctionner plus efficacement) et/ou un bêtabloquant.

Pharmacopie chez les groupes de patients particulières

Le médecin pourra prescrire une dose plus faible, en particulier en début de traitement chez certains patients, comme ceux traités par des diurétiques à doses élevées, ou les patients insuffisants hépatiques ou les patients de plus de 75 ans. L'utilisation de losartan n'est pas recommandée chez les patients ayant une insuffisance hépatique grave.

## Contre-indications :

- Ne prenez jamais PREZAD<sup>®</sup> 50 mg, comprimé pelliculé sécable :
- Si vous êtes allergique au losartan ou à un des autres composants.
  - Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (il est également préférable d'éviter la grossesse - voir rubrique "Grossesse").
  - Si votre fonction hépatique est gravement dégradée.

Et contre tout autre diabète ou d'insuffisance rénale et si vous prenez l'insuline.

## Effets Indésirables :

Comme tous les médicaments, ce médicament est susceptible d'avoir des effets indésirables sur tout le monde.

Si vous ressentez l'effet suivant, arrêtez de prendre PREZAD<sup>®</sup> 50 mg, comprimé pelliculé sécable et contactez votre pharmacien ou l'hôpital le plus proche.

Une réaction allergique sévère (éruption cutanée, démangeaisons, gêne respiratoire ou asthme à révéler).

Ceci est un effet secondaire grave pouvant survenir avec plus d'un patient d'une surveillance médicale en urgence ou d'une hospitalisation.

Les effets indésirables suivants ont été rapportés avec PREZAD<sup>®</sup> 50 mg :

### Fréquents :

• Étourdissements,

• Baisse de la pression artérielle (particulièrement après une perfusion de glucose ou de doses élevées de diurétiques),

• Faiblesse,

• Fatigue,

• Trop peu de sucre dans le sang (hypoglycémie),

• Trop de potassium dans le sang (hyperkaliémie),

• Modification de la fonction rénale, y compris insuffisance rénale,

• Réduction du nombre de globules rouges dans le sang (anémie),

• élévation de l'urée dans le sang, de la créatinine et du potassium dans le

### Peu fréquents :

• Somnolence,

• Mauve de tête,

• Troubles du sommeil,

• Sensation d'accélération du rythme cardiaque (palpitations),

• Douleur dans la poitrine (angine de poitrine),

• Esoufflement (dyspnée),

• Douleurs abdominales,

• Constipation opiniâtre,

• Diarrhée,

• Nausées,

• Vomissements,

• Éruption (urticaire),

• Démangeaisons (prurit),

• Éruption cutanée,

• Gonflement localisé (œdème),

• Toux,

### Rares :

• Hypersensibilité,

• Angio-oedème,

• Inflammation des vaisseaux sanguins (vascularite incluant purpura et syndrome d'Eales),

• Enrouement ou picotements (paresthesies),

• Évanouissement (syncope),

• Battements de cœur très rapides et irréguliers (fibrillation auriculaire),

• Atteinte cérébrale (AVC),

• Inflammation du foie (hépatite),

• élévation du taux de l'alanine amino-transférase (ALAT), qui habite

### Fréquence indéterminée :

• Diminution du nombre de plaquettes,

• Migraine,

• Anomalies de la fonction hépatique,

• Douleurs musculaires et articulaires,

• Syndrome pseudo-grippal,

• Douleur dorsale et infection urinaire,

• Augmentation de la sensibilité ou de la tolérance (photosensibilité),

• Douleur musculaire inexplicable avec des urines foncées (de la couleuvre),

• Impuissance,

• Inflammation du pénis (pancréatite),

• Toux bas de sodium dans le sang (hypotonatrémie),

• Dépression,

• Sensation générale de malaise,

• Tintement, bourdonnement, grondement ou claquement dans les oreilles,

• Troubles du goût (dyguesie).

Les effets indésirables chez les enfants sont identiques à ceux rapportés

## Mises en garde spéciales et Précautions posées

Adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien avant

Vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou êtes suspecté) de grossesse ou si vous êtes enceinte ou si vous êtes enceinte d'utilisation à partir de ce stade de la grossesse.

Il est important d'avertir votre médecin avant de prendre PREZAD<sup>®</sup> 50

• Si vous avez déjà eu un angio-oedème (gonflement du visage, des lèvres,

• Si vous avez ou des vomissements importants ou des diarrhées, ou

• Si vous prenez des diurétiques (médicaments qui augmentent la quantité

sans sel peuvent conduire à une perte importante de liquide et de sel à

# PREZAD<sup>®</sup>

Losartan

Comprimé

PPV: 8 4DH80

PER: 04/25

LOT: L1576

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais pourraut lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet négatif, parlez-en à votre pharmacien.

Si vous avez des questions dans cette notice, parlez-en à votre

## Composition du médicament :

La substance active est :

LOSARTAN POTASSIQUE

Les autres composants sont :

Lactose monohydraté, cellulose microcristalline, emidon de maïs prégalatinisé, stéarate de magnésium, croscarmellose sodique type A, opadry II OY-5/28908 (white).

Liste des excipients à effet notable : Lactose.

Classe pharmaco-thérapeutique :

Le losartan (PREZAD<sup>®</sup>) appartient à un groupe de médicaments appelés antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II. L'angiotensine est une substance produite par votre organisme qui se lie aux récepteurs de la parole des vaisseaux sanguins entraînant leur contraction. Cela induit une augmentation de la pression artérielle. Le losartan empêche la liaison de l'angiotensine II à ces récepteurs entraînant la dilatation des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle. Le losartan ralentit la dégradation de la fonction rénale chez les patients ayant une pression artérielle élevée et un diabète de type 2.

## Indications thérapeutiques :

PREZAD<sup>®</sup> 50 mg, comprimé pelliculé sécable est utilisé :

- Pour traiter les adultes ayant une pression artérielle élevée (hypertension).
- Pour préserver la fonction rénale des patients hypertendus diabétiques de type 2 présentant une insuffisance rénale et une protéinurie ≥ 0,5g/jour (présence d'une quantité anormale de protéines dans les urines) confirmées par des examens biologiques.
- Pour traiter les patients insuffisants cardiaques lorsque le médecin juge qu'un traitement par les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC, médicaments antihypertenseurs) ne convient pas. Si l'insuffisance cardiaque a été stabilisée par un IEC, le traitement ne doit pas être modifié pour le losartan.
- Chez les patients présentant une hypertension et un épaissement du ventricule gauche. PREZAD<sup>®</sup> 50 mg, comprimé pelliculé sécable réduit le risque d'accident vasculaire cérébral (étude LIFE).

## Posologie, Mode et voie(s) d'administration, Durée du traitement et Fréquence d'administration:

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou de votre pharmacien en cas de doute.

Les comprimés doivent être avalés avec un verre d'eau. Essayez de prendre votre traitement quotidien à la même heure chaque jour. Il est important de ne pas arrêter le traitement par PREZAD<sup>®</sup> 50 mg, comprimé pelliculé sécable sans l'avis de votre médecin.

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou votre pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou votre pharmacien en cas de doute. Votre médecin décidera de la dose appropriée de PREZAD<sup>®</sup> 50 mg, comprimé pelliculé sécable en fonction de votre état et si vous prenez d'autres médicaments. Il est important de continuer à prendre PREZAD<sup>®</sup> 50 mg, comprimé pelliculé sécable aussi longtemps que votre médecin vous le prescrit, afin de permettre un contrôle régulier de votre pression artérielle.

Patients adultes hypertendus

La dose habituelle d'initiation est de 50 mg de losartan une fois par jour (1 comprimé de PREZAD<sup>®</sup> 50 mg, comprimé pelliculé sécable). L'effet sur la diminution de la pression artérielle atteint son maximum 3 à 6 semaines après le début du traitement. Chez certains patients la dose peut, plus tard, être augmentée à 100 mg de losartan une fois par jour (2 comprimés de PREZAD<sup>®</sup> 50 mg, comprimé pelliculé sécable ou 1 comprimé de PREZAD<sup>®</sup> 100 mg, comprimé pelliculé).

Si vous avez l'impression que l'effet de PREZAD<sup>®</sup> 50 mg, comprimé pelliculé sécable est trop fort ou trop faible, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Patients adultes hypertendus diabétiques de type 2

La dose habituelle d'initiation est 50 mg de losartan une fois par jour (1 comprimé de PREZAD<sup>®</sup> 50 mg, comprimé pelliculé sécable). La dose peut ensuite, être augmentée à 100 mg de losartan une fois par jour (2 comprimés de PREZAD<sup>®</sup> 50 mg, comprimé pelliculé sécable ou 1 comprimé de PREZAD<sup>®</sup> 100 mg, comprimé pelliculé) en fonction de la réponse tensionnelle.

Les comprimés de losartan peuvent être pris avec d'autres médicaments antihypertenseurs (tels que les diurétiques, les inhibiteurs calciques, les alpha et bêtabloquants et les antihypertenseurs d'action centrale) ainsi qu'avec l'insuline et les autres médicaments antidiabétiques couramment utilisés (par exemple, sulfamides hypoglycémiants, glicazones et inhibiteurs alpha glucosidases).

Patients adultes insuffisants cardiaques

La dose habituelle d'initiation est de 12,5 mg de losartan une fois par jour. Habituellement, la dose doit être augmentée par paliers chaque semaine (c'est-à-dire 12,5 mg par jour la première semaine, 25 mg par jour la deuxième semaine, 50 mg par jour la troisième semaine, 100 mg par jour la quatrième semaine, 150 mg par jour la cinquième semaine) jusqu'à la dose d'entretien établie par votre médecin. Une dose maximale de 150 mg de losartan une fois par jour peut être utilisée (par exemple, 3 comprimés de PREZAD<sup>®</sup> 50 mg, comprimé pelliculé sécable ou 1 comprimé de PREZAD<sup>®</sup> 100 mg, comprimé pelliculé et 1 comprimé de PREZAD<sup>®</sup> 50 mg, comprimé pelliculé sécable).

Dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, le losartan est habituellement associé à un diurétique (médicament qui augmente le passage de l'eau à travers le rein) et/ou un digitalique (médicament qui aide le cœur à fonctionner plus efficacement) et/ou un bêtabloquant.

Pharmacopie chez les groupes de patients particulières

Le médecin pourra prescrire une dose plus faible, en particulier en début de traitement chez certains patients, comme ceux traités par des diurétiques à doses élevées, ou les patients insuffisants hépatiques ou les patients de plus de 75 ans. L'utilisation de losartan n'est pas recommandée chez les patients ayant une insuffisance hépatique grave.

## Contre-indications :

- Ne prenez jamais PREZAD<sup>®</sup> 50 mg, comprimé pelliculé sécable :
- Si vous êtes allergique au losartan ou à un des autres composants.
  - Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (il est également préférable d'éviter la grossesse - voir rubrique "Grossesse").
  - Si votre fonction hépatique est gravement dégradée.

Et contre tout autre diabète ou d'insuffisance rénale et si vous prenez l'insuline.

## Effets Indésirables :

Comme tous les médicaments, ce médicament est susceptible d'avoir des effets indésirables sur tout le monde.

Si vous ressentez l'effet suivant, arrêtez de prendre PREZAD<sup>®</sup> 50 mg, comprimé pelliculé sécable et contactez votre pharmacien ou l'hôpital le plus proche.

Une réaction allergique sévère (éruption cutanée, démangeaisons, gêne respiratoire ou asthme à révéler).

Ceci est un effet secondaire grave pouvant survenir avec plus d'un patient d'une surveillance médicale en urgence ou d'une hospitalisation.

Les effets indésirables suivants ont été rapportés avec PREZAD<sup>®</sup> 50 mg :

### Fréquents :

• Étourdissements,

• Baisse de la pression artérielle (particulièrement après une perfusion de glucose ou de doses élevées de diurétiques),

• Faiblesse,

• Fatigue,

• Trop peu de sucre dans le sang (hypoglycémie),

• Trop de potassium dans le sang (hyperkaliémie),

• Modification de la fonction rénale, y compris insuffisance rénale,

• Réduction du nombre de globules rouges dans le sang (anémie),

• élévation de l'urée dans le sang, de la créatinine et du potassium dans le

### Peu fréquents :

• Somnolence,

• Mauve de tête,

• Troubles du sommeil,

• Sensation d'accélération du rythme cardiaque (palpitations),

• Douleur dans la poitrine (angine de poitrine),

• Esoufflement (dyspnée),

• Douleurs abdominales,

• Constipation opiniâtre,

• Diarrhée,

• Nausées,

• Vomissements,

• Éruption (urticaire),

• Démangeaisons (prurit),

• Éruption cutanée,

• Gonflement localisé (œdème),

• Toux,

### Rares :

• Hypersensibilité,

• Angio-oedème,

• Inflammation des vaisseaux sanguins (vascularite incluant purpura et syndrome d'Eales),

• Enrouement ou picotements (paresthesies),

• Évanouissement (syncope),

• Battements de cœur très rapides et irréguliers (fibrillation auriculaire),

• Atteinte cérébrale (AVC),

• Inflammation du foie (hépatite),

• élévation du taux de l'alanine amino-transférase (ALAT), qui habite

### Fréquence indéterminée :

• Diminution du nombre de plaquettes,

• Migraine,

• Anomalies de la fonction hépatique,

• Douleurs musculaires et articulaires,

• Syndrome pseudo-grippal,

• Douleur dorsale et infection urinaire,

• Augmentation de la sensibilité ou de la tolérance (photosensibilité),

• Douleur musculaire inexplicable avec des urines foncées (de la couleuvre),

• Impuissance,

• Inflammation du pénis (pancréatite),

• Toux bas de sodium dans le sang (hypotonatrémie),

• Dépression,

• Sensation générale de malaise,

• Tintement, bourdonnement, grondement ou claquement dans les oreilles,

• Troubles du goût (dyguesie).

Les effets indésirables chez les enfants sont identiques à ceux rapportés.

## Mises en garde spéciales et Précautions posologiques

Adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien avant

Vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou êtes susceptible) déconseillée en début de grossesse ou si vous êtes enceinte ou d'utilisation à partir de ce stade de la grossesse.

Il est important d'avertir votre médecin avant de prendre PREZAD<sup>®</sup> 50 mg.

• Si vous avez déjà eu un angio-oedème (gonflement du visage, des lèvres,

• Si vous avez ou des vomissements importants ou des diarrhées, ou

• Si vous prenez des diurétiques (médicaments qui augmentent la quantité de liquide et de sel à

# PREZAD<sup>®</sup>

Losartan

Comprimé

PPV: 8 4DH80

PER: 04/25

LOT: L1576

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais pourraut lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet négatif, parlez-en à votre pharmacien.

Si vous avez des questions dans cette notice, parlez-en à votre

## Composition du médicament :

La substance active est :

LOSARTAN POTASSIQUE

Les autres composants sont :

Lactose monohydraté, cellulose microcristalline, emidon de maïs prégalatinisé, stéarate de magnésium, croscarmellose sodique type A, opadry II OY-5/28908 (white).

Liste des excipients à effet notable : Lactose.

Classe pharmaco-thérapeutique :

Le losartan (PREZAD<sup>®</sup>) appartient à un groupe de médicaments appelés antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II. L'angiotensine est une substance produite par votre organisme qui se lie aux récepteurs de la parole des vaisseaux sanguins entraînant leur contraction. Cela induit une augmentation de la pression artérielle. Le losartan empêche la liaison de l'angiotensine II à ces récepteurs entraînant la dilatation des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle. Le losartan ralentit la dégradation de la fonction rénale chez les patients ayant une pression artérielle élevée et un diabète de type 2.

## Indications thérapeutiques :

PREZAD<sup>®</sup> 50 mg, comprimé pelliculé sécable est utilisé :

- Pour traiter les adultes ayant une pression artérielle élevée (hypertension).
- Pour préserver la fonction rénale des patients hypertendus diabétiques de type 2 présentant une insuffisance rénale et une protéinurie ≥ 0,5g/jour (présence d'une quantité anormale de protéines dans les urines) confirmées par des examens biologiques.
- Pour traiter les patients insuffisants cardiaques lorsque le médecin juge qu'un traitement par les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC, médicaments antihypertenseurs) ne convient pas. Si l'insuffisance cardiaque a été stabilisée par un IEC, le traitement ne doit pas être modifié pour le losartan.
- Chez les patients présentant une hypertension et un épaissement du ventricule gauche. PREZAD<sup>®</sup> 50 mg, comprimé pelliculé sécable réduit le risque d'accident vasculaire cérébral (étude LIFE).

## Posologie, Mode et voie(s) d'administration, Durée du traitement et Fréquence d'administration:

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou de votre pharmacien en cas de doute.

Les comprimés doivent être avalés avec un verre d'eau. Essayez de prendre votre traitement quotidien à la même heure chaque jour. Il est important de ne pas arrêter le traitement par PREZAD<sup>®</sup> 50 mg, comprimé pelliculé sécable sans l'avis de votre médecin.

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou votre pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou votre pharmacien en cas de doute. Votre médecin décidera de la dose appropriée de PREZAD<sup>®</sup> 50 mg, comprimé pelliculé sécable en fonction de votre état et si vous prenez d'autres médicaments. Il est important de continuer à prendre PREZAD<sup>®</sup> 50 mg, comprimé pelliculé sécable aussi longtemps que votre médecin vous le prescrit, afin de permettre un contrôle régulier de votre pression artérielle.

Patients adultes hypertendus

La dose habituelle d'initiation est de 50 mg de losartan une fois par jour (1 comprimé de PREZAD<sup>®</sup> 50 mg, comprimé pelliculé sécable). L'effet sur la diminution de la pression artérielle atteint son maximum 3 à 6 semaines après le début du traitement. Chez certains patients la dose peut, plus tard, être augmentée à 100 mg de losartan une fois par jour (2 comprimés de PREZAD<sup>®</sup> 50 mg, comprimé pelliculé sécable ou 1 comprimé de PREZAD<sup>®</sup> 100 mg, comprimé pelliculé).

Si vous avez l'impression que l'effet de PREZAD<sup>®</sup> 50 mg, comprimé pelliculé sécable est trop fort ou trop faible, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Patients adultes hypertendus diabétiques de type 2

La dose habituelle d'initiation est 50 mg de losartan une fois par jour (1 comprimé de PREZAD<sup>®</sup> 50 mg, comprimé pelliculé sécable). La dose peut ensuite, être augmentée à 100 mg de losartan une fois par jour (2 comprimés de PREZAD<sup>®</sup> 50 mg, comprimé pelliculé sécable ou 1 comprimé de PREZAD<sup>®</sup> 100 mg, comprimé pelliculé) en fonction de la réponse tensionnelle.

Les comprimés de losartan peuvent être pris avec d'autres médicaments antihypertenseurs (tels que les diurétiques, les inhibiteurs calciques, les alpha et bêtabloquants et les antihypertenseurs d'action centrale) ainsi qu'avec l'insuline et les autres médicaments antidiabétiques couramment utilisés (par exemple, sulfamides hypoglycémiants, glicazones et inhibiteurs alpha glucosidases).

Patients adultes insuffisants cardiaques

La dose habituelle d'initiation est de 12,5 mg de losartan une fois par jour. Habituellement, la dose doit être augmentée par paliers chaque semaine (c'est-à-dire 12,5 mg par jour la première semaine, 25 mg par jour la deuxième semaine, 50 mg par jour la troisième semaine, 100 mg par jour la quatrième semaine, 150 mg par jour la cinquième semaine) jusqu'à la dose d'entretien établie par votre médecin. Une dose maximale de 150 mg de losartan une fois par jour peut être utilisée (par exemple, 3 comprimés de PREZAD<sup>®</sup> 50 mg, comprimé pelliculé sécable ou 1 comprimé de PREZAD<sup>®</sup> 100 mg, comprimé pelliculé et 1 comprimé de PREZAD<sup>®</sup> 50 mg, comprimé pelliculé sécable).

Dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, le losartan est habituellement associé à un diurétique (médicament qui augmente le passage de l'eau à travers le rein) et/ou un digitalique (médicament qui aide le cœur à fonctionner plus efficacement) et/ou un bêtabloquant.

Pharmacopie chez les groupes de patients particulières

Le médecin pourra prescrire une dose plus faible, en particulier en début de traitement chez certains patients, comme ceux traités par des diurétiques à doses élevées, ou les patients insuffisants hépatiques ou les patients de plus de 75 ans. L'utilisation de losartan n'est pas recommandée chez les patients ayant une insuffisance hépatique grave.

## Contre-indications :

- Ne prenez jamais PREZAD<sup>®</sup> 50 mg, comprimé pelliculé sécable :
- Si vous êtes allergique au losartan ou à un des autres composants.
  - Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (il est également préférable d'éviter la grossesse - voir rubrique "Grossesse").
  - Si votre fonction hépatique est gravement dégradée.

Et contre tout autre diabète ou d'insuffisance rénale et si vous prenez l'insuline.

## Effets Indésirables :

Comme tous les médicaments, ce médicament est susceptible d'avoir des effets indésirables sur tout le monde.

Si vous ressentez l'effet suivant, arrêtez de prendre PREZAD<sup>®</sup> 50 mg, comprimé pelliculé sécable et contactez votre pharmacien ou l'hôpital le plus proche.

Une réaction allergique sévère (éruption cutanée, démangeaisons, gêne respiratoire ou asthme à révéler).

Ceci est un effet secondaire grave pouvant survenir avec plus d'un patient d'une surveillance médicale en urgence ou d'une hospitalisation.

Les effets indésirables suivants ont été rapportés avec PREZAD<sup>®</sup> 50 mg :

### Fréquents :

• Étourdissements,

• Baisse de la pression artérielle (particulièrement après une perfusion de glucose ou de doses élevées de diurétiques),

• Faiblesse,

• Fatigue,

• Trop peu de sucre dans le sang (hypoglycémie),

• Trop de potassium dans le sang (hyperkaliémie),

• Modification de la fonction rénale, y compris insuffisance rénale,

• Réduction du nombre de globules rouges dans le sang (anémie),

• élévation de l'urée dans le sang, de la créatinine et du potassium dans le

### Peu fréquents :

• Somnolence,

• Mauve de tête,

• Troubles du sommeil,

• Sensation d'accélération du rythme cardiaque (palpitations),

• Douleur dans la poitrine (angine de poitrine),

• Esoufflement (dyspnée),

• Douleurs abdominales,

• Constipation opiniâtre,

• Diarrhée,

• Nausées,

• Vomissements,

• Éruption (urticaire),

• Démangeaisons (prurit),

• Éruption cutanée,

• Gonflement localisé (œdème),

• Toux,

### Rares :

• Hypersensibilité,

• Angio-oedème,

• Inflammation des vaisseaux sanguins (vascularite incluant purpura et syndrome d'Eales),

• Enrouement ou picotements (paresthesies),

• Évanouissement (syncope),

• Battements de cœur très rapides et irréguliers (fibrillation auriculaire),

• Atteinte cérébrale (AVC),

• Inflammation du foie (hépatite),

• élévation du taux de l'alanine amino-transférase (ALAT), qui habite

### Fréquence indéterminée :

• Diminution du nombre de plaquettes,

• Migraine,

• Anomalies de la fonction hépatique,

• Douleurs musculaires et articulaires,

• Syndrome pseudo-grippal,

• Douleur dorsale et infection urinaire,

• Augmentation de la sensibilité ou de la tolérance (photosensibilité),

• Douleur musculaire inexplicable avec des urines foncées (de la couleuvre),

• Impuissance,

• Inflammation du pénis (pancréatite),

• Toux bas de sodium dans le sang (hypotonatrémie),

• Dépression,

• Sensation générale de malaise,

• Tintement, bourdonnement, grondement ou claquement dans les oreilles,

• Troubles du goût (dyguesie).

Les effets indésirables chez les enfants sont identiques à ceux rapportés.

## Mises en garde spéciales et Précautions posologiques

Adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien avant

Vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou êtes susceptible) déconseillée en début de grossesse ou si vous êtes enceinte ou d'utilisation à partir de ce stade de la grossesse.

Il est important d'avertir votre médecin avant de prendre PREZAD<sup>®</sup> 50 mg.

• Si vous avez déjà eu un angio-oedème (gonflement du visage, des lèvres,

• Si vous avez ou des vomissements importants ou des diarrhées, ou

• Si vous prenez des diurétiques (médicaments qui augmentent la quantité de liquide et de sel à







# ZYLORIC® 100 mg, 200 mg et 300 mg, comprimés

## ALLOPURINOL

Veuillez lire attentivement  
médicament car elle contient :

- Gardez cette notice, vous en aurez besoin.
- Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser à votre pharmacien ou à votre médecin.
- Ce médicament vous aide à prévenir la maladie de goutte chez d'autres personnes. Il peut être nécessaire de prendre ce médicament sur une longue période, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que ZYLORIC comprimés, et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ZYLORIC, comprimés ?
3. Comment prendre ZYLORIC comprimés ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ZYLORIC comprimés ?
6. Informations supplémentaires.

### 1. QU'EST-CE QUE ZYLORIC comprimés, ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Les comprimés de ZYLORIC contiennent un principe actif appelé l'allopurinol. Il agit en ralentissant la vitesse de certaines réactions chimiques dans votre organisme afin de diminuer le taux d'acide urique dans le sang et les urines. ZYLORIC, comprimé est utilisé pour réduire ou prévenir la formation de dépôts d'urate/d'acide urique lorsque votre organisme produit en trop grande quantité une substance appelée l'acide urique. Ces dépôts sont responsables de la goutte ou de certains types de calculs rénaux ou de certains autres types de problèmes rénaux.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZYLORIC comprimés ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

**Ne prenez jamais ZYLORIC, comprimé :**

- En cas d'allergie connue à l'allopurinol ou à l'un des constituants du produit mentionnés dans la rubrique 6.
- Chez l'enfant de moins de 6 ans (contre-indication liée à la forme pharmaceutique).

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

#### Avertissements et précautions :

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ière avant de prendre ZYLORIC mg, comprimé si vous :

- Avez des problèmes au niveau de votre foie ou de vos reins.
- Souffrez de problèmes cardiaques ou d'une hypertension artérielle et si vous prenez des diurétiques et/ou un médicament appelé un IEC (inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine).
- Souffrez actuellement d'une crise de goutte.
- Êtes d'origine chinoise, ethnie Han, africaine ou indienne.
- Avez des problèmes de thyroïde.

Faites particulièrement attention avec ZYLORIC, comprimé :

- Des éruptions cutanées ont été signalées chez des patients prenant de l'allopurinol. Fréquemment, l'éruption cutanée peut entraîner des ulcères au niveau de la bouche, de la gorge, du nez, des organes génitaux et une conjonctivite (yeux rouges et gonflés). Ces éruptions cutanées graves sont souvent précédées par des symptômes pseudo-grippaux, fièvre, maux de tête, courbatures (symptômes ressemblant à la grippe). L'éruption peut évoluer vers une apparition de vésicules sur tout le corps et une desquamation de la peau. En cas d'éruption cutanée ou de symptômes cutanés, arrêtez de prendre

LOT 221348  
EXP 05.2026  
PPV 31.30

l'allopurinol et contactez votre médecin.

• Si vous souffrez de石道症, veuillez consulter votre médecin.

**Autres médicaments**

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez ou pourriez prendre l'un des médicaments suivants :

• Aspirine

• Théophylline, utilisée pour traiter l'asthme et la bronchite chronique.

• Médicaments utilisés pour traiter l'acné.

• Vidarabine (anti-viral).

• Didanosine, utilisée pour traiter l'acné.

• Antibiotiques (ampicilline).

• Médicaments utilisés pour traiter l'acné.



# ZYLORIC® 100 mg, 200 mg et 300 mg, comprimés

## ALLOPURINOL

Veuillez lire attentivement  
médicament car elle contient :

- Gardez cette notice, vous en aurez besoin.
- Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser à votre pharmacien ou à votre médecin.
- Ce médicament vous aide à prévenir les crises de goutte chez d'autres personnes. Il peut être nécessaire de prendre ce médicament la nuit, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que ZYLORIC comprimés, et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ZYLORIC, comprimés ?
3. Comment prendre ZYLORIC comprimés ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ZYLORIC comprimés ?
6. Informations supplémentaires.

### 1. QU'EST-CE QUE ZYLORIC comprimés, ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Les comprimés de ZYLORIC contiennent un principe actif appelé l'allopurinol. Il agit en ralentissant la vitesse de certaines réactions chimiques dans votre organisme afin de diminuer le taux d'acide urique dans le sang et les urines. ZYLORIC, comprimé est utilisé pour réduire ou prévenir la formation de dépôts d'urate/d'acide urique lorsque votre organisme produit en trop grande quantité une substance appelée l'acide urique. Ces dépôts sont responsables de la goutte ou de certains types de calculs rénaux ou de certains autres types de problèmes rénaux.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZYLORIC comprimés ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

**Ne prenez jamais ZYLORIC, comprimé :**

- En cas d'allergie connue à l'allopurinol ou à l'un des constituants du produit mentionnés dans la rubrique 6.
- Chez l'enfant de moins de 6 ans (contre-indication liée à la forme pharmaceutique).

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

#### Avertissements et précautions :

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ière avant de prendre ZYLORIC mg, comprimé si vous :

- Avez des problèmes au niveau de votre foie ou de vos reins.
- Souffrez de problèmes cardiaques ou d'une hypertension artérielle et si vous prenez des diurétiques et/ou un médicament appelé un IEC (inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine).
- Souffrez actuellement d'une crise de goutte.
- Êtes d'origine chinoise, ethnie Han, africaine ou indienne.
- Avez des problèmes de thyroïde.

Faites particulièrement attention avec ZYLORIC, comprimé :

- Des éruptions cutanées ont été signalées chez des patients prenant de l'allopurinol. Fréquemment, l'éruption cutanée peut entraîner des ulcères au niveau de la bouche, de la gorge, du nez, des organes génitaux et une conjonctivite (yeux rouges et gonflés). Ces éruptions cutanées graves sont souvent précédées par des symptômes pseudo-grippaux, fièvre, maux de tête, courbatures (symptômes ressemblant à la grippe). L'éruption peut évoluer vers une apparition de vésicules sur tout le corps et une desquamation de la peau. En cas d'éruption cutanée ou de symptômes cutanés, arrêtez de prendre

LOT 221348  
EXP 05.2026  
PPV 31.30

l'allopurinol et contactez

• Si vous souffrez de

passer dans les voies urinaires.

**Autres médicaments :**

Informez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce médicament, car il pourrait vous déranger.

• Aspirine

• Théophylline, utilisée pour traiter l'asthme et la bronchite chronique.

• Médicaments utilisés pour traiter les infections virales.

• Didanosine, utilisée pour traiter les infections virales.

• Antibiotiques (ampicilline, ciprofloxacine, etc.).

• Médicaments utilisés pour traiter les crises d'épilepsie.

• Médicaments utilisés pour traiter



# ZYLORIC® 100 mg, 200 mg et 300 mg, comprimés

## ALLOPURINOL

Veuillez lire attentivement  
médicament car elle contient :

- Gardez cette notice, vous en aurez besoin.
- Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser à votre pharmacien ou à votre médecin.
- Ce médicament vous aide à prévenir les crises de goutte chez d'autres personnes. Il peut être nécessaire de prendre ce médicament la nuit, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que ZYLORIC comprimés, et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ZYLORIC, comprimés ?
3. Comment prendre ZYLORIC comprimés ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ZYLORIC comprimés ?
6. Informations supplémentaires.

### 1. QU'EST-CE QUE ZYLORIC comprimés, ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Les comprimés de ZYLORIC contiennent un principe actif appelé l'allopurinol. Il agit en ralentissant la vitesse de certaines réactions chimiques dans votre organisme afin de diminuer le taux d'acide urique dans le sang et les urines. ZYLORIC, comprimé est utilisé pour réduire ou prévenir la formation de dépôts d'urate/d'acide urique lorsque votre organisme produit en trop grande quantité une substance appelée l'acide urique. Ces dépôts sont responsables de la goutte ou de certains types de calculs rénaux ou de certains autres types de problèmes rénaux.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZYLORIC comprimés ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

**Ne prenez jamais ZYLORIC, comprimé :**

- En cas d'allergie connue à l'allopurinol ou à l'un des constituants du produit mentionnés dans la rubrique 6.
- Chez l'enfant de moins de 6 ans (contre-indication liée à la forme pharmaceutique).

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

#### Avertissements et précautions :

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ière avant de prendre ZYLORIC mg, comprimé si vous :

- Avez des problèmes au niveau de votre foie ou de vos reins.
- Souffrez de problèmes cardiaques ou d'une hypertension artérielle et si vous prenez des diurétiques et/ou un médicament appelé un IEC (inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine).
- Souffrez actuellement d'une crise de goutte.
- Êtes d'origine chinoise, ethnie Han, africaine ou indienne.
- Avez des problèmes de thyroïde.

Faites particulièrement attention avec ZYLORIC, comprimé :

- Des éruptions cutanées ont été signalées chez des patients prenant de l'allopurinol. Fréquemment, l'éruption cutanée peut entraîner des ulcères au niveau de la bouche, de la gorge, du nez, des organes génitaux et une conjonctivite (yeux rouges et gonflés). Ces éruptions cutanées graves sont souvent précédées par des symptômes pseudo-grippaux, fièvre, maux de tête, courbatures (symptômes ressemblant à la grippe). L'éruption peut évoluer vers une apparition de vésicules sur tout le corps et une desquamation de la peau. En cas d'éruption cutanée ou de symptômes cutanés, arrêtez de prendre

LOT 221348  
EXP 05.2026  
PPV 31.30

l'allopurinol et contactez

• Si vous souffrez de

passer dans les voies urinaires.

**Autres médicaments :**

Informez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce médicament, car il pourrait vous déranger.

• Aspirine

• Théophylline, utilisée pour traiter l'asthme et la bronchite chronique.

• Médicaments utilisés pour traiter les infections virales.

• Didanosine, utilisée pour traiter les infections virales.

• Antibiotiques (ampicilline, ciprofloxacine, etc.).

• Médicaments utilisés pour traiter les crises d'épilepsie.

• Médicaments utilisés pour traiter



# ZYLORIC® 100 mg, 200 mg et 300 mg, comprimés

## ALLOPURINOL

Veuillez lire attentivement  
médicament car elle contient :

- Gardez cette notice, vous en aurez besoin.
- Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser à votre pharmacien ou à votre médecin.
- Ce médicament vous aide à prévenir la maladie de goutte chez d'autres personnes. Il peut être nécessaire de prendre ce médicament sur une longue période, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que ZYLORIC comprimés, et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ZYLORIC, comprimés ?
3. Comment prendre ZYLORIC comprimés ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ZYLORIC comprimés ?
6. Informations supplémentaires.

### 1. QU'EST-CE QUE ZYLORIC comprimés, ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Les comprimés de ZYLORIC contiennent un principe actif appelé l'allopurinol. Il agit en ralentissant la vitesse de certaines réactions chimiques dans votre organisme afin de diminuer le taux d'acide urique dans le sang et les urines. ZYLORIC, comprimé est utilisé pour réduire ou prévenir la formation de dépôts d'urate/d'acide urique lorsque votre organisme produit en trop grande quantité une substance appelée l'acide urique. Ces dépôts sont responsables de la goutte ou de certains types de calculs rénaux ou de certains autres types de problèmes rénaux.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZYLORIC comprimés ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

**Ne prenez jamais ZYLORIC, comprimé :**

- En cas d'allergie connue à l'allopurinol ou à l'un des constituants du produit mentionnés dans la rubrique 6.
- Chez l'enfant de moins de 6 ans (contre-indication liée à la forme pharmaceutique).

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

#### Avertissements et précautions :

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ière avant de prendre ZYLORIC mg, comprimé si vous :

- Avez des problèmes au niveau de votre foie ou de vos reins.
- Souffrez de problèmes cardiaques ou d'une hypertension artérielle et si vous prenez des diurétiques et/ou un médicament appelé un IEC (inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine).
- Souffrez actuellement d'une crise de goutte.
- Êtes d'origine chinoise, ethnie Han, africaine ou indienne.
- Avez des problèmes de thyroïde.

Faites particulièrement attention avec ZYLORIC, comprimé :

- Des éruptions cutanées ont été signalées chez des patients prenant de l'allopurinol. Fréquemment, l'éruption cutanée peut entraîner des ulcères au niveau de la bouche, de la gorge, du nez, des organes génitaux et une conjonctivite (yeux rouges et gonflés). Ces éruptions cutanées graves sont souvent précédées par des symptômes pseudo-grippaux, fièvre, maux de tête, courbatures (symptômes ressemblant à la grippe). L'éruption peut évoluer vers une apparition de vésicules sur tout le corps et une desquamation de la peau. En cas d'éruption cutanée ou de symptômes cutanés, arrêtez de prendre

LOT 221348  
EXP 05.2026  
PPV 31.30

l'allopurinol et contactez votre médecin.

• Si vous souffrez de石道症, veuillez consulter votre médecin.

**Autres médicaments**

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez ou pourriez prendre l'un des médicaments suivants :

• Aspirine

• Théophylline, utilisée pour traiter l'asthme et la bronchite chronique.

• Médicaments utilisés pour traiter l'acné.

• Vidarabine (anti-viral).

• Didanosine, utilisée pour traiter l'acné.

• Antibiotiques (ampicilline).

• Médicaments utilisés pour traiter l'acné.

• Médicaments utilisés pour traiter l'acné.