

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

M22- 0020656

143501

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 6986

Actif Pensionné(e)

Société : Retrite RAM -

Autre :

Nom & Prénom : SERBOUTI ABDELLAÏD

Date de naissance :

Adresse : Tranche 18 num 23 n° 14 ATTachouak

Tél. : 066.18.14.74

Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 01/11/2022

Nom et prénom du malade : SERBOUTI Abdellader Age:

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

DERMATITE DÉSINFECTÉE DE LA MAIN DRABIELE TYPE 2

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.



Fait à :

Le : 01/11/2022

Signature de l'adhérent(e) :



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
01/01/22	C	0		 

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
INPE:092057199	01/11/2012 272,-	272,00

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

AUXILIAIRES MEDICAUX


Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				Coefficient des travaux
				Montants des soins
				Début d'exécution
				Fin d'exécution
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H 25533412 00000000 D 00000000 35533411	G 21433552 00000000 G 00000000 11433553	B	Coefficient des travaux
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			Montants des soins
				Date du devis
				Date de l'exécution

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Le : 01/11/22.

ORDONNANCE

SERBOUTI

132,00

1) NANOCHIM S
AS



α 3 / 10



140,00

Meho



2)



272,00
Medecin Generaliste
DR. FAHIMA BENDOUAR

PHARMACIE WALLI
ABERRAZAK MOUJADI
DOCTEUR EN PHARMACIE
Hay El Wella 3 N° 7 SIDI
BENNOUAR Casablanca Tel: 05 22 72 53 01

DR BENNOUAR u.

mebo

Pommade

Tube de 30g

DCI : Extrait de l'huile de sésame
(β -SITOSTEROL)

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous. Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les instructions fournies dans cette notice ou par votre pharmacien ou votre médecin.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes, il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que Mebo POMMADE et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Mebo POMMADE ?
3. Comment prendre Mebo POMMADE ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Mebo POMMADE ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE Mebo POMMADE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Introduction :

Le traitement des brûlures exposées à l'humidité a été introduit dans la pratique médicale depuis deux décennies en Chine. Le concept de cette thérapie était d'exposer la plaie à l'humidité ambiante dans le but d'augmenter le processus de cicatrisation naturel, pour que la migration des kératinocytes, l'anxiogénies ainsi que l'interaction avec les facteurs de croissance soient facilitées.

Mebo (pommade pour le traitement des brûlures exposées à l'humidité) est donc la pommade spécialement développée pour répondre à ces critères.

Mode d'action :

Code ATC : D03A, Préparations pour le traitement des plaies et des ulcères, cicatrisants.

Mebo agit en :

- Fournissant un optimum d'humidité physiologique nécessaire à la régénération et à la réparation.
- Provoyant un effet anti-inflammatoire et réduisant cependant l'œdème et l'erythème.
- Créeant une atmosphère défavorable à la colonisation bactérienne et fongique.
- Isolant et protégeant les extrémités nerveuses exposées et lésées produisant cependant un effet analgésique.
- Fournissant une nutrition locale pour les cellules de fond lésées.
- Liquéfiant les tissus nécrotiques.
- Isolant et protégeant les plaies du milieu ambiant mais en même temps en conservant un drainage ainsi qu'un échange gazeux efficace.
- Réduisant la perte de fluide de la peau endommagée (brûlures).
- Absorbant la chaleur résiduelle dans les brûlures aigües.
- Activant l'épithérialisation dans un ordre exceptionnellement acceptable.

Indications thérapeutique :

• Brûlures d'épaisseur partielle et superficielle locales et des ulcères cutanés.

• Plaies aiguës superficielles, coupures et égratignures.

• Avec le pansement sur des plaies chirurgicales et sur le tissu nécrotique de la peau.

• Talons secs et fissurés, mamelons crevassés, et les plaies des muqueuses.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE Mebo POMMADE ?

Contre-indications :

• Mebo ne doit pas être utilisé chez les personnes ayant présenté une hypersensibilité à l'un de ses composants.

Mises en garde spéciales et précautions d'emploi :

• Mebo ne doit pas être utilisé chez les personnes ayant présenté une hypersensibilité à l'un de ses composants.

• Pendant la conservation l'apparence physique de la pommade Mebo peut changer spécialement durant les saisons chaudes mais sans que cela puisse affecter l'efficacité du produit.

• Ce médicament contient l'huile de sésame. Peut, dans de rares cas, provoquer de graves réactions allergiques.

Interaction avec autres médicaments et autres formes d'interactions :

Aucune interaction médicamenteuse connue n'a été signalée.

Interaction avec les aliments et les boissons :

Sans objet.

Fécondité, grossesse et allaitement

Mebo est utilisé depuis plus de deux décennies, même par les femmes enceintes et allaitantes, sans aucun effet secondaire signalé.

Enfant :

Mebo est sans danger pour les enfants.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines:

Il n'est pas probable que Mebo peut affecter l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

Sportifs :

Sans objet

Excipients à effet notable :

Huile de sésame.

3. COMMENT PRENDRE Mebo POMMADE ?

Mode d'administration:

Voie cutanée.

NOVOCLIN® Sachets Amoxicilline - acide clavulanique

PRESENTATIONS ET COMPOSITION :

NOVOCLIN 1 g/125 mg (Rapport : 8/1), boîtes de 12, 16 et 20 sachets.

Acide clavulanique.....

NOVOCLIN 500 mg/62,5 mg (Rapport : 8/1), boîtes de 12, 16 et 20 sachets.

Amoxicilline.....

Acide clavulanique.....

NOVOCLIN 250 mg/31,25 mg (Rapport : 8/1), boîtes de 12, 16 et 20 sachets.

Amoxicilline.....

Acide clavulanique.....

Excipients à effet notable : Aspartam.

INDICATIONS :

Elles sont limitées aux infections dûes aux germes sensibles et aux espèces bactériennes responsables de l'infection peuvent être sensibles et/ou résistantes aux antibiotiques actuellement disponibles. NOVOCLIN présente un intérêt particulier dans les indications suivantes :

- Otites moyennes aiguës du jeune enfant, otites récidivantes ;
- Sinusites ;
- Angines récidivantes, amygdalite chronique ;
- Bronchopneumopathies aiguës du sujet à risque : éthylique chronique, tabagique, sujet de plus de 65 ans ;
- Surinfections de bronchopneumopathies chroniques ;
- Infections urinaires récidivantes ou compliquées à l'exclusion des prostatiques ;
- Infections gynécologiques hautes à l'exclusion des infections à chlamydiae ;
- Infections stomatologiques sévères : abcès, phlegmons, cellulites, parodontites.

CONTRE-INDICATIONS :

- Allergie aux pénicillines ;
- Mononucléose et association avec l'allopurinol (risque accru d'accidents cutanés).

EFFETS INDESIRABLES :

- Manifestations digestives : nausées, vomissements, diarrhées, dyspepsies et douleurs abdominales.
- Manifestations allergiques, notamment urticaire, éosinophilie, œdème de Quincke, gêne respiratoire, exceptionnellement choc anaphylactique.
- Eruptions cutanées maculopapuleuses d'origine allergique ou non.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Tenir compte du risque d'allergie croisée avec les antibiotiques de la famille des céphalosporines.
- En cas d'insuffisance rénale, adapter la posologie en fonction de la clairance de la créatinine.
- Tenir compte du fait que NOVOCLIN traverse la barrière placentaire et passe dans le lait maternel.

MISES EN GARDE :

En cas de manifestation allergique, arrêter le traitement et prévenir le médecin.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE :

Voie orale.

Déchirer le haut du sachet et verser le contenu dans un verre, ajouter de l'eau, remuer et boire immédiatement.

Les posologies sont exprimées en Amoxicilline elles dépendent de la sévérité de l'infection, en moyenne :

- **Adultes** : la posologie usuelle est de 2 à 3 g/jour soit 1 sachet de 1g/125 mg 2 à 3 fois par jour.
- **Enfants de 6 à 12 ans** : la posologie est de 40 à 50 mg/kg/jour de Novoclin sachets 500 mg/62,5 mg 2 à 3 fois par jour sans jamais dépasser 15 mg/kg/jour d'acide clavulanique.
- **Enfants de 30 mois à 6 ans** : la posologie est de 80 mg/kg/jour de Novoclin sachets 500 mg /62,5 mg 2 à 3 fois par jour.

- **Enfants de moins de 30 mois** : la posologie est de 80 mg/kg/jour de Novoclin sachets 250 mg/31,25mg 3 fois par jour.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE STOCKAGE ET DE CONSERVATION :

- A conserver à une T°<25° à l'abri de l'humidité.
- Durée de conservation : 2 ans.

Liste 1.



Fabriqué par le laboratoire Pharmaceutique NOVOPHARMA
Z.I.I.2 Tit Mellil - Casablanca -

PRLN0V02 V02