

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n°09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 [LG] - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



**MUPRAS**  
Mutuelle de Prévoyance  
& d'Actions Sociales  
de Royal Air Maroc

## Déclaration de Maladie

M22- N° 003102

143788

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

### Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 2538

Société : Ret RAM

Actif  Pensionné(e)  Autre :

Nom & Prénom : KACHANI MUSTAPHA

Date de naissance : 01/01/1951

Adresse : JAMILA 5 Rue 187 N° 29 C10 CASA

Tél. : 0667028896

Total des frais engagés : 967,80 Dh

### Cadre réservé au Médecin

Docteur Abdellah HALIMI  
Hépatogastroentérologue  
Angle Place de la préfecture & Bd 10 Mars  
2<sup>e</sup> Etage Sidi Othmane - Casablanca  
INP : 091071340 Tél. : 05 22 57 83 31

Date de consultation : 31 DEC. 2022

Nom et prénom du malade : SEMHI KHALIDA Age: 68 ans

Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint  Enfant

Nature de la maladie : lipomes virginali.

Affection longue durée ou chronique :  ALD  ALC

Pathologie :


En cas d'accident préciser les causes et circonstances

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent(e) :



Le : 04/01/2023

Autorisation CNPD N° : A-A-215 / 2019

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Recouvrement des Actes
1 DEC. 2022	1 C2 + Edo	1 + K30	20000 + 3000	Dr Abdellah HAFIZI Rue Pasteur - Casablanca - Tel : 05 22 57 53 31

### EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE MAMADOU LARIZI 153 Bd NAKDAR LARIZI ICE: 002847547000080	31/12/22	467.80

### ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

### AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

#### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	COEFFICIENT DES TRAVAUX
				
				
<b>O.D.F PROTHESES DENTAIRES</b>				
<b>DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE</b>				<b>COEFFICIENT DES TRAVAUX</b>
H	25533412 00000000	21433552 00000000	G	
D	00000000 35533411	00000000 11433553	B	
<b>(Création, remont, adjonction)</b> Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession				<b>MONTANTS DES SOINS</b>
				<b>DATE DU DEVIS</b>
				<b>DATE DE L'EXECUTION</b>
				<b>VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION</b>

# Dr. Abdelilah HALIMI

SPÉCIALISTE DES MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF  
(Foie, estomac, intestins, maladies et chirurgie de l'anus)

## ENDOSCOPIE DIGESTIVE - ECHOGRAPHIE

Lauréat de l'Université de Montpellier

Diplômé Universitaire en échographie clinique

Diplômé Universitaire en proctologie

Ancien attaché du CHU de Montpellier et des hôpitaux de France

# الدكتور عبد الله حليمي

إخلاصي في أمراض الجهاز الهضمي  
الكبد - المعدة - الأمعاء - أمراض و جراحة المخرج  
الفحص بالألياف الضوئية - الفحص بالأمواج فوق الصوتية  
خريج كلية الطب مونبلييه فرنسا  
حاصل على شهادة جامعية في الفحص بالأمواج فوق الصوتية  
حاصل على شهادة جامعية في أمراض المخرج  
طبيب في مستشفيات فرنسا والمركز الطبي الجامعي مونبلييه سابقا



INP091071340

Casablanca, le : 31/12/2022

## Mme SEMHI Khadija

40.00x2

ANTI-SPA 200 MG N° 2

1 comprimé, 3 fois par jour, avant les repas

28.00 ALIVIAR 50

1 comprimé, 3 fois par jour, après les repas

25.00 RACIPER 40 MG, BOITE DE 28

1 comprimé le matin, 30 mn avant le repas

89.50 NEOBILINE AD


1 ampoule, à boire à midi, avant le repas

56.30 CARMINEX

1 sachet, matin et soir, après les principaux les repas

467,80

Dr. Abdelilah HALIMI  
Hépato-gastroentérologue  
Angle Place de la préfecture & Bd 10 Mars  
2<sup>e</sup> Etage Sidi Othmane - Casablanca  
INP : 091071340 Tél : 05 22 57 53 31





# ANTI-SPA® 200 mg, comprimés pelliculés

## Boîte de 30

### Mébénzépine chlorhydrate

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

#### Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE ANTI-SPA 200 mg, comprimés pelliculés ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAIRE AVANT DE PRENDRE ANTI-SPA 200 mg, comprimés pelliculés ?
3. COMMENT PRENDRE ANTI-SPA 200 mg, comprimés pelliculés ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER ANTI-SPA 200 mg, comprimés pelliculés ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

#### 1. QU'EST-CE QUE ANTI-SPA 200 mg, comprimés pelliculés ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

##### ANTISPASMODIQUE MUSCULOTROPE

(A: appareil digestif et métabolisme)

Ce médicament est un anti-spasmodique musculotrope.

Il est indiqué dans les douleurs spastiques du tube digestif et des voies biliaires et l'inconfort intestinal.

#### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAIRE AVANT DE PRENDRE ANTI-SPA 200 mg, comprimés pelliculés ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

##### Ne prenez jamais ANTI-SPA 200 mg, comprimés pelliculés:

Allergie à l'un des constituants et chez l'enfant de moins de 6 ans en raison du risque de fausse route (avaler de travers).

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

##### Précautions d'utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament pris sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

##### Grossesse et allaitement

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin.

car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

L'administration de ce médicament est déconseillée chez la femme qui allaite.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

#### 3. COMMENT PRENDRE ANTI-SPA 200 mg, comprimés pelliculés ?

##### Posologie

La posologie usuelle est de 1 comprimé, 2 à 3 fois par jour. Le comprimé sera pris avant les repas, avec un verre d'eau.

##### Mode d'administration

Voie orale.

##### Fréquence d'administration

Se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin.

##### Durée de traitement

Se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin.

#### 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ANTI-SPA 200 mg, comprimés pelliculés est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

- Rarement: nausées, céphalées.

- Très rares éruptions cutanées avec ou sans prurit. Très rares réactions allergiques, notamment urticaire ou œdème de Quincke.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

#### 5. COMMENT CONSERVER ANTI-SPA 200 mg, comprimés pelliculés ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser ANTI-SPA 200 mg, comprimés pelliculés après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

Pas de conditions particulières de conservation

#### 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient ANTI-SPA 200 mg, comprimés pelliculés ?

La substance active est :

Mébénzépine chlorhydrate ..... 200,00 mg

Pour un comprimé pelliculé.

Les autres composants sont :

Lactose, hydroxyéthylcellulose, saccharose, amyloglycollate de sodium, aerosil, avicel PH 102, stéarate de magnésium, eau purifiée.

Pelliculage : Dioxyde de titane, talc, hydroxypropylméthylcellulose, eau purifiée.

Excipients à effet notable : Lactose, saccharose.

Qu'est-ce que ANTI-SPA 200 mg, comprimés pelliculés extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de comprimés pelli-

Fabricant / Titulaire d'AMM :

Laboratoires SOTHEMA

B.P. N° 1, 27182 Bouskoura

MAROC

Conditions de presc.

Liste II (Tableau C)

LOT 220750 3 EXP 03 2024

Date de révision de

PPU 40.00 DH

Anti-Spa® 200 mg

30 comprimés pelliculés

AMM N° 65/G/17/DMP/21/NRQ



6 118000 021780



# ANTI-SPA® 200 mg, comprimés pelliculés

## Boîte de 30

### Mébénzépine chlorhydrate

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

#### Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE ANTI-SPA 200 mg, comprimés pelliculés ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAIRE AVANT DE PRENDRE ANTI-SPA 200 mg, comprimés pelliculés ?
3. COMMENT PRENDRE ANTI-SPA 200 mg, comprimés pelliculés ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER ANTI-SPA 200 mg, comprimés pelliculés ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

#### 1. QU'EST-CE QUE ANTI-SPA 200 mg, comprimés pelliculés ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

##### ANTISPASMODIQUE MUSCULOTROPE

(A: appareil digestif et métabolisme)

Ce médicament est un anti-spasmodique musculotrope.

Il est indiqué dans les douleurs spastiques du tube digestif et des voies biliaires et l'inconfort intestinal.

#### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAIRE AVANT DE PRENDRE ANTI-SPA 200 mg, comprimés pelliculés ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

##### Ne prenez jamais ANTI-SPA 200 mg, comprimés pelliculés:

Allergie à l'un des constituants et chez l'enfant de moins de 6 ans en raison du risque de fausse route (avaler de travers).

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

##### Prise en utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament pris sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

##### Grossesse et allaitement

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin.

car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

L'administration de ce médicament est déconseillée chez la femme qui allaite.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

#### 3. COMMENT PRENDRE ANTI-SPA 200 mg, comprimés pelliculés ?

##### Posologie

La posologie usuelle est de 1 comprimé, 2 à 3 fois par jour. Le comprimé sera pris avant les repas, avec un verre d'eau.

##### Mode d'administration

Voie orale.

##### Fréquence d'administration

Se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin.

##### Durée de traitement

Se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin.

#### 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ANTI-SPA 200 mg, comprimés pelliculés est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

- Rarement: nausées, céphalées.

- Très rares éruptions cutanées avec ou sans prurit. Très rares réactions allergiques, notamment urticaire ou œdème de Quincke.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

#### 5. COMMENT CONSERVER ANTI-SPA 200 mg, comprimés pelliculés ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser ANTI-SPA 200 mg, comprimés pelliculés après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

Pas de conditions particulières de conservation

#### 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient ANTI-SPA 200 mg, comprimés pelliculés ?

La substance active est :

Mébénzépine chlorhydrate ..... 200,00 mg

Pour un comprimé pelliculé.

Les autres composants sont :

Lactose, hydroxyéthylcellulose, saccharose, amyloglycollate de sodium, aerosil, avicel PH 102, stéarate de magnésium, eau purifiée.

Pelliculage : Dioxyde de titane, talc, hydroxypropylméthylcellulose, eau purifiée.

Excipients à effet notable : Lactose, saccharose.

Qu'est-ce que ANTI-SPA 200 mg, comprimés pelliculés extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de comprimés pelli-

Fabricant / Titulaire d'AMM :

Laboratoires SOTHEMA

B.P. N° 1, 27182 Bouskoura

MAROC

Conditions de presc.

Liste II (Tableau C)

LOT 220750 3 EXP 03 2024

Date de révision de

PPU 40.00 DH

Anti-Spa® 200 mg

30 comprimés pelliculés

AMM N° 65/G/17/DMP/21/NRQ



6 118000 021780

votre propre chef le dosage prescrit. Adresser-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte. Veuillez ne pas interrompre votre traitement préalablement sans l'avis de votre médecin.

Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

La posologie est variable et doit être adaptée à chaque cas. La posologie minimale efficace sera toujours recherchée. Si l'état clinique du patient le permet le traitement sera instauré à dose faible, puis augmenté progressivement par palier.

- **Recommandations des doses habituelles :**

- **Adulte**

La posologie journalière est de 50 mg à 150 mg pendant 4 semaines au maximum.

- **Enfants de plus de 6 ans**

La posologie journalière est 5 à 10 mg /kg

- **Symptômes et instructions en cas de surdosage :**

- **Si vous avez pris plus de ALIVIAR® 50 mg, gélules que vous n'auriez dû**

En cas de prise d'une dose excessive de médicament, prévenir immédiatement un médecin ou un service d'urgence en raison du risque de survenue de troubles cardiaques graves.

En cas de surdosage peuvent survenir : dyskynésie avec torticolis spasmodique, protrusion de la langue et trismus, certains patients peuvent développer un syndrome parkinsonien pouvant mettre en jeu le pronostic vital voire coma.

Le surpoids est partiellement éliminé par hémodialyse.

- **Traitements**

Il n'existe pas d'antidote spécifique au sulpiride. Traitement symptomatique, réanimation sous étroite surveillance respiratoire et cardiaque continue (risque d'allongement de l'intervalle QT et d'arythmie ventriculaire) qui sera poursuivie jusqu'à rétablissement du patient.

Si un syndrome extrapyramidal sévère apparaît, administrer un anticholinergique.

- **Si vous oubliez de prendre ALIVIAR® 50 mg, gélules**

Ne pas administrer deux doses à la fois pour compenser les doses oubliées.

- **Si vous arrêtez de prendre ALIVIAR® 50 mg, gélules**

Sans object.

**4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES EVENTUELS ?**

Comme tous les médicaments, ALIVIAR® 50 mg, gélules, peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

- Absence de règles, augmentation du volume des seins, écoulement de lait par le mamelon en dehors des périodes normales d'allaitement,
- Impuissance, frigidité,
- Prise de poids,
- Somnolence,
- Tremblements, rigidité et/ou mouvements anormaux dont ceux du visage (incluant la langue),
- Sensation de vertiges lors du passage de la position allongée ou assise à la position debout,
- Troubles du rythme cardiaque, pouvant entraîner le décès (voir rubrique Mises en garde spéciales),
- Convulsion,
- Eruption cutanée,
- Augmentation des enzymes hépatiques,
- Des caillots sanguins veineux, particulièrement au niveau des jambes (les symptômes incluent gonflement, douleur et rougeur au niveau des jambes) peuvent se déplacer via les vaisseaux sanguins jusqu'aux poumons et provoquer une douleur dans la poitrine et une difficulté à respirer. Si vous ressentez un de ces symptômes, consultez immédiatement un médecin,
- Syndrome malin des neuroleptiques pouvant mettre en jeu le pronostic vital: fièvre inexplicable, sueurs, pâleur, modification de la tension artérielle et du rythme cardiaque, altération de la conscience, rigidité musculaire. La survenue d'un de ces signes nécessite d'alerter immédiatement un médecin ou un service d'urgence (voir Mises en garde spéciales).

• **Syndrome de sevrage néonatal (voir rubrique « Grossesse et allaitement »).**

- **Déclaration des effets indésirables**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via Centre Anti Poison et de la Pharmacovigilance du Maroc.

Site Internet : [www.capp.ma](http://www.capp.ma)

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

**5. COMMENT CONSERVER ALIVIAR® 50 MG, GÉLULES?**

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser ALIVIAR® 50 mg, gélules après la date de péremption figurant sur la boîte et sur les blisters.

Pas de précautions particulières de conservation.

Ne jetez aucun médicament dans les égouts ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

**6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES**

- **Quel contenu ALIVIAR® 50 mg, gélules?**

- La substance active est : Pour une gélule Sulpiride (DCI)..... 50 mg.

- Les autres composants sont :

Lactose monohydraté ..... 108 mg

Stéarate de magnésium ..... 1,6 mg

- **Qu'est ce que ALIVIAR® 50 mg, gélules et contenu de l'emballage extérieur ?**

ALIVIAR® 50 mg, gélules : Chaque boîte contient 20 gélules.

(2 blisters contenant 10 gélules chacun).

- **EXCIPIENTS A EFFETS NOTOIRE :**

Lactose monohydraté.

Nom et adresse du laboratoire titulaire de l'AMM au Maroc

laboratoire pharmaceutique IBERMA

Zone Industrielle, lot 149

Ham Soualem, Province de settat

Maroc

- **Date de révision de la Notice :**

Août 2018

**Conditions de prescription et de délivrance.**

Tableau A. (Liste I)



6 118000 230250

LOT : 09/22015  
PER : 05/2027  
F.P.V : 27.00 DH



**DOCTEUR ABDLILLAH HALIMI**  
**HEPATO-GASTRO-ENTEROLOGUE**  
**ENDOSCOPIE DIGESTIVE-ECHOGRAPHIE**

Laureat de l'Université de Montpellier  
Diplômé Universitaire en échographie clinique  
Diplômé Universitaire en proctologie  
Ancien attaché au CHU de Montpellier et des hôpitaux de France  
Membre des Sociétés Nationale Française de colo-proctologie et de gastro-entérologie

## Note d'honoraires

Date	Numéro
<b>31/12/2022</b>	<b>604/22</b>

SEMHI Khadija

Date	Lieu	Acte	Montant
31/12/22	Cabinet	Consultation [C2]	200,00
		Echographie	300,00
<u>Arrêtée la présente Note à la somme de:</u>			Total 500,00

CINQ CENTS DIRHAMS

Docteur Abdellah HALIMI  
Hépato-gastroentérologue  
Angle Place de la préfecture & Bd 10 Mars  
2<sup>e</sup> Etage Sidi Othmane Casablanca  
INP : 091071340 Tél. : 05 22 57 53 31

ICE: 001917217000064

Centre Médical Sidi Othmane Avenue 10 Mars Angle place de la Préfecture , 2 éme étage Sidi Othmane 20760  
Casablanca Tél: 05 22 57 53 31 Fax: 05 22 57 53 31 e-mail : docteur.halimi@gmail.com

**DOCTEUR ABDILLAH**  
**HEPATO-GASTRO-ENTEROLOGUE**  
**ENDOSCOPIE DIGESTIVE-ECHOGRAPHIE**

Laureat de l'Université de Montpellier  
Diplomé Universitaire en échographie clinique  
Diplomé Universitaire en proctologie

Ancien attaché au CHU de Montpellier et des hôpitaux de France  
Membre des Sociétés Nationale Française de colo-proctologie et de gastro-entérologie

Casablanca le, 31/12/2022

**Mme SEMHI Khadija**

**ECHOGRAPHIE ABDOMINALE**

Opérateur Dr A. Halimi

Mindray Dp8500

Lieu Cabinet

**Clinique**

Référence: 221210292

Douleurs abdominales.

**Examen**

Foie homogène, de dimensions normales, son échostructure est modérément hyperéchogène avec absorption des faisceaux en profondeur compatible avec une stéatose diffuse modérée.  
Vaisseaux hépatiques libres.

Vésicule biliaire présente une paroi fine et contient plusieurs images hyperéchogènes avec cône d'ombre postérieur.

Voie biliaire principale de calibre normal (6 mm).

Voies biliaires intra et extrahépatiques non dilatées.

Panréas mal examiné en raison d'interpositions digestives.

Rate homogène, de volume normal.

Reins de taille et d'échostructure normales avec bonne différenciation corticosinusale, sans dilatation des cavités pyélocalicielles.

**Conclusion**

Vésicule biliaire multilithiasique non compliquée.  
Stéatose hépatique.

INP : 091071340 Tél : 05 22 57 53 31  
2<sup>e</sup> Etage Sidi Othmane - Casablanca  
Angle Place de la Préfecture & Bd 10 Mars  
Hépato-Gastroentérologue  
DOCTEUR Abdellah HALIMI

DOCT  
HEPA  
ENDOSCO

La  
Diplom  
D

Ancien attaché  
Membre des Sociétés Na



**Mme SEMHI Khadija**

Mindray Dp850u

Lieu Cabinet

## Clinique

Référence: 221210292  
Douleurs abdominales.

## Examen

Foie homogène, de dimensions normales, son échostructure est modérément hyperéchogène avec absorption des faisceaux en profondeur compatible avec une stéatose diffuse modérée.  
Vaisseaux hépatiques libres.

Vésicule biliaire présente une paroi fine et contient plusieurs images hyperéchogènes avec cône d'ombre postérieur.

Voie biliaire principale de calibre normal (6 mm).

Voies biliaires intra et extrahépatiques non dilatées.

Pancréas mal examiné en raison d'interpositions digestives.

Rate homogène, de volume normal.

Reins de taille et d'échostructure normales avec bonne différenciation corticosinusale, sans dilatation des cavités pyélocalicielles.

## Conclusion

Vésicule biliaire multilithiasique non compliquée.  
Stéatose hépatique.

INP : 091071340 Tél : 05 22 57 53 31  
2<sup>e</sup> Etage Sidi Othmane - Casablanca  
Angle Place de la Préfecture & Bd 10 Mars  
Hépato-gastroentérologue  
DOCTEUR Abdellah HALIMI