

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

M22- 0030046

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 4343 Société : RAM 144438

Actif Pensionné(e) Autre :


Nom & Prénom : JAMER MOHAMED

Date de naissance : 21/02/1964

Adresse : HAY SNARA 1 Rue 15 N°21 Chara

Tél. : 06681914344 Total des frais engagés : 1916,00 Dhs

Cadre réservé au Médecin



Date de consultation : 02/05/2022

Nom et prénom du malade : JAMER MOHAMED Age : 56

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : Digestive

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : 05/01/2023 Le : 05/01/2023

Signature de l'adhérent(e) : [Signature]



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
22/11/22	Op		30000 Dh.	Dr. Siham EDDEGHAI SPECIALISTE EN HEPATO - GASTRO ENTEROLOGIE 8 Salam 1 Bd Med Zekri Rsd RYM 1 App 19 Etg 3 POSTE DE MARCHÉ SIDI KACIBEN ANASSI CASABLANCA 19 Dr. Siham EDDEGHAI SPECIALISTE EN HEPATO - GASTRO ENTEROLOGIE 4 Med Zekri Rsd RYM 1 App 19 Etg 3 POSTE DE MARCHÉ SIDI KACIBEN ANASSI CASABLANCA 19
28/11/22	Contrôle		G	

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur		Date	Montant de la Facture
PHARMACEUTIQUE LAFFIEX 550, Bd. Al Gods, Inra 3, Casablanca - Tél.: 05 22 52 40 22 RELLUMIERES SARL AU Ain Chok - 10/27		09/20/22	461,50
		08/12/22	154,50




AUXILIAIRES MEDICAUX						
Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX 
				MONTANTS DES SOINS 
				DEBUT D'EXECUTION 
				FIN D'EXECUTION 
O.D.F PROTHESES DENTAIRES		DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE		COEFFICIENT DES TRAVAUX 
		H 25533412 21433552 00000000 00000000 D 00000000 00000000 35533411 11433553 B	G	MONTANTS DES SOINS 
		[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession.		DATE DU DEVIS 
				DATE DE L'EXECUTION 

Dr. Siham EDDEGHAI
SPECIALISTE EN HEPATO - GASTRO
ENTEROLOGIE

Ancien Medecin des CHU Ibn Roch à Casablanca

et Mohamed VI à Marrakech

Endoscopie digestive

Echographie abdominale

Proctologie médicale et chirurgicale

Membre de L'AEF

et SNFGE



الدكتورة سهام الدغاي
أخصائية في أمراض الجهاز الهضمي
والكبد

طبيبة سابقة بالمستشفيات الجامعية ابن رشد بالدار البيضاء

ومحمد السادس بمراكنش

الفحص بالمنظار

الفحص بالصدى الصوتي

أمراض المخرج والبواسير

عضو الجمعية الفرنسية

لأمراض الجهاز الهضمي

**PHARMACIE LUMI
LAHRICHI SANIA**
550, Bd. Al Qods, Ifara, Ain C
Casablanca - N°PE : 09204
Tél.: 05 22 52 11 11

Date : 08/12/22

MR Damer Mohamed

→ Fortans sauf :
 142,20 sauf dans l'intervalle d'100
 x4.

2 litres : de 16H à 10H

2 litres : de 02H à 05H
 du matin.

12/30

154,50

Contalox 60 : **S.V**

2 g à 20H

2 g à 00H

2 g à 05H

السلام 1 شارع محمد الزفزاف إقامة رقم 1، ش 19 الطابق 3. (قرب بريد المغرب حي أناسي) - سيدى مومن - الدار البيضاء
 المجمع الطبى أناسي

Dr. Siham EDDEGHAI
 SPECIALISTE EN HEPATO - GASTRO ENTEROLOGIE
 8, salam 1, Bd Med Zefzaf, Rsd RYM 1, Appt 19, Etg 3 (POSTE DU MAROC ANASSI) Sidi Moumen
 (POSTE DU MAROC) SIDI MOUAMEN-ANASSI
 CASABLANCA

8, salam 1, Bd Med Zefzaf, Rsd RYM 1, Appt 19, Etg 3 (POSTE DU MAROC ANASSI) Sidi Moumen
 E-mail : dreddeghaicabinet@gmail.com - Tél : 05 22 75 19 19 / 07 00 19 34 57

Complexe Médicale Anassi

اکیر بیان

لنز اس

لنز اس

میں 2 صبا جا
ایجی 3 صبا جا

میں 4 صبا جے 3 میں 1

کو نزد کس

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR**FORTRANS, poudre pour solution buvable en sachet****Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourrez avoir besoin de la relier.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration et que vous sentez moins bien.

Que contient :

1. Qu'est-ce ?
 2. Quelles sont les indications ?
 3. Comment l'utiliser ?
 4. Quels sont les effets indésirables ?
 5. Comment se débarrasser des déchets ?
 6. Contenu.
- 1. QU'EST-CE ?**

**Laxatif osmotique**

Ce médicament permet le lavage colique assurant la préparation des patients avant une exploration médicale ou une intervention chirurgicale.

FORTRANS appartient à un groupe de médicaments appelés laxatifs osmotiques contenant du macrogol (polyéthylène glycol ou PEG) à poids moléculaire élevé et des sels additionnels.

FORTRANS permet d'augmenter la quantité d'eau dans l'intestin, ce qui augmente la fréquence des selles dont le contenu devient de plus en plus liquide et, à terme, provoque un lavage de l'intestin.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE FORTRANS, poudre pour solution buvable en sachet ?**Ne prenez jamais FORTRANS, poudre pour solution buvable en sachet :**

- Si vous êtes allergique au macrogol 4000 ou au sulfate de sodium anhydre ou au bicarbonate de sodium, ou au chlorure de sodium ou de potassium ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament et mentionnés en rubrique 6.
- Si vous présentez une altération grave de l'état général telle qu'une déshydratation sévère ou une atteinte cardiaque sévère (insuffisance cardiaque).
- Si vous présentez un des problèmes digestifs suivants :
 - Un carcinome de stade avancé ou autre atteinte grave du colon entraînant une fragilité de la muqueuse trop importante ;
 - Phases aiguës sévères d'inflammation du tractus intestinal y compris maladie de Crohn et rectocolite hémorragique ;
 - Une occlusion connue ou suspectée de l'intestin ou une sténose ;
 - Un ileus ;
 - Une perforation de la paroi de l'intestin ;
 - Un problème de vidange gastrique (telle qu'une gastroparesie, une stase gastrique) ;
 - Une coller toxicique ou un mélangeon toxique ;
- Enfants et adolescents de moins de 18 ans.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre FORTRANS, poudre pour solution buvable en sachet.

Chez le sujet âgé à l'état général précaire, il est recommandé de ne procéder à l'administration du produit que sous surveillance médicale.

La diarrhée consécutive à l'emploi de ce médicament peut perturber considérablement l'absorption des médicaments administrés simultanément (voir rubrique « prise ou utilisation d'autres médicaments »). Ce médicament contient du macrogol. Des manifestations allégoriques ont été rapportées avec des spécialités à base de macrogol : éruption cutanée, urticaire, et réactions allergiques sévères avec confluent soulignant du visage, des lèvres, de la langue, respiration courte ou suffoquante.

Si vous êtes à risque de présenter des troubles de vos taux sanguins en sels minéraux (troubles de l'équilibre électrolytiques), votre médecin pourra décider de surveiller vos taux sanguins d'électrolytes avant et après la prise du médicament.

Informez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce médicament si :

- Vous avez des problèmes cardiaques (dont notamment une insuffisance cardiaque),
- Vous avez des problèmes rénaux,
- Vous avez des difficultés à avaler ou vous êtes à risque de présenter des fausses routes (passage d'aliments ou de liquide dans vos poumons),
- Vous devez rester allié(e),
- Vous prenez un traitement diurétique (médicaments augmentant le volume d'urine).

Si vous ressentez soudainement une douleur abdominale ou êtes victime d'une hémorragie rectale tandis que vous prenez FORTRANS pour la préparation intestinale, contactez votre médecin ou demandez immédiatement un avis médical.

Enfants et adolescents

FORTRANS ne doit pas être utilisé chez l'enfant de moins de 18 ans. Sa tolérance et son efficacité n'ont pas été établies dans cette population.

Ce médicament contient du sodium. Ce médicament contient 2,890 g de sodium par sachet. A prendre en compte chez les patients缺点 contenant leur apport alimentaire en sodium.

Autres médicaments et FORTRANS, poudre pour solution buvable en sachet

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourrez prendre tout autre médicament, en particulier :

- Les médicaments pris régulièrement par voie orale (par la bouche) : les traitements pris par voie orale risquent de ne pas être absorbés en raison de la vidange intestinale induite par la préparation et doivent être administrés plus de 2 heures avant l'ingestion du lavement. Eviter la prise des autres traitements pendant et après l'ingestion du laxatif, et jusqu'à la réalisation de l'examen.

Pour les médicaments à marge thérapeutique étroite ou à demi-vie courte, l'efficacité peut être particulièrement affectée.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

FORTRANS, poudre pour solution buvable en sachet contient du sodium.**3. COMMENT PRENDRE FORTRANS, poudre pour solution buvable en sachet ?**

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

FORTRANS doit être administré par voie orale et doit être utilisé chez l'adulte.

La dose recommandée est de 1 litre de solution pour 15 à 20 kg de poids corporel, ce qui représente une dose moyenne de 3 à 4 litres de solution reconstituée.

Chaque sachet doit être dissous dans 1 litre d'eau. Mélanger jusqu'à ce que la poudre soit complètement dissoute.

Une fois la poudre dissoute, la solution doit être absorbée sans délai. Chaque litre de solution doit être ingéré en 1 heure. FORTRANS peut être ingéré soit en une prise (3 à 4 litres le soir précédent l'examen) soit en prise fractionnée (2 litres le soir avant l'examen, 1 à 2 litres le matin de l'examen ou bien 3 litres le soir et 1 litre le matin de l'examen).

Selon la prescription de votre médecin, vous devrez boire un verre de 250 ml de la solution toutes les 10 à 15 minutes.

Nous devons avoir fini d'ingérer la solution au moins 3 ou 4 heures avant le début de l'examen.

vous avez pris plus de FORTRANS, poudre pour solution buvable en sachet que vous

jeunez dû

Si vous prenez que vous avez pris plus de FORTRANS que vous n'auriez dû, informez votre médecin et buvez suffisamment d'eau ou de liquide pour éviter de vous déshydrater.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Après avoir pris ce médicament, vous aurez des émissions fréquentes d'aller à la selle. Ceci est normal et montre que le médicament est en train d'agir. Restez à proximité de toilettes jusqu'à ce que les effets du médicament s'arrêtent.

Informez votre médecin immédiatement et arrêtez de prendre FORTRANS si vous ressentez les effets suivants :

- Une réaction allergique sévère se manifestant par un gonflement de la face, des lèvres, de la langue, ou de la gorge ou une difficulté à respirer ou par un malaise sévère avec chute de la pression artérielle (chock anaphylactique).
- Les effets indésirables incluent :
 - Très fréquent (chez plus d'1 patient sur 10) :
 - Nausées, douleurs abdominales et distension (gonflement) abdominale.
 - Fréquent (jusqu'à 1 patient sur 10) :
 - Vomissements.
 - Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles) : Autres réactions allergiques : éruption cutanée et urticaire.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet www.signalement-sante.gouv.fr.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT PRENDRE FORTRANS, poudre pour solution buvable en sachet ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte et le sachet après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Pas de condition particulière de conservation.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égoût ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien de déliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS**Ce que contient FORTRANS, poudre pour solution buvable en sachet**

• Les substances actives sont :	
Macrogol 4000*	64,00 g
Sulfate de sodium anhydre	5,700 g
Bicarbonate de sodium	1,680 g
Chlorure de sodium	1,460 g
Chlorure de potassium	0,750 g

Pour un sachet de 73,690 g.

* = P.E.G. 4000 = polyéthyléneglycol 4000

• L'autre composant est :

Saccharine sodique

Qu'est-ce que FORTRANS, poudre pour solution buvable en sachet et contenu de l'emballage extérieur

Ce médicament se présente sous forme de poudre pour solution buvable de couleur blanche à blanchâtre. Boîte de 40 ou 50 sachets. Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire / Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché

IPSEN Consumer HealthCare

65, QUAI GEORGES GORSE

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Fabricant

BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE

RUE ETIENNE VIRTUIN

28100 DREUX

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est Décembre 2020

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).

Contalax™

Bisacodyl

comprimé gastro-résistant

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes sur le traitement.

Si vous avez d'autres questions, demandez plus au médecin ou à votre pharmacien. Gardez cette notice, vous la relire.

- Gardez cette notice, veuillez la relire.
 - Si vous avez besoin de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
 - Si les symptômes s'aggravent après 10 jours, consultez un médecin.
 - Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

1. QU'EST-CE QUE CONTALAX, comprimé gastro-résistant ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CONTALAX, comprimé gastro-résistant ?

3. COMMENT PRENDRE CONTALAX, comprimé gastro-résistant ?

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

5. COMMENT CONSERVER CONTALAX, comprimé gastro-résistant ?

3. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE CONTALAX, comprimé gastro-résistant ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

LAXATIF STIMULANT

(A: appareil digestif et métabolisme)

Ce médicament est indiqué dans le traitement de courte durée de la constipation occasionnelle.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CONTALAX, comprimé gastro-résistant ?

Ne prenez jamais CONTALAX, comprimé gastro-résistant dans les cas suivants:

- hypersensibilité à l'un des composants,
 - certaines maladies de l'intestin et du côlon, telles que rectocolite, maladie de Crohn, occlusion intestinale, • en cas de douleurs abdominales (douleurs du ventre), • déshydratation sévère.

Ce médicament NE DOIT

GENERALLEMENT PAS ETRE UTILISE,
sauf avis contraire de votre mdecin,
pendant la grossesse ni en association
avec des mdicaments donnant certains
ardiaques (torsade de pointe).

DE DOUTE, IL EST
SABLE DE DEMANDER L'AVIS
DU MEDECIN OU DE VOTRE
EN

option avec CONTAX.

comprimé gastro-résistant

Mises en garde spéciales
DANS LE CADRE DE LA CONSTIPATION PAS D'UTILISATION PROLONGEE (SUPERIEURE A 10 JOURS) SANS AVIS MEDICAL.

JOURS) SANS AVIS MEDICAL
Génération occasionnelle

Constipation occasionnelle
Elle peut être liée à une modification récente du mode de vie (voyage par exemple). Le médicament peut être une aide en traitement court. Toute constipation récente inexplicable par le changement du mode de vie, toute constipation accompagnée de douleurs, de fièvre, de gonflement du ventre doit faire demander l'avis du médecin.

Constipation chronique (constipation de longue durée)

Elle peut être liée à deux causes:

- soit une maladie de l'intestin qui nécessite une prise en charge par le médecin; • soit à un déséquilibre de la fonction intestinale dû aux habitudes alimentaires et au mode de vie.

Le traitement comporte entre autre: • une augmentation des apports alimentaires en produits d'origine végétale (légumes verts, crudités, pain complet, fruits...);

- une augmentation de la consommation d'eau et de jus de fruits;
 - une augmentation des activités physiques (sport, marche...);
 - une rééducation du réflexe de défécation;
 - parfois, l'adjonction de son à l'alimentation.

Cas particuliers de l'enfant

Chez l'enfant le traitement de la constipation est basé sur des mesures d'hygiène de vie et de diététique:

Dr. Siham EDDEGHAI
 SPECIALISTE EN HEPATO · GASTRO
 ENTEROLOGIE

Ancien Médecin des CHU Ibn Rochd à Casablanca
 et Mohamed VI à Marrakech

Endoscopie digestive
 Echographie abdominale
 Proctologie médicale et chirurgicale
 Membre de L'AFEF
 et SNFGE



الدكتورة سهام الدغاي
 أخصائية في أمراض الجهاز الهضمي
 والكبد

طبيبة سابقة بالمستشفيات الجامعية ابن رشد بالدار البيضاء

ومحمد السادس بمراكنش

الفحص بالمنظار

الفحص بالصدى الصوتي

أمراض المخرج والبواسير

عضو الجمعية الفرنسية

لأمراض الجهاز الهضمي

PHARMACIE LUMIERES
 LAHRICHI SARL AU
 550, Bd. Al Qods, Inara, Ain Chok
 Casablanca - INPE : 09204042
 Tél.: 05 22 52 40 29

DR Damer Mohamed Date : 12/11/20

1) Ranipholz 20 mg
 84,50 1 gr lemate 14,50

✓
S.

2) libalte souffle 134,00
 134,00 1 gr lemate 14,50

✓
S.

3) lidi for 99,00
 99,00 1 gr lemate 14,50

✓
S.

4) Ed tramadol 95,00
 95,00 1 gr lemate 14,50

✓
S.

5) Rizolax 100mg : 69,00
 69,00 1 gr lemate 14,50

✓
S.

Dr. Siham EDDEGHAI
 SPECIALISTE EN HEPATO - GASTRO ENTEROLOGIE
 8 Salam 1 Bd Med Zefzaf Rsd RYM 1 Appt 19
 Etg 3 (POSTE DU MAROC) SIDI MOUMEN - ANASSI
 CASABLANCA

461,50

8, السلام 1, شارع محمد الزفزافي، إقامة رقم 1، ش 19 الطابق 3 (قرب بريد المغرب حي أناسي) - سيدى مومن - الدار البيضاء
 المجمع الطبي أناسي

8, salam 1 , Bd Med Zefzaf, Rsd RYM 1, Appt 19, Etg 3 (POSTE DU MAROC ANASSI) Sidi Moumen
 E-mail : dreddeghaicabinet@gmail.com - Tél : 05 22 75 19 19 / 07 00 19 34 57

Complexe Médicale Anassi

Date de fabrication :
A consommer de
préférence avant fin :

N° de lot :

PPC = 95,00 DHS

10/2
10/2L
09210.

LIXIFOR

COMPOSITION : Dose par gél.

	LOT	PER	Prix	
- Séné				140 mg
- Radis Noir				75 mg
- Anis Etoilé				75 mg
- Cascara				30 mg

PROPRIETES :

LIXIFOR Actif dès le premier jour spécialement formulé pour :

- Régulation du volume et de la fréquence des selles
- Réduction des gaz
- Ballonnements et pesanteur abdominale
- Active le péristaltisme
- Améliore le confort intestinal
- Stimule le transit intestinal
- Combat les fermentations intestinales
- Favorise un transit régulier

CONSEILS D'UTILISATION :

- 1 gélule par jour le soir au coucher avec un verre d'eau.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans.
- Ce produit est déconseillé aux femmes enceintes ou qui allaitent sans avis médical.
- A conserver dans un endroit sec et frais.
- Sans ingrédient d'origine animale, sans gluten, sans gélatine.

PRÉSENTATION :

Boîte de 15 gélules.

LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES
FORTE PHARMA

"Le Patio Palace" - 41 - Av. Hector otto
98000 - MONACO

CIBALAX®

FOS, - *Bifidobacterium lactis*

Cibalax® est un complément alimentaire riche en fibres alimentaires et contient également une haute concentration de bifidobactéries qui favorisent naturellement des selles régulières et un bon transit intestinal

Qu'est-ce que CIBALAX®?

- Chaque stick de Cibalax® contient de *Bifidobacterium lactis*. Les Bifidobactéries dans Cibalax® sont protégées grâce à l'Intellicaps™, technologie de microencapsulation brevetée mondialement. Cela garantit une meilleure survie du produit.
- FOS qui est une fibre soluble.

PPC : 134 DH 00



Dans quels cas CIBALAX® est-il utilisé?

- Cibalax® favorise naturellement le bon fonctionnement intestinal et l'émission régulière des selles.
- Cibalax® est efficace dès les premiers jours d'utilisation.
- Cibalax® n'entraîne pas de prise de poids.
- Cibalax® peut être utilisé de manière prolongée.

Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CIBALAX®?

- Il est recommandé de ne pas dépasser la quantité journalière recommandée.
- Il n'existe pas de contre-indication à la prise de Cibalax®, cependant les personnes souffrant de troubles sévères de l'immunité doivent être suivies de près par leur médecin.
- Ne pas utiliser Cibalax® en cas d'hypersensibilité ou d'allergie à un ou plusieurs excipients du produit.
- Cibalax® ne peut se substituer à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain.

CIBALAX® en période de grossesse ou d'allaitement

- Grâce à sa composition naturelle, Cibalax® peut être utilisé par la femme enceinte ou en période d'allaitement.

Qu'est-ce que CIBALAX®?

■ Utilisé par les enfants à 1 an et les adultes. La dose recommandée est de 1 stick par jour. Cette dose peut être nécessaire à maximum de 2 sticks.

Prenez Cibalax® avec un verre d'eau ou de jus de fruit, ou encore dans les céréales du petit-déjeuner.

Quelques conseils supplémentaires d'hygiène de vie

- Démarrez votre journée par la prise d'un grand verre d'eau et veillez à boire 1,5 à 2 litres de liquides par jour.
- Prenez vos repas assis et à heure fixe en mangeant lentement et en mâchant bien les aliments.
- Favorisez les aliments riches en fibres.
- Maintenez une activité physique régulière.
- Évitez de vous retenir lorsque le besoin se fait sentir.

Comment conserver CIBALAX®?

- Il est conseillé de conserver Cibalax® au sec, à une température inférieure à 25°C et de le consommer avant la date de péremption.
- La date de péremption est mentionnée sur la face externe de l'emballage et fait référence au produit non ouvert et correctement conservé.

Quelle est la composition de CIBALAX®?

Fructo-oligo-saccharides (FOS); *Bifidobacterium lactis*; Dioxyde de silicium

Comment se procurer CIBALAX®?

- Cibalax est disponible en pharmacie.
- En cas de doute, n'hésitez pas à consulter votre médecin ou votre pharmacien.

Distribué par :



bottu/JR

82, Allée des Casuarinas - Ain Seba - Casablanca

VÉSALÉ PHARMA
Microbiotic Solutions

iphaDERM

6, rue Ibnou Khalkane - Quartier Palmier Casablanca
Importeur et distributeur par iphaDERM - Maroc
www.biolar.fr
6, rue des Marguerites 92000 Nanterre - France
Fabricant par les laboratoires Biolar - France

En vente libre chez votre pharmacien.
DELIVRANCE :

Hépatite en phase aigüe
Tout obstacle organique sur les voies biliaires.
PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

équilibree. Tenter alors de porter des vêtements. Consulter dans un endroit frais et sec à température ambiante.
Complexe alimentaire n'est pas un médicament. A utiliser en complément d'une alimentation variée et
A utiliser en fonction des besoins ou en cure régulière de 30 jours.
1 comprimé effervescent dans un grand verre d'eau, la prise est renouvelée une fois dans la journée si nécessaire.

CONSEILS D'UTILISATION :

Dyspepsie biliaire. Drainage hépatique
Réflux gastro-oesophagien.
Nausées - Érucalcin - + diurétiques.
Indigestion, ou Diète Poids net / N°
C

BIOFAR DIGESTION CP EFF BTE 8

PPC : 69.00

Ut	Av	Lot :
		1279/5

IPHADEM

aliments.
- Très riche en protéines du corps végétal.
- Les FOS qui régissent les enzymes digestives (enzymes digestives et physiologique).
- L'extrait d'arnanais (à base de sels biliaires) favorisant la régénération de la fibre intestinale et apaisant (riche en papaye) compléte l'action des papayes (riche en papaine) contribuant à la sécrétion de sels biliaires.
- Un extrait d'artichaut hautement concentré en acéts, doué d'activité stimulante sur la sécrétion de sels biliaires. Biofar Digestion exerce 4 actions synergiques grâce à ses principes actifs :

PROPRIÉTÉS :
COMPOSITION PAR COMPRIMÉ :
Extrait d'arnanais (300 mg), Extrait d'artichaut (100 mg), Extract de papaye (100 mg), Fructo-oligosaccharides (FOS) (900 mg), Vitamine B1 (0,7 mg), Vitamine B2 (0,8 mg), Vitamine B6 (1 mg), sans sucre

PRESSENTATION :
Boîte de 8 comprimés effervescents en utileuse

BIOFAR® Digestion

Ranciphex® 10 et 20 mg

Rabéprazole sodique

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir des questions.
- Si vous avez toute autre question ou si vous avez besoin d'informations à votre médecin ou à un pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou par quelqu'un d'autre, même en cas de symptôme nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient gênant ou si l'effet indésirable non mentionné dans cette notice vous préoccupe, contactez votre pharmacien.

1. DENOMINATION

RANCIPHEX® 10 mg.
RANCIPHEX® 20 mg.

2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

RANCIPHEX® 10 mg.

La substance active est :

Rabéprazole sodique 10 mg
Pour un comprimé gastro-résistant.

RANCIPHEX® 20 mg

La substance active est :

Rabéprazole sodique 20 mg
Pour un comprimé gastro-résistant.

Les autres composants :

Mannitol, oxyde de magnésium, hydroxypropylcellulose faiblement substituée, hydroxypropylcellulose, stéarate de magnésium, éthylcellulose, phtalate d'hypromellose, monoglycérides diacétylés, talc, dioxyde de titane, oxyde de fer jaune.

3. FORME PHARMACEUTIQUE

Ce médicament se présente sous forme de comprimés gastro-résistants. Boîtes de 14, 28 et 56.

4. CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

Les effets indésirables sont généralement modérés et s'améliorent sans que vous ayez besoin d'arrêter de prendre ce médicament.

Arrêtez de prendre RANCIPHEX® et consultez immédiatement un médecin si vous remarquez l'un des effets indésirables suivants - vous pouvez avoir besoin d'un traitement médical urgent :

- Réactions allergiques - les signes peuvent inclure : gonflement soudain de votre visage, difficulté à respirer ou pression sanguine basse pouvant causer un évanouissement ou une chute.
 - Signes fréquents d'infection, tels qu'un mal de gorge, une température élevée (fièvre), ou un ulcère dans votre bouche ou votre gorge.
 - Contusions ou saignements faciles.
- Ces effets indésirables sont rares (touchent moins de 1 personne sur 1000).
- Eruptions vésiculeuses, douleur ou ulcération de votre bouche et de votre gorge.
- Ces effets indésirables sont très rares (touchent moins de 1 personne sur 10000).

Autres effets indésirables possibles :

Fréquents (touchent moins de 1 personne sur 10)

- Infections.
- Sommeil difficile.
- Maux de tête, vertiges.
- Toux, nez qui coule ou mal de gorge (pharyngite).
- Effets sur votre estomac ou votre intestin tels que douleurs au ventre, diarrhées, flatulence, nausées, vomissements ou constipation.
- Courbatures ou mal de dos.
- Faiblesse ou syndrome pseudo-grippal.

Peu fréquents (touchent moins de 1 personne sur 100)

- Nervosité ou somnolence.
 - Infection au niveau des poumons (bronchite).
 - Sinus douloureux et bouchés (sinusite).
 - Bouche sèche.
 - Indigestion ou rôts (éruption cutanée).
 - Éruption cutanée ou rougeur de la peau.
 - Douleur au niveau des muscles, des jambes ou des articulations.
 - Infection de la vessie (infection des voies urinaires).
 - Douleur thoracique.
 - Frissons ou fièvre.
 - Modifications du fonctionnement de votre foie (mesurable par des tests sanguins).
- Rares (touchent moins de 1 personne sur 1000)
- Perte d'appétit (anorexie).
 - Dépression.
 - Hypersensibilité (incluant des réactions allergiques).
 - Troubles visuels.

Dr. Siham EDDEGHAI
 SPECIALISTE EN HEPATO - GASTRO
 ENTEROLOGIE

Ancien Medecin des CHU Ibn Rochd à Casablanca
 et Mohamed VI à Marrakech

Endoscopie digestive
 Echographie abdominale
 Proctologie médicale et chirurgicale
 Membre de L'AEF
 et SNFGE



الدكتورة سهام الدغاي
 أخصائية في أمراض الجهاز الهضمي
 والكبد

طبيبة سابقة بالمستشفيات الجامعية ابن رشد بالدار البيضاء

ومحمد السادس بمراكنش

الفحص بالمنظار

الفحص بالصدى الصوتي

أمراض المخرج والمواسير

عضو الجمعية الفرنسية

لأمراض الجهاز الهضمي

Date : 22/11/22

MR Damer Mohamed

- Sirogogia helicobacter pylori
- Dérage quantitative du sang dans la salive par méthode turbidimétrique
- TSH , CG
- AST, ALP, fetum

Laboratoire Othmani
 Mohamed DAMER
 322751213



8, salam 1, شارع محمد الرفاق إقامة ريم 1, ش 19 الطابق 3 . قرب بريد الماء
 بني موهمن - الدار البيضاء
 المجمع الطبي أناسي

Dr. Siham EDDEGHAI
 SPECIALISTE EN HEPATO - GASTRO ENTEROLOGIE
 8, salam 1 Bd Med Zefzaf Rsd RYM 1 Apt 19
 POSTE DU MAROC ANASSI
 CASABLANCA

8, salam 1 , Bd Med Zefzaf, Rsd RYM 1, Apt 19, Etg 3 (POSTE DU MAROC ANASSI) Sidi Moumen
 E-mail : dreddeghaicabinet@gmail.com - Tél : 05 22 75 19 19 / 07 00 19 34 57

Complexe Médicale Anassi

LABORATOIRE
 Dr. Houda MEDHAMI
 No2, Bd Othmani
 Quartier El Qods
 Tel: 05 22 21 22 11 - Ain Chock - Biologiste
 11 - Ain Chock El Qods
 NPB: 093 061596
 22 21 22 39
 CASABLANCA

LABORATOIRE

Dr. Houda MEDHAMI

No2, Bd Othmani
 Quartier El Qods
 Tel: 05 22 21 22 11 - Ain Chock - Biologiste
 11 - Ain Chock El Qods
 NPB: 093 061596
 22 21 22 39
 CASABLANCA

Laboratoire OTHMANI D'Analyses Médicales

Dr. Houda OTHMANI

N°2 Res El Qods, Bd El Qods Quartier Omaria, Ain Chock - Casablanca
Tél : 0522212211 - Fax : 0522212239 - E-mail : othmani.laboratoire@gmail.com

Facture



N° facture : 2022-6488

Edité le : 24/11/2022

Patient : Mr DAMER Mohamed

Date prélèvement : 24/11/2022

N° Dossier : 322751213

Analyses	Valeur en B	Montant
NUMERATION GLOBULAIRE	80	107,20
Glycémie à jeun	30	40,20
Ferritine	250	335,00
TSH us	250	335,00
Sérologie Hélicobacter pylori	250	335,00
Dosage de Sang dans les Selles	250	335,00
Total B	1110	1 487,40
APB	1,0	15,00
Majoration de garde		
Total		1 000,00

LABORATOIRE OTHMANI D'ANALYSES
MÉDICALES
Dr. Houda Othmani - Biologiste
N°2, Bd El Qods, Résidence El Qods
Quartier Omaria - Ain Chock - CASABLANCA
Tél: 05 22 21 22 11 - Fax: 05 22 21 22 39
INPE: 093061496



LABORATOIRE OTHMANI D'ANALYSES MEDICALES

مختبر عثمانی للتحاليل الطبية

(Hématologie - Biochimie - Immunologie - Bactériologie - Parasitologie - Mycologie-virologie - Hormonologie - Spérmologie)



Casablanca , le 25/11/2022

Compte rendu d'analyses

Dossier N° : 322751213 Pvt du: 24/11/2022 7:39

Nom : Mr DAMER Mohamed

Age : 55 ans

Demandé par Dr : EDDEGHAI SIHAM

Page : 1/2

HEMATOLOGIE

NUMERATION GLOBULAIRE

		Valeurs Usuelles	Antériorité
Erythrocytes	: 4,80 M/mm ³	(4,28 - 6)	
Hémoglobine	: 15,30 g/dl	(13 - 18)	
Hématocrite	: 46,20 %	(39 - 53)	
VGM	: 96,25 fL	(78 - 98)	
TCMH	: 31,88 pg	(26 - 34)	
CCMH	: 33,12 g/dl	(31 - 36)	
Leucocytes	: 6 100 /mm ³	(4000 - 10000)	
Plaquettes	: 243 000 /mm ³	(150000 - 400000)	

FORMULE LEUCOCYTAIRE

Polynucléaires Neutrophiles	: 51,5 % Soit 3142,00 /mm ³	(2000 - 7500)
Polynucléaires Eosinophiles	: 3,9 % Soit 238,00 /mm ³	(Inférieur à 400)
Polynucléaires Basophiles	: 1,2 % Soit 73,00 /mm ³	(Inférieur à 150)
Lymphocytes	: 35,0 % Soit 2135,00 /mm ³	(1500 - 4000)
Monocytes	: 8,4 % Soit 512,00 /mm ³	(200 - 800)

Etude du frottis sur lame

La formule leucocytaire est contrôlée sur frottis sanguin.

BIOCHIMIE

Glycémie à jeun

	Valeurs Usuelles	Antériorité
Glycémie à jeun	: 0,89 g/l 4,94 mmol/l	(0,7 - 1,1) (3,88 - 6,1)

Résultat sous réserve d'un bon respect des conditions du prélèvement.(8 à 12h de jeûne)

Ferritine

(Technique: AIA-TOSOH)

Ferritine	: 20,70 ng/ml
-----------	---------------

Homme : 30 - 280 ng/ml

Femme cyclique : 20 - 120 ng/ml

Femme ménopausée : 30 - 280 ng/ml

Naissance :

nouveau-né : 50 - 450 ng/ml

1 mois à 2 mois : 90 - 500 ng/ml

3 mois à 5 mois : 40 - 250 ng/ml

6 mois à 16 ans : 20 - 200 ng/ml

Prélèvement à domicile sur rendez-vous

Adresse : N°2 Res El Qods, Bd El Qods Quartier Omaria, Ain Chock - Casablanca

Tél: 0522 21 22 11 - Fax : 0522 21 22 39 - Gsm : 0662 27 99 66 / 0767 78 76 75 - E-mail : othmani.laboratoire@gmail.com - Site web : www.othmanilab.ma



LABORATOIRE OTHMANI D'ANALYSES MEDICALES

مختبر عثماني للتحاليل الطبية

(Hématologie - Biochimie - Immunologie - Bactériologie - Parasitologie - Mycologie-virologie - Hormonologie - Spérmologie)

Mr DAMER Mohamed

Dossier N° : 322751213

Page : 2/2

ENDOCRINOLOGIE

TSH-us

: 2,237 µUI/ml

Valeurs Usuelles

Antériorité

(0,25 - 5)

(Technique: EIA / AIA TOSOH)

La TSH est l'indicateur le plus sensible pour évaluer un dysfonctionnement thyroïdien.

Une variation minime de T4L provoque une réponse très amplifiée de la TSH.

Cependant, la TSH répond aux variations de la T4L avec un temps de latence important, au moins 8 semaines pour une réponse complète.

IMMUNOLOGIE-SEROLOGIE

Sérologie Hélicobacter pylori

(Technique : ELFA/VIDAS-Biomérieux)

Ac anti Hélicobacter pylori (IgG)

: Positif

Résultat

: 3,76 U/ml

Interprétation :

Négatif : < 0,75 U/ml

Équivoque : 0,75 - 1,00 U/ml

Positif : >1,00 U/ml

COPROLOGIE

Valeurs Usuelles

Antériorité

Dosage de Sang dans les Selles

Date

: 24/11/2022

Résultat

: 11 µg hb/g de selles

(Inférieur à 15)

(Technique : Immunoturbidimétrie(iFOBT))

Demande validée biologiquement par Dr. Houda OTHMANI

Dr. Houda OTHMANI
N°2 Res El Qods, Bd El Qods Quartier Omaria, Ain Chock - Casablanca
Téléphone : 0522 21 22 11 - Fax : 0522 21 22 39 - GSM : 0662 27 99 66 / 0767 78 76 75 - E-mail : othmani.laboratoire@gmail.com - Site web : www.othmanilab.ma

Nous vous remercions de votre confiance
Prélèvement à domicile sur rendez-vous

Adresse : N°2 Res El Qods, Bd El Qods Quartier Omaria, Ain Chock - Casablanca

Téléphone : 0522 21 22 11 - Fax : 0522 21 22 39 - GSM : 0662 27 99 66 / 0767 78 76 75 - E-mail : othmani.laboratoire@gmail.com - Site web : www.othmanilab.ma