

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- | | |
|--|-----------------------|
| <input type="radio"/> Réclamation | : contact@mupras.com |
| <input type="radio"/> Prise en charge | : pec@mupras.com |
| <input type="radio"/> Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.



Declaration de Maladie

N° W21-768530

<input type="checkbox"/> Maladie	<input type="checkbox"/> Dentaire	<input type="checkbox"/> Optique
Cadre réservé à l'adhérent (e)		
Matricole : 12462		
<input type="checkbox"/> Actif	<input type="checkbox"/> Pensionné(e)	<input type="checkbox"/> Autre
Nom & Prénom : GENANE ICHAR		
Date de naissance : 23.10.7185		
Adresse :		
Tél. : Total des frais engagés :		

Autorisation CNDP N° : A-A-215/2019	Cadre réservé au Médecin
	Cachet du médecin :
	<i>: Touria BENNIS Spécialiste O.R.L. 1. Av des F.A.R. Mohammedia Tél. 05 23 32 53 30</i>
	Date de consultation : 27/12/2022
	Nom et prénom du malade : BENABDE LIJAL DINA Age:
	Lien de parenté : <input type="checkbox"/> Lui-même <input type="checkbox"/> Conjoint <input type="checkbox"/> Enfan
	Nature de la maladie : Angine
	En cas d'accident préciser les causes et circonstances :
	Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'at: médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : / / Le : / /

"adhérent(e)"

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
27/12/21	ce		25570,00	INP DR. Touria BENI
	examen		200,00	Spécialiste O.R.L.
	Epidémie			Av des FAR Mohamed
	12/22			23/05/2023

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE D'ALIAZI MOHAMED AVENUE DES FAR MOHAMED 05 23 22 24 16 / INPE 20240820	27/12/22	320,80

ANALYSES - RADIGRAPHIES


Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX


Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

VOLET ADHERENT

* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.



O.D.F PROTHESES DENTAIRES



DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	25533412	21433552
D	00000000	00000000
B	35533411	11433553
G	00000000	00000000

(Création, remont, adjonction)
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DEBUT D'EXECUTION

FIN D'EXECUTION

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DATE DU DEVIS

DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXE

Dr. Touriya BENNIS

Diplômée de la Faculté de Médecine de TOULOUSE

الدكتورة ثريا بنيس

خريجة كلية الطب تولوز

Spécialiste Nez - Gorge - Oreilles

Chirurgie de la Face et du Cou

Surdité - Vertige



اختصاصية في أمراض الرأس
الأذن - الأنف - الحنجرة
جراحة الوجه و العنق

27 - 12 - 2022

Enf BEN ABDelfjalil

DINA

23860

- OROKEEN

sirup



*11930*2*

sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat - R.P.I-
Ain Sébaâ 20250 - Casablanca
OROKEEN 100MG/5ML GR P OR FL40ML
P.P.V. : 119DH30



Graal 22 x 2 l

Lyres



*24400*3*

- Cetinal

sirup

8220 1 cui

le 10/11

polt

sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat - R.P.I-
Ain Sébaâ 20250 - Casablanca
OROKEEN 100MG/5ML GR P OR FL40ML
P.P.V. : 119DH30



320.80

PHARMACIE ORTHOPÉDIE
DU MAGHREB
M. TAÏZI YOUNES
AVENUE DES F.A.R MOHAMMEDIA
05 23 32 24 16 / INPE : 092040850

Touriya BENNIS

*Spécialiste O.R.L.
A.R. Mohammedia
: 22 59 30*

21 ، شارع الجيش الملكي - الطابق الثاني - رقم 20 - المحمدية الهاتف: 05 23 32 53 30

21, Avenue des F.A.R., 2ème Etage N° 20 MOHAMMEDIA - Tél : 05 23 32 53 30

CETIRAL®

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes sur votre traitement.

Si vous avez des autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament n'est pas personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui faire mal.

1. IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

a) DENOMINATION

CETIRAL®

b) COMPOSITIONS QUALITATIVES ET QUANTITATIVES

• Comprimé pelliculé :

Cétirizine (DCl) diclofénacate..... 10 mg

Excipients : Célateque microstabilisé, lactose monohydraté, crospovidone, silice colloïdale

antioxydant, stearate de magnésium.

Pellucide : hypromellose, macrogol stérane, cellulose microstabilisée, propylenglycol.

doséole de titan E 171, édta purifié.

• Solution buvable :

• Cétirizine (DCl) diclofénacate..... 1 mg/ml

Excipients : Propylenglycol, glycérol, parahydroxybenzoate de méthyle, paracétamol/glycérine de propyle, acétate de sodium, acétate adélique, sucre de canne, sorbitol, alcool de banane, eau purifiée.

c) FORMES PHARMACEUTIQUES ET PRÉSENTATIONS

• Comprimé pelliculé : Boîte de 15.

Solution buvable : Flacon de 90 ml accompagné d'une pipette graduée jusqu'à 5 ml (1 dose équivalente à 5 ml).

d) CLASSE PHARMACOTHERAPIQUE

Déméris de la histamine (Code ATC : R06A7).

2. DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

* Comprimé : Adoles et enfants de 6 ans et plus.

* Solution buvable : Adulte et enfant à partir de 2 ans.

Traitement des symptômes rhiniques et oculaires des réactions allergiques saisonnières et perennielles.

Traitement des symptômes de l'urticaire chronique idiopathique.

3. ATTENTION !

a) DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

* Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :
exceptions entre dans la composition de ce médicament.

* Insuffisance rénale sévère.

* Enfant de moins de 6 ans à cause du risque de tussus riche (comprimé).

b) MISE EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

UTILISATION DE MÉDICAMENT AVEC PRÉCAUTION :

* La cétirizine doit être administrée avec prudence chez les patients atopiques ou à risque de convulsions.

* Comprimé et solution buvable : Ce médicament contient du propylenglycol et peut entraîner des irritations de la peau.

* Comprimé : L'utilisation de Cetirizine® est déconseillée chez les patients présentant une insensibilité au galactose, un déficit en lactase ou Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

* Solution buvable : Les personnes susceptibles de provoquer des réactions allergiques (dont le délai d'apparition peut être tardif) à la pose.

* Solution buvable : En raison de la présence de sorbitol, Cetirizine® est déconseillée en cas d'intolérance au fructose (maladie heréditaire rare).

* CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU VOTRE PHARMACIEN.

c) INTERACTIONS

Compte tenu des données pharmacologiques et du profil de tolérance de la cétirizine, aucune interaction avec Cetirizine® n'est attendue.

Par ailleurs, il n'est recommandé que les taux d'absorption de ce médicament.

FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MÉDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

d) GROSSESSE ET ALLAITEMENT

GROSSESSE : Cetirizine (DCl) présente avec prudence chez la femme enceinte. Par ailleurs, il n'est recommandé que les taux d'absorption de ce médicament.

ALLAITEMENT : La cétirizine passe dans le lait maternel. Sa prescription durant l'allaitement doit être prudente.

DEMANDER CONSEIL A VOTRE MÉDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE TOUT MÉDICAMENT.

e) CONDUCTEURS ET UTILISATEURS DE MACHINES

Certains patients sensibles, ce médicament peut provoquer une somnolence. Il est donc conseillé aux patients qui doivent conduire un véhicule ou utiliser une machine dangereuse de ne pas dépasser la posologie recommandée, et d'éviter leur vigilance sous traitement.

0. LISTE DES EXCÉPTEMENTS DONT LA CONNAISSANCE UTILISATION SANS RISQUE CHEZ CERTAINS PATRÉ

Comprimé : Lactose, propylenglycol.

Solution buvable : Propylenglycol, sorbitol, pa

4. COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ?

a) POSOLOGIES USUELLES

• La forme « comprimé » est réservée à l'adulte et à l'enfant.

• La forme « solution buvable » peut être administrée à l'adulte et à l'enfant.

• Pour la solution buvable, une dose correspond à 5 ml.

b) FORME D'ADMINISTRATION

• Enfant entre 6 et 12 ans : 5 mg 2 fois par jour.

• Adulte et enfant de plus de 12 ans : 10 mg par jour (soit 1 comprimé de la matin + ½ comprimé le soir).

• Enfant entre 2 à 6 mois : 2,5 mg 2 fois par jour.

• soit ½ dose de la matin + ½ dose le soir.

• Enfant entre 6 et 12 mois : 5 mg 2 fois par jour.

• Adulte et enfant de plus de 12 ans : 10 mg par jour (soit ½ comprimé de la matin + ½ comprimé le soir).

• Adulte et enfant de plus de 12 ans : 10 mg par jour (soit 1 dose de la matin + 1 dose le soir).

• Adulte et enfant de plus de 12 ans : 10 mg par jour (soit ½ comprimé de la matin + ½ comprimé le soir).

• Adulte et enfant de plus de 12 ans : 10 mg par jour (soit ½ comprimé de la matin + ½ comprimé le soir).

• Adulte et enfant de plus de 12 ans : 10 mg par jour (soit ½ comprimé de la matin + ½ comprimé le soir).

• Adulte et enfant de plus de 12 ans : 10 mg par jour (soit ½ comprimé de la matin + ½ comprimé le soir).

• Adulte et enfant de plus de 12 ans : 10 mg par jour (soit ½ comprimé de la matin + ½ comprimé le soir).

• Adulte et enfant de plus de 12 ans : 10 mg par jour (soit ½ comprimé de la matin + ½ comprimé le soir).

• Adulte et enfant de plus de 12 ans : 10 mg par jour (soit ½ comprimé de la matin + ½ comprimé le soir).

• Adulte et enfant de plus de 12 ans : 10 mg par jour (soit ½ comprimé de la matin + ½ comprimé le soir).

• Adulte et enfant de plus de 12 ans : 10 mg par jour (soit ½ comprimé de la matin + ½ comprimé le soir).

• Adulte et enfant de plus de 12 ans : 10 mg par jour (soit ½ comprimé de la matin + ½ comprimé le soir).

• Adulte et enfant de plus de 12 ans : 10 mg par jour (soit ½ comprimé de la matin + ½ comprimé le soir).

• Adulte et enfant de plus de 12 ans : 10 mg par jour (soit ½ comprimé de la matin + ½ comprimé le soir).

• Adulte et enfant de plus de 12 ans : 10 mg par jour (soit ½ comprimé de la matin + ½ comprimé le soir).

• Adulte et enfant de plus de 12 ans : 10 mg par jour (soit ½ comprimé de la matin + ½ comprimé le soir).

• Adulte et enfant de plus de 12 ans : 10 mg par jour (soit ½ comprimé de la matin + ½ comprimé le soir).

• Adulte et enfant de plus de 12 ans : 10 mg par jour (soit ½ comprimé de la matin + ½ comprimé le soir).

• Adulte et enfant de plus de 12 ans : 10 mg par jour (soit ½ comprimé de la matin + ½ comprimé le soir).

• Adulte et enfant de plus de 12 ans : 10 mg par jour (soit ½ comprimé de la matin + ½ comprimé le soir).

• Adulte et enfant de plus de 12 ans : 10 mg par jour (soit ½ comprimé de la matin + ½ comprimé le soir).

• Adulte et enfant de plus de 12 ans : 10 mg par jour (soit ½ comprimé de la matin + ½ comprimé le soir).

• Adulte et enfant de plus de 12 ans : 10 mg par jour (soit ½ comprimé de la matin + ½ comprimé le soir).

• Adulte et enfant de plus de 12 ans : 10 mg par jour (soit ½ comprimé de la matin + ½ comprimé le soir).

• Adulte et enfant de plus de 12 ans : 10 mg par jour (soit ½ comprimé de la matin + ½ comprimé le soir).

• Adulte et enfant de plus de 12 ans : 10 mg par jour (soit ½ comprimé de la matin + ½ comprimé le soir).

• Adulte et enfant de plus de 12 ans : 10 mg par jour (soit ½ comprimé de la matin + ½ comprimé le soir).

• Adulte et enfant de plus de 12 ans : 10 mg par jour (soit ½ comprimé de la matin + ½ comprimé le soir).

• Adulte et enfant de plus de 12 ans : 10 mg par jour (soit ½ comprimé de la matin + ½ comprimé le soir).

• Adulte et enfant de plus de 12 ans : 10 mg par jour (soit ½ comprimé de la matin + ½ comprimé le soir).

• Adulte et enfant de plus de 12 ans : 10 mg par jour (soit ½ comprimé de la matin + ½ comprimé le soir).

• Adulte et enfant de plus de 12 ans : 10 mg par jour (soit ½ comprimé de la matin + ½ comprimé le soir).

• Adulte et enfant de plus de 12 ans : 10 mg par jour (soit ½ comprimé de la matin + ½ comprimé le soir).

• Adulte et enfant de plus de 12 ans : 10 mg par jour (soit ½ comprimé de la matin + ½ comprimé le soir).

• Adulte et enfant de plus de 12 ans : 10 mg par jour (soit ½ comprimé de la matin + ½ comprimé le soir).

• Adulte et enfant de plus de 12 ans : 10 mg par jour (soit ½ comprimé de la matin + ½ comprimé le soir).

• Adulte et enfant de plus de 12 ans : 10 mg par jour (soit ½ comprimé de la matin + ½ comprimé le soir).

• Adulte et enfant de plus de 12 ans : 10 mg par jour (soit ½ comprimé de la matin + ½ comprimé le soir).

• Adulte et enfant de plus de 12 ans : 10 mg par jour (soit ½ comprimé de la matin + ½ comprimé le soir).

• Adulte et enfant de plus de 12 ans : 10 mg par jour (soit ½ comprimé de la matin + ½ comprimé le soir).

• Adulte et enfant de plus de 12 ans : 10 mg par jour (soit ½ comprimé de la matin + ½ comprimé le soir).

• Adulte et enfant de plus de 12 ans : 10 mg par jour (soit ½ comprimé de la matin + ½ comprimé le soir).

• Adulte et enfant de plus de 12 ans : 10 mg par jour (soit ½ comprimé de la matin + ½ comprimé le soir).

• Adulte et enfant de plus de 12 ans : 10 mg par jour (soit ½ comprimé de la matin + ½ comprimé le soir).

• Adulte et enfant de plus de 12 ans : 10 mg par jour (soit ½ comprimé de la matin + ½ comprimé le soir).



27,40

CETIRAL 1 mg/ml

Flacon de 60 ml de

solution buvable

071402

Zone Industrielle Ouest Aïn Harrouda

Roua Régionale n° 29 (ex R.S 111)

Km 12,400 Aïn Harrouda 29 050 - Mohammédia, Maroc

© 2012

www.sanofi.com

CETIRAL®

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes sur votre traitement.

Si vous avez des autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament n'est pas personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui faire mal.

1. IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

a) DENOMINATION

b) COMPOSITIONS QUALITATIVES ET QUANTITATIVES

• Comprimé pelliculé :	Prix comprimé :
Cétirizine (DCI) diclofénacate.....	10 mg
Excipients : - Cetilice, microcristalline, lactose monohydraté, crospovidone, silice colloïdale	
antioxydant, stearate de magnésium,	
alcalogénie : hypromellose, macrogol stérane, cellulose microcristalline, propylenglycol,	
glycérol de titan E 171, eau purifiée.	

c) FORMES PHARMACEUTIQUES ET PRÉSENTATIONS

• Comprimé pelliculé : Boîte de 15.	Prix/ml :
Station buvable : Flacon de 90 ml accompagné d'une pipette graduée jusqu'à 5 ml (1 dose équivalente à 5 ml).	1 mg

d) CLASSE PHARMACOTHERAPIQUE

Démarrage de la hypertension (code ATC: R04B).

e) FORMES PHARMACEUTIQUES ET PRÉSENTATIONS

• Comprimé : Adultes et enfants de 6 ans et plus.	Prix/ml :
Solution buvable : Adulte et enfant à partir de 2 ans.	1 mg

f) FORMES PHARMACEUTIQUES ET PRÉSENTATIONS

• Solutio... buvable : Adulte et enfant à partir de 2 ans.	Prix/ml :
Traitement des symptômes rhumatisants et ostéopathiques.	1 mg

g) FORMES PHARMACEUTIQUES ET PRÉSENTATIONS

• Solutio... buvable : Adulte et enfant à partir de 2 ans.	Prix/ml :
Traitement des symptômes rhumatisants et ostéopathiques.	1 mg

h) FORMES PHARMACEUTIQUES ET PRÉSENTATIONS

• Solutio... buvable : Adulte et enfant à partir de 2 ans.	Prix/ml :
Traitement des symptômes rhumatisants et ostéopathiques.	1 mg

i) ATTENTION

a) DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

- Ce médicament ne doit PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :
 - Hypersensibilité à la cétirizine ou aux dérivés de la pléniazine ou à l'un des excipients entrant dans la composition de ce médicament.
 - Insuffisance rénale sévère.
 - Enfant de moins de 6 ans à cause du risque de tissus mûrs (comprimé).
 - Enfant de moins de 2 ans (solution buvable).

b) MISE EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

UTILISATION DE MÉDICAMENT AVEC PRÉCAUTION :

- La cétirizine doit être administrée avec prudence chez les patients atopiques ou à risque de convulsions.
- Comprimés et solution buvable : Ce médicament contient du propylenglycol et peut entraîner des irritations de la peau.

* Utilisation de Cetirizine est déconseillée chez les patients présentant une insuffisance au galactosidase, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

* Solution buvable : Les parasympatholytiques de cyclopipéline et de méthylpipéline sont des conservateurs qui sont susceptibles de provoquer des réactions allergiques (dont le délai d'apparition peut être long par rapport à la pose).

* Solution buvable : En raison de la présence de sorbitol, Cetirizine est déconseillée en cas d'intolérance au fructose (maladie heréditaire rare).

* CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU VOTRE PHARMACIEN

c) INTERACTIONS

Compte tenu des données pharmacologiques et du profil de tolérance de la cétirizine, aucune interaction avec Cetirizine n'est attendue.

Par ailleurs, il n'est recommandé que la prise d'abstention de ce médicament.

FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

* GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Grossesse : Cetirizine doit être présent avec prudence chez la femme enceinte. Allaitement : La cétirizine passe dans le lait maternel. Sa prescription durant l'allaitement doit être prudente.

DEMANDER CONSEIL A VOTRE MÉDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE TOUT MÉDICAMENT.

* CONDUCTEURS ET UTILISATEURS DE MACHINES

Cette certaines personnes peuvent sentir des effets secondaires, comme la somnolence. Il est donc conseillé aux patients qui doivent conduire un véhicule ou utiliser une machine dangereuse de ne pas dépasser la posologie recommandée, et d'éviter leur vigilance sous traitement.

II. LISTE DES EXCÉPTEMENTS DONT LA CONNAISSANCE UTILISATION SANS RISQUE CHEZ CERTAINS PATRÉ

Composante : Lactose, propylenglycol.

Solution buvable : Propylenglycol, sorbitol, pa

4. COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ?

a) POSOLOGIES USUELLES

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 10 mg par jour (une forme = comprimé + est réservée à l'adulte et à la forme = solution buvable, une dose correspond à 5 ml).

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 10 mg par jour (une forme = comprimé + est réservée à l'adulte et à la forme = solution buvable, une dose correspond à 5 ml).

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 mg par jour (une forme = comprimé + est réservée à l'adulte et à la forme = solution buvable, une dose correspond à 5 ml).

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 mg par jour (une forme = comprimé + est réservée à l'adulte et à la forme = solution buvable, une dose correspond à 5 ml).

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 mg par jour (une forme = comprimé + est réservée à l'adulte et à la forme = solution buvable, une dose correspond à 5 ml).

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 mg par jour (une forme = comprimé + est réservée à l'adulte et à la forme = solution buvable, une dose correspond à 5 ml).

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 mg par jour (une forme = comprimé + est réservée à l'adulte et à la forme = solution buvable, une dose correspond à 5 ml).

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 mg par jour (une forme = comprimé + est réservée à l'adulte et à la forme = solution buvable, une dose correspond à 5 ml).

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 mg par jour (une forme = comprimé + est réservée à l'adulte et à la forme = solution buvable, une dose correspond à 5 ml).

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 mg par jour (une forme = comprimé + est réservée à l'adulte et à la forme = solution buvable, une dose correspond à 5 ml).

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 mg par jour (une forme = comprimé + est réservée à l'adulte et à la forme = solution buvable, une dose correspond à 5 ml).

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 mg par jour (une forme = comprimé + est réservée à l'adulte et à la forme = solution buvable, une dose correspond à 5 ml).

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 mg par jour (une forme = comprimé + est réservée à l'adulte et à la forme = solution buvable, une dose correspond à 5 ml).

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 mg par jour (une forme = comprimé + est réservée à l'adulte et à la forme = solution buvable, une dose correspond à 5 ml).

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 mg par jour (une forme = comprimé + est réservée à l'adulte et à la forme = solution buvable, une dose correspond à 5 ml).

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 mg par jour (une forme = comprimé + est réservée à l'adulte et à la forme = solution buvable, une dose correspond à 5 ml).

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 mg par jour (une forme = comprimé + est réservée à l'adulte et à la forme = solution buvable, une dose correspond à 5 ml).

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 mg par jour (une forme = comprimé + est réservée à l'adulte et à la forme = solution buvable, une dose correspond à 5 ml).

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 mg par jour (une forme = comprimé + est réservée à l'adulte et à la forme = solution buvable, une dose correspond à 5 ml).

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 mg par jour (une forme = comprimé + est réservée à l'adulte et à la forme = solution buvable, une dose correspond à 5 ml).

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 mg par jour (une forme = comprimé + est réservée à l'adulte et à la forme = solution buvable, une dose correspond à 5 ml).

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 mg par jour (une forme = comprimé + est réservée à l'adulte et à la forme = solution buvable, une dose correspond à 5 ml).

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 mg par jour (une forme = comprimé + est réservée à l'adulte et à la forme = solution buvable, une dose correspond à 5 ml).

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 mg par jour (une forme = comprimé + est réservée à l'adulte et à la forme = solution buvable, une dose correspond à 5 ml).

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 mg par jour (une forme = comprimé + est réservée à l'adulte et à la forme = solution buvable, une dose correspond à 5 ml).

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 mg par jour (une forme = comprimé + est réservée à l'adulte et à la forme = solution buvable, une dose correspond à 5 ml).

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 mg par jour (une forme = comprimé + est réservée à l'adulte et à la forme = solution buvable, une dose correspond à 5 ml).

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 mg par jour (une forme = comprimé + est réservée à l'adulte et à la forme = solution buvable, une dose correspond à 5 ml).

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 mg par jour (une forme = comprimé + est réservée à l'adulte et à la forme = solution buvable, une dose correspond à 5 ml).

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 mg par jour (une forme = comprimé + est réservée à l'adulte et à la forme = solution buvable, une dose correspond à 5 ml).

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 mg par jour (une forme = comprimé + est réservée à l'adulte et à la forme = solution buvable, une dose correspond à 5 ml).

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 mg par jour (une forme = comprimé + est réservée à l'adulte et à la forme = solution buvable, une dose correspond à 5 ml).

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 mg par jour (une forme = comprimé + est réservée à l'adulte et à la forme = solution buvable, une dose correspond à 5 ml).



27,40

CETIRAL 1 mg/ml

Flacon de 60 ml de solution buvable

soit 1 dose de 1 mg/ml de

à 4 doses par jour (une forme = comprimé + est réservée à l'adulte et à la forme = solution buvable, une dose correspond à 5 ml).

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 mg par jour (une forme = comprimé + est réservée à l'adulte et à la forme = solution buvable, une dose correspond à 5 ml).

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 mg par jour (une forme = comprimé + est réservée à l'adulte et à la forme = solution buvable, une dose correspond à 5 ml).

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 mg par jour (une forme = comprimé + est réservée à l'adulte et à la forme = solution buvable, une dose correspond à 5 ml).

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 mg par jour (une forme = comprimé + est réservée à l'adulte et à la forme = solution buvable, une dose correspond à 5 ml).

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 mg par jour (une forme = comprimé + est réservée à l'adulte et à la forme = solution buvable, une dose correspond à 5 ml).

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 mg par jour (une forme = comprimé + est réservée à l'adulte et à la forme = solution buvable, une dose correspond à 5 ml).

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 mg par jour (une forme = comprimé + est réservée à l'adulte et à la forme = solution buvable, une dose correspond à 5 ml).

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 mg par jour (une forme = comprimé + est réservée à l'adulte et à la forme = solution buvable, une dose correspond à 5 ml).

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 mg par jour (une forme = comprimé + est réservée à l'adulte et à la forme = solution buvable, une dose correspond à 5 ml).

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 mg par jour (une forme = comprimé + est réservée à l'adulte et à la forme = solution buvable, une dose correspond à 5 ml).

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 mg par jour (une forme = comprimé + est réservée à l'adulte et à la forme = solution buvable, une dose correspond à 5 ml).

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 mg par jour (une forme = comprimé + est réservée à l'adulte et à la forme = solution buvable, une dose correspond à 5 ml).

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 mg par jour (une forme = comprimé + est réservée à l'adulte et à la forme = solution buvable, une dose correspond à 5 ml).

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 mg par jour (une forme = comprimé + est réservée à l'adulte et à la forme = solution buvable, une dose correspond à 5 ml).

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 mg par jour (une forme = comprimé + est réservée à l'adulte et à la forme = solution buvable, une dose correspond à 5 ml).

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 mg par jour (une forme = comprimé + est réservée à l'adulte et à la forme = solution buvable, une dose correspond à 5 ml).

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 mg par jour (une forme = comprimé + est réservée à l'adulte et à la forme = solution buvable, une dose correspond à 5 ml).

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 mg par jour (une forme = comprimé + est réservée à l'adulte et à la forme = solution buvable, une dose correspond à 5 ml).

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 mg par jour (une forme = comprimé + est réservée à l'adulte et à la forme = solution buvable, une dose correspond à 5 ml).

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 mg par jour (une forme = comprimé + est réservée à l'adulte et à la forme = solution buvable, une dose correspond à 5 ml).

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 mg par jour (une forme = comprimé + est réservée à l'adulte et à la forme = solution buvable, une dose correspond à 5 ml).

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 mg par jour (une forme = comprimé + est réservée à l'adulte et à la forme = solution buvable, une dose correspond à 5 ml).

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 mg par jour (une forme = comprimé + est réservée à l'adulte et à la forme = solution buvable, une dose correspond à 5 ml).

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 mg par jour (une forme = comprimé + est réservée à l'adulte et à la forme = solution buvable, une dose correspond à 5 ml).

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 mg par jour (une forme = comprimé + est réservée à l'adulte et à la forme = solution buvable, une dose correspond à 5 ml).

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 mg par jour (une forme = comprimé + est réservée à l'adulte et à la forme = solution buvable, une dose correspond à 5 ml).

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 mg par jour (une forme = comprimé + est réservée à l'adulte et à la forme = solution buvable, une dose correspond à 5 ml).

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 mg par jour (une forme = comprimé + est réservée à l'adulte et à la forme = solution buvable, une dose correspond à 5 ml).

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 mg par jour (une forme = comprimé + est réservée à l'adulte et à la forme = solution buvable, une dose correspond à 5 ml).

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 mg par jour (une forme = comprimé + est réservée à l'adulte et à la forme = solution buvable, une dose correspond à 5 ml).

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 mg par jour (une forme = comprimé + est réservée à l'adulte et à la forme = solution buvable, une dose correspond à 5 ml).

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 mg par jour (une forme = comprimé + est réservée à l'adulte et à la forme = solution buvable, une dose correspond à 5 ml).

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 mg par jour (une forme = comprimé + est réservée à l'adulte et à la forme = solution buvable, une dose correspond à 5 ml).

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 mg par jour (une forme = comprimé + est réservée à l'adulte et à la forme = solution buvable, une dose correspond à 5 ml).

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 mg par jour (une forme = comprimé + est réservée à l'adulte et à la forme = solution buvable, une dose correspond à 5 ml).

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 mg par jour (une forme = comprimé + est réservée à l'adulte et à la forme = solution buvable, une dose correspond à 5 ml).

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 mg par jour (une forme = comprimé + est réservée à l'adulte et à la forme = solution buvable, une dose correspond à 5 ml).

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 mg par jour (une forme = comprimé + est réservée à l'adulte et à la forme = solution buvable, une dose correspond à 5 ml).

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 mg par jour (une forme = comprimé + est réservée à l'adulte et à la forme = solution buvable, une dose correspond à 5 ml).

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 mg par jour (une forme = comprimé + est réservée à l'adulte et à la forme = solution buvable, une dose correspond à 5 ml).

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 mg par jour (une forme = comprimé + est réservée à l'adulte et à la forme = solution buvable, une dose correspond à 5 ml).

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 mg par jour (une forme = comprimé + est réservée à l'adulte et à la forme = solution buvable, une dose correspond à 5 ml).

Ordonnance

Médic

le : 27-12-2022

Nom & prénom :

Fatma DINA BEN Abdelljalil

- Recu pour Impédomancemétrie

$$k_{\frac{d}{D}} = 200 \text{ DH}$$

- C.R : dysfonction tubaire

Dr. Touriya BENNIS
Spécialiste O.R.L.
21. AV des F.A.R. Mohammedia
Tél 05 23 32 53 30




Prénom Dina
Nom Benabdeljalil

27/12/2022 18:36:33

مركز طب الأذن، الأنف و الحنجرة
CENTRE ORL

MOHAMMEDIA



M. Touriya BENNIS
Spécialiste O.R.L.
21. Av des F.A.R. Mohammedia
+212 05 23 32 99 90