

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

M22- 0025404

Optique

Autres

Maladie Dentaire

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 10492 Société : 144693

Actif Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : BOU GIB SAID

Date de naissance : 08-03-1966

Adresse : BLAC 1 AVENUE CHOUHADA N°142 H. M casa

Tél. : 06 64 33 36 11 Total des frais engagés : 727 Dhs Dhs

Cadre réservé au Médecin

Dr. Abdeslam EL MADANI
Chirurgien
INPE : 091057661
22, Bd. Omar El Khayam Beauséjour
Tél : 0522 36 69 00 - Casablanca

Cachet du médecin :

Date de consultation : 13/12/2022

Nom et prénom du malade : BOU GIB SAID Age :

Lien de parenté : Lui-même Conjoint

Enfant

Nature de la maladie : Dolente abdominale

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie :


En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : 12 JAN. 2023

Signature de l'adhérent(e) :



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
13/12/22	Chirurgien	x	200000 Dhs 300000 Dhs	Abdeslam EL MARDI Chirurgien INPE : 091057661 22 Bd. Ouard El Khayam Ben Séjjour 0522 36 69 00 - Casablanca

EXECUTION DES ORDONNANCES Dr. Abdes Chirurgien

Cachet du Pharmacien, ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture : INPE : 0910576 22 Bd. Oмар Хамади Yam Beauseigneur Tél. : 0522 36 69 00 - Casablanca
 INPE: 092007343	13 12 2022	2073.00

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE


	H
25533412	21433552
00000000	00000000
D	
00000000	00000000
25533411	11433553

A diagram showing a 10x10 grid of circles. The circles are numbered with integers from 1 to 8. The grid is bounded by arrows labeled D (left), G (right), H (top), and B (bottom). The numbers are arranged as follows:

- Row 1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2
- Row 2: 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2
- Row 3: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4
- Row 4: 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5
- Row 5: 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6
- Row 6: 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
- Row 7: 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
- Row 8: 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1

[Création, remont, adjonction]

Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE  <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">H</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">G</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">25533412</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">21433552</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">00000000</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">00000000</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">D</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">00000000</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">35533411</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">B</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">G</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">11433553</td> <td></td> </tr> </table> [Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession	H	G	25533412	21433552	00000000	00000000	D		00000000		35533411		B	G	11433553		COEFFICIENT DES TRAVAUX  MONTANTS DES SOINS  DATE DU DEVIS  DATE DE L'EXECUTION 
H	G																	
25533412	21433552																	
00000000	00000000																	
D																		
00000000																		
35533411																		
B	G																	
11433553																		

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr. Abdeslam El Madani

Chirurgie Viscérale & Digestive Coelioscopique
Lauréat de la faculté de médecine de Paris
Ancien Attaché des Hôpitaux de Paris
Ex chirurgien à l'hôpital militaire de Meknès

- Coeliochirurgie
- Chirurgie Viscérale et Digestive
- Chirurgie Cancerologique
- Chirurgie Gynécologique et Endocrinienne
- Proctologie - Chirurgie des Varices
- circoncision

الدار البيضاء في Casablanca, le 13.12.2022

Mr BOUGTIB Said

1 DUSPATALIN GEL

2 LIXIFOR GELLULES

3 ALIVIAR 50 MG

Prendre 1 Comprimé le matin et le soir, avant le repas, pendant 20 jours.

Dr Abdeslam EL MADANI

22, Bd. Omar El Khayam 2ème étage, Résidence Fatima-Zohra - Beauséjour - CASA
Tél. : 0522 36.69.00 / 06.66.19.12.30 - Fax : 0522 36.68.99 - GSM : 0661 06.92.51 - E-mail : abdeslam.elmadani@gmail.com - ICE : 00171274400080

في حالة المستعجلات الاتصال بمصحة لونشون الهاتف : 05 22 04 07 07



DUSPATALIN®

200 mg Chlorhydrate de mébérérine

Veuillez lire attentivement cette médicament car elle contient vous.

- Gardez cette notice.
 - Si vous avez d'autre pharmacien.
 - Ce médicament n'est pas à d'autre signes de leur
 - Si vous ressentez des effets indésirables qui ne seraient pas indésirables.
- DUSPATALIN 200 mg
GELU 820
P.P.V: 54DH00
1188881618531
L01/22E002
PER-09 2024
- Prendre ce médicament pour vous. Votre médecin ou votre pharmacien ou votre pharmacien pour prendre ce médicament. Ne le donnez pas à d'autre. Il est nocif, même si les effets indésirables. Parlez-en à votre pharmacien si s'applique aussi à tout effet indésirable mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.



P.P.V: 54DH00
1188881618531

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que DUSPATALIN 200 mg, gélule et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre DUSPATALIN 200 mg, gélule ?
3. Comment prendre DUSPATALIN 200 mg, gélule ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver DUSPATALIN 200 mg, gélule ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE DUSPATALIN 200 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC

DUSPATALIN 200 mg contient du chlorhydrate de mébérérine. Il appartient à un groupe de médicaments appelé antispasmodiques, qui agissent sur votre intestin.

DUSPATALIN 200 mg est utilisé pour soulager les symptômes des troubles fonctionnels intestinaux. Ces symptômes varient d'une personne à l'autre mais peuvent inclure :

- des douleurs et des crampes du ventre
- une sensation de ballonnements et des flatulences
- une diarrhée, une constipation ou une association des deux
- des petites selles (fèces) dures, en forme de granulés ou de ruban.

En l'absence d'amélioration ou si les symptômes s'aggravent, consultez votre médecin.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DUSPATALIN 200 mg, gélule ?

Ne prenez jamais DUSPATALIN 200 mg si :

• si vous êtes allergique au chlorhydrate de mébérérine ou à d'autres composants de DUSPATALIN 200 mg.

En cas de doute, il est indispensable de consulter votre pharmacien.

Autres médicaments et DUSPATALIN 200 mg

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez ou pourriez prendre tout autre médicament.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allez planifier une grossesse, demandez conseil à votre pharmacien.

DUSPATALIN 200 mg n'est pas recommandé pendant la grossesse. DUSPATALIN 200 mg ne doit pas être donné à une femme enceinte.

Votre médecin pourrait vous conseiller d'utiliser un autre médicament si vous êtes enceinte.

Demandez conseil à votre pharmacien ou à votre pharmacien pour prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation d'outils

Aucun effet susceptible d'altérer l'aptitude à conduire ou à utiliser des machines n'est attendu.

3. COMMENT PRENDRE DUSPATALIN 200 mg, gélule ?

Veillez à toujours prendre ce médicament dans les indications de votre pharmacien. Vérifiez avec votre pharmacien en cas de doute.

Posologie

Adulte

La posologie usuelle est de 1 gélule, 2 fois par jour.

Mode d'administration

Voie orale.

La gélule sera prise avant les repas, au petit déjeuner et au dîner.

Fréquence d'administration

Se conformer strictement à l'ordonnance.

Durée de traitement

Se conformer strictement à l'ordonnance.

Si vous avez pris plus de DUSPATALIN 200 mg, gélule

Consultez immédiatement votre pharmacien ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre DUSPATALIN 200 mg, gélule

- Si vous oubliez une gélule, ne la prenez pas à l'heure habituelle.

- Ne prenez pas de dose double pour faire l'heure oublie de prendre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas toujours.

NOTICE: INFORMATION POUR L'UTILISATEUR

Dénomination du médicament

ALIVIAR® 50 mg, gélules

DCI : Sulpiride

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'information à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autres, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que ALIVIAR® 50 mg, gélules et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ALIVIAR® 50 mg, gélules ?
3. Comment prendre ALIVIAR® 50 mg, gélules ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ALIVIAR® 50 mg, gélules ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QU'ALIVIAR® 50 MG, GELULES ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

- **Classe pharmaco-thérapeutique :** Antipsychotique neuroleptique, benzamide code ATC : N05AL01

Il appartient à la famille des benzamides. C'est un antipsychotique neuroleptique.

- **Indications :**

Adultes : traitement symptomatique de courte durée de l'anxiété en cas d'échec des thérapeutiques habituelles.

Enfant (de plus de 6 ans) : Troubles graves du comportement (agitation, automutilations, stéréotypies), notamment dans le cadre des syndromes autistiques.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ALIVIAR® 50 MG, GELULES ?

- **Ne prenez jamais ALIVIAR® 50 mg, gélules dans les cas suivants:**

- Hypersensibilité au sulpiride ou à l'un des autres constituants du produit,
- Tumeur connue dépendant de la prolactine, par exemple (adénome hypophysaire à prolactine ou cancer du sein),
- Phéochromocytome (atteinte de la glande médulosurrénale provoquant une hypertension artérielle sévère),
- En association avec les dopaminergiques non antiparkinsoniens cabergoline et quinagolide (médicaments utilisés dans les troubles de la lactation),

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS D'UN AUTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

- **Mises en garde :**

- **Mises en garde :**

Si vous présentez des symptômes de l'anxiété, commencez le traitement.

- En cas d'apparition d'effets indésirables, il est impératif d'interrompre le traitement et de consulter le service d'urgence.

- Avant la prise du médicament, le médecin pourra évaluer si le médicament peut être prescrit.

- Ce médicament doit être pris avec prudence chez les personnes souffrant de facteurs de risque d'accident.

- Ce médicament doit être utilisé avec prudence chez les patients âgés atteints de

démence.

- Ce médicament peut entraîner la formation de caillots sanguins et la formation de caillots dans les artères et les veines.

- La prise de ce médicament chez les personnes alcoolisées ou des personnes souffrant de maladies neurodégénératives peut entraîner une pointe (troubles graves) et peut entraîner l'apparition de symptômes indésirables.

- Ce médicament doit être utilisé avec prudence chez l'enfant, un enfant peut prendre ce médicament avec succès.

- La prise de comprimés peut entraîner l'avalage de traveaux et de déficit en lactase.

- **Précautions d'emploi :**

Afin que votre médecin puisse déterminer le traitement, il est nécessaire de faire une évaluation de la santé mentale.

- En cas de maladie mentale, il est nécessaire de faire une évaluation de la santé mentale.

- En cas de diabète, il est nécessaire de faire une évaluation de la santé mentale.

- En cas d'insuffisance cardiaque, il est nécessaire de faire une évaluation de la santé mentale.

- En cas d'antécédents de crises épileptiques, il est nécessaire de faire une évaluation de la santé mentale.

- Chez les sujets âgés, il est nécessaire de faire une évaluation de la santé mentale.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS D'UN AUTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

• Associations connues :

Dopaminergiques peuvent entraîner des effets indésirables tels que : tachycardie, hypertension, sudation, sueur, mictions fréquentes, sialorrhée, sotalol, diphenhydramine, IV, neuroleptiques, ol, levormelol, de, adone.

Certains médicaments peuvent entraîner des effets indésirables :

- Antiparkinsonien

LOT : 03922010
FER : 04/2027
PPV : 27.00 DA

NOTICE: INFORMATION POUR L'UTILISATEUR

Dénomination du médicament

ALIVIAR® 50 mg, gélules

DCI : Sulpiride

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'information à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autres, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que ALIVIAR® 50 mg, gélules et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ALIVIAR® 50 mg, gélules ?
3. Comment prendre ALIVIAR® 50 mg, gélules ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ALIVIAR® 50 mg, gélules ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QU'ALIVIAR® 50 MG, GELULES ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

- **Classe pharmaco-thérapeutique :** Antipsychotique neuroleptique, benzamide code ATC : N05AL01

Il appartient à la famille des benzamides. C'est un antipsychotique neuroleptique.

- **Indications :**

Adultes : traitement symptomatique de courte durée de l'anxiété en cas d'échec des thérapeutiques habituelles.

Enfant (de plus de 6 ans) : Troubles graves du comportement (agitation, automutilations, stéréotypies), notamment dans le cadre des syndromes autistiques.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ALIVIAR® 50 MG, GELULES ?

- **Ne prenez jamais ALIVIAR® 50 mg, gélules dans les cas suivants:**

- Hypersensibilité au sulpiride ou à l'un des autres constituants du produit,
- Tumeur connue dépendant de la prolactine, par exemple (adénome hypophysaire à prolactine ou cancer du sein),
- Phéochromocytome (atteinte de la glande médullosurrénale provoquant une hypertension artérielle sévère),
- En association avec les dopaminergiques non antiparkinsoniens cabergoline et quinagolide (médicaments utilisés dans les troubles de la lactation),

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS D'UN AUTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

- **Mises en garde :**

- **Mises en garde :**

Si vous présentez des symptômes de l'anxiété, commencez le traitement.

- En cas d'apparition d'effets indésirables, il est impératif d'intervenir au service d'urgence.

- Avant la prise du médicament, le médecin pourra évaluer si le médicament peut être prescrit.

- Ce médicament doit être pris avec prudence chez les patients souffrant de facteurs de risque d'accident.

- Ce médicament doit être utilisé avec prudence chez les patients âgés atteints de

démence.

- Ce médicament doit être utilisé avec prudence chez les patients atteints de formation de caillots sanguins.

- La prise de ce médicament peut entraîner des réactions d'hypersensibilité chez les personnes alcoolisées ou des personnes souffrant de troubles psychotiques. Ces réactions peuvent être graves et nécessiter une hospitalisation.

- Ce médicament doit être utilisé avec prudence chez les personnes souffrant de risque d'apparition de symptômes psychotiques, principalement de la délire.

- Chez l'enfant, un suivi régulier est recommandé.

- La prise de comprimés peut entraîner une aspiration, ce qui peut entraîner de graves complications.

- En raison de présence d'effets secondaires, il est recommandé de prendre des médicaments qui n'ont pas d'effets secondaires.

- Afin que votre médecin puisse évaluer l'efficacité du traitement, il est nécessaire de prendre des médicaments qui n'ont pas d'effets secondaires.

- En cas de maladie de Parkinson, il est recommandé de prendre des médicaments qui n'ont pas d'effets secondaires.

- En cas de diabète, il est recommandé de prendre des médicaments qui n'ont pas d'effets secondaires.

- En cas d'insuffisance rénale, il est recommandé de prendre des médicaments qui n'ont pas d'effets secondaires.

- En cas d'antécédents de crises épileptiques, il est recommandé de prendre des médicaments qui n'ont pas d'effets secondaires.

- Chez les sujets âgés, il est recommandé de prendre des médicaments qui n'ont pas d'effets secondaires.

- Votre pharmacien peut vous conseiller des médicaments qui n'ont pas d'effets secondaires.

- Certains médicaments peuvent entraîner des effets secondaires.

- Antiparkinsonien.

LOT : 03922010
FER : 04/2027
PPV : 27.00 DA

LIXIFOR

COMPOSITION : Dose par gélule

- Séné 140 mg
- Radis N 5 mg
- Anis E mg
- Casca Lot/À consommer mg
de préférence ava

X1022 0126

LOT

PER



3 700221 339503

Prix 99.00

PROPI

LIXIFOR

- Régulat
- Reduct
- Ballonne
- Active le p

Dr. Abdeslam El Madani



Chirurgie Viscérale & Digestive Coelioscopique
Lauréat de la faculté de médecine de Paris
Ancien Attaché des Hôpitaux de Paris
Ex chirurgien à l'hôpital militaire de Meknès

Cœliochirurgie

Chirurgie Viscérale et Digestive

Chirurgie Cancerologique

Chirurgie Gynécologique et Endocrinienne

Proctologie - Chirurgie des Varices

circoncision

Casablanca, le

13/12/22

د. محمد السلام المداني

جراحة الجهاز الهضمي والعدد الجراحية بالمنظار

خريج كلية الطب بباريس

جراح سابق بمستشفيات باريس

جراح سابق بالمستشفى العسكري بمكناس

الجراحة بالمنظار

جراحة الجهاز الهضمي والمخرج

الجراحة الباطنية وال العامة

جراحة النساء والعدد

جراحة السرطان - جراحة العروق

الختان

الدار البيضاء في

Mr BOUAFIA SAID

Echographie abdominale faite le

Très cents dirhams
(300 Dhs)

Dr. Abdeslam EL MADANI
Chirurgien
INPE: 091057661
22 Bd. Omar El Khayam Beauséjour
Tel.: 0522 36 69 00 . Casablanca

22, Bd. Omar El Khayam 2ème étage, Résidence Fatima-Zohra - Beauséjour - CASA
Tél. : 0522 36.69.00 / 06.66.19.12.30 - Fax : 0522 36.68.99 - GSM : 0661 06.92.51 - E-mail : abdeslam.elmadani@gmail.com - ICE : 001712744000080

Site Web : www.dr-elmadani.com

في حالة المستعجلات الاتصال بمنصحة لونشون الهاتف : 05 22 04 07 07

Docteur Abdeslam El Madani

CHIRURGIEN

Lauréat de la faculté de médecine de Paris

Chirurgie Coelioscopique

Chirurgie Viscérale, Digestive

Endocrinienne et Vasculaire

ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

22, Bd Omar El Khayam Beauséjour Casablanca

Tel : 0522366900

CASABLANCA

13 12

/2022

BOUGTIB SAID
DOULEURS ABDOMINALES

- Foie homogène **Echostructure normale**
- **de contours réguliers**, de taille normale ;
- Vésicule biliaire Alithiasique
- VBP fine, elle est apparemment libre ;
- Les voies biliaires intra-hépatiques ne sont pas dilatées, les veines sus-hépatiques sont de répartition et de morphologie normale ;
- Le TP est mesuré 8 mm, de calibre normal, libre,
- La rate est d'echostructure homogène, de taille normale,
- Les reins sont de taille normale, avec une bonne différentiation cortico-medullaire, il n'y a pas d'image de lithiase ni hypotonie des calices droites
- Le pancréas a pu être exploré en totalité , il n'y a pas d'image suspecte détectable échographiquement ;
- Il n'est pas détecté d'adénopathies profondes,
- PAS d'épanchement dans le cul de sac de DOUGLAS,
- NI l'espace inter-hépato-rénal de MORISSON ;

CONCLUSION :

**ECHO NORMALE
EN DEHORS AEROCOLIE**

Dr. Abdeslam EL MADANI
Chirurgien
INPE : 091057661
Bd. Omar El Khayam Beauséjour
Tel. : 0522366900 Casablanca, ELMADANI

Voluson boughtib, said *
274923SU2-22-12-01-4

4C-RS/ABD
20.1cm/1.2/25Hz

MI 0.7
TIs 0.4

Dr EL Madani Abdeslam

13.12.2022 6:24:30 PM

Abdomen
Har-Faible
100G
Gn 0
C4 / M4
FF2 / E3
SRI II 3 / CRI 3



Voluson boughtib, said *
274923SU2-22-12-13-4

4C-RS/ABD
20.1cm/1.2/25Hz

MI 0.7
TIs 0.4

Dr EL Madani Abdeslam

13.12.2022 6:24:15 PM

Abdomen
Har-Faible
100G
Gn 0
C4 / M4
FF2 / E3
SRI II 3 / CRI 3



Voluson boughtib, said *
274923SU2-22-12-13-4

4C-RS/ABD
20.1cm/1.2/25Hz

MI 0.7
TIs 0.4

Dr EL Madani Abdeslam

13.12.2022 6:23:54 PM
Abdomen
Har-Faible
100G
Gn 0
C4 / M4
FF2 / E3
SRI II 3 / CRI 3

