

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 0 Réclamation | : contact@mupras.com |
| 0 Prise en charge | : pec@mupras.com |
| 0 Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 13121

Société : RAM 145013

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : Joudat Mohammed Reda

Date de naissance : 25.10.89


Adresse :

Tél. : 0661776408

Total des frais engagés : 695,90 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 13/12/2022

Nom et prénom du malade : SOUDAT HADY

Age :

Lien de parenté : Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca

Signature de l'adhérent(e) :



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
13.12.22	E	1	300 DT	Dr. S. Pédiaire Résidence du Centre 30 Rue de la Marquise 22 bis 65 90 500

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE DES JARDINS Centre Commercial Laimoult Tél. 022 99 48 11	15/12/2022	395,90

ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	Coefficient des Travaux
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			Coefficient des Travaux
	H 25533412 00000000 35533411	21433552 00000000 11433553	G 00000000 00000000	MONTANTS DES SOINS
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS				VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr. Rachid BENNOUNA

PEDIATRE

Diplômé de la Faculté Médecine de Paris
Réanimation Néonatale
Gastro Entérologie Pédiatrique
(Fibroscopie - PH méttrie)



الدكتور رشيد بنونة

اختصاصي في أمراض الرضيع و الطفل

خريج كلية الطب بباريس

أستاذ مساعد سابقاً

بمستشفيات باريس

sablanca, le.....

15.12.2022

الدار البيضاء، في

ID:651090 GlaxoSmithKline Maroc
Aïn El Aouda
Région de Rabat
PPV: 125,00 DH
6 118001 140329

ID:651090 GlaxoSmithKline Maroc
Aïn El Aouda
Région de Rabat
PPV: 125,00 DH
6 118001 140329

Nourrisson JOUDAT Hady

Age : 13 mois 26 jours

Poids : 11,90 Kg

1 SERUM PHYSIOLOGIQUE 9P1000

1 lavage nasal le matin, à midi, le soir et au coucher. Seringue 2.5

SV

2 AUGMENTIN ENFANT 100MG/12.5MG PAR ML

Donner la graduation n°12 Kg fois 3 par jour pendant 10 jours avant le repas. a gardes au frais.

SV

3 BETASTENE GOUTTES

12 gouttes le matin, pendant 3 jours.

SV

4 DOLIPEDIATRIQUE SOLUTION BUVABLE

Donner la graduation N° 10+2 Kg toutes les 6 heures pendant 3 jours.

SV

5 VENTOLINE 100 µg susp p inhal : FI/200d

1 inhalation le matin, à midi et le soir, pendant 2 semaines.

PHARMACIE DES SCIENCES
Centre Commercial Al Lamoun II
CASABLANCA
Tél : 022 99 48 18

Rachid BENNOUNA
Résidence du Centre BEN SAID
30 Rue du Marché (Maârif) - Casablanca
Tél.: 0522.98.65.98 - Fax.: 0522.98.65.92 - Urgences Clinique AJIAL : 05.22.87.81.81
E-mail : bennounarachid41@gmail.com

إقامة مركز بننوع - 30 زنقة المرشي - المعريف - الدار البيضاء

Résidence du Centre BEN SAID - 30, Rue du Marché (Maârif) - Casablanca

Tél.: 0522.98.65.98 - Fax.: 0522.98.65.92 - Urgences Clinique AJIAL : 05.22.87.81.81



AUGMENTIN 100mg/12,5mg/1mg suspension buvable en flacon 50 ml

AUGMENTIN 100mg/12,5mg/1mg Suspension buvable en flacon 50 ml Enfant, poudre pour suspension buvable en sachet-dose, boîte de 12 sachets.

Amoxicilline/Acide clavulrique

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'information au médecin ou au pharmacien.

- Ce médicament vous a été prescrit à votre enfant.
- Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en au médecin ou au pharmacien.

Quel content cette notice ? AUGMENTIN a-t-il dans quel cas est-il utilisé ?

1. Quels sont les effets de AUGMENTIN ?
2. Comment prendre AUGMENTIN ?
3. Où puis-je trouver des informations supplémentaires ?

QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE AUGMENTIN ?

Votre médecin vous a informé(e) de une insuffisance à certains sucres, contre-indication, ou a prescrit ce médicament.

Il convient, dans tous les cas, de faire attention à ces indications. L'amoxicilline appartient à un groupe de médicaments appelés "pénicillines". Qui peuvent empêcher cette activation.

AUGMENTIN est utilisé chez l'adulte et chez l'enfant pour traiter les infections suivantes :

infections de l'oreille moyenne et des sinus,

infections des voies respiratoires,

infections de la peau et des tissus mous, incluant les infections dentaires,

infections des os et des articulations.

QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE AUGMENTIN ?

Il convient, dans tous les cas, de faire attention à ces indications. L'amoxicilline appartient à un groupe de médicaments appelés "pénicillines". Qui peuvent empêcher cette activation.

AUGMENTIN, à votre enfant, n'a pas d'effets secondaires connus.

Il convient, dans tous les cas, de faire attention à ces indications. L'amoxicilline appartient à un groupe de médicaments appelés "pénicillines". Qui peuvent empêcher cette activation.

Il convient, dans tous les cas, de faire attention à ces indications. L'amoxicilline appartient à un groupe de médicaments appelés "pénicillines". Qui peuvent empêcher cette activation.

Il convient, dans tous les cas, de faire attention à ces indications. L'amoxicilline appartient à un groupe de médicaments appelés "pénicillines". Qui peuvent empêcher cette activation.

Il convient, dans tous les cas, de faire attention à ces indications. L'amoxicilline appartient à un groupe de médicaments appelés "pénicillines". Qui peuvent empêcher cette activation.

Il convient, dans tous les cas, de faire attention à ces indications. L'amoxicilline appartient à un groupe de médicaments appelés "pénicillines". Qui peuvent empêcher cette activation.

Il convient, dans tous les cas, de faire attention à ces indications. L'amoxicilline appartient à un groupe de médicaments appelés "pénicillines". Qui peuvent empêcher cette activation.

Il convient, dans tous les cas, de faire attention à ces indications. L'amoxicilline appartient à un groupe de médicaments appelés "pénicillines". Qui peuvent empêcher cette activation.

Il convient, dans tous les cas, de faire attention à ces indications. L'amoxicilline appartient à un groupe de médicaments appelés "pénicillines". Qui peuvent empêcher cette activation.

Il convient, dans tous les cas, de faire attention à ces indications. L'amoxicilline appartient à un groupe de médicaments appelés "pénicillines". Qui peuvent empêcher cette activation.

Il convient, dans tous les cas, de faire attention à ces indications. L'amoxicilline appartient à un groupe de médicaments appelés "pénicillines". Qui peuvent empêcher cette activation.

Il convient, dans tous les cas, de faire attention à ces indications. L'amoxicilline appartient à un groupe de médicaments appelés "pénicillines". Qui peuvent empêcher cette activation.

Il convient, dans tous les cas, de faire attention à ces indications. L'amoxicilline appartient à un groupe de médicaments appelés "pénicillines". Qui peuvent empêcher cette activation.

Il convient, dans tous les cas, de faire attention à ces indications. L'amoxicilline appartient à un groupe de médicaments appelés "pénicillines". Qui peuvent empêcher cette activation.

Il convient, dans tous les cas, de faire attention à ces indications. L'amoxicilline appartient à un groupe de médicaments appelés "pénicillines". Qui peuvent empêcher cette activation.

Il convient, dans tous les cas, de faire attention à ces indications. L'amoxicilline appartient à un groupe de médicaments appelés "pénicillines". Qui peuvent empêcher cette activation.

Il convient, dans tous les cas, de faire attention à ces indications. L'amoxicilline appartient à un groupe de médicaments appelés "pénicillines". Qui peuvent empêcher cette activation.

Il convient, dans tous les cas, de faire attention à ces indications. L'amoxicilline appartient à un groupe de médicaments appelés "pénicillines". Qui peuvent empêcher cette activation.

Il convient, dans tous les cas, de faire attention à ces indications. L'amoxicilline appartient à un groupe de médicaments appelés "pénicillines". Qui peuvent empêcher cette activation.

Il convient, dans tous les cas, de faire attention à ces indications. L'amoxicilline appartient à un groupe de médicaments appelés "pénicillines". Qui peuvent empêcher cette activation.

Il convient, dans tous les cas, de faire attention à ces indications. L'amoxicilline appartient à un groupe de médicaments appelés "pénicillines". Qui peuvent empêcher cette activation.

Il convient, dans tous les cas, de faire attention à ces indications. L'amoxicilline appartient à un groupe de médicaments appelés "pénicillines". Qui peuvent empêcher cette activation.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si votre enfant, devrait recevoir ce médicament

être encadrée, demandez à son médecin ou au pharmacien.

AUGMENTIN contient :

• Du (Aspirine) (150 mg) qui est une source de salicylathiamine. Celle-ci peut être nocive chez les enfants nés avec une maladie appelée "maladie de Reye".

• De la Malécavacine (Guaïacol). Si votre enfant a une maladie à certains sucres, contactez le pharmacien avant de lui administrer ce médicament.

• Du paracétamol : en fonction de la température, il peut donner des effets indésirables chez les enfants suivant un régime pauvre en sucre.

• Du sodium, en forte quantité chez les enfants suivant un régime pauvre en sucre, il peut donner des effets indésirables chez les enfants suivant un régime pauvre en sucre.

• Comment prendre AUGMENTIN ?

• Pour augmenter la tolérance au médicament, veillez, auprès du médecin ou du pharmacien, à toujours prendre ce médicament à une heure différente de celle où vous prenez d'autres médicaments.

• Ces recommandations ne sont pas recommandées pour les adultes et les enfants de moins de 12 mois.

• Toutes ces doses sont établies en fonction du poids de l'enfant en kilogrammes.

• Enfants pesant moins de 10 kg : 60 mg/10 mg/kg/jour en trois doses.

• Votre médecin vous indiquera la quantité d'AUGMENTIN à administrer à votre bébé ou enfant.

• Une seringue graduée vous est fournie. Vous devez utiliser pour administrer la dose correcte à votre bébé ou enfant. Des informations sur la façon d'utiliser la seringue graduée sont fournies à la fin de la notice.

• Pour AUGMENTIN en flacon, une seringue graduée fournie avec ce médicament est graduée en millilitres (ml) et est uniquement réservée à l'usage d'AUGMENTIN. Chaque graduation représente 0,1 ml. Donnez 10 ml en trois doses de 10 mg/kg/jour en trois doses.

• AUGMENTIN 100 mg/12,5 mg/1 mg en flacon : Si vous avez une maladie au paracétamol, il faut correspondre au poids de l'enfant pour example, sur la seringue graduée correspondante à la gradation pour l'enfant de 0 à 10 kg.

• AUGMENTIN 100 mg/12,5 mg en flacon : Si vous avez une maladie au paracétamol, il faut correspondre à la gradation pour l'enfant de 0 à 10 kg.

• L'administration pourra nécessiter une adaptation de la dose pour être nécessaire.

• Si votre enfant a des problèmes de santé ou des antécédents de santé, il peut être nécessaire d'ajuster la dose.

• Donnez toujours à votre enfant au moins une dose au cours d'un repas.

• AUGMENTIN 500 mg/62,5 mg/6,25 mg : Si vous avez administré plus d'AUGMENTIN que nous n'en avions dit :

• Consultez immédiatement le médecin ou le pharmacien.

• La prise d'un quatrième dosage d'AUGMENTIN par votre enfant peut entraîner des maux de tête (taux), nausées, vomissements ou diarrhée) ou des convulsions. Parlez-en au médecin.

• Si vous oubliez de donner AUGMENTIN à votre enfant, administrer la dose que vous y avez oubliée de donner au plus tard 4 heures après la dose suivante.

• Par contre, attendez jusqu'à 4 heures avant de lui administrer la dose suivante.

• N'administrez pas deux doses pour compenser la dose que vous avez oubliée de lui donner.

• Si vous avez arrêté de prendre AUGMENTIN :

• Vous devez continuer de donner AUGMENTIN jusqu'à la fin du traitement.

• Même si le taux initial de toute maladie persiste, il est important pour contrôler l'infection. Si

• Si vous avez arrêté de prendre AUGMENTIN, il est important de se faire tester pour déterminer si d'autres questions existent.

• Si vous avez arrêté de prendre AUGMENTIN, il est important de se faire tester pour déterminer si d'autres questions existent.

• Si vous avez arrêté de prendre AUGMENTIN, il est important de se faire tester pour déterminer si d'autres questions existent.

• Si vous avez arrêté de prendre AUGMENTIN, il est important de se faire tester pour déterminer si d'autres questions existent.

• Si vous avez arrêté de prendre AUGMENTIN, il est important de se faire tester pour déterminer si d'autres questions existent.

• Si vous avez arrêté de prendre AUGMENTIN, il est important de se faire tester pour déterminer si d'autres questions existent.

6
118000 160205

PPV: 70 60 522 2024
LOT: 64 04
PER: 04



permet de vérifier la date de validité.

de ce code.

L'allaitement est à éviter pendant le traitement en raison du

utilisation de ce médicament est stricte surveillance chez les patients

Allaitement

nécessite de poursuivre ce traitement.

ce médicament doit être pris sous stricte surveillance médicale.

trirement, consulter votre médecin car lui seul peut juger

la raison de la présence d'aspartam dans la forme comprimé.

nécessaire. Si vous découvrez que vous êtes sensible au

phényletanolamine (maladie héréditaire dépassée à la naissance).

ce médicamenteux ne sera utilisée pendant la grossesse ou

alors qu'il n'y a pas de constatations.

nécessaire.

certains troubles mentaux non traités,

hépatite, varicelle, zona).

certains malades vivent dans évolution hépatite virale.

sans objet.

la plupart jamaïcaine dans les cas suivants :

INTERACTIONS AVCC LES PRODUITS DE PHYTOTHERAPIE

INTERRACTIONS AVEC LES ALIMENTS ET LES BOISSONS

Ce médicamenteux est un corticoïde. Il est indiqué dans certains

penicillidine, sparfloxacine, sulfisoxazole, téfendamicine.

malades, ou il utilise pour son effet anti-inflammatoire.

érythromycine en injection intraveineuse, halofantrine

glucocorticoïde - usage systémique.

troubles rythme cardiaque (astmazole, bepridil).

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

notamment avec certains médicaments pouvant donner c

disperstable

traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmaciste

BETASTENE 0,05 % solution buvable, q.s.p 100 ml de solution

pour éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs

disperstable

suivre un régime, en particulier pauvre en sel.

BETASTENE 2 mg comprimé disperstable, q.s.p 1 comprimé

Pendant le traitement, votez médecin pourra vous conseiller de

betaméthasone par 100 ml de solution.

métabolise.

BETASTENE 0,05 % solution buvable, contenu 0,05 g de

guttement, prévenez-le de situation de stress (drive,

compostion

Sous traitement et à cours d'une suintant l'arête du

BETASTENE 2 mg comprimé disperstable, contenu 2 mg de

pour la diminution des doses.

substance active : Betaméthasone.

récommmandations de votre médecin

BETASTENE 0,05 % solution buvable : Flacon de 30 ml.

er brûllement le

BETASTENE 2 mg comprimé disperstable : Boîte de 20 comprimé

les régions du

si les symptômes s'aggravent ou persistent, consulter votre

échec, en cas

gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

révention

plus d'informations à votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

medecin.

medicamenteux. Elle contient des informations importantes pour

utilisez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce

medicamenteux.

si les symptômes s'aggravent ou persistent, consulter votre

récente, en cas

gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

é diabète,

plus d'informations à votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.

si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez

au votre pharmacien.