

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

M22- 0041161

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent [e]

Matricule : 008314

Société : MAPORCIN

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : BOVTAIB NAJATE

Date de naissance : Née 1955

Adresse : Née le 1955 LOTADA MOUVERUE 3 MA 19 DULFA Casablanca

Tél. : 0600200137

Total des frais engagés :

Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr. MEZIANE Amine
Chirurgien Urologue
Clinique La Source - Casa
Tél. 05 22 20 45 45

Date de consultation : 25/10/2020

Nom et prénom du malade : BOUAFIA B. MAGATE Age:

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

Affection urinaire

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : 25/10/2020

Signature de l'adhérent[e] :

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
25/10/82	S		300 Dhs Chirurgien Urologue Clinique La Source Casa Tél : 715 20 11 11	ELIANE AMINE

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Remisseyeur	Date	Montant de la Facture
HARMACEUTIQUE sous Docteur en Pharmacie 4, Rasheed Al Annaim - Casablanca T : 22.00.43.03	25/10/22	194,40 Dhs

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Cœfficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important:

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX 
				MONTANTS DES SOINS 
				DEBUT D'EXECUTION 
				FIN D'EXECUTION 
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H 25533412 00000000 D 00000000 35533411	G 21433552 00000000 G 00000000 11433553	B	COEFFICIENT DES TRAVAUX 
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS 
				DATE DU DEVIS 
				DATE DE L'EXECUTION 

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



Docteur MEZIANE EL MAHDI

Docteur MEZIANE MUSTAPHA

Docteur MEZIANE ANAS

Docteur MEZIANE AMINE

Chirurgiens Urologues

الدكتور مزيان المهدى

الدكتور مزيان مصطفى

الدكتور مزيان أناس

الدكتور مزيان أمين

جريدة المسالك البولية النسائية
25/10/2022

ORDONNANCE

Mme BOUTAIB NAJATE Casablanca, le:

جريدة المسالك البولية النسائية

UROLOGIE

endo-urologie العلاج المنظاري
lithotritie تفتيت الحصى

86.40

DOLICOX 90 MG

1 cp / jour x 5 jours



الجراحة العامة والمنظارية

CHIRURGIE GENERALE
COELIO-CHIRURGIE

108.00

VECA 5

1 cp le soir x 1 mois



جريدة الأطفال

CHIRURGIE PEDIATRIQUE

جريدة النساء

CHIRURGIE GYNECOLOGIQUE

الإنعاش وجميع
الإختصاصات الطبية

REANIMATION ET TOUTES
SPECIALITES MEDICALES

مركز تفتيت الحصى

CENTRE DE LITHOTRIPSIE
EXTRACORPORELLE

مركز الفحص بالأشعة

CENTRE DE RADIOLOGIE

SCANNER

RADIOLOGIE STANDARD

Dr. MEZIANE ANAS
Chirurgien Urologue
Clinique La Source Casablanca
Tél : 05 22 20 14 40

PHARMACIE RESIDENCE ANNAM
Sham El Baroudi Pharmacie
Dorien Annam Osella
4, Résidence Annam Osella Casablanca
Tél.: 022.39.42.09

14, Rue Taki Eddine (Ex.Berne) Quartier des Hôpitaux - Casablanca - 20 000 الدار البيضاء - زنة تقى الدين (برن سابقا) حي المستشفيات 20 000 الدار البيضاء -

Tél. : 05 22 20 14 40 / 41 - GSM / WhatsApp : 06 62 05 10 35 - Fax : 05 22 20 13 99

www.cliniquelasource.ma - E-mail : contact@cliniquelasource.ma

RDV de Consultation d'Urologie(1er Etage) - Tél. : 05 22 20 14 42 / 43

S.C.P. - I.F.:14415714 - C.N.S.S. :9428120 - T.P. :36335867

DOLICOX®

Etoricoxib

60 mg

90 mg

120 mg

Comprimé pelliculé

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice, avant de prendre ce médicament :

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques; cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Composition du médicament :

60mg comprimé pelliculé :

- Composition qualitative et quantitative en substance active par unité de prise : Etoricoxib 60 mg

90mg comprimé pelliculé :

- Composition qualitative et quantitative en substance active par unité de prise : Etoricoxib 90 mg

120mg comprimé pelliculé :

- Composition qualitative et quantitative en substance active par unité de prise : Etoricoxib 120 mg

Excipient à effet notable : Lactose monohydrate.

Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

DOLICOX® 60 mg 90mg et 120mg, comprimé pelliculé est l'un des médicaments de la classe des inhibiteurs sélectifs de la cyclo-oxygénase-2 (COX-2).

La classe pharmacothérapeutique : anti-inflammatoires anti-rhumatismaux, non stéroïdiens, coxibs.

Indications thérapeutiques :

DOLICOX® 60mg, comprimé pelliculé contribue à réduire la douleur et le gonflement (inflammation) des articulations et des muscles chez les patients atteints d'arthrose.

DOLICOX® 90mg, comprimé pelliculé contribue à réduire la douleur et le gonflement (inflammation) des articulations et des muscles chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde et de spondylarthrite ankylosante.

DOLICOX® 90mg, comprimé pelliculé est également utilisé pour le traitement de courte durée de la douleur modérée après chirurgie dentaire.

DOLICOX® 120 mg, comprimé pelliculé contribue à réduire la douleur et le gonflement (inflammation) des articulations et des muscles chez les patients atteints de goutte.

Posologie

Les comprimés pelliculés DOLICOX® 60mg, 90mg & 120mg, ne doivent être pris ni par les enfants, ni par les adolescents de moins de 16 ans.

Ne pas dépasser la dose recommandée pour le traitement de votre maladie. Il est important d'utiliser la dose la plus faible qui soulage votre douleur et de ne pas prendre DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, comprimé pelliculé plus longtemps que prescrit.

Asthme

La dose recommandée est de 30 mg une fois par jour, augmentée à 60 mg maximum une fois par jour si nécessaire.

Patients avec problèmes hépatiques.

Polyarthrite rhumatoïde

La dose recommandée est de 90 mg une fois par jour.

Douleur aiguë

L'étoricoxib ne doit être utilisé que pendant la période de douleur aiguë.

Douleur post-opératoire après chirurgie dentaire

La dose recommandée est de 90 mg une fois par jour, traitement limité à 3 jours au maximum.

Patients avec problèmes hépatiques

Goutte

La dose recommandée est de 120 mg une fois par jour qui ne doit être utilisée que pendant la période aiguë de la douleur, limitée à 8 jours au maximum.

Patients avec problèmes hépatiques

En cas d'insuffisance hépatique légère (maladie du foie), vous ne devez pas prendre plus de 60 mg par jour.

Si vous avez une forme modérée d'insuffisance hépatique, la dose maximale recommandée est de 60 mg un jour sur deux, ou de 30 mg par jour.

Mode d'administration :

Voie orale.

Le ou les comprimés pelliculés DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, doivent être avalés en une prise par jour. DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, comprimé pelliculé peut être pris au cours ou en dehors des repas.

Durée du traitement

Ne prenez

suivantes :

- Allergie (

DOLICOX®

- Allergie

inhibiteurs

- Ulcère de

- Maladie

- Maladie

- Grossesse

allaitement

- Enfants et

- Maladie inflammatoire de l'intestin, telle qu'
ou colite,

- Diagnostic de maladie cardiaque à type d'
angine de poitrine, antécédents de crise
artères périphériques, ou toute sorte d'accident
ischémique transitoire. L'étoricoxib pourra
utilisé chez les patients ayant déjà eu des pro-
cébral,

- Hypertension artérielle non contrôlée par
votre infirmière si vous n'êtes pas sûr que vous
Si vous pensez que l'un de ces points vous
avoir consulté votre médecin au préalable.

Effets indésirables :

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, DOLICOX® 60 provoque des effets indésirables, mais ils ne monde.

Si vous présentez un de ces symptômes, vo-

60mg, 90mg & 120mg, comprimé pelliculé

- Apparition ou aggravation d'un essoufflement cheveux,

- Coloration jaune de la peau et des yeux (p-
troubles hépatiques,

- Douleur d'estomac importante ou permanen-

- Réaction allergique pouvant inclure des pro-
ou de vésicules, ou gonflement du visage, de
entrainer une difficulté à respirer.

La fréquence des effets indésirables possibles
suivante :

Très fréquents (survenant chez plus de 1 pat-

Fréquents (survenant chez 1 à 10 patients su-

Peu fréquents (survenant chez 1 à 10 patients)

Rares (survenant chez 1 à 10 patients sur 100)

Très rares (survenant chez moins de 1 patient sur 100). Les effets indésirables suivants peuvent survenir chez 1 à 10 patients sur 100.

60mg, 90mg & 120mg, comprimé pelliculé

Très fréquents : Douleur à l'estomac.

Fréquents :

- Alvéolite, Gonflement des jambes et/ou de

- Étourdissements, maux de tête; Palpitations,

pression artérielle; Sifflements ou difficultés n-

inflammation de l'œsophage, ulcérations

sanguins évaluent le fonctionnement du foie

pseudo-grippal.

Peu fréquents :

- Gastroentérite, infection des voies respirato-

nombre de globules rouges, diminution du

plaquettes, hypersensibilité, augmentation

anxiété, dépression, diminution du discernem-

n'existe pas, altération du goût, insomnie,

sonnolence, vision trouble, irritation et rougeur

anomalie du rythme cardiaque, fréquence

sensation d'oppression, de pression ou de p-

de chaleur, accident vasculaire cérébral,

artérielle, inflammation des vaisseaux sang-

ballonnement de l'estomac ou de l'intestin, à

la bouche, ulcère de l'estomac, inflammatio-

grave et aller jusqu'à l'hémorragie, syndrome

crampes/spasme musculaire, douleur muscu-

sang, modification des examens sanguins ou

troubles rénaux graves, douleur thoracique.

Peu fréquents pour DOLICOX® 120mg :

voies respiratoires hautes, Ulcérations de la

Rares

- Anglo-adème (réaction allergique sévère à

- Confusion, agitation; Problèmes hépatiq-

- Insuffisance hépatique, jaunissement de la

- Diminution du taux de sodium dans le sang

Très rares pour DOLICOX® 120mg :

voies respiratoires hautes, Ulcérations de la

peau, syndrome de Guillain-Barré, syn-

dothrombopénie, syndrome de Stevens

Johnson, syndrome de l'œsophage, syn-

dothrombopénie, syndrome de Stevens

Johnson, syndrome de l'œsophage, syn-

dothrombopénie, syndrome de Stevens

Johnson, syndrome de l'œsophage, syn-

dothrombopénie, syndrome de Stevens

Johnson, syndrome de l'œsophage, syn-

dothrombopénie, syndrome de Stevens

Johnson, syndrome de l'œsophage, syn-

dothrombopénie, syndrome de Stevens

Johnson, syndrome de l'œsophage, syn-

dothrombopénie, syndrome de Stevens

Johnson, syndrome de l'œsophage, syn-

dothrombopénie, syndrome de Stevens

Johnson, syndrome de l'œsophage, syn-

dothrombopénie, syndrome de Stevens

Johnson, syndrome de l'œsophage, syn-

dothrombopénie, syndrome de Stevens

Johnson, syndrome de l'œsophage, syn-

dothrombopénie, syndrome de Stevens

Johnson, syndrome de l'œsophage, syn-

dothrombopénie, syndrome de Stevens

Johnson, syndrome de l'œsophage, syn-

dothrombopénie, syndrome de Stevens

Johnson, syndrome de l'œsophage, syn-

dothrombopénie, syndrome de Stevens

Johnson, syndrome de l'œsophage, syn-

dothrombopénie, syndrome de Stevens

Johnson, syndrome de l'œsophage, syn-

dothrombopénie, syndrome de Stevens

Johnson, syndrome de l'œsophage, syn-

dothrombopénie, syndrome de Stevens

Johnson, syndrome de l'œsophage, syn-

dothrombopénie, syndrome de Stevens

Johnson, syndrome de l'œsophage, syn-

dothrombopénie, syndrome de Stevens

Johnson, syndrome de l'œsophage, syn-

dothrombopénie, syndrome de Stevens

Johnson, syndrome de l'œsophage, syn-

dothrombopénie, syndrome de Stevens

Johnson, syndrome de l'œsophage, syn-

dothrombopénie, syndrome de Stevens

Johnson, syndrome de l'œsophage, syn-

dothrombopénie, syndrome de Stevens

Johnson, syndrome de l'œsophage, syn-

dothrombopénie, syndrome de Stevens

Johnson, syndrome de l'œsophage, syn-

dothrombopénie, syndrome de Stevens

Johnson, syndrome de l'œsophage, syn-

dothrombopénie, syndrome de Stevens

Johnson, syndrome de l'œsophage, syn-

dothrombopénie, syndrome de Stevens

Johnson, syndrome de l'œsophage, syn-

dothrombopénie, syndrome de Stevens

Johnson, syndrome de l'œsophage, syn-

dothrombopénie, syndrome de Stevens

Johnson, syndrome de l'œsophage, syn-

dothrombopénie, syndrome de Stevens

Johnson, syndrome de l'œsophage, syn-

dothrombopénie, syndrome de Stevens

Johnson, syndrome de l'œsophage, syn-

dothrombopénie, syndrome de Stevens

Johnson, syndrome de l'œsophage, syn-

dothrombopénie, syndrome de Stevens

Johnson, syndrome de l'œsophage, syn-

dothrombopénie, syndrome de Stevens

Johnson, syndrome de l'œsophage, syn-

dothrombopénie, syndrome de Stevens

Johnson, syndrome de l'œsophage, syn-

dothrombopénie, syndrome de Stevens

Johnson, syndrome de l'œsophage, syn-

dothrombopénie, syndrome de Stevens

Johnson, syndrome de l'œsophage, syn-

dothrombopénie, syndrome de Stevens

Johnson, syndrome de l'œsophage, syn-

dothrombopénie, syndrome de Stevens

Johnson, syndrome de l'œsophage, syn-

dothrombopénie, syndrome de Stevens

Johnson, syndrome de l'œsophage, syn-

dothrombopénie, syndrome de Stevens

Johnson, syndrome de l'œsophage, syn-

dothrombopénie, syndrome de Stevens

Johnson, syndrome de l'œsophage, syn-

dothrombopénie, syndrome de Stevens

Johnson, syndrome de l'œsophage, syn-

dothrombopénie, syndrome de Stevens

Johnson, syndrome de l'œsophage, syn-

dothrombopénie, syndrome de Stevens

Johnson, syndrome de l'œsophage, syn-

dothrombopénie, syndrome de Stevens

Johnson, syndrome de l'œsophage, syn-

dothrombopénie, syndrome de Stevens

Johnson, syndrome de l'œsophage, syn-

dothrombopénie, syndrome de Stevens

Johnson, syndrome de l'œsophage, syn-

dothrombopénie, syndrome de Stevens

Johnson, syndrome de l'œsophage, syn-

dothrombopénie, syndrome de Stevens

Johnson, syndrome de l'œsophage, syn-

dothrombopénie, syndrome de Stevens

Johnson, syndrome de l'œsophage, syn-

dothrombopénie, syndrome de Stevens

Johnson, syndrome de l'œsophage, syn-

dothrombopénie, syndrome de Stevens

Johnson, syndrome de l'œsophage, syn-

dothrombopénie, syndrome de Stevens

Johnson, syndrome de l'œsophage, syn-

dothrombopénie, syndrome de Stevens

Johnson, syndrome de l'œsophage, syn-

dothrombopénie, syndrome de Stevens

Johnson, syndrome de l'œsophage, syn-

dothrombopénie, syndrome de Stevens

Johnson, syndrome de l'œsophage, syn-

dothrombopénie, syndrome de Stevens

Johnson, syndrome de l'œsophage, syn-

dothrombopénie, syndrome de Stevens

Johnson, syndrome de l'œsophage, syn-

dothrombopénie, syndrome de Stevens

Johnson, syndrome de l'œsophage, syn-

dothrombopénie, syndrome de Stevens

Johnson, syndrome de l'œsophage, syn-

dothrombopénie, syndrome de Stevens

Johnson, syndrome de l'œsophage, syn-

dothrombopénie, syndrome de Stevens

Johnson, syndrome de l'œsophage, syn-

dothrombopénie, syndrome de Stevens

Johnson, syndrome de l'œsophage, syn-

dothrombopénie, syndrome de Stevens

Johnson, syndrome de l'œsophage, syn-

dothrombopénie, syndrome de Stevens

Johnson, syndrome de l'œsophage, syn-

dothrombopénie, syndrome de Stevens

Johnson, syndrome de l'œsophage, syn-

dothrombopénie, syndrome de Stevens

Johnson, syndrome de l'œsophage, syn-

dothrombopénie, syndrome de Stevens

Johnson, syndrome de l'œsophage, syn-

dothrombopénie, syndrome de Stevens

Johnson, syndrome de l'œsophage, syn-

cœur insuffisante) ou une maladie du rein). Si l'infection urinaire, votre médecin vous prescrira un traitement contre certaines infections bactériennes).

nents et VECA®, comprimé pelliculé

meilleur pourriez prendre tout autre médicament. Il est important que vous prévenez votre

ment anticholinergiques, car les effets et les effets des deux médicaments peuvent être accentués. Les cholinergiques, car ils peuvent réduire l'effet de VECA®.

nts tels que le métoclopramide ou le cisapride, qui ralentissent le fonctionnement du tube digestif. VECA®, comprimé pelliculé peut réduire les effets de ces médicaments.

nts tels que le kéroconazole, le ritonavir, le nizatidine, le vérapamil ou le diltiazem, qui peuvent accélérer la dégradation de VECA®, comprimé pelliculé dans

tels que la rifampicine, la phénytoïne ou la carbamazépine. Ils peuvent accélérer la dégradation de VECA®, dans l'organisme.

tels que les bisphosphonates, qui peuvent provoquer une œsophagite (inflammation de

pelliculé contient du lactose :

ce médicament est déconseillée chez les patients atteints de galactose, un déficit en lactase de l'intestin ou de malabsorption du glucose ou du fructose (rare).

pelliculé avec des aliments et boissons

pelliculé peut être pris indifféremment pendant les repas.

enfants et fertilité

Si vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou que vous allez au travail, demandez conseil à votre médecin avant de prendre ce médicament.

Il est recommandé d'utiliser VECA®, comprimé pelliculé lorsque cela est nécessaire.

Il est recommandé d'utiliser VECA®, comprimé pelliculé si vous allaitez car la quantité de médicament dans le lait maternel est très faible. Consultez votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

utilisation de machines

Il est recommandé d'utiliser VECA®, comprimé pelliculé si vous souffrez de l'un de ces symptômes : fatigue, faiblesse musculaire, douleurs articulaires, douleurs rénales.

succinate. En cas de survenue d'un angioédème, la solifénacine succinate doit être immédiatement arrêté et un traitement et/ou des mesures appropriées doivent être pris.

VECA®, comprimé pelliculé peut provoquer les autres effets indésirables suivants :

Très fréquents (peut affecter plus de 1 personne sur 10)

- Sécheresse de la bouche.

Fréquents (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10)

- Vision trouble.
- Constipation, nausées, indigestion avec des symptômes tels que douleur abdominale, douleur abdominale, régurgitations, nausées et brûlures d'estomac (dyspepsie), gêne au niveau de l'estomac.

Peu fréquents (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 100)

- Infection urinaire, infection de la vessie.
- Somnolence.
- Perturbation du goût (dysgueusie).
- Sécheresse (irritation) des yeux.
- Sécheresse du nez.
- Reflux gastro-œsophagien.
- Sécheresse de la gorge.
- Sécheresse de la peau.
- Difficultés pour uriner.
- Fatigue.
- Accumulation de liquide dans les jambes (œdème).

Rares (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000)

- Accumulation d'une grande quantité de matières fécales dans le gros intestin (fécalome).
- Accumulation d'urine dans la vessie par impossibilité de vider la vessie (rétenzione urinaire).
- Sensations vertigineuses - mauvaise tête.

**LOT : 8558
UT. AV : 04-25
P.P.V : 108 DH 00**

A18780

a

- Troubles de la vue.
- Troubles de la vue.
- Faiblesse musculaire.
- Troubles rénaux.

Déclaration des effets secondaires