

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 [LG] - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 3538

Société :

Actif Pensionné(e) Autre :

Nom & Prénom : CHOUKAIKI Nouria

Date de naissance : 25/07/1959


Adresse : 790 Impasse Flodiba KEITA Polo

CAZIA

Tél. : 0661098982 Total des frais engagés : 1539,70 - Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 09/01/2023

Nom et prénom du malade : CHOUKAIKI Nouria Age:

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie :

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASABLANCA Le : 18/01/2023

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
01/01/2023	C		200.00	<i>[Handwritten signature and stamp over the row]</i>

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Formisseur	Date	Montant de la Facture
<i>PHARMACIE Dr. TIR Abdelaziz 58, Route Mly Thami Hay Hassan Casablanca tel: 0522 90 11 67</i>	12/01/2023	391.70

ANALYSES - RADIOPHGRAPHIES		
Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients Montant des Honoraires
<i>ANALYSES MEDIC RUE Mousa Cha L Maâni 27 66 24 27 66 79 - CASA</i>	12 JAN 2023	B 200 Pcr 348,00 71



AUXILIAIRES MEDICAUX					
Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre		Montant détaillé des Honoraires	
		A M	P C	I M	I V

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	Coefficient DES TRAVAUX
				
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			Coefficient DES TRAVAUX
	H	25533412 00000000 35533411	G	21433552 00000000 11433553
D	00000000	B	00000000	MONTANTS DES SOINS
	35533411		11433553	DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

[Création, remont, adjonction]
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Saïd GZOULI

الدكتور سعيد الكزوولي

Médecin Assermenté

طبيب محلف

Expert près les Tribunaux

طبيب لدى المحاكم


ST CTOUKAIAI N° 01 AIA

Casablanca, le : 09-01-2023 الدار البيضاء، في:

1. Zolam 30

70.70. 1g/1

AS



2. 79.50 Rectofolax A X 2

1g/1 AS

3. Maxitol X 2 6fg

1/4 - 1/4 - 1/2

4. Vaxigrip 1/2 X 2 6fg
391.70

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat - R.P.1.
Ain sebâa Casablanca
Vaxigrip Tetra 15 µg/0.5 ml
sol inj b1
P.P.V : 125,30 DH
6 118001 082247

PHARMACIE POLYCLINIQUE
Dr. TIR Abdelaziz AS
Route Mly Thami Hay Hassani
0522.90.21.67 Casablanca

60، طريق مولاي التهامي (قرب مصحة الضمان الاجتماعي) مازولا - الحسي - الدار البيضاء

60, Route Moulay Thami (à côté de la Polyclinique Hay Hassani), Mazola - Hay Hassani - Casablanca

Tél. : 05 22.90.70.88 - الهاتف : drgzsa@gmail.com

1. Dénomination

Soyez très prudent
Ne pas conduire sans l'avoir

Veuillez
médi
Gard
Si v
d'inf
Ce quelq
Si l'u
indés.
pharm.

2. Compo
Compo
Bromaz
Excipir
Liste

3. Clas
ANXIOL
4. Indi
Ce me
s'accomp
manifesta
5. Posolog
Respectez tot
consultez votr
La posologie est stric
usuelle.

- Mode et voies d'administration :
Voie orale.

Avez ce médicament avec un verre d'eau.

- Durée du traitement :

La durée du traitement doit être aussi brève que possible et ne devrait pas dépasser 8 à 12 semaines (voir Mises en garde).

6. Contre-indications

Ne prenez jamais ANXIOL, comprimé quadriscable dans les cas suivants :

- allergie connue à cette classe de produits ou à l'un des composants du médicament,
- insuffisance respiratoire grave,
- syndrome d'apnée du sommeil (pauses respiratoires pendant le sommeil),
- maladie grave du foie,
- myasthenie (maladie caractérisée par une tendance excessive à la fatigue musculaire).

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

7. Effets indésirables

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Ils sont en rapport avec la dose ingérée et la sensibilité individuelle du patient.

Effets indésirables neuro-psychiatriques (voir Mises en garde) : Fréquence indéterminée

- troubles de mémoire, qui peuvent survenir aux doses thérapeutiques, le risque augmentant proportionnellement à la dose,
- dépression
- troubles du comportement, modifications de la conscience, irritabilité, agressivité, agitation,
- dépendance physique et psychique, même à doses thérapeutiques avec syndrome de sevrage ou de rebond à l'arrêt du traitement,
- sensations de vertiges, maux de tête, difficulté à coordonner certains mouvements,
- confusion, baisse de vigilance voire somnolence (particulièrement chez le sujet âgé), insomnie, cauchemars, tension,
- modifications de la libido.

Effets indésirables Cutanés : Fréquence indéterminée

• éruptions cutanées, avec ou sans démangeaisons, urticaire.

Effets indésirables cardiaques : Fréquence indéterminée

• insuffisance cardiaque, y compris arrêt cardiaque

Effets indésirables respiratoires : Fréquence indéterminée

• diminution des capacités respiratoires

Effets indésirables digestifs : Fréquence indéterminée

• nausées, vomissements, constipation.

Effets indésirables du rein et des voies urinaires : Fréquence indéterminée

• incapacité à uriner

Effets indésirables oculaires : Fréquence indéterminée

• vision double.

Effets indésirables du système immunitaire : Fréquence indéterminée

• allergies (réactions telles que gonflement, rougeur de la peau, ...), y compris réactions allergiques graves (choc anaphylactique, œdème de Quincke)

Effets indésirables généraux : Fréquence indéterminée

• faiblesse musculaire, fatigue.

Complications liées au traitement (voir Mises en garde) : Fréquence indéterminée

• chutes, fractures.

Déclaration des effets secondaires :

La déclaration des effets indésirables suivants est importante. Elle permet une surveillance des médicaments.

8. Mises en garde spéciales et précautions

Mises en garde spéciales : Si une perte d'efficacité survient lorsqu'on n'augmente pas la dose.

Risque de DÉPENDANCE : ce traitement prolongé, un état de dépendance physique favorise la survenue de la dépendance :

- durée du traitement,
 - dose,
 - antécédents d'autres dépendances : médicaments, alcool, tabac, drogues.
- La dépendance peut survenir même en l'absence de ces facteurs. Pour plus d'information, parlez-en à votre pharmacien.
- Arrêter BRUTALEMENT ce traitement peut entraîner une dépendance à l'alcool et au tabac.** Ce traitement peut entraîner une dépendance à l'alcool et au tabac. Cela peut se produire avec une réapparition de symptômes (insomnie, tension, douleurs musculaires, diarrhée, agitation, irritabilité, maux de tête, céphalées, douleurs articulaires, nausées, vomissements, constipation, œdème de Quincke). Ces symptômes peuvent apparaître dans les heures ou les jours suivants l'arrêt du traitement.

Les modalités de l'arrêt du traitement doivent être discutées avec votre pharmacien.

La diminution très PROGRESSIVE des doses de ce médicament peut représenter la meilleure prévention de la dépendance. La diminution progressive des doses de ce médicament peut être d'autant plus longue que le traitement est prolongé. Malgré la diminution progressive des doses, la dépendance peut se produire, avec réapparition de symptômes (insomnie, tension, douleurs musculaires, diarrhée, agitation, irritabilité, maux de tête, céphalées, douleurs articulaires, nausées, vomissements, constipation, œdème de Quincke). Ces symptômes peuvent apparaître dans les heures ou les jours suivants l'arrêt du traitement.

Chez certains sujets, ce médicament peut entraîner des réactions secondaires (insomnie, cauchemars, agitation, tension, désinhibition, amnésie, hallucinations, délire, étourdissements, colère, voire des comportements potentiellemen

te ou automatiques). Ces réactions sont plus courantes chez les sujets âgés.

Si une ou plusieurs de ces réactions surviennent, il convient de consulter votre pharmacien.

Les benzodiazépines et produits apparentés peuvent entraîner des réactions secondaires chez le sujet jeune, en raison du risque de dépendance physique et psychique.

Des troubles de la mémoire peuvent également apparaître dans les heures ou les jours suivants l'arrêt du traitement.

L'utilisation simultanée de bromazépam et d'autres benzodiazépines peut entraîner une somnolence sévère et une diminution de l'activité sexuelle.

9. Précautions d'emploi

La durée du traitement doit être aussi courte que possible (8 à 12 semaines).

Ce traitement médicamenteux ne peut pas remplacer les autres moyens pour lutter contre votre anxiété.

La prise de ce médicament nécessite une surveillance régulière de l'état de santé respiratoire, ainsi que chez les enfants et les adolescents.

Ce médicament ne traite pas la dépression ou l'anxiété associée à la dépression, il traite la dépression évoluer pour son propre compte et peut entraîner un risque suicidaire.

La prise d'alcool est formellement déconseillée.

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

- Mentions relatives aux excipients à effet secondaire.

Si votre pharmacien vous a informé(e) d'une réaction indésirable, il convient de prendre ce médicament.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les personnes présentant une intolérance au galactose, un déficit en glucose-6-phosphate déhydrogénase ou une malabsorption du glucose ou du galactose.

9. Interactions

- Interactions avec d'autres médicaments.

Autres médicaments et ANXIOL, comprimé quadriscable

Associations déconseillées

- Alcool (boissons alcoolisées et médicaments contenant de l'alcool).

Associations à prendre en compte

- dérivés morphiniques (analgesiques, hypnotiques, buprénorphine).

36,70



الصادر
SPIMACO MAROC

1. Dénomination

Soyez très prudent
Ne pas conduire sans l'avoir

Veuillez
médi
Gard
Si v
d'inf
Ce quelq
Si l'u
indés.
pharm.

2. Compo
Compo
Bromaz
Excipir
Liste

3. Clas
ANXIOL
4. Indi
Ce me
s'accomp
manifesta
5. Posolog
Respectez tot
consultez votr
La posologie est stric
usuelle.

- Mode et voies d'administration :
Voie orale.

Avez ce médicament avec un verre d'eau.

- Durée du traitement :

La durée du traitement doit être aussi brève que possible et ne devrait pas dépasser 8 à 12 semaines (voir Mises en garde).

6. Contre-indications

Ne prenez jamais ANXIOL, comprimé quadrifiable dans les cas suivants :

- allergie connue à cette classe de produits ou à l'un des composants du médicament,
- insuffisance respiratoire grave,
- syndrome d'apnée du sommeil (pauses respiratoires pendant le sommeil),
- maladie grave du foie,
- myasthenie (maladie caractérisée par une tendance excessive à la fatigue musculaire).

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

7. Effets indésirables

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Ils sont en rapport avec la dose ingérée et la sensibilité individuelle du patient.

Effets indésirables neuro-psychiatriques (voir Mises en garde) : Fréquence indéterminée

- troubles de mémoire, qui peuvent survenir aux doses thérapeutiques, le risque augmentant proportionnellement à la dose,
- dépression
- troubles du comportement, modifications de la conscience, irritabilité, agressivité, agitation,
- dépendance physique et psychique, même à doses thérapeutiques avec syndrome de sevrage ou de rebond à l'arrêt du traitement,
- sensations de vertiges, maux de tête, difficulté à coordonner certains mouvements,
- confusion, baisse de vigilance voire somnolence (particulièrement chez le sujet âgé), insomnie, cauchemars, tension,
- modifications de la libido.

Effets indésirables Cutanés : Fréquence indéterminée

• éruptions cutanées, avec ou sans démangeaisons, urticaire.

Effets indésirables cardiaques : Fréquence indéterminée

• insuffisance cardiaque, y compris arrêt cardiaque

Effets indésirables respiratoires : Fréquence indéterminée

• diminution des capacités respiratoires

Effets indésirables digestifs : Fréquence indéterminée

• nausées, vomissements, constipation.

Effets indésirables du rein et des voies urinaires : Fréquence indéterminée

• incapacité à uriner

Effets indésirables oculaires : Fréquence indéterminée

• vision double.

Effets indésirables du système immunitaire : Fréquence indéterminée

• allergies (réactions telles que gonflement, rougeur de la peau, ...), y compris réactions allergiques graves (choc anaphylactique, œdème de Quincke)

Effets indésirables généraux : Fréquence indéterminée

• faiblesse musculaire, fatigue.

Complications liées au traitement (voir Mises en garde) : Fréquence indéterminée

• chutes, fractures.

Déclaration des effets secondaires :

La déclaration des effets indésirables suivants est importante. Elle permet une surveillance des médicaments.

8. Mises en garde spéciales et précautions

Mises en garde spéciales : Si une perte d'efficacité survient lorsqu'on n'augmente pas la dose.

Risque de DÉPENDANCE : ce traitement prolongé, un état de dépendance physique favorise la survenue de la dépendance :

- durée du traitement,
- dose,

• antécédents d'autres dépendances : médicaments, alcool, tabac... La dépendance peut survenir même en l'absence de ces substances. Pour plus d'information, parlez-en à votre pharmacien. Arrêter BRUTALEMENT ce traitement peut entraîner une dépendance à l'alcool ou au tabac (SEVRAGE). Celui-ci se caractérise par des crises de sevrage (nausées, sueurs, palpitations, tension, douleurs musculaires, diarrhée, étourdissements, agitation, une irritabilité, des maux de tête, des céphalées, des douleurs articulaires, des douleurs des extrémités, une sensibilité anormale, convulsions, hallucinations, convulsions, perturbation de la perception de la réalité).

Les modalités de l'arrêt du traitement doivent être discutées avec votre pharmacien.

La diminution très PROGRESSIVE des doses de ce médicament représentent la meilleure prévention de la dépendance. La diminution progressive des doses sera d'autant plus longue que le traitement sera efficace. Malgré la diminution progressive des doses, la dépendance peut se produire, avec réapparition des symptômes (insomnie, tension, douleurs musculaires, diarrhée, étourdissements, agitation, une irritabilité, des maux de tête, des céphalées, des douleurs articulaires, des douleurs des extrémités, une sensibilité anormale, convulsions, hallucinations, perturbation de la perception de la réalité).

Ces réactions peuvent survenir chez certains sujets, mais elles sont moins fréquentes chez d'autres. Chez certains sujets, ce médicament peut provoquer des réactions secondaires (insomnie, cauchemars, agitation, tension, désinhibition, amnésie, hallucinations, étourdissements, céphalées, douleurs articulaires, douleurs des extrémités, douleurs musculaires, diarrhée, étourdissements, agitation, une irritabilité, des maux de tête, des céphalées, des douleurs articulaires, des douleurs des extrémités, une sensibilité anormale, convulsions, hallucinations, perturbation de la perception de la réalité).

Si une ou plusieurs de ces réactions surviennent, il est recommandé de consulter votre pharmacien.

Les benzodiazépines et produits apparentés peuvent provoquer des réactions secondaires chez le sujet âgé, en raison du risque de dépendance physique et psychique qui peuvent favoriser les réactions secondaires.

L'utilisation simultanée de bromazépam et d'autres benzodiazépines ou d'autres psychotropes peut entraîner une dépendance physique et psychique, ainsi qu'une augmentation de la somnolence et de l'irritabilité.

Précautions d'emploi

La durée du traitement doit être aussi courte que possible (8 à 12 semaines).

Ce traitement médicamenteux ne peut pas remplacer les autres traitements pour lutter contre l'anxiété. La prise de ce médicament nécessite une surveillance régulière de l'état de santé respiratoire, ainsi que chez les enfants et les adolescents. Ce médicament ne traite pas la dépression ou l'anxiété, mais il peut aider à les traiter. Il peut également aider à la dépression évoluer pour son propre compte et à réduire le risque suicidaire.

La prise d'alcool est formellement déconseillée. EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

- Mentions relatives aux excipients à effet secondaire : Si votre pharmacien vous a informé(e) d'une réaction secondaire, il est recommandé de prendre ce médicament.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les personnes souffrant d'intolérance au galactose, d'un déficit en glucose-6-phosphate déhydrogénase (G6PD) ou d'une malabsorption du glucose ou du galactose.

9. Interactions

- Interactions avec d'autres médicaments

Autres médicaments et ANXIOL, comprimé quadrifiable

• Alcool (boissons alcoolisées et médicaments contenant de l'alcool)

• Associations à prendre en compte

• dérivés morphiniques (analgesiques, hypnotiques, buprénorphine)

36,70



الصادر
SPIMACO MAROC

ndre ce

dez plus

is à
toci.
effet
votre

- dose

حقن شرجية
مكونة من مركب سكري نباتي

ركتُلَكْسٌ

للكبار

محلول عن طريق الشرج



حقنة شرجية

6 حقن شرجية من 9

DISPOSITIF MÉDICAL CE

عن طريق الشرج
لا يبلغ

Thérapharm
LABORATOIRES

LOT

210462



2024/07

PPC: 79,50DH

حقن شرجية
مكونة من مركب سكري نباتي

ركتالكس®

للكبار

محلول عن طريق الشرج



حقنة شرجية

6 حقن شرجية من 9

DISPOSITIF MÉDICAL CE

عن طريق الشرج
لا يبلغ

Thérapharm
LABORATOIRES

LOT

210462



2024/07

PPC: 79,50DH

٢٤٩

Docteur Saïd GZOULI

Médecin Assermenté

Expert près les Tribunaux

الدكتور سعيد الكزوولي

طبيب معلم

خبير لدى المحاكم

Casablanca, le : 09 JAN 2023 الدار البيضاء، في :

Tchoukaihi Nouria

Recherche des anticorps
anti-auglutaminase

Tissulaire -

~~دكتور سعيد الكزوولي
لدى المحاكم~~

طبيب معلم، خبير لدى المحاكم
60، طريق مولاي التهامي (قرب مصحة الضمان الاجتماعي)
قرب مسجد شفيف الأحمد - الدار البيضاء.

(قرب الحب الحسني) - 022.90.70.88.
مانفواز - 022.90.70.88.
fax: 290.97.66.

LABORATOIRE D'ANALYSES
MEDECINALE ET LABOMEDIC
462, RUE MUSAÏDHA EL MAâNI
Tél.: 0522.27.66.24/27.66.73. CASABLANCA

60، طريق مولاي التهامي (قرب مصحة الضمان الاجتماعي) مازولا - الحي الحسني - الدار البيضاء

60, Route Moulay Thami (à côté de la Polyclinique Hay Hassani), Mazola - Hay Hassani - Casablanca

Tél. : 05 22.90.70.88 - E-mail : drgzsa@gmail.com

مختبر التحاليلات الطبية لمحمد سعيد LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES LABOMEDIC

M.S. EL HAROUCHI

Pharmacien Biogiste - Ancien interne des hôpitaux de Lyon

CES : - Biochimie - Bactériologie - Hématologie
- Virologie - Parasitologie - Immunologie

الهاروشي محمد سعيد

اختصاصي في التحاليلات الطبية

Prélèvement du : 13/01/2023 à 09:57:17

Edition du : 14/01/2023



MA94332

Madame CHOUKAIRI NOURIA

Dossier n° : BB749

Dr.

Page : 1 / 1

MARQUEURS SEROLOGIQUES DE LA MALADIE COELIAQUE

AUTO-ANTICORPS IgA ANTI-TRANSGLUTAMINASE

Résultats.....:

5

U/ml

(< = à 7)

INTERPRETATION :

- | | | |
|-------------|---|-------------|
| < 7 U/ml | : | Négatif |
| 7 - 10 U/ml | : | Taux limite |
| > 10 u/ml | : | Positif |

MARQUEURS SEROLOGIQUES DE LA MALADIE COELIAQUE

AUTO-ANTICORPS IgG ANTI -TRANSGLUTAMINASE

Résultats

4

(< = à 7)

INTERPRETATION :

- | | | |
|-------------|---|-------------|
| < 7 U/ml | : | Négatif |
| 7 - 10 U/ml | : | Taux limite |
| > 10 U/ml | : | Positif |

Dr. EL HAROUCHI Mohamed Said
Laboratoire d'Analyses Médicales
LABOMEDIC
462 Rue Mustapha El Maâni Casablanca
Tél. : 05.22.27.66.24 - Fax : 05.22.27.66.73

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES LABOMEDIC

M.S. EI HAROUCHI (PHARMACIEN BIOLOGISTE) ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX DE CASABLANCA

462,Rue Mustapha El Maani -Casablanca Tel :0522-27.66.73/24 Fax:0522-26.50.87
mail.labolabomadic@gmail.com

ICE:00154307500027- RC:1636-Pat :34201990- CNSS:128090 - IF:41802740
INPE.093000180 RIB : ATW007780000180200000001626

Facture N: 23 / 458

Date :
13/01/2023

Suite aux Analyses Effectuées Le 13/01/2023

Sous La Prescription Du Docteur

Docteur CHOUKAIRI NOURIA

Portant La Référence 23113957172



Organisme : BB749

Bilan :

~ACTRA~ACTRG

Cotation : B 700 + Prelevement (10 DH)

Montant Net : 948 Dhs

ARRETEE LA PRESENTE FACTURE A LA SOMME DE :

NEUF CENT QUARANTE HUIT DHS

ACTRA 400

ACTRG 300

LABORATOIRE D'ANALYSE
MEDICALES LABOMEDIC
462, RUE MUSTAPHA EL MAANI
TÉL.: 0522 27 66 24 / 27 66 73 - CASA