

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

M22- N° 001156

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 9292 Société : RAM ALA 280

Actif  Pensionné(e)  Autre :

Nom & Prénom : ABOULKABILA ABD ALLAH

Date de naissance : 12/12/57

Adresse : 5, la colline I, 2nd étage, Marjouf, Casablanca

Tél. : 0661332550 Total des frais engagés : 1000 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation :

Nom et prénom du malade :

Age :

Lien de parenté :

Lui-même  Conjoint  Enfant

Nature de la maladie : Pathologie respiratoire, Mycosé

Affection longue durée ou chronique :  ALD  ALC

Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :


Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le :

Signature de l'adhérent(e) :



## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
31.01.23	CS		200,00	 Dr. Taha OTTMAN LAHROUR         Ancien Médecin des Hôpitaux de Paris         Médecine Générale         EchoGaphie ECG         10 Rue Kairi Ben El Djin, 100-101, 2 KHC Casablanca         Tél: 05 22.23.49.13. Gsm: 06. 94 31.19.81

## EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
 <b>ARMACIE FLORIDA</b> Dr. ZIAD Mounia Lotissement Florida, Lot. 281 Sidi Maârouf - Casa Tél-Fax 0522 32 19 59	3/01/23	390.60

## ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Cœfficients	Montant des Honoraires

## AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	
15.05.2015	15.05.2015					

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION

O.D.F  
PROTHESES DENTAIRES

## DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

	H
25533412	21433552
00000000	00000000
D	G
00000000	00000000
35533411	11433553

### **[Création, remont, adjonction]**

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

# Docteur Othman L.TAZI

Médecine Générale - Médecine du Travail

ECG - ECHOGRAPHIE

Ancien Médecin des Hôpitaux de Paris - France

الدكتور عثمان الحسين التازي

الطب العام - طب الشغل

التخطيط الطبي - الفحص بالصدى

طبيب سابق بمستشفيات باريس - فرنسا

Casablanca, le

3/01/2023

الدار البيضاء، في

29.70 x 2 mme Chtibitti WATHOUDI Khadja  
 29.70 x 2 Azix 500 mg cp (N° 2)  
 1 cp le 1<sup>er</sup> jour puis 1/2 cp du 2 au 7<sup>th</sup> jour  
 14.00 Doligrane 1g cp  
 3.80 x 2 cp chaque 8h si fièvre ou douleurs  
 3.80 x 2 Vitamine C 1000 mg cp eff (N° 2)  
 4.00 x 2 1 cp eff x 2/j  
 4.00 x 2 Zinaskin 45 mg cp eff (N° 2)  
 29.90 1 cp eff x 2/j pdt 20 jours  
 5. Fitorale sirap Ad  
 89.60 1 cés x 3/j après les r  
 89.60 Cure forte amp buv  
 1 amp à boire chaque 2 semaines  
 7. Diflucan 150 mg gélules  
 7. 1 gél / semaine pdt 01 mois

PPV: 49,60 DH  
 LOT: 20E25  
 EXP: 05/2023

Dr TAZI OTTHMAN LAHOUSSINE  
 Ancien Médecin des Hôpitaux de Paris  
 Médecine Générale  
 Echographie - ECG  
 2 Rue Ibnou Katir Hst. El Beida Imm. A - Appt N° 2 (RDC) Casablanca  
 Tél: 05 22 33 49 13 Cam: 06 19 31 11 85

زنقة ابن كثير، إقامة البيضاء - عمارة A - الشقة رقم 2 - الدار البيضاء

Rue Ibnou Katir - Résidence EL Beida - Imm. A - Appt N° 2 (RDC) - Casablanca

مستعجلات : 06 61 30 23 00 / الالهاتف : 05 22 23 49 13 / Urgences : Email : drothmantazi@gmail.com

# VITAMINE C® GANOMICA 1g

Veuillez médicament. Vous devez les informer au pharmacien.

- Gardez cet emballage.
- Adressez-vous à votre pharmacien.
- Si vous avez des questions, contactez votre pharmacien ou votre médecin.
- Vous devez vous sentir mieux après une amélioration ou



Il de prendre  
importantes pour vous.  
scrupuleusement  
à votre pharmacien ou votre  
médecin ou votre pharmacien.

lire.  
information.  
ez-en à votre  
effet indésirable

*Il n'est pas recommandé de prendre ce médicament si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 1 mois de traitement.*

## Que contient cette notice :

1. QU'EST-CE QUE VITAMINE C®, ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE VITAMINE C® ?
3. COMMENT PRENDRE VITAMINE C® ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER VITAMINE C® ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

## 1. QU'EST-CE QUE VITAMINE C® ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique :  
ACIDE ASCORBIQUE (VIT C)

### Indications thérapeutiques :

Ce médicament contient de la vitamine C. Il est indiqué dans les états de fatigue passagers de l'adulte et de l'enfant de plus de 15 ans.

Vous devez vous adresser à votre pharmacien si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 1 mois de traitement.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE VITAMINE C® ?

Si votre pharmacien vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

### Contre-indications :

Ne prenez jamais VITAMINE C® :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.

planifiez une grossesse, demandez conseil à votre pharmacien ou votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

**Grossesse :** Par mesure de précaution, il est préférable d'éviter l'utilisation de VITAMINE C®, pendant la grossesse.

**Allaitement :** La vitamine C passe dans le lait maternel. Il n'existe pas de données suffisantes sur les effets de la vitamine C chez les nouveau-nés et les nourrissons. Par conséquent, il est préférable d'éviter l'utilisation de VITAMINE C® pendant l'allaitement.

**Fertilité :** Il n'existe pas de données relatives aux effets de VITAMINE C® sur la fertilité humaine.

**Sportifs :** Sans objet.

**Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines :** VITAMINE C® n'a aucun effet ou qu'un effet négligeable sur l'aptitude à conduire un véhicule ou à utiliser des machines.

**Liste des excipients à effet notoire :**

VITAMINE C, comprimé effervescent contient jaune orangé S (E110), sodium, saccharose.

## 3. COMMENT PRENDRE VITAMINE C® ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre pharmacien ou votre pharmacien. Vérifiez auprès de votre pharmacien ou pharmacien en cas de doute.

### Posologie :

Réservez à l'adulte et à l'enfant de plus de 15 ans.

La dose recommandée est de 1 comprimé par jour.

### Mode et voie d'administration :

Voie orale.

Le comprimé doit être dissous dans un verre d'eau.

### Durée du traitement :

La durée du traitement est limitée à 1 mois.

**Si vous avez pris plus de VITAMINE C® que vous n'auriez dû :**

Les symptômes généraux d'un surdosage en vitamine C peuvent inclure des troubles gastro-intestinaux tels que des diarrhées, des nausées et des vomissements.

La consommation chronique de doses élevées d'acide ascorbique (> 500 mg / jour) peut aggraver une surcharge en fer et peut mener à des lésions tissulaires chez les patients atteints d'hémochromatose.

À doses supérieures à 1 g/jour en vitamine C, peuvent survenir des troubles digestifs (brûlures gastriques, diarrhée) ; troubles rénaux et urinaires (calculs rénaux, insuffisance rénale, nécrose tubulaire aiguë) ; hémolyse (destruction des globules rouges) chez les sujets déficients en glucose-6-phosphate déshydrogénase (enzyme spécifique des globules rouges).

Si ces symptômes apparaissent, consultez immédiatement votre pharmacien ou votre pharmacien.

**Si vous oubliez de prendre VITAMINE C® :**

Ne prenez pas de dose double pour compenser le comprimé que vous avez oublié de prendre.

**Si vous arrêtez de prendre VITAMINE C® :** Sans objet.

# VITAMINE C® GANOMICA 1g

Veuillez médicament. Vous devez les informer au pharmacien.

- Gardez cet emballage.
- Adressez-vous à votre pharmacien.
- Si vous avez des questions, contactez votre pharmacien ou votre médecin.
- Vous devez vous sentir mieux après une amélioration ou



Il de prendre  
importantes pour vous.  
scrupuleusement  
à votre pharmacien ou votre  
médecin ou votre pharmacien.

lire.  
information.  
ez-en à votre  
effet indésirable

*Il n'est pas recommandé de prendre ce médicament si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 1 mois de traitement.*

## Que contient cette notice :

1. QU'EST-CE QUE VITAMINE C®, ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE VITAMINE C® ?
3. COMMENT PRENDRE VITAMINE C® ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER VITAMINE C® ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

## 1. QU'EST-CE QUE VITAMINE C® ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique :  
ACIDE ASCORBIQUE (VIT C)

### Indications thérapeutiques :

Ce médicament contient de la vitamine C. Il est indiqué dans les états de fatigue passagers de l'adulte et de l'enfant de plus de 15 ans.

Vous devez vous adresser à votre pharmacien si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 1 mois de traitement.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE VITAMINE C® ?

Si votre pharmacien vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

### Contre-indications :

Ne prenez jamais VITAMINE C® :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.

planifiez une grossesse, demandez conseil à votre pharmacien ou votre médecin avant de prendre ce médicament.

**Grossesse :** Par mesure de précaution, il est préférable d'éviter l'utilisation de VITAMINE C® pendant la grossesse.

**Allaitement :** La vitamine C passe dans le lait maternel. Il n'existe pas de données suffisantes sur les effets de la vitamine C chez les nouveau-nés et les nourrissons. Par conséquent, il est préférable d'éviter l'utilisation de VITAMINE C® pendant l'allaitement.

**Fertilité :** Il n'existe pas de données relatives aux effets de VITAMINE C® sur la fertilité humaine.

**Sportifs :** Sans objet.

**Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines :** VITAMINE C® n'a aucun effet ou qu'un effet négligeable sur l'aptitude à conduire un véhicule ou à utiliser des machines.

**Liste des excipients à effet notoire :**

VITAMINE C, comprimé effervescent contient jaune orangé S (E110), sodium, saccharose.

## 3. COMMENT PRENDRE VITAMINE C® ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre pharmacien ou votre médecin.

Vérifiez auprès de votre pharmacien ou votre médecin en cas de doute.

### Posologie :

Réservez à l'adulte et à l'enfant de plus de 15 ans.

La dose recommandée est de 1 comprimé par jour.

### Mode et voie d'administration :

Voie orale.

Le comprimé doit être dissous dans un verre d'eau.

### Durée du traitement :

La durée du traitement est limitée à 1 mois.

**Si vous avez pris plus de VITAMINE C® que vous n'auriez dû :**

Les symptômes généraux d'un surdosage en vitamine C peuvent inclure des troubles gastro-intestinaux tels que des diarrhées, des nausées et des vomissements.

La consommation chronique de doses élevées d'acide ascorbique (> 500 mg / jour) peut aggraver une surcharge en fer et peut mener à des lésions tissulaires chez les patients atteints d'hémochromatose.

À doses supérieures à 1 g/jour en vitamine C, peuvent survenir des troubles digestifs (brûlures gastriques, diarrhée) ; troubles rénaux et urinaires (calculs rénaux, insuffisance rénale, nécrose tubulaire aiguë) ; hémolyse (destruction des globules rouges) chez les sujets déficients en glucose-6-phosphate déshydrogénase (enzyme spécifique des globules rouges).

Si ces symptômes apparaissent, consultez immédiatement votre pharmacien ou votre médecin.

**Si vous oubliez de prendre VITAMINE C® :**

Ne prenez pas de dose double pour compenser le comprimé que vous avez oublié de prendre.

**Si vous arrêtez de prendre VITAMINE C® :** Sans objet.

# Doliprane 1000 mg

PARACETAMOL

imé

## DOLIPRANE

La substance active est le paracétamol (1111,11 mg), pour un comprimé.

Les autres composants sont : croscarmellose saine, lactose, cellulose K30, amidon de maïs prégélatinisé, acide stéarique (origine végétale).

PPV 140111  
PER 04/2011  
LOT L1561

paracétamol DC 90

## QU'EST-CE QUE DOLIPRANE® 1000 mg COMPRIMÉ ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament contient du paracétamol. Il est indiqué pour la douleur et/ou fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures, règles douloureuses. Il peut également être prescrit par votre ~~médecin~~ dans les douleurs de l'arthrose.

Cette présentation est réservée à l'adulte (à partir de 15 ans) :

Lire attentivement la rubrique "Posologie".

Pour les enfants de moins de 15 ans, il existe d'autres ~~présentations~~ de paracétamol. Demandez conseil à votre ~~médecin~~ ou à votre ~~pharmacien~~.

## QUELLES SONT LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT DE PRENDRE DOLIPRANE® 1000 mg, COMPRIMÉ ?

### Contre-indications :

Ne pas prendre DOLIPRANE® 1000 mg, comprimé dans les cas suivants : allergie connue au paracétamol, maladie grave du foie, enfant de moins de 15 ans.

## PRENDRE DES PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES AVEC DOLIPRANE® 1000 mg, COMPRIMÉ :

### Précautions Particulières :

Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours ou en cas d'efficacité insuffisante ou de survenue de tout autre signe, ne pas continuer le traitement sans l'avis de votre ~~médecin~~.

En cas de maladie grave du foie ou des reins, il est nécessaire de consulter votre ~~médecin~~ avant de prendre du paracétamol.

### Mises en garde :

En cas de surdosage ou de prise par erreur d'une dose trop élevée, consultez immédiatement votre ~~médecin~~.

Ce médicament contient du paracétamol. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée (cf. chapitre "Posologie").

### Grossesse et allaitement :

Le Paracétamol, dans les conditions normales d'utilisation, peut être utilisé pendant la grossesse ainsi qu'en cas d'allaitement.



# أزيكس®

أزيتروميسين

## تعليمات علاجية :

للماكروليد. أزيكس له  
ليها.



أزيكس  
فعالية  
مضاد  
ـ حمدا  
ـ ضعف

### تنبيه :

- في حالة أي ردود فعل حساسية (طفح جلدي، حكة...) يجب استشارة الطبيب المعالج - يجب الإحاطة إلى علم الطبيب المعالج بأي حساسية عند الإستطباب بالمضادات الحيوية من صنف الماكروليد - لا يجب استعمال هذا الدواء عند المصابين بضعف في وظيفة الكبد - أمام عدم وجود معطيات علمية، ينصح عدم استعمال مشتقات مهمناز الجودر.

### احتياطات الاستعمال :

- يجب إحاطة علم الطبيب المعالج في حالة :  
ضعف في وظيفة الكبد، ردود فعل حساسية، اضطرابات جلدية ناتجة عن حالة حساسية، حالة حمل، حالة رضاع، أخذ أدوية أخرى في آن واحد.

### التأثيرات الجانبية :

- اضطرابات هضمية : غثيان، قيء، إسهال وأوجاع بطنية.  
- ردود فعل حساسية : حكة، طفح جلدي أو ديماكوبينك.

### المقابير :

- التفبد بوصفة الطبيب.  
- للبالغين والأطفال الذين يزيد وزنهم عن 45 كيلو : قرص واحد من عيار 500 ملجم في اليوم لمدة 3 أيام.

### كيفية الاستعمال :

أزيكس أقراص يمكن أخذه في أي حين من اليوم خلال أو خارج الوجبة الغذائية.

أزيكس أقراص من عيار 500 ملجم من الأزيتروميسين. علبة 3 أقراص.  
جدول أ (لائحة أ).

بوتي شم

82، معر الكازباريناس - عين السبع - الدار البيضاء  
س. اليشوشي - صيدلي مسؤول



# أزيكس®

أزيتروميسين

## تعليمات علاجية :

للماكروليد. أزيكس له  
ليها.



أزيكس  
فعالية  
مضاد  
ـ حمدا  
ـ ضعف

### تنبيه :

- في حالة أي ردود فعل حساسية (طفح جلدي، حكة...) يجب استشارة الطبيب المعالج - يجب الإحاطة إلى علم الطبيب المعالج بأي حساسية عند الإستطباب بالمضادات الحيوية من صنف الماكروليد - لا يجب استعمال هذا الدواء عند المصابين بضعف في وظيفة الكبد - أمام عدم وجود معطيات علمية، ينصح عدم استعمال مشتقات مهمناز الجودر.

### احتياطات الاستعمال :

- يجب إحاطة علم الطبيب المعالج في حالة :  
ضعف في وظيفة الكبد، ردود فعل حساسية، اضطرابات جلدية ناتجة عن حالة حساسية، حالة حمل، حالة رضاع، أخذ أدوية أخرى في آن واحد.

### التأثيرات الجانبية :

- اضطرابات هضمية : غثيان، قيء، إسهال وأوجاع بطنية.  
- ردود فعل حساسية : حكة، طفح جلدي أو ديماكوبينك.

### المقابير :

- التفبد بوصفة الطبيب.  
- للبالغين والأطفال الذين يزيد وزنهم عن 45 كيلو : قرص واحد من عيار 500 ملجم في اليوم لمدة 3 أيام.

### كيفية الاستعمال :

أزيكس أقراص يمكن أخذه في أي حين من اليوم خلال أو خارج الوجبة الغذائية.

أزيكس أقراص من عيار 500 ملجم من الأزيتروميسين. علبة 3 أقراص.  
جدول أ (لائحة أ).

بوتي شم

82، معر الكازباريناس - عين السبع - الدار البيضاء  
س. اليشوشي - صيدلي مسؤول



# ZINASKIN®

(Sulfate de zinc)

ZINASKIN® 45 mg

DENOMINA

ZINASKIN® 4

PPV 40DH90

EXP 12/20  
LOT 18066

Veuillez lire les informations importantes suivantes :

- Gardez cette notice.
- Si vous avez des questions, consultez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que ZINASKIN® 45 mg, comprimés effervescents et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser ZINASKIN® 45 mg, comprimés effervescents ?
3. Comment utiliser ZINASKIN® 45 mg, comprimés effervescents ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ZINASKIN® 45 mg, comprimés effervescents ?
6. Informations supplémentaires.

## 1 - QU'EST-CE QUE ZINASKIN® 45 mg, COMPRIMÉS EFFERVESCENTS ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

### - Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité

Classe pharmacothérapeutique : Autres préparations à usage systémique.

Code ATC : D10BX (D : Dermatologie).

Ce médicament contient du zinc.

### - Indications thérapeutiques

- Acné,
- Séborrhée,
- Pelade,
- Chute de cheveux,
- Psoriasis,
- Aphtose,
- Eczéma atopique ou chronique.

## 2 - QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZINASKIN® 45 mg, COMPRIMÉS EFFERVESCENTS ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

### - Ne prenez jamais ZINASKIN® 45 mg, comprimés effervescents (Contre-indications)

Si vous êtes allergique à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.

### - Faites attention avec ZINASKIN® 45 mg, comprimés effervescents (Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi)

• Afin d'obtenir une absorption maximale, ZINASKIN® doit être pris à distance des repas.

• Ce médicament contient 413,71 mg de sodium par comprimé effervescent. A prendre en compte chez les patients contrôlant leur apport alimentaire en sodium.

• En raison de la présence du saccharose, ce médicament ne peut être administré en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en sucrase-isomaltase.

Sulfate de zinc, 45,350 g par comprimé effervescent. Patients diabétiques.

- **Autres médicaments**  
Informer votre médecin ou pharmacien. Vous pourriez prendre des médicaments contenant du calcium, les quinolones, les insulines (Interactuants).

forte tisane, lentilles de contact, noix...) peuvent absorber les vitamines et minéraux riches en zinc. Cela peut réduire l'absorption de zinc. Il est recommandé de prendre le zinc au moins 2 heures avant ou après ces aliments.

- **grossesse et allaitement**  
Grossesse : Ce médicament doit être conseillé par votre médecin. Si vous envisagez une grossesse ou si vous êtes enceinte, consultez votre médecin pour suivre le suivi.

- **Allaitement**  
Ce médicament peut être donné à votre enfant pendant la grossesse.

Demandez conseil à votre médecin avant de prendre tout médicament.

- **Effets sur l'état physique à conduire et sur les machines**  
Sans effet.
- **Excipients à effet notable** :
  - Sodium.
  - Saccharose.

## 3 - COMMENT PRENDRE ZINASKIN® 45 mg, COMPRIMÉS EFFERVESCENTS ?

- **Instruction pour un bon usage**  
Veuillez à toujours utiliser ce médicament conformément aux instructions de cette notice ou les recommandations de votre pharmacien. Vérifiez auprès de votre pharmacien.

- **Posologie, mode et/ou voie (s) d'administration et durée du traitement**  
Posologie :

Dans tous les cas, si conformément aux recommandations de votre pharmacien. A titre indicatif, la posologie est de 1 comprimé effervescent par jour.

ZINASKIN® peut être utilisé lors de l'application de la crème.

**Mode et voie d'administration :**

Votre pharmacien vous indiquera la posologie et la durée du traitement.

Dissoudre le comprimé effervescent dans un verre d'eau à la température ambiante.

A prendre à distance des repas (au moins 2 heures avant ou après les repas).

Ne prenez pas de dose double pour faire oublier une dose oubliée de prendre.

- **Si vous arrêtez de prendre ZINASKIN® 45 mg, comprimés effervescents (Risque de syndrome de la malabsorption)**

Sans effet.

## 4 - QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne sont pas tous connus. Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

# ZINASKIN®

(Sulfate de zinc)

ZINASKIN® 45 mg

DENOMINA

ZINASKIN® 4

PPV 40DH90

EXP 12/20  
LOT 18066

Veuillez lire les informations importantes suivantes :

- Gardez cette notice.
- Si vous avez des questions, consultez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que ZINASKIN® 45 mg, comprimés effervescents et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser ZINASKIN® 45 mg, comprimés effervescents ?
3. Comment utiliser ZINASKIN® 45 mg, comprimés effervescents ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ZINASKIN® 45 mg, comprimés effervescents ?
6. Informations supplémentaires.

## 1 - QU'EST-CE QUE ZINASKIN® 45 mg, COMPRIMÉS EFFERVESCENTS ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

### - Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité

Classe pharmacothérapeutique : Autres préparations à usage systémique.

Code ATC : D10BX (D : Dermatologie).

Ce médicament contient du zinc.

### - Indications thérapeutiques

- Acné,
- Séborrhée,
- Pelade,
- Chute de cheveux,
- Psoriasis,
- Aphtose,
- Eczéma atopique ou chronique.

## 2 - QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZINASKIN® 45 mg, COMPRIMÉS EFFERVESCENTS ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

### - Ne prenez jamais ZINASKIN® 45 mg, comprimés effervescents (Contre-indications)

Si vous êtes allergique à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.

### - Faites attention avec ZINASKIN® 45 mg, comprimés effervescents (Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi)

• Afin d'obtenir une absorption maximale, ZINASKIN® doit être pris à distance des repas.

• Ce médicament contient 413,71 mg de sodium par comprimé effervescent. A prendre en compte chez les patients contrôlant leur apport alimentaire en sodium.

• En raison de la présence du saccharose, ce médicament ne peut être administré en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en sucrase-isomaltase.

Sulfate de zinc, 45,350 g par comprimé effervescent. Patients diabétiques.

- **Autres médicaments**  
Informer votre médecin ou pharmacien. Vous pourriez prendre des médicaments contenant du calcium, les quinolones, les insulines (Interactuants).

forte tisane, lentilles de contact, noix...) peuvent absorber les vitamines et minéraux riches en zinc. Cela peut réduire l'absorption de zinc. Il est recommandé de prendre le zinc au moins 2 heures avant ou après ces aliments.

- **grossesse et allaitement**  
Grossesse : Ce médicament doit être conseillé par votre médecin. Si vous envisagez une grossesse ou si vous êtes enceinte, consultez votre médecin pour suivre le suivi.

- **Allaitement**  
Ce médicament peut être donné à votre enfant pendant la grossesse.

Demandez conseil à votre médecin avant de prendre tout médicament.

- **Effets sur l'état physique à conduire et sur les machines**  
Sans effet.
- **Excipients à effet notable** :
  - Sodium.
  - Saccharose.

## 3 - COMMENT PRENDRE ZINASKIN® 45 mg, COMPRIMÉS EFFERVESCENTS ?

- **Instruction pour un bon usage**  
Veuillez à toujours utiliser ce médicament conformément aux instructions de cette notice ou les recommandations de votre pharmacien. Vérifiez auprès de votre pharmacien.

- **Posologie, mode et/ou voie (s) d'administration et durée du traitement**  
Posologie :

Dans tous les cas, si conformément aux instructions de votre pharmacien. A titre indicatif, la posologie est de 1 comprimé effervescent par jour.

ZINASKIN® peut être utilisé lors de l'application de la crème.

**Mode et voie d'administration :**

Votre pharmacien vous indiquera la posologie.

Dissoudre le comprimé effervescent dans une tasse d'eau à température ambiante.

A prendre à distance des repas (au moins 2 heures avant ou après les repas).

Ne pas diluer dans un verre d'eau.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.

Ne pas prendre plus de 1 comprimé par jour.



Solution buvable

# FitOrax®

## FORMES ET PRESENTATIONS :

FitOrax® Adultes Solution buvable, flacon 200ml.

FitOrax® Enfants Solution buvable, flacon 200ml.

## PROPRIETES :

FitOrax® solution buvable est à base d'extraits de Propolis naturels qui contribuent à libérer les voies respiratoires et la gorge tout en fortifiant les défenses naturelles de l'organisme respiratoire global.

## UTILISATIONS :

- Voies respiratoires encombrées.
- Gorge irritée.
- Enrouement.

8 032578 479515

Lot :  
À consommer  
avant le :

220128

02/2025

PPC : 79,90 DH

# DIFLUCAN® 150 mg

(FLUCONAZOLE)

## IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

Dénomination commerciale: DIFLUCAN®.

Principe actif: fluconazole.

## COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

1 gélule contient 150 mg de fluconazole.

Excipients : lactose monohydrate, amidon de maïs, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium, lauryl sulfate de sodium.

## FORME PHARMACEUTIQUE

DIFLUCAN® 150mg, boîte de 1 et 4 gélules.

## CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE ou type d'activité

Antimycosique à usage systémique (J : Anti-infectieux)

## INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Ce médicament est préconisé dans le traitement des :

- infections vaginales à Candida,
- dermatomycoses : tinea pedis, tinea corporis, tinea cruris, onychomycose (tinea unguum).

## CONTRE-INDICATIONS

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISÉ dans les cas suivants:

- hypersensibilité connue à ce médicament et aux dérivés apparentés,
- association avec le cisapride.
- pendant la grossesse et l'allaitement, sauf avis médical.

*EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.*

## MISES EN GARDE

En cas de survenue de symptômes évocateurs d'atteinte hépatique grave (fatigue importante, anorexie, nausées persistantes, vomissements, jaunisse), vous devez consulter votre médecin. Si vous avez préalablement présenté une réaction cutanée associée à la prise de fluconazole ou à un autre dérivé azolé, en cas de survenue de lésions bulleuses, vous devez consulter votre médecin le plus rapidement possible.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Avant de prendre ce médicament, prévenez votre médecin ou votre pharmacien si vous êtes enceinte.

Chez la femme en période d'activité génitale, une contraception efficace est indispensable.

*EN CAS DE DOUCE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.*

