

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 01293

Société :

117321

Actif Pensionné(e) Autre :

Nom & Prénom : FARAS. Mohamed

Date de naissance : 01-01-1946

Adresse : Dr. Lassoued Blc. M. N° 7 - Casablanca

Tél. 0645387597 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : / /

Nom et prénom du malade : Age:

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : Infection

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
23/12 20/22	CS		000000	
23/12 20/22	Val R. F. Académ		200000	CLINIQUE FIRDAOUI Boulevard Mohamed Bââma Lot Chanab An Senda - Casablanca Tel 0522 76 23 2422

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE DU RADIS CASA Dr. BOUSTANE ZAKIA Bloc L - N°8 Dar Lamane Hay Mohammadi - Casablanca Tél: 05 22 60 80 71	23/12/2022 02/01/23	238,90 216,-

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
MEA MOHAMMED MED. ANALYSTES TEL: 05 22 60 15 88 / 05 22 60 15 89 FAX: 05 22 60 15 88 / 05 22 60 15 89 E-mail: mohamedanalystes@wanadoo.fr	28/12/22	B.26.2	296,00

AUXILIAIRES MEDICAUX

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				Coefficient des travaux
				Montants des soins
				Début d'exécution
				Fin d'exécution

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
D	G
00000000	00000000
35533411	11433553

A diagram of a dental arch (maxilla) with 12 numbered teeth (1 through 12) arranged in a curve. The teeth are labeled with numbers and letters: 12 (B), 11 (B), 10 (G), 9 (G), 8 (D), 7 (D), 6 (D), 5 (D), 4 (D), 3 (B), 2 (B), and 1 (B). The arch is oriented with a vertical line through the center, a horizontal line to the left labeled 'D' (Deciduous), a horizontal line to the right labeled 'G' (Gingival), and a downward-pointing arrow labeled 'B' (Buccal).

(Création, remont, adjonction)

VISA ET SACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE REVIS

VISA ET SACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Mohamed Anis Khelil

Chirurgien Urologue Sexologue, Andrologue

Lauréat de la Faculté de Médecine de Casablanca.
Diplôme InterUniversitaire d'Uro-oncologie
de la Faculté de Médecine de Rabat
Diplôme InterUniversitaire de Médecine Hyperbare
et Subaquatique de la Faculté de Médecine de Marseille
Diplôme des Explorations Périneales et d'Urodynamique
de la Faculté de Médecine de Oujda.
Diplôme inter universitaire de la faculté de Médecine
de Montpellier de la microchirurgie de la verge.
Membre de l'Association Européenne et Américaine
d'Urologie et de Sexologie.



الدكتور
محمد أنيس خليل

إخلاصي في أمراض وجراحة
المسالك البولية، الكلي، المثانة والجهاز التناسلي

خريج كلية الطب بالدار البيضاء
دبلوم علاج سرطان المسالك البولية

من كلية الطب بالرباط

دبلوم العلاج بالضغط العالى من كلية الطب بمرسيليا
دبلوم استكشاف العرق وديناميكا البول

من كلية الطب بوجدة

دبلوم في ميكرو جراحة القصيب من كلية مونبلييه
عضو في الجمعية الأوروبية والأمريكية لجراحة المسالك البولية
والجهاز التناسلي

Ordonnance

Casablanca, le الدار البيضاء، في

Mr/ Mme Mlle :

Faouz Khelil

Dr. Khelil
Chirurgien Urologue
Andrologue
94, Rue Guernaoui
Hay Quods
Casablanca



① ofikan
170,00
46,00
② Racines
100,00
Hay Guernaoui
94, Bd Guernaoui Hay Quods, 1^{er} étage - Sidi Bernoussi - Casablanca
Tél/Fax : 0522 73 03 49 - Urgence : 06 61 51 26 80 - email : kheliluro@gmail.com
www.drkhelilanis.com

LOT 220473 1

EXP 02 24

PPV 170.00 DH

PPV:46 DH 00



Clinique Firdaous
Multidisciplinaire
Hay Chabab - Casablanca

Le 23/12/22

Dr Fars. N°1

PHARMACIE DU PARADIS CASA
Dr. BOUSTANE ZAKIA
Bloc L - N°8 Dar Lamane
Hay Mohammadi - Casa
Tél : 05 22 60 80 71

58.90

① Oct 2009

S.V

180.00

1 g x 2 / pas Jan
Glibencl

② Vect ray 4 mg
à prendre

238.90 1 g / pas mois

S.V

Dr. Khellil
Chirurgien Méd ANIS
Andrologue
Tél. 05.22.76.63.92

OCET® 200 mg, comprimés enrobés

Oflaxacine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre.

LOT
EXP
PPV
222112 2
06 2025
58.90

1. QU'EST-CE QUE OCET 200 mg, comprimés enrobés ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament est un antibiotique antibactérien de la famille des quinolones; c'est un antibiotique.

Ce médicament est indiqué dans le traitement de certaines infections bactériennes à g.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE OCET ?

Ne prenez jamais OCET 200 mg, comprimés enrobés dans les cas suivants :

- antécédents de tendinite avec un médicament de la même famille,
- allergie à ce médicament ou aux médicaments de la famille des quinolones,
- épilepsie,
- enfant de moins de 6 ans,
- déficit en glucose-6-phosphate-déshydrogénase.

L'administration de ce médicament contre-indique l'allaitement.

Ce médicament NE DOIT GENERALEMENT PAS ETRE UTILISE :

- chez l'enfant à partir de l'âge de 6 ans jusqu'à la fin de la période de croissance, sauf cas exceptionnels.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec OCET 200 mg, comprimés enrobés :

Mises en garde spéciales

- Les antibiotiques peuvent provoquer rarement des diarrhées sévères, persistantes et/ou sanguinolentes pouvant révéler une colite pseudo-membraneuse. Si une diarrhée survient pendant ou après la prise de ce médicament, vous devez contacter immédiatement votre médecin. Il sera peut-être nécessaire d'arrêter le traitement par ce médicament et de prendre un traitement spécifique. La survenue de diarrhée au cours du traitement ne doit pas être traitée sans avis médical (voir Quels sont les effets indésirables éventuels?).

- Eviter l'exposition au soleil et aux rayonnements ultra-violets pendant le traitement, en raison du risque de photosensibilisation (réaction cutanée lors d'une exposition au soleil ou aux U.V.).

- Attention à la prise de ce médicament si vous êtes une personne âgée ou si vous prenez des médicaments corticoïdes pendant une longue période, en raison risque de tendinite (inflammation d'un tendon) et de rupture du tendon d'Achille.

Le risque d'arthropathie (maladie des articulations) est à surveiller, plus particulièrement chez l'enfant.

- Dans de très rares cas, des troubles du comportement peuvent survenir dès les premières prises du médicament. Il faut alors prévenir votre médecin sans tarder ce médicament devant être peut-être arrêté (voir Quels sont les effets indésirables éventuels?).

- En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).

- La prise de comprimé est contre-indiquée chez l'enfant avant 6 ans car il peut avaler de travers et s'étouffer.

Précautions d'emploi

Il est important de prévenir votre médecin en cas d'antécédents de convulsions ou de myasthénie (maladie des muscles).

En cas de douleur ou de gonflement du tendon d'Achille, arrêter le traitement, rester au repos complet et prévenir immédiatement votre médecin.

Chez l'enfant, en cas de douleur articulaire, arrêter le traitement, mettre l'articulation concernée au repos et prévenir votre médecin qui prendra les mesures nécessaires.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

NE JAMAIS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.

Prise ou utilisation d'autres médicaments :

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement :

Il est préférable, par mesure de précaution de ne pas utiliser ce médicament au cours de la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez rapidement votre médecin, lui seul pourra adapter le traitement à votre état.

L'administration de ce médicament fait contre-indiquer l'allaitement, en raison du passage du produit dans le lait maternel.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines :

En raison du risque de troubles neurologiques, vous devez être attentif à votre propre réaction au traitement avant de vous livrer à des occupations nécessitant une certaine vigilance, telles que la conduite d'un véhicule ou l'utilisation d'une machine.

Liste des excipients à effets notoires : lactose.

3. COMMENT PRENDRE OCET 200 mg, comprimés enrobés ?

Posologie :

À titre indicatif, chez l'adulte, la posologie usuelle est de 400 mg/jour en 2 prises (1 comprimé matin et soir).

Dans certaines infections bronchiques, la posologie est de 400 mg/jour en une seule prise, soit 2 comprimés en une seule fois.

La posologie plus importante selon la sévérité de l'infection ne doit pas dépasser 800 mg/jour.

Ne pas prendre plus de 800 mg/jour sans avis médical.

CONNAISSANCE DE VOTRE

Veca

® Comprimé pelliculé
Solfénacine Succinate

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Gardez cette notice. Vous pourrez avoir besoin de la relire.
Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

Si ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourraient être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que Veca®, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Veca®, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre Veca®, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Veca®, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QUEST-CE QUE Veca®, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmaco-thérapeutique : Médicaments urologiques, médicaments de l'incontinence urinaire.

La solfénacine succinale (la substance active de Veca®) appartient à la classe pharmaco-thérapeutique des anticholinergiques. Ces médicaments sont utilisés pour réduire les contractions de la vessie lorsque celle-ci est hyperactive. Ceci vous permettra d'attendre plus longtemps avant de devoir aller aux toilettes et augmentera la volume des urines que peut retenir votre vessie.

Veca®, comprimé pelliculé est indiqué dans le traitement des symptômes de la vessie hyperactive (incontinence urinaire). Les symptômes indiquent : un besoin pressant et soutenu d'uriner ainsi que signe précurseur, des envies fréquentes d'uriner ainsi que des émissions involontaires d'urine sans que vous ayez eu le temps d'aller aux toilettes.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE Veca®, comprimé pelliculé ?

Si vous êtes en cours de traitement par Veca®, comprimé pelliculé, informez votre pharmacien ou votre médecin.

de pompage du cœur insuffisante) ou une maladie du rein). Si vous avez une infection urinaire, votre médecin vous prescrira un antibiotique (traitement contre certaines infections bactériennes).

Autres médicaments et Veca®, comprimé pelliculé

Informez votre pharmacien si vous prenez, 2022 récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Il est particulièrement important que vous prévenez votre médecin si vous prenez :

- D'autres médicaments anticholinergiques, car les effets et les effets indésirables des deux médicaments peuvent être accentués.
- Des médicaments cholinergiques, car ils peuvent réduire l'effet de Veca®, comprimé pelliculé.
- Des médicaments tels que le métoclopramide ou le cisapride, qui accélèrent le fonctionnement du tube digestif. Veca®, comprimé pelliculé peut réduire les effets de ces médicaments.
- Des médicaments tels que le tétonazole, le ritonavir, le nefazodin, l'itraconazole, le verapamil ou le diltiazem, qui accélèrent la dégradation de Veca®, comprimé pelliculé dans l'organisme.
- Des médicaments tels que la rifampicine, la phénprocaine ou la catéchampicine, car ils peuvent accélérer la dégradation de Veca®, comprimé pelliculé dans l'organisme.

• Des médicaments tels que les bisphosphonates, qui peuvent déclencher ou aggraver une œsophagite (inflammation de l'œsophage).

Veca®, comprimé pelliculé contient du lactose :

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

Veca®, comprimé pelliculé avec des aliments et boissons

Veca®, comprimé pelliculé peut être pris indifféremment pendant ou en dehors des repas.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament. Il n'est pas recommandé d'utiliser Veca®, comprimé pelliculé pendant la grossesse, sauf nécessité absolue.

Si vous ne pouvez pas prendre Veca®, comprimé pelliculé sans allaiter car la solfénacine succinale peut passer dans le lait maternel, demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Veca®, comprimé pelliculé peut provoquer une vision trouble et parfois une somnolence ou une fatigue. Si vous souffrez de l'un de ces effets indésirables, ne conduisez pas et n'utilisez pas de machine.

succinat. En cas de survenue d'un angioédème, la solfénacine succinat doit être immédiatement arrêté et un traitement et/ou des mesures appropriées doivent être pris.

Veca®, comprimé pelliculé peut provoquer les autres effets indésirables suivants :

• Sécheresse de la bouche.

Fréquents (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10)

• Vision trouble.

• Constipation, nausées, indigestion avec des symptômes tels que lourdeur abdominal, douleur abdominal, régurgitations, nausées et brûlures d'estomac (dyspepsie), gêne au niveau de l'estomac.

Peu fréquents (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 100)

• Infection urinaire, infection de la vessie.

• Somnolence.

• Perturbation du goût (dysgueusie).

• Sécheresse (irritation) des yeux.

• Sécheresse du nez.

• Reflux gastro-œsophagien.

• Sécheresse de la gorge.

• Sécheresse de la peau.

• Difficultés pour uriner.

• Fatigue.

• Accumulation de liquide dans les jambes (œdème).

Rares (peut affecter 1 personne sur 1 000 et plus)

• Accumulation d'urine.

• GROSSESSE.

• Difficultés pour uriner.

• Accumulation de liquide dans les jambes (œdème).

• Sensibilité.

• Vomissements.

• Débâcle.

• Hallucinations.

• Eruption cutanée.

• Diminution de la force.

• Sang qui peut prendre une couleur bleue.

• Augmentation de la pression artérielle.

• Modifications de la pression artérielle.

• Cardiopathies (irrigation rétrograde de l'artère coronaire).

• Accélération du rythme cardiaque.

• Troubles de la voix.

• Troubles hépatiques.

• Faiblesse musculaire.

• Troubles rénaux.

Déclaration des effets secondaires

COMMENT PRENDRE Veca® comprimé pelliculé à 62 mg

Si vous prenez Veca®, comprimé pelliculé, informez votre pharmacien ou votre médecin.

LOT : 9112
PER : 05-25
P.P.V : 180 DH 00

A18790



Clinique Firdaous
Multidisciplinaire
Hay Chabab - Casablanca

Dr. Khelil Med AMIS
Chirurgien Urologue
Andrologue - sexologue
Tél: 0661512880

Le 23/12/20

Mr. Faysal S. M.

Eczéma

neutro

verv.-pyro

- les deux nez sont déshabillés sans sauter la pyrexie
- Veste à coton beige
- pantalon bleu à 30% de coton

Dr. Khelil Med AMIS
Chirurgien Urologue
Andrologue - sexologue
Tél: 0661512880



Clinique Firdaous
Multidisciplinaire
Hay Chabab - Casablanca

Le 23/12/2002

Mr Farid
Reg

Glycémie à jeun

HbA_{1c}

FCBU + Pathologie

LABORATOIRE D'ANALYSES
DE BIOLOGIE MÉDICALE AL QODS
158 BD DE GRANDE CEINTURE
HAY MOHAMMADI - CASABLANCA
TEL: 05 22 60 18 65 / 05 22 63 78 74
FAX: 05 22 60 78 68

Dr Khelil Med ANIS
Chirurgien Urologue
Andrologue - sexologue
Tél: 06 61 51 26 80



Clinique Firdaous
Multidisciplinaire
Hay Chabab - Casablanca

696/2022

DATE D'ENCAISSEMENT : 23/12/2022

NOM DE PATIENT : FARAS MOHAMED

N°	Désignation	Montant DH
1	ECHOGRAPHIE	200DH
TOTAL		200DH

CLINIQUE FIRDAOUS
Boulevard Mohamed Bâamrani
Lot Chabab Ain Sebaa - Casablanca
Tél. 0522.6.73.66392

ختبر التحاليل الطبية القدس

Laboratoire d'Analyses de Biologie Médicale AL QODS

LARBI RAMDANI pharmacien biologiste

Edition du : 18/01/23

Réf. : 23A1076

Code patient : 42606 du : 17/01/23 -

M. FARAS MOHAMED

Docteur MED ANIS KHELIL

EXAMENS MICROBIOLOGIQUES

EXAMEN CYTO-BACTERIOLOGIQUE DES URINES

Prélèvement : Urines
Aspect : jaune clair limpide
Culot : Faible.

EXAMEN CHIMIQUE

Sucre : Absence.
Albumine : Absence.

EXAMEN CYTOLOGIQUE

Leucocytes	2	/mm3	< 10
Hématies	0	/mm3	< 10
Cellules épithéliales	0	/mm3	< 10
Cristaux	Absence.		
Cylindres	Absence.		
Parasites	Absence.		
Levures	Absence.		
Flore microbienne	Néant		

CULTURE

Identification : Stérile.

~~LABORATOIRE D'ANALYSES
DE BIOLOGIE MEDICALE AL QODS
158 BD DE GRANDE CEINTURE
HAY MOHAMMADI - CASABLANCA
TEL:05 22 60 18 65 / 05 22 63 78 74
FAX : 05 22 60 78 68~~

مختبر التحاليل الطبية القدس

Laboratoire d'Analyses de Biologie Médicale AL QODS

LARBI RAMDANI pharmacien biologiste

Edition du : 02/01/23

Réf. : 22L1776

Code patient : 42606 du : 28/12/22

M. FARAS MOHAMED

Docteur MED ANIS KHELIL

BIOCHIMIE

			Normales	Antériorités
Glycémie	----- :	1,07	g/l	17/02/2022
	Soit :	5,99	mmol/l	0,98
Hémoglobine glycosylée	----- :	5,41	%	3,88 - 6,11
	(Métabolisme équilibré < 7)			5,40
			4 - 6,5	5,32

LA LABORATOIRE D'ANALYSES
DE BIOLOGIE MÉDICALE AL QODS
158 BD DE GRANDE CEINTURE
HAY MOHAMMADI - CASABLANCA
TEL: 05 22 60 18 65 / 05 22 63 78 74
FAX: 05 22 60 78 68

مختبر التحاليل الطبية القدس

Laboratoire d'Analyses de Biologie Médicale AL QODS

LARBI RAMDANI pharmacien biologiste

Edition du : 02/01/23

Réf. : 22L1776

Code patient : 42606 du : 28/12/22

M. FARAS MOHAMED

Docteur MED ANIS KHELIL

EXAMENS MICROBIOLOGIQUES

EXAMEN CYTO-BACTERIOLOGIQUE DES URINES

Prélèvement -----:
Aspect -----:
Culot -----:

Urides
Jaune Trouble
Important

EXAMEN CHIMIQUE

Sucre -----:
Albumine -----:

Absence.
Traces.

EXAMEN CYTOLOGIQUE

Leucocytes -----:
Hématies -----:
Cellules épithéliales -----:
Cristaux -----:
Cylindres -----:
Parasites-----:
Levures -----:
Flore microbienne -----:

2 040 *	/mm ³	< 10
10	/mm ³	< 10
0	/mm ³	< 10
Absence.		
bacilles gram (-)		

CULTURE

Numération des germes -----:
Identification -----:

>10
Escherichia coli

TELE: 0522 60 18 65 / 0522 63 78 74
FAX: 0522 60 18 65 / 0522 63 78 74
HAY MOHAMMADI - 158 Bd de la Grande Ceinture - Casablanca
158 Bd de la Grande Ceinture - Casablanca
LABORATOIRE D'ANALYSES AL QODS

مختبر التحاليل الطبية القدس

Laboratoire d'Analyses de Biologie Médicale AL QODS

LARBI RAMDANI pharmacien biologiste

Edition du : 02/01/23

Réf. : 22L1776

Code patient : 42606 du : 28/12/22

M. FARAS MOHAMED

Docteur MED ANIS KHELIL

ANTIBIOTICGRAMME

Nature du germe : *Escherichia coli*


Origine du prélèvement : URINES

ANTIBIOTIQUES			
Amoxicilline	SENSIBLE	Amoxil, Clamox, A -Grám, Hiconcil ...	
Amoxi + Ac.clavulanique	SENSIBLE	Augmentin	
Pipéracilline	Résistant	Pipérilline	
Ticarcilline	Résistant	Ticaren	
Imipénème	SENSIBLE	Tiénam	
Ertapénème	SENSIBLE	Invanz Ig	
CEPHALOSPORINES			
Céfalexine	SENSIBLE	Keforal	
Céfuroxine	SENSIBLE	Zinacef, Curoxime, Zinnat	
Cefoxitine	SENSIBLE	Méfoxin	
Ceftriaxone	SENSIBLE	Rocéphine	
Ceftazidime	SENSIBLE	Fortum	
Cefixime	SENSIBLE	Oroken	
AMINOSIDES			
Amikacine	SENSIBLE	Amiklin	
Gentamicine	Résistant	Gentalline	
Tobramycine	SENSIBLE	Nebcine	
QUINOLONES			
Nitroxoline	SENSIBLE	Nibiol	
Ciprofloxacine	Résistant	Ciproxine, Ciflox	
Norfloxacine	Résistant	Noroxine	
Ofloxacine	Résistant	Offocet	
Lévofloxacine	Résistant	Biovanic, Eraxine, Evox, Levakin, Lovanic, Tavanic,,	
TETRACYCLINES			
Minocycline	Résistant	Mynocine	
SULFAMIDES			
Triméthoprime + Sulfamide	SENSIBLE	Bactrim	
ANTIDIABETIQUE			
Nitrofurantoïne	SENSIBLE	Furatandine	

Docteur Mohamed Anis KHELIL

Chirurgien Urologue Sexologue, Andrologue

- Lauréat de la faculté de Médecine de Casablanca
- Ancien interne des Hôpitaux de Casablanca
- Diplôme Interuniversitaire d'Uro-oncologie de la Faculté de Médecine de Rabat
- Diplôme Interuniversitaire de Médecine Hyperbare et Subaquatique la Faculté de Médecine de Marseille
- Membre de l'Association Européenne d'Urologie et de sexologie



الدكتور محمد أنيس خليل

- اختصاصي في أمراض و جراحة المسالك البولية، الكلى، المثانة والجهاز التناسلي
- خريج كلية الطب بالدار البيضاء
- سابق طبيب داخلي بمستشفيات الدار البيضاء
- دبلوم علاج سرطان المسالك البولية من كلية الطب بالرباط
- دبلوم العلاج بالضغط العالى من كلية الطب بمرسيليا
- عضو في الجمعية الأوروبية لجراحة المسالك البولية والجهاز التناسلي

CASABLANCA 23/12/ 2022

MR : FARAS MOHAMED

FACTURE

CONSULTATION : 400 dh

Total : 400 dh

DR KHELIL ANIS
Chir. Uro. Sex. Andrologue
Andrologue - Sexologue - Urologue
94, Rue Guernaoui Hay Qods 1^{er} étage
El Bernoussi - Casablanca 101 - 0522 73 04 49
INP : 09167466 652 73 03 49

DR KHELIL ANIS
Andrologue - Sexologue - Urologue
94, Rue Guernaoui Hay Qods 1^{er} étage
El Bernoussi - Casablanca 101 - 0522 73 04 49
INP : 09167466 652 73 03 49

مختبر التحاليل الطبية القدس

Laboratoire d'Analyses de Biologie Médicale AL QODS

LARBI RAMDANI pharmacien biologiste

Casablanca le 28 décembre 2022

M. FARAS MOHAMED

FACTURE N°	13910
------------	-------

Analyses :

B118 Glycémie (à jeûn) -----	B	30	
B119 Hémoglobine glycosylée -----	B	80	
B241 Cytobactériologie des urines -----	B	90	
Antibiogramme -----	B	60	Total : B 260
			Total : B 260

Prélèvements :

Sang-----	Pc	1,5
-----------	----	-----

TOTAL DOSSIER	296,00 DH
---------------	-----------

Arrêtée la présente facture à la somme de :

Deux Cent Quatre vingt Seize Dirhams

LABORATOIRE D'ANALYSES
DE BIOLOGIE MEDICALE AL QODS
158 BD DE GRANDE CEINTURE
HAY MOHAMMADI CASABLANCA
TLL:05 22 60 18 65 / 05 22 63 78 74
FAX: 05 22 60 78 68