

## RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

### Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

### Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

### Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

### Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

### Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

### Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

### Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

### Adresses Mails utiles

- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| ○ Réclamation                      | : contact@mupras.com  |
| ○ Prise en charge                  | : pec@mupras.com      |
| ○ Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

## Déclaration de Maladie

N° W21-655266

147603

<input type="checkbox"/> Maladie	<input type="checkbox"/> Dentaire	<input type="checkbox"/> Optique
Cadre réservé à l'adhérent(e)		
Matricule : 09372	Société : ROYAL AIR MAROC	<input type="checkbox"/> Autres
<input checked="" type="checkbox"/> Actif	<input type="checkbox"/> Pensionné(e)	CHOUAP ABDELGHANI
Nom & Prénom : 11.11.1965		
Date de naissance : 177 DERR CHAKA EL ALIA		
Adresse : 066 204 8528 Total des frais engagés : 1392.80 Dhs		
Tél. : 13 112 1222		

Autorisation CNDP N° : A-A-215/2019

Cachet du médecin :	Dr BELKHALFIA Mohamed Médecin-chirurgien Diplômé en Médecine du Travail en Médecine Légale 13 112 1222 Tel 022 31 31 99 Mdia		
Date de consultation :	13	Age:	57
Nom et prénom du malade :	CHOUAP	Lien de parenté :	<input type="checkbox"/> Lui-même <input type="checkbox"/> Conjoint <input type="checkbox"/> Enfant
Nature de la maladie :	Séropathie de l'œil et celle de la peau		
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :			
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.			

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : MARRAKESH

Signature de l'adhérent(e) :

Le : 13/11/2022

#### **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
13/01/2015 12/01/2015 11/01/2015	CS A	1	300	INP : 0910189410 KHALIFA Mohamed in chirurgie du travail

## **EXECUTION DES ORDONNANCES**

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Diplôme obtenu le _____ Tél 023 313 199 Maté Montant de la Facture
<b>PHARMACIE ET OPTIQUE D'AFS</b> <b>Dr. A. AFSI NAFIS</b> <b>Bd Mohamed V 105 - 06 23 30 36 36</b>	13/12/22	70,60
	17/12/22	42800

## **ANALYSES - RADIOGRAPHIES**

ANALYSES - RADIGRAPHIES			
Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
INSTITUT RADIOPATHOLOGIQUE Mohammed A BIOLOGIE 1, Bd. Med. Vét. Tél : 05 55 22 02 02	14/12/82	A 3.80	SSU 2201 14.7000

#### AUXILIAIRES MEDICAUX



AUXILIAIRES MEDICAUX					
Cachet et signature du Particulier	Date des Soins	Nombre			Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	

#### **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

**Important :**

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP : <input type="text"/>	
				<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	FIN D'EXECUTION <input type="text"/>	
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE				COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>  MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>  DATE DU DEVIS <input type="text"/>  DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>
	H 25533412 00000000	G 21433552 00000000	D 00000000 35533411	B 11433553 00000000	
	<b>[Création, remont, adjonction]</b> Fonctionnel. Therapeutique, nécessaire à la profession				
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

**Dr. BELKHALFIA Mohammed**

Ancien chef des Services de chirurgie à Casablanca et à Mohammedia  
 Spécialiste en Chirurgie Générale et Proctologie  
 Diplômé d'Echographie de Montpellier  
 Diplômé du Médecine de Travail et d'Ergonomie de Rennes  
 Diplômé de Médecine légale et en Réparation Juridique de Dommage Corporel de Rennes  
 Expert Assermenté auprès des tribunaux

**الدكتور بلخلفية محمد**

رئيس قسم الجراحة سابقاً بالدار البيضاء والمحمدية  
 اختصاصي في الجراحة العامة بروكتولوجيا  
 حاصل على دبلوم الفحص بالصدى من جامعة مونبولي بفرنسا  
 حاصل على دبلوم طب الشغل والارجonomia من جامعة رين بفرنسا  
 حاصل على دبلوم الطب الشرعي والتعميسي  
 القانوني للضرر البدني من جامعة رين بفرنسا  
 خبير محلف لدى المحاكم

Mohmmadia, le

le 13/12/2022

H/ CHOUAL Adelphane

Nf  
 - glycérine  
 Dr BELKHALFIA Mohamed  
 Médecin chirurien  
 Diplômé en Médecine du Travail  
 et en Médecine Légale  
 Tél 023 31 31 99  
 Média

✓  
 HOC  
 LDC

B  
 - Transglyc.  
 - Lipides totaux  
 - cholestérol )

# Dr. BELKHALFIA Mohammed

Ancien chef des Services de chirurgie à Casablanca et à Mohammedia  
Spécialiste en Chirurgie Générale et Proctologie  
Diplômé d'Échographie de Montpellier  
Diplômé du Médecine de Travail et d'Ergonomie de Rennes  
Diplômé de Médecine légale et en Réparation Juridique de Dommage Corporel de Rennes  
Expert Assermenté auprès des tribunaux

# الدكتور بلخalfia محمد

رئيس قسم الجراحة سابقاً بالدار البيضاء والمحمدية  
اختصاصي في الجراحة العامة بروكتولوجيا  
حاصل على دبلوم الفحص بالصدى من جامعة  
مونبولي بفرنسا  
حاصل على دبلوم طب الشغل والارجونوميا  
من جامعة رين بفرنسا  
حاصل على دبلوم الطب الشرعي والتعويض  
القانوني للضرر البدنى من جامعة رين بفرنسا  
خبرير محلف لدى المحاكم

Mohammed, le

Le 17/12/2022  
Chouval Belkhalifa

48800

DR BELKHALFIA MOHAMMED  
Médecin chirurgien  
Diplômé en Médecine du Travail  
et en Médecine Légale  
Tél 023 31 31 99 Mohammedia



DR KHATTOU Abdellah  
PHARMACIE ET ORTHOPEDIE  
IBN NAFIS  
32 Bd Mouassine, Tel/Fax: 05 23 30 36 36  
Mohammedia - Tel/Fax: 05 23 30 36 36

(Mo do 20)  
pour  
24400 x 2

# ROZAT® 10, 20 mg

Rosuvastatine

Comprimé pelliculé Boîte de 28

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Composition du médicament :

### Composition qualitative et quantitative en substance active par unité de prise :

Rosuvastatine ..... 10 mg

Rosuvastatine ..... 20 mg

### Les autres composants sont :

Cellulose microcristalline [Avicel PH 200], lactose granule, sodium carbonate anhydre, crospovidone, stéarate de magnésium, opadry AMB 80W34464 Pink, eau purifiée.

Liste des excipients à effet notable : Lactose, Sodium.

### Classe pharmaco-thérapeutique ou type d'activité :

ROZAT® appartient au groupe des médicaments appelés statines.

### Indications thérapeutiques :

ROZAT® comprimé pelliculé vous a été prescrit parce que :

- Vous avez un taux élevé de cholestérol ce qui signifie que vous présentez un risque de faire une attaque cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. ROZAT® comprimé pelliculé est utilisé chez les adultes, les adolescents et les enfants âgés de 6 ans et plus pour traiter un taux de cholestérol élevé.

Il vous est recommandé de prendre des statines, car parfois un régime alimentaire adapté et une activité physique ne suffisent pas à corriger votre taux de cholestérol. Vous devez poursuivre le régime hypocaloréolémiant et l'activité physique en même temps que la prise de ROZAT® comprimé pelliculé.

Ou

\* Vous avez d'autres facteurs qui augmentent votre risque d'avoir une attaque cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou des problèmes de santé liés à ces facteurs.

Une attaque cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou des problèmes de santé liés à ces facteurs peuvent être causés par une maladie appelée l'athérosclérose. L'athérosclérose est due à une accumulation de dépôts de graisse dans vos artères.

### Pourquoi il est important de continuer de prendre ROZAT® comprimé pelliculé :

\* ROZAT® comprimé pelliculé est utilisé pour corriger le taux de substances grasses dans le sang appelé lipides, le plus fréquent étant le cholestérol.

\* Il y a différents types de cholestérol trouvés dans le sang :

le « mauvais cholestérol » (LDL-C) et le « bon cholestérol » (HDL-C).

\* ROZAT® comprimé pelliculé peut réduire le « mauvais cholestérol » et augmenter le « bon cholestérol ».

\* Il agit en aidant à bloquer la production de « mauvais cholestérol » par votre organisme. Il améliore également l'aptitude de votre corps à l'éliminer de votre sang.

Pour la plupart des personnes, un taux de cholestérol élevé n'a pas de conséquence sur la façon dont elles se sentent parce que cela n'entraîne aucun symptôme. Cependant, sans traitement, des dépôts graisseux peuvent s'accumuler sur la paroi des vaisseaux sanguins et réduire leur diamètre.

Parfois, ce rétrécissement des vaisseaux peut empêcher le passage du sang jusqu'au cœur ou au cerveau conduisant à une attaque cardiaque ou un accident vasculaire cérébral.

En diminuant votre taux de cholestérol, vous pouvez réduire le risque d'avoir une attaque cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou des problèmes de santé qui y sont liés.

Il est très important de continuer à prendre ROZAT® comprimé pelliculé, même si votre taux de cholestérol revient à la normale, parce qu'il prévient la remontée de votre taux de cholestérol et donc l'accumulation de dépôts de graisse.

Cependant, vous devez arrêter votre traitement si votre médecin vous le dit, ou si vous découvrez que vous êtes enceinte.

### Posologie Mode et voies d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement :

Doses usuelles chez les adultes.

Si vous prenez ROZAT® comprimé pelliculé pour un taux de cholestérol élevé :

Votre traitement avec ROZAT® comprimé pelliculé doit débuter avec une dose de 5 ou 10 mg, même si vous prenez une dose plus élevée d'une autre statine avant.

Le choix de la dose initiale dépendra de :

- Votre taux de cholestérol.
- Vos risques d'avoir une attaque cardiaque ou un accident vasculaire cérébral.

- Facteurs pouvant vous rendre plus sensible à certains effets indésirables.

Veuillez vérifier auprès de votre médecin ou pharmacien la dose

initiale qui vous est le mieux adapté.

Une dose initiale de 5 mg par jour est recommandée chez les patients :

- D'origine asiatique : (japonais, chinois, philippin, vietnamien, coréen et indien).
- Âgés de plus de 70 ans :
- Présentant une insuffisance rénale modérée.
- Présentant des facteurs prédisposant à une myopathie (atteinte musculaire).

### Augmentation de la dose et dose maximale quotidienne :

Votre médecin peut décider d'augmenter les doses jusqu'à ce que la posologie soit appropriée pour vous. Si vous débutez à 5 mg, votre médecin peut décider de doubler la dose jusqu'à 10 mg puis 20 mg si nécessaire.

Si vous commencez avec 10 mg, votre médecin peut décider de doubler la dose jusqu'à 20 mg puis 40 mg si nécessaire. Une période de 4 semaines est nécessaire entre chaque adaptation de dose. La dose maximale quotidienne est de 40 mg. Cette dose concerne les patients ayant un taux de cholestérol élevé et un risque élevé d'avoir une attaque cardiaque ou un accident vasculaire cérébral pour lesquels le taux de cholestérol n'a pas été suffisamment baissé avec 20 mg.

Si vous prenez ROZAT® comprimé pelliculé pour réduire le risque d'avoir une attaque cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou des problèmes de santé qui y sont liés :

La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour. Cependant votre médecin pourra décider d'utiliser une dose plus faible si vous avez l'un des facteurs mentionnés ci-dessus.

Utilisation chez les enfants et adolescents âgés de 6 à 17 ans.

La dose initiale usuelle est de 5 mg. Votre docteur pourra augmenter votre dose afin de trouver la dose adaptée de ROZAT® comprimé pelliculé. La dose maximale de ROZAT® comprimé pelliculé est 10 mg par jour pour les enfants âgés de 6 à 9 ans et de 20 mg par jour pour les enfants âgés de 10 à 17 ans. Prenez cette dose une fois par jour. La dose de 40 mg de ROZAT® comprimé pelliculé ne doit pas être utilisée chez les enfants.

### Mode et voies d'administration :

Avalez chaque comprimé en entier avec de l'eau.

### Durée du traitement et Fréquence d'administration :

ROZAT® doit être pris une fois par jour. Vous pouvez prendre le comprimé à tout moment de la journée avec ou sans nourriture.

Il est recommandé de prendre votre comprimé chaque jour à la même heure, ceci vous évitera d'oublier de le prendre.

Contrôle régulier de votre cholestérol :

Il est important que vous rentriez voir votre médecin pour des contrôles réguliers de votre cholestérol afin d'être sûr que ce dernier est bien contrôlé.

Votre médecin peut décider d'augmenter la dose de ROZAT® comprimé pelliculé jusqu'à ce qu'elle soit appropriée pour vous.

### Contre-indications :

Ne prenez jamais ROZAT® comprimé pelliculé :

- Si vous êtes allergique à la rosuvastatine ou à l'un des autres composants du produit.

- Si vous êtes enceinte, si vous allaitez, arrêtez immédiatement le traitement et prévenez votre médecin ; il convient de prendre un contraceptif approprié pour éviter d'être enceinte pendant le traitement par ROZAT® comprimé pelliculé.

- Si vous avez actuellement des problèmes hépatiques.

- Si vous avez des problèmes rénaux graves (si vous avez un doute, demandez à votre médecin).

- Si vous avez des troubles musculaires appelés myopathies (douleurs musculaires répétées ou inexplicables).

- Si vous prenez de la clopidogrel (utilisée par exemple lors de greffes d'organes).

### Effets Indésirables :

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Il est important que vous soyez informés des effets indésirables possibles. Ils sont :

### Arrêtez de consulter si

réactions allergiques

Difficulté à respirer

de la langue et

Gonflement

qui peut causer

Démangeaisons

### Consultez si

ressentez des

douleurs

anormales

plus fréquentes

comme avec

une ou des

danger pour

### Effets indésirables

maux de tête

douleurs d'estomac

constipation,

sensation de malaise

douleurs musculaires

sensations générales

sensations vertigineuses

augmentation de

ceci revient généralement

ROZAT® 20 mg  
Rosuvastatine  
28 comprimés pelliculés



PPU: 244DH00  
TER: 08/11  
LOT: K2070-2

# ROZAT® 10, 20 mg

Rosuvastatine

Comprimé pelliculé Boîte de 28

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Composition du médicament :

### Composition qualitative et quantitative en substance active par unité de prise :

Rosuvastatine ..... 10 mg

Rosuvastatine ..... 20 mg

### Les autres composants sont :

Cellulose microcristalline [Avicel PH 200], lactose granule, sodium carbonate anhydre, crospovidone, stéarate de magnésium, opadry AMB 80W34464 Pink, eau purifiée.

Liste des excipients à effet notable : Lactose, Sodium.

### Classe pharmaco-thérapeutique ou type d'activité :

ROZAT® appartient au groupe des médicaments appelés statines.

### Indications thérapeutiques :

ROZAT® comprimé pelliculé vous a été prescrit parce que :

- Vous avez un taux élevé de cholestérol ce qui signifie que vous présentez un risque de faire une attaque cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. ROZAT® comprimé pelliculé est utilisé chez les adultes, les adolescents et les enfants âgés de 6 ans et plus pour traiter un taux de cholestérol élevé.

Il vous est recommandé de prendre des statines, car parfois un régime alimentaire adapté et une activité physique ne suffisent pas à corriger votre taux de cholestérol. Vous devez poursuivre le régime hypocaloréolémiant et l'activité physique en même temps que la prise de ROZAT® comprimé pelliculé.

Ou

\* Vous avez d'autres facteurs qui augmentent votre risque d'avoir une attaque cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou des problèmes de santé liés à ces facteurs.

Une attaque cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou des problèmes de santé liés à ces facteurs peuvent être causés par une maladie appelée l'athérosclérose. L'athérosclérose est due à une accumulation de dépôts de graisse dans vos artères.

### Pourquoi il est important de continuer de prendre ROZAT® comprimé pelliculé :

\* ROZAT® comprimé pelliculé est utilisé pour corriger le taux de substances grasses dans le sang appelé lipides, le plus fréquent étant le cholestérol.

\* Il y a différents types de cholestérol trouvés dans le sang :

le « mauvais cholestérol » (LDL-C) et le « bon cholestérol » (HDL-C).

\* ROZAT® comprimé pelliculé peut réduire le « mauvais cholestérol » et augmenter le « bon cholestérol ».

\* Il agit en aidant à bloquer la production de « mauvais cholestérol » par votre organisme. Il améliore également l'aptitude de votre corps à l'éliminer de votre sang.

Pour la plupart des personnes, un taux de cholestérol élevé n'a pas de conséquence sur la façon dont elles se sentent parce que cela n'entraîne aucun symptôme. Cependant, sans traitement, des dépôts graisseux peuvent s'accumuler sur la paroi des vaisseaux sanguins et réduire leur diamètre.

Parfois, ce rétrécissement des vaisseaux peut empêcher le passage du sang jusqu'au cœur ou au cerveau conduisant à une attaque cardiaque ou un accident vasculaire cérébral.

En diminuant votre taux de cholestérol, vous pouvez réduire le risque d'avoir une attaque cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou des problèmes de santé qui y sont liés.

Il est très important de continuer à prendre ROZAT® comprimé pelliculé, même si votre taux de cholestérol revient à la normale, parce qu'il prévient la remontée de votre taux de cholestérol et donc l'accumulation de dépôts de graisse.

Cependant, vous devez arrêter votre traitement si votre médecin vous le dit, ou si vous découvrez que vous êtes enceinte.

### Posologie Mode et voies d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement :

Doses usuelles chez les adultes.

Si vous prenez ROZAT® comprimé pelliculé pour un taux de cholestérol élevé :

Votre traitement avec ROZAT® comprimé pelliculé doit débuter avec une dose de 5 ou 10 mg, même si vous prenez une dose plus élevée d'une autre statine avant.

Le choix de la dose initiale dépendra de :

- Votre taux de cholestérol.
- Vos risques d'avoir une attaque cardiaque ou un accident vasculaire cérébral.

- Facteurs pouvant vous rendre plus sensible à certains effets indésirables.

Veuillez vérifier auprès de votre médecin ou pharmacien la dose

initiale qui vous est le mieux adapté.

Une dose initiale de 5 mg par jour est recommandée chez les patients :

- D'origine asiatique : (japonais, chinois, philippin, vietnamien, coréen et indien).
- Âgés de plus de 70 ans :
- Présentant une insuffisance rénale modérée.
- Présentant des facteurs prédisposant à une myopathie (atteinte musculaire).

### Augmentation de la dose et dose maximale quotidienne :

Votre médecin peut décider d'augmenter les doses jusqu'à ce que la posologie soit appropriée pour vous. Si vous débutez à 5 mg, votre médecin peut décider de doubler la dose jusqu'à 10 mg puis 20 mg si nécessaire.

Si vous commencez avec 10 mg, votre médecin peut décider de doubler la dose jusqu'à 20 mg puis 40 mg si nécessaire. Une période de 4 semaines est nécessaire entre chaque adaptation de dose. La dose maximale quotidienne est de 40 mg. Cette dose concerne les patients ayant un taux de cholestérol élevé et un risque élevé d'avoir une attaque cardiaque ou un accident vasculaire cérébral pour lesquels le taux de cholestérol n'a pas été suffisamment baissé avec 20 mg.

Si vous prenez ROZAT® comprimé pelliculé pour réduire le risque d'avoir une attaque cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou des problèmes de santé qui y sont liés :

La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour. Cependant votre médecin pourra décider d'utiliser une dose plus faible si vous avez l'un des facteurs mentionnés ci-dessus.

Utilisation chez les enfants et adolescents âgés de 6 à 17 ans.

La dose initiale usuelle est de 5 mg. Votre docteur pourra augmenter votre dose afin de trouver la dose adaptée de ROZAT® comprimé pelliculé. La dose maximale de ROZAT® comprimé pelliculé est 10 mg par jour pour les enfants âgés de 6 à 9 ans et de 20 mg par jour pour les enfants âgés de 10 à 17 ans. Prenez cette dose une fois par jour. La dose de 40 mg de ROZAT® comprimé pelliculé ne doit pas être utilisée chez les enfants.

### Mode et voies d'administration :

Avalez chaque comprimé en entier avec de l'eau.

### Durée du traitement et Fréquence d'administration :

ROZAT® doit être pris une fois par jour. Vous pouvez prendre le comprimé à tout moment de la journée avec ou sans nourriture.

Il est recommandé de prendre votre comprimé chaque jour à la même heure, ceci vous évitera d'oublier de le prendre.

Contrôle régulier de votre cholestérol :

Il est important que vous rentriez voir votre médecin pour des contrôles réguliers de votre cholestérol afin d'être sûr que ce dernier est bien contrôlé.

Votre médecin peut décider d'augmenter la dose de ROZAT® comprimé pelliculé jusqu'à ce qu'elle soit appropriée pour vous.

### Contre-indications :

Ne prenez jamais ROZAT® comprimé pelliculé :

- Si vous êtes allergique à la rosuvastatine ou à l'un des autres composants du produit.

- Si vous êtes enceinte, si vous allaitez, arrêtez immédiatement le traitement et prévenez votre médecin ; il convient de prendre un contraceptif approprié pour éviter d'être enceinte pendant le traitement par ROZAT® comprimé pelliculé.

- Si vous avez actuellement des problèmes hépatiques.

- Si vous avez des problèmes rénaux graves (si vous avez un doute, demandez à votre médecin).

- Si vous avez des troubles musculaires appelés myopathies (douleurs musculaires répétées ou inexplicables).

- Si vous prenez de la clopidogrel (utilisée par exemple lors de greffes d'organes).

### Effets Indésirables :

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Il est important que vous soyez informés des effets indésirables possibles. Ils sont :

### Arrêtez de consulter si

réactions allergiques

Difficulté à respirer

de la langue et

Gonflement

qui peut causer

Démangeaisons

### Consultez si

ressentez des

douleurs

anormales

plus fréquentes

comme avec

une ou des

danger pour

### Effets indésirables

maux de tête

douleurs d'estomac

constipation,

sensation de malaise

douleurs musculaires

sensations générales

sensations vertigineuses

augmentation de

ceci revient généralement

ROZAT® 20 mg  
Rosuvastatine  
28 comprimés pelliculés



PPU: 244DH00  
TER: 08/11  
LOT: K2070-2

# Dr. BELKHALFIA Mohammed

Ancien chef des Services de chirurgie à Casablanca et à Mohammedia  
Spécialiste en Chirurgie Générale et Proctologie  
Diplômé d'Échographie de Montpellier  
Diplômé du Médecine de Travail et d'Ergonomie de Rennes  
Diplômé de Médecine légale et en Réparation Juridique de Dommage Corporel de Rennes  
Expert Assermenté auprès des tribunaux

# الدكتور بلخلفية محمد

رئيس قسم الجراحة سابقاً بالدار البيضاء والمحمدية  
اختصاصي في الجراحة العامة بروكتولوجيا  
حاصل على دبلوم الفحص بالصدى من جامعة  
مونبولي بفرنسا  
حاصل على دبلوم طب الشغل والارجنتينية  
من جامعة رين بفرنسا  
حاصل على دبلوم الطب الشرعي والتعويض  
القانوني للضرر البدني من جامعة رين بفرنسا  
خبرير محلف لدى المحاكم

Mohmmedia, le

13/12/22

1<sup>er</sup>

MOUAL Abdelkhan,

40.00

Dolifip



20.00 x 2

30.60

DR BELKHALFIA Mohammed  
Médecin chirurgien  
Diplômé en Médecine du Travail  
et en Médecine Légale  
Tél 023 31 31 99 Midia

15.30 x 2

70.60

Vit C 500



PHARMACIE ET ORTHOPEDIE  
IBN NAFIS  
Dr. KHATTOU Abdellah  
33, Bd Mounastir Dem Rbat  
Mohammmedia - Tél/Fax : 05 23 30 98 36



# DoliGrippe®

Paracétamol - Vitamine C - Maléate de Phéniramine

Granulés pour solution buvable en sachet

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave, ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Composition du médicament

- Composition qualitative et quantitative en substance active par unité de prise :

Paracétamol .....	500 mg
Acide Ascorbique (Vitamine C) .....	200 mg
Maléate de Phéniramine .....	25 mg

- Composition qualitative en excipients :

Mannitol, acide citrique anhydre, povidone K 30, dicarbonate de magnésium anhydre, aspartame, arôme fruits rouges. Composition de l'arôme : Substances aromatisantes, Rouge Cochenille A E124, Maltodextrine, Eau, Gomme Arabique E414, Acide Ascorbique E300, Triacetine E1518, Sulfaté de sodium E514.

- Excipients à effet notable :

Aspartame, Rouge Cochenille A (E124).

## Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité

DoliGrippe® granulés pour solution buvable en sachet, fait partie des médicaments appartenant à la classe pharmaco-thérapeutique ou au type d'activité MEDICAMENTS DU RHUME EN ASSOCIATION,

DoliGrippe®, granulés pour solution buvable en sachet, agit en exerçant une action antihistaminique qui permet de réduire les rhinorrhées et les phénomènes spasmotiques tels que les éternuements en salive. • Une action antalgique antipyétique permettant une séduction de l'organisme.

## Indications thérapeutiques

Ce médicament est indiqué dans le traitement au cours des rhumes de l'adulte et l'enfant de plus de 15 ans :

- De l'écoulement nasal clair et des larmoiements,
- Des éternuements,
- Des maux de tête et/ou fièvre.

## Posologie

Réservez à l'adulte et l'enfant de plus de 15 ans.

1 sachet à renouveler si nécessaire au bout de 4 heures minimum, sans limite de temps.

## Mode d'administration :

Voie orale.

Les sachets doivent être pris dans une quantité suffisante d'eau, froide.

Au cours des états grippaux, il est préférable de prendre ce médicament.

## Durée du traitement :

La durée maximale du traitement est de 5 jours.

## Fréquence d'administration :

En cas d'insuffisance rénale, (clairance de la créatinine < 30 ml/min), prendre tous les 8 heures.

## Contre-indications

Ne prenez jamais DoliGrippe®, gr.

- Enfant de moins de 15 ans,
- En cas d'antécédent d'allergie à l'aspartame,
- En cas de certaines formes de goutte,
- En cas de difficultés à uriner d'origine prostatique,
- En cas de maladie grave du foie,
- En cas de phénylcétonurie (maladie génétique).

Vous ne devez généralement pas utiliser ce médicament pendant la grossesse et l'allaitement.

EN CAS DE DOUCEUR, IL EST INDISPENSABLE DE CONSULTER Votre Médecin ou Votre Pharmacien.

## Effets indésirables



presence d'aspartame.  
Veuillez consulter Votre Médecin pendant la grossesse et l'allaitement.

CONSULEZ Votre MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.



# Vita C 1000®

(Acide ascorbique)

## DENOMINATION DU MEDICAMENT

VITA C 1000®, Comprimés effervescents : Boîte de 10

VITA C 1000®, Comprimés effervescents : Boîte de 20 (2 tubes de 10)

VITA C 1000® SANS SUCRE, Comprimés effervescents : Boîte de 10

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice.
- Vous devez-vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

### Que contient cette notice

1. Qu'est-ce que VITA C 1000® Comprimés effervescents et VITA C 1000® SANS SUCRE Comprimés effervescents et dans quel cas sont-ils utilisés ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre VITA C 1000® Comprimés effervescents et VITA C 1000® SANS SUCRE Comprimés effervescents ?
3. Comment prendre VITA C 1000® Comprimés effervescents ou VITA C 1000® SANS SUCRE Comprimés effervescents ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver VITA C 1000® Comprimés effervescents et VITA C 1000® SANS SUCRE Comprimés effervescents ?
6. Informations supplémentaires

## 1 - QU'EST-CE QUE VITA C 1000® COMPRIMÉS EFFERVESCENTS ET VITA C 1000® SANS SUCRE COMPRIMÉS EFFERVESCENTS ET DANS QUELS CAS SONT-ILS UTILISÉS ?

### - Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité

ACIDE ASCORBIQUE (VITAMINE C), NON ASSOCIEE - code ATC : A11GA01.

### - Indications thérapeutiques

Ce médicament contient de la vitamine C.

Il est indiqué dans les états de fatigue passagers de l'adulte et de l'enfant de plus de 15 ans.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 1 mois de traitement.

## 2 - QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE SUR VITA C 1000® COMPRIMÉS EFFERVESCENTS ET VITA C 1000® SANS SUCRE COMPRIMÉS EFFERVESCENTS ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une insuffisance rénale, contactez-le avant de prendre VITA C 1000® comprimés effervescents.

### - Ne prenez jamais VITA C 1000® comprimés effervescents sans sucre

- si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des composants contenus dans ce médicament
- si vous êtes atteint de phénylcétonurie (maladie de naissance), en raison de la présence d'acide phényletanoïque dans les comprimés effervescents
- si vous présentez une insuffisance rénale (maladie des fonctions du rein)
- si vous présentez ou avez présenté des calculs d'oxalate de calcium
- si vous avez moins de 15 ans

### - Faites attention avec VITA C 1000® et VITA C 1000® SANS SUCRE comprimés effervescents

#### précautions particulières d'emploi

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien pour prendre VITA C 1000® comprimés effervescents ou VITA C 1000® SANS SUCRE comprimés effervescents.

### • VITA C 1000® comprimés effervescents

• Si votre fatigue s'accompagne de vertiges ou de votre pharynx

• En raison d'un état de fatigue ou de la vitamine C en excès

• Prendre en complément d'autres médicaments (risque de surdosage)

• La vitamine C (vitamine C d'hémochromatose, fer), adressez-vous à votre pharmacien pour prendre l'objet de précaution

• La vitamine C (vitamine C glucose-6-phosphate, car des personnes atteintes de goutte favorisent le risque de maladie des globules rouges)

• La vitamine C (vitamine C, notamment de la vitamine C dans les maladies héréditaires)

• Ce médicament peut provoquer des réactions d'hypersensibilité

• Ce médicament peut provoquer des réactions d'hypersensibilité

### • VITA C 1000® comprimés effervescents

• Ce médicament peut provoquer des réactions d'hypersensibilité

• En raison de la présence de vitamine C chez les patients atteints de malabsorption du fer (maladie héréditaire)

• Ce médicament peut provoquer des réactions d'hypersensibilité dont il faut tenir compte

• Ce médicament peut provoquer des réactions d'hypersensibilité

### • VITA C 1000® comprimés effervescents

• Ce médicament peut provoquer des réactions d'hypersensibilité

Vita C 1000

PPV 15D H30  
EXP 05/2025  
LOT 22034 20

Vita C 1000®

10 Comprimés effervescents



6 118000 032069

AMM N° 03 DMP/21

# Vita C 1000®

(Acide ascorbique)

## DENOMINATION DU MEDICAMENT

VITA C 1000®, Comprimés effervescents : Boîte de 10

VITA C 1000®, Comprimés effervescents : Boîte de 20 (2 tubes de 10)

VITA C 1000® SANS SUCRE, Comprimés effervescents : Boîte de 10

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice.
- Vous devez-vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

### Que contient cette notice

1. Qu'est-ce que VITA C 1000® Comprimés effervescents et VITA C 1000® SANS SUCRE Comprimés effervescents et dans quel cas sont-ils utilisés ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre VITA C 1000® Comprimés effervescents et VITA C 1000® SANS SUCRE Comprimés effervescents ?
3. Comment prendre VITA C 1000® Comprimés effervescents ou VITA C 1000® SANS SUCRE Comprimés effervescents ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver VITA C 1000® Comprimés effervescents et VITA C 1000® SANS SUCRE Comprimés effervescents ?
6. Informations supplémentaires

## 1 - QU'EST-CE QUE VITA C 1000® COMPRIMÉS EFFERVESCENTS ET VITA C 1000® SANS SUCRE COMPRIMÉS EFFERVESCENTS ET DANS QUELS CAS SONT-ILS UTILISÉS ?

### - Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité

ACIDE ASCORBIQUE (VITAMINE C), NON ASSOCIEE - code ATC : A11GA01.

### - Indications thérapeutiques

Ce médicament contient de la vitamine C.

Il est indiqué dans les états de fatigue passagers de l'adulte et de l'enfant de plus de 15 ans.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 1 mois de traitement.

## 2 - QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE SUR VITA C 1000® COMPRIMÉS EFFERVESCENTS ET VITA C 1000® SANS SUCRE COMPRIMÉS EFFERVESCENTS ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une insuffisance rénale, contactez-le avant de prendre VITA C 1000® comprimés effervescents.

### - Ne prenez jamais VITA C 1000® comprimés effervescents sans sucre

- si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des composants contenus dans ce médicament
- si vous êtes atteint de phénylcétonurie (maladie de naissance), en raison de la présence d'acide phényletanoïque dans les comprimés effervescents
- si vous présentez une insuffisance rénale (maladie des fonctions du rein)
- si vous présentez ou avez présenté des calculs d'oxalate de calcium
- si vous avez moins de 15 ans

### - Faites attention avec VITA C 1000® et VITA C 1000® SANS SUCRE comprimés effervescents

#### précautions particulières d'emploi

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien pour prendre VITA C 1000® comprimés effervescents ou VITA C 1000® SANS SUCRE comprimés effervescents.

### • VITA C 1000® comprimés effervescents

• Si votre fatigue s'accompagne de vertiges ou de votre pharynx

• En raison d'un état de fatigue ou de la vitamine C en excès

• Prendre en complément d'autres médicaments (risque de surdosage)

• La vitamine C (vitamine C d'hémochromatose, fer), adressez-vous à votre pharmacien pour prendre l'objet de précaution

• La vitamine C (vitamine C glucose-6-phosphate, car des personnes atteintes de goutte favorisent le risque de maladie des globules rouges)

• La vitamine C (vitamine C, notamment de la vitamine C dans les maladies héréditaires)

• Ce médicament peut provoquer des réactions d'hypersensibilité

• Ce médicament peut provoquer des réactions d'hypersensibilité

### • VITA C 1000® comprimés effervescents

• Ce médicament peut provoquer des réactions d'hypersensibilité

• En raison de la présence de vitamine C chez les patients atteints de malabsorption du fer (maladie héréditaire)

• Ce médicament peut provoquer des réactions d'hypersensibilité dont il faut tenir compte

• Ce médicament peut provoquer des réactions d'hypersensibilité

### • VITA C 1000® comprimés effervescents

• Ce médicament peut provoquer des réactions d'hypersensibilité

Vita C 1000

PPV 15DH30  
EXP 05/2025  
LOT 22034 20

Vita C 1000®

10 Comprimés effervescents



6 118000 032069

AMM N° 03 DMP/21

**LABORATOIRE AMARA D'ANALYSES MEDICALES**

Dr. M. AMARA

3,Bd Mohammed V - Tél.: 0523.30.40.30 - Fax: 0523.30.43.20

Référence:

**21214421**

Analyses effectuées le: 14/12/2022

Pour.....: **Mr. CHOUAL ABDELGHANI**

Sur préscription du: Dr BELKHALFIA MOHAMED

Code.....: 00060896



Organisme.....:

**Bilan:**

NFS PQ GLY CHO HDL LDL TRIGL LIP AUR  
CREAT

Cotation : (B 380 )

**Montant Net :** 534.20 **Dhs**

ARRETEE LA PRESENTE FACTURE A LA SOMME DE :

**CINQ CENT TRENTÉ QUATRE Dhs 20 Cts**



**Mohammed AMARA**  
Pharmacien Biologiste

Diplômé de l'Université de Bruxelles (U.L.B.)  
Spécialités : Biochimie - Hématologie  
Immunologie - Bactériologie - Mycologie

# مختبر اعمارة للتحليلات الطبية

## LABORATOIRE AMARA D'ANALYSES MEDICALES

Prélèvement du : 14/12/2022  
Edition du : 14/12/2022  
Code Patient : 00060896  
Matricule :

Heure : 09:41

Référence 21214T2421 du : 14/12/2022

Mr. CHOUAL ABDELGHANI

Médecin: Dr. BELKHALFIA MOHAMED  
HEMATOLOGIE

Analyses	Résultats	Normes	Antécédents
<b>NUMERATION GLOBULAIRE</b>			
Globules rouges.....	<b>5.0</b>	M/ $\mu$ l	(4.5 à 6.5) 5.0 (17/11/20)
Hémoglobine.....	<b>13.9</b>	g/dl	(13.0 à 18.0) 13.1 (17/11/20)
Hématocrite .....	<b>43</b>	%	(40 à 54) 39 (17/11/20)
V.G.M .....	<b>86</b>	fl	(85 à 100) 78 (17/11/20)
T.C.M.H.....	<b>28</b>	pg	(27 à 32) 26 (17/11/20)
C.C.M.H.....	<b>32</b>	%	(32 à 36) 34 (17/11/20)
Globules blancs.....	<b>6100</b>	/ $\mu$ l	(4.000 à 11.000) 6200 (17/11/20)
<b>FORMULE LEUCOCYTAIRE</b>			
Polynucléaires Neutrophiles..... soit.....	<b>36</b>	%	41 (17/11/20)
Lymphocytes..... soit.....	<b>21.96</b>	/ $\mu$ l	(2000 à 7500) 41 (17/11/20)
Monocytes .....	<b>55</b>	%	48 (17/11/20)
Polynucléaires Eosinophiles..... soit.....	<b>3355</b>	/ $\mu$ l	(1500 à 4000) 48 (17/11/20)
Polynucléaires Basophiles..... soit.....	<b>8</b>	%	9 (17/11/20)
Plaquettes.....	<b>246.000</b>	/ $\mu$ l	(200 à 800) 2 (17/11/20)
			(< à 400) 2 (17/11/20)
			0 (17/11/20)
			(< à 400) 0 (17/11/20)
			150.000/450.000 37.000 (17/11/20)

### BIOCHIMIE EXAMEN DE SANG

Analyses	Résultats	Normes	Antécédents
Glycémie.....	<b>1.00</b>	g/l	(0.70 à 1.10) 0.97 (11/03/22)
Créatinin.....	<b>10.1</b>	mg/l	(7.0 à 13.5) 9.7 (17/11/20)
Acide urique.....	<b>60</b>	mg/l	(30 à 70) 62 (11/03/22)
Cholestérol total.....	<b>2.54</b>	g/l	(1.50 à 2.00) 2.63 (11/03/22)
Cholestérol H.D.L.....	<b>0.53</b>	g/l	(> à 0.40) 0.64 (11/03/22)
Cholestérol LDL.....	<b>1.42</b>	g/l	(< 1.90) 1.40 (11/03/22)
Triglycérides.....	<b>2.94</b>	g/l	(0.50 à 1.50) 2.93 (11/03/22)
Lipides Totaux.....	<b>9</b>	g/l	(4 à 10) 10 (17/11/20)