

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

M22- 0033632

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 875 Société : Royal Air Maroc

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : KABBAT AZEDINE

AZEDINE 14/7724

Date de naissance : 01 - 01 - 1949

Adresse : 11, rue de Bourguiba
casablanca

Tél. : 0661310214 Total des frais engagés : 1575,60 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 21/12/22

Nom et prénom du malade : KABBAT BENNAI NABIL

Age : 72 ans

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

hyper cholestérolémie

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie : H

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca

Le : 21/12/22

Signature de l'adhérent(e)



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestent le Paiement des Actes
21.12.22	C2	1	250,00 DHS	Dr. B. Lekouni, OBSTETRICIAN & GYNECOLOGIST Tél: 0522 61 10 30

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
 PHARMACIE ABOUDABI 9,Rue des Bouvreuils Oasis Casablanca Tél: 0522 99 64 10	21-12-12	1325,60

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

AUXILIAIRES MEDICAUX

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important:

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESSES DENTAIRES		DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATRICE		

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

		H
D	25533412 00000000	21433552 00000000
	00000000 35533411	00000000 11433553

[Création, remont, adjonction]

SA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur KABBAJ Ghita Ep. SEBTI
Gynécologue Obstétricienne

Diplômée de la Faculté de médecine de Casablanca
Ancien médecin interne au CHU Ibn Rochd



الدكتورة قباج غيثة زوجة السبتي
طبيبة اختصاصية في أمراض النساء والتوليد

خريجة كلية الطب بالدار البيضاء
طبيبة داخلية سابقاً
بالمراكز الاستشفائية الجامعية ابن رشد

Casablanca le 21.12.22 الدار البيضاء في

Nom et Prénom :

نسمة Kabbaj Naima Néé

185,70 x 3

S.V

Bennani

- Crestor 10 mg Acp 15 min 3 bts

138,30

- Augmentin 500mg S2x2b x 8 jours

43,20 x 5

S.V

- Zytomic 300 Acp 15 min 5 bts.

30,60 x 11

S.V

- Esidex 25 mg 2cp / Matin 10 bts

49,60

S.V

- Dure

100.000

1amp

PPV: 49,60 DH
LOT: 22H22
EXP: 08/2025

14.000 x 2

S.V

- Deliprane 1000 mg

18te

Acp x 21

1325,60
Rue des Retireuils
Casablanca
Tél: 0522 99 64 10

PHARMACIE ABDUDABI
9, Rue des Retireuils Oasis
Casablanca
Tél: 0522 99 64 10

إقامة ببنس بلازا، رقم 400 شارع الزرقطوني (إتجاه مسجد الحسن الثاني) الطابق الثاني رقم 14 - الدار البيضاء
Business Plaza, N° 400 Bd. Zerkouni (Direction Mosquée Hassan II) 2ème étage, N° 14 - Casablanca
البريد الإلكتروني : Tél. : 05 22 47 16 89 - E-mail : kabbaj_ghita2008@yahoo.fr

ZYLORIC® 100 mg, 200 mg, 300 mg, comprimé ALLOPURINOL

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la réire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui faire mal.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

- QU'EST-CE QUE ZYLORIC, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
- QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZYLORIC, comprimé ?
- COMMENT PRENDRE ZYLORIC, comprimé ?
- QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES EVENTUELS ?
- COMMENT CONSERVER ZYLORIC, comprimé ?
- INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE ZYLORIC, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

INHIBITEUR DE LA SYNTHÈSE D'ACIDE URIQUE.

Ce médicament est préconisé pour le traitement et la prévention des troubles liés à l'excès d'acide urique tels que gouttes, calculs,...

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZYLORIC, comprimé ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucrels, contactez-le avant de prendre ce médicament.

N'utilisez jamais ZYLORIC, comprimé :

- en cas d'allergie connue à l'allopurinol ou à l'un des constituants du produit,
- chez l'enfant de moins de 6 ans (contre-indication liée à la forme pharmaceutique),
- en cas d'allaitement.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec ZYLORIC, comprimé :

Mises en garde spéciales

CE MEDICAMENT NE DOIT ETRE PRIS QUE SOUS SURVEILLANCE MEDICALE.

Au cours du traitement, averez immédiatement votre médecin en cas de :

- manifestations cutanées de type démangeaisons, rougeurs, vésicules, décollement de la peau pouvant rapidement s'étendre de façon très grave à tout le corps,
- fièvre associée à une atteinte de l'état général, éruption cutanée, atteinte du foie ou du rein.

Ces manifestations rares peuvent être graves et imposent le plus souvent l'arrêt immédiat du traitement.

En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).

Précautions d'emploi

Afin d'éviter le déclenchement d'une crise de goutte, ce médicament devra (pendant les premiers mois de traitement) être associé à la colchicine. Il ne doit pas être utilisé lors d'une crise aiguë de goutte.

AVANT DE PRENDRE CE MEDICAMENT, PREVENIR VOTRE MEDECIN EN CAS DE :

- défaillance des fonctions du rein,
- de maladie du sang.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS notamment avec la vidarabine (anti-viral), la didanosine, l'azathioprine ou la mercaptopurine, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse

L'utilisation de ce médicament est déconseillée, sauf avis contraire de votre médecin, pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez rapidement votre médecin : lui seul pourra adapter le traitement à votre état.

Allaitement

En raison du passage de ce médicament dans le lait maternel, l'allaitement est contre-indiqué.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Dans de rares cas, la prise de ce médicament peut entraîner des vertiges.

Liste des excipients à effet notable : lactose.

3. COMMENT PRENDRE ZYLORIC, comprimé ?

Posologie

La posologie usuelle varie de 100 à 300 mg par jour. Elle est fonction des résultats du taux sanguin et urinaire en acide urique.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Les comprimés sont à avaler tels quels avec un grand verre d'eau, après le repas.

Durée du traitement

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

Si vous avez pris plus de ZYLORIC, comprimé que vous n'auriez dû :

En cas de surdosage ou d'intoxication accidentelle, prévenir immédiatement votre médecin.

43, 20

ZYLORIC 300 mg

Boîte de 28 comprimés

A.M.M. N° 01 DMP/21/INTT

SOTHEMIA BOUSHOURA

Remboursable AMO



6 118000 022275



ZYLORIC® 100 mg, 200 mg, 300 mg, comprimé ALLOPURINOL

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la réire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui faire mal.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

- QU'EST-CE QUE ZYLORIC, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
- QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZYLORIC, comprimé ?
- COMMENT PRENDRE ZYLORIC, comprimé ?
- QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES EVENTUELS ?
- COMMENT CONSERVER ZYLORIC, comprimé ?
- INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE ZYLORIC, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

INHIBITEUR DE LA SYNTHÈSE D'ACIDE URIQUE.

Ce médicament est préconisé pour le traitement et la prévention des troubles liés à l'excès d'acide urique tels que gouttes, calculs,...

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZYLORIC, comprimé ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucrels, contactez-le avant de prendre ce médicament.

N'utilisez jamais ZYLORIC, comprimé :

- en cas d'allergie connue à l'allopurinol ou à l'un des constituants du produit,
- chez l'enfant de moins de 6 ans (contre-indication liée à la forme pharmaceutique),
- en cas d'allaitement.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec ZYLORIC, comprimé :

Mises en garde spéciales

CE MEDICAMENT NE DOIT ETRE PRIS QUE SOUS SURVEILLANCE MEDICALE.

Au cours du traitement, averez immédiatement votre médecin en cas de :

- manifestations cutanées de type démangeaisons, rougeurs, vésicules, décollement de la peau pouvant rapidement s'étendre de façon très grave à tout le corps,
- fièvre associée à une atteinte de l'état général, éruption cutanée, atteinte du foie ou du rein.

Ces manifestations rares peuvent être graves et imposent le plus souvent l'arrêt immédiat du traitement.

En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).

Précautions d'emploi

Afin d'éviter le déclenchement d'une crise de goutte, ce médicament devra (pendant les premiers mois de traitement) être associé à la colchicine. Il ne doit pas être utilisé lors d'une crise aiguë de goutte.

AVANT DE PRENDRE CE MEDICAMENT, PREVENIR VOTRE MEDECIN EN CAS DE :

- défaillance des fonctions du rein,
- de maladie du sang.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS notamment avec la vidarabine (anti-viral), la didanosine, l'azathioprine ou la mercaptopurine, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse

L'utilisation de ce médicament est déconseillée, sauf avis contraire de votre médecin, pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez rapidement votre médecin : lui seul pourra adapter le traitement à votre état.

Allaitement

En raison du passage de ce médicament dans le lait maternel, l'allaitement est contre-indiqué.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Dans de rares cas, la prise de ce médicament peut entraîner des vertiges.

Liste des excipients à effet notable : lactose.

3. COMMENT PRENDRE ZYLORIC, comprimé ?

Posologie

La posologie usuelle varie de 100 à 300 mg par jour. Elle est fonction des résultats du taux sanguin et urinaire en acide urique.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Les comprimés sont à avaler tels quels avec un grand verre d'eau, après le repas.

Durée du traitement

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

Si vous avez pris plus de ZYLORIC, comprimé que vous n'auriez dû :

En cas de surdosage ou d'intoxication accidentelle, prévenir immédiatement votre médecin.

43, 20

ZYLORIC 300 mg

Boîte de 28 comprimés

A.M.M. N° 01 DMP/21/INTT

SOTHEMIA BOUSHOURA

Remboursable AMO



6 118000 022275



ZYLORIC® 100 mg, 200 mg, 300 mg, comprimé ALLOPURINOL

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la réire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui faire mal.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

- QU'EST-CE QUE ZYLORIC, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
- QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZYLORIC, comprimé ?
- COMMENT PRENDRE ZYLORIC, comprimé ?
- QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES EVENTUELS ?
- COMMENT CONSERVER ZYLORIC, comprimé ?
- INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE ZYLORIC, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

INHIBITEUR DE LA SYNTHÈSE D'ACIDE URIQUE.

Ce médicament est préconisé pour le traitement et la prévention des troubles liés à l'excès d'acide urique tels que gouttes, calculs,...

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZYLORIC, comprimé ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucrels, contactez-le avant de prendre ce médicament.

N'utilisez jamais ZYLORIC, comprimé :

- en cas d'allergie connue à l'allopurinol ou à l'un des constituants du produit,
- chez l'enfant de moins de 6 ans (contre-indication liée à la forme pharmaceutique),
- en cas d'allaitement.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec ZYLORIC, comprimé :

Mises en garde spéciales

CE MEDICAMENT NE DOIT ETRE PRIS QUE SOUS SURVEILLANCE MEDICALE.

Au cours du traitement, averez immédiatement votre médecin en cas de :

- manifestations cutanées de type démangeaisons, rougeurs, vésicules, décollement de la peau pouvant rapidement s'étendre de façon très grave à tout le corps,
- fièvre associée à une atteinte de l'état général, éruption cutanée, atteinte du foie ou du rein.

Ces manifestations rares peuvent être graves et imposent le plus souvent l'arrêt immédiat du traitement.

En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).

Précautions d'emploi

Afin d'éviter le déclenchement d'une crise de goutte, ce médicament devra (pendant les premiers mois de traitement) être associé à la colchicine. Il ne doit pas être utilisé lors d'une crise aiguë de goutte.

AVANT DE PRENDRE CE MEDICAMENT, PREVENIR VOTRE MEDECIN EN CAS DE :

- défaillance des fonctions du rein,
- de maladie du sang.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS notamment avec la vidarabine (anti-viral), la didanosine, l'azathioprine ou la mercaptopurine, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse

L'utilisation de ce médicament est déconseillée, sauf avis contraire de votre médecin, pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez rapidement votre médecin : lui seul pourra adapter le traitement à votre état.

Allaitement

En raison du passage de ce médicament dans le lait maternel, l'allaitement est contre-indiqué.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Dans de rares cas, la prise de ce médicament peut entraîner des vertiges.

Liste des excipients à effet notable : lactose.

3. COMMENT PRENDRE ZYLORIC, comprimé ?

Posologie

La posologie usuelle varie de 100 à 300 mg par jour. Elle est fonction des résultats du taux sanguin et urinaire en acide urique.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Les comprimés sont à avaler tels quels avec un grand verre d'eau, après le repas.

Durée du traitement

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

Si vous avez pris plus de ZYLORIC, comprimé que vous n'auriez dû :

En cas de surdosage ou d'intoxication accidentelle, prévenir immédiatement votre médecin.

43, 20

ZYLORIC 300 mg

Boîte de 28 comprimés

A.M.M. N° 01 DMP/21/INTT

SOTHEMIA BOUSHOURA

Remboursable AMO



6 118000 022275



ZYLORIC® 100 mg, 200 mg, 300 mg, comprimé ALLOPURINOL

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la réire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui faire mal.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

- QU'EST-CE QUE ZYLORIC, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
- QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZYLORIC, comprimé ?
- COMMENT PRENDRE ZYLORIC, comprimé ?
- QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES EVENTUELS ?
- COMMENT CONSERVER ZYLORIC, comprimé ?
- INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE ZYLORIC, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

INHIBITEUR DE LA SYNTHÈSE D'ACIDE URIQUE.

Ce médicament est préconisé pour le traitement et la prévention des troubles liés à l'excès d'acide urique tels que gouttes, calculs,...

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZYLORIC, comprimé ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucrels, contactez-le avant de prendre ce médicament.

N'utilisez jamais ZYLORIC, comprimé :

- en cas d'allergie connue à l'allopurinol ou à l'un des constituants du produit,
- chez l'enfant de moins de 6 ans (contre-indication liée à la forme pharmaceutique),
- en cas d'allaitement.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec ZYLORIC, comprimé :

Mises en garde spéciales

CE MEDICAMENT NE DOIT ETRE PRIS QUE SOUS SURVEILLANCE MEDICALE.

Au cours du traitement, averez immédiatement votre médecin en cas de :

- manifestations cutanées de type démangeaisons, rougeurs, vésicules, décollement de la peau pouvant rapidement s'étendre de façon très grave à tout le corps,
- fièvre associée à une atteinte de l'état général, éruption cutanée, atteinte du foie ou du rein.

Ces manifestations rares peuvent être graves et imposent le plus souvent l'arrêt immédiat du traitement.

En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).

Précautions d'emploi

Afin d'éviter le déclenchement d'une crise de goutte, ce médicament devra (pendant les premiers mois de traitement) être associé à la colchicine. Il ne doit pas être utilisé lors d'une crise aiguë de goutte.

AVANT DE PRENDRE CE MEDICAMENT, PREVENIR VOTRE MEDECIN EN CAS DE :

- défaillance des fonctions du rein,
- de maladie du sang.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS notamment avec la vidarabine (anti-viral), la didanosine, l'azathioprine ou la mercaptopurine, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse

L'utilisation de ce médicament est déconseillée, sauf avis contraire de votre médecin, pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez rapidement votre médecin : lui seul pourra adapter le traitement à votre état.

Allaitement

En raison du passage de ce médicament dans le lait maternel, l'allaitement est contre-indiqué.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Dans de rares cas, la prise de ce médicament peut entraîner des vertiges.

Liste des excipients à effet notable : lactose.

3. COMMENT PRENDRE ZYLORIC, comprimé ?

Posologie

La posologie usuelle varie de 100 à 300 mg par jour. Elle est fonction des résultats du taux sanguin et urinaire en acide urique.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Les comprimés sont à avaler tels quels avec un grand verre d'eau, après le repas.

Durée du traitement

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

Si vous avez pris plus de ZYLORIC, comprimé que vous n'auriez dû :

En cas de surdosage ou d'intoxication accidentelle, prévenir immédiatement votre médecin.

43, 20

ZYLORIC 300 mg

Boîte de 28 comprimés

A.M.M. N° 01 DMP/21/INTT

SOTHEMIA BOUSHOURA

Remboursable AMO



6 118000 022275



ZYLORIC® 100 mg, 200 mg, 300 mg, comprimé ALLOPURINOL

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la réire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui faire mal.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

- QU'EST-CE QUE ZYLORIC, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
- QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZYLORIC, comprimé ?
- COMMENT PRENDRE ZYLORIC, comprimé ?
- QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES EVENTUELS ?
- COMMENT CONSERVER ZYLORIC, comprimé ?
- INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE ZYLORIC, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

INHIBITEUR DE LA SYNTHÈSE D'ACIDE URIQUE.

Ce médicament est préconisé pour le traitement et la prévention des troubles liés à l'excès d'acide urique tels que gouttes, calculs,...

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZYLORIC, comprimé ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucrels, contactez-le avant de prendre ce médicament.

N'utilisez jamais ZYLORIC, comprimé :

- en cas d'allergie connue à l'allopurinol ou à l'un des constituants du produit,
- chez l'enfant de moins de 6 ans (contre-indication liée à la forme pharmaceutique),
- en cas d'allaitement.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec ZYLORIC, comprimé :

Mises en garde spéciales

CE MEDICAMENT NE DOIT ETRE PRIS QUE SOUS SURVEILLANCE MEDICALE.

Au cours du traitement, averez immédiatement votre médecin en cas de :

- manifestations cutanées de type démangeaisons, rougeurs, vésicules, décollement de la peau pouvant rapidement s'étendre de façon très grave à tout le corps,
- fièvre associée à une atteinte de l'état général, éruption cutanée, atteinte du foie ou du rein.

Ces manifestations rares peuvent être graves et imposent le plus souvent l'arrêt immédiat du traitement.

En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).

Précautions d'emploi

Afin d'éviter le déclenchement d'une crise de goutte, ce médicament devra (pendant les premiers mois de traitement) être associé à la colchicine. Il ne doit pas être utilisé lors d'une crise aiguë de goutte.

AVANT DE PRENDRE CE MEDICAMENT, PREVENIR VOTRE MEDECIN EN CAS DE :

- défaillance des fonctions du rein,
- de maladie du sang.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS notamment avec la vidarabine (anti-viral), la didanosine, l'azathioprine ou la mercaptopurine, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse

L'utilisation de ce médicament est déconseillée, sauf avis contraire de votre médecin, pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez rapidement votre médecin : lui seul pourra adapter le traitement à votre état.

Allaitement

En raison du passage de ce médicament dans le lait maternel, l'allaitement est contre-indiqué.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Dans de rares cas, la prise de ce médicament peut entraîner des vertiges.

Liste des excipients à effet notable : lactose.

3. COMMENT PRENDRE ZYLORIC, comprimé ?

Posologie

La posologie usuelle varie de 100 à 300 mg par jour. Elle est fonction des résultats du taux sanguin et urinaire en acide urique.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Les comprimés sont à avaler tels quels avec un grand verre d'eau, après le repas.

Durée du traitement

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

Si vous avez pris plus de ZYLORIC, comprimé que vous n'auriez dû :

En cas de surdosage ou d'intoxication accidentelle, prévenir immédiatement votre médecin.

43, 20

ZYLORIC 300 mg

Boîte de 28 comprimés

A.M.M. N° 01 DMP/21/INTT

SOTHEMIA BOUSHOURA

Remboursable AMO



6 118000 022275



PPV: 14DH00

PER: 10/25

LOT: L3548

Doliprane®

PARACETAMOL

DOLIPRANE® 1000 mg, comprimé :

La substance active est : paracétamol 1000 mg, souffre (1111,11 mg), pour un comprimé.

Les autres composants sont : croscarmellose sodique, maïs prégelatinisé, acide stéarique (origine végétale).

QU'EST -CE QUE DOLIPRANE® 1000 mg, COMPRIMÉ ?

Ce médicament contient du paracétamol. Il est indiqué dans les cas suivants : douleurs de tête, états grippaux, douleurs dentaires, rhumatismales, lombalgies, douleurs de l'arthrose.

Cette présentation est réservée à l'adulte (à partir de 15 ans) :

Lire attentivement la rubrique "Posologie".

Pour les enfants de moins de 15 ans, il existe d'autres présentations de paracétamol. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

QUELLES SONT LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT DE PRENDRE DOLIPRANE® 1000 mg, COMPRIMÉ ?

Contre-indications :

Ne pas prendre DOLIPRANE® 1000 mg, comprimé dans les cas suivants : allergie connue au paracétamol, maladie grave du foie, enfant de moins de 15 ans.

PRENDRE DES PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES AVEC DOLIPRANE® 1000 mg, COMPRIMÉ :

Précautions Particulières :

Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours ou en cas d'efficacité insuffisante ou de survenue de tout autre signe, ne pas continuer le traitement sans l'avis de votre médecin.

En cas de maladie grave du foie ou des reins, il est nécessaire de consulter votre médecin avant de prendre du paracétamol.

Mises en garde :

En cas de surdosage ou de prise par erreur d'une dose trop élevée, consultez immédiatement votre médecin.

Ce médicament contient du paracétamol. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée (cf. chapitre "Posologie").

Grossesse et allaitement :

Le Paracétamol, dans les conditions normales d'utilisation, peut être utilisé pendant la grossesse ainsi qu'en cas d'allaitement.

Doliprane® 1000 mg

PARACÉTAMOL

10 comprimés



6 118000 040972



PPV: 14DH00

PER: 10/25

LOT: L3548

Doliprane®

PARACETAMOL

DOLIPRANE® 1000 mg, comprimé :

La substance active est : paracétamol 1000 mg, souffre (1111,11 mg), pour un comprimé.

Les autres composants sont : croscarmellose sodique, maïs prégelatinisé, acide stéarique (origine végétale).

QU'EST -CE QUE DOLIPRANE® 1000 mg, COMPRIMÉ ?

Ce médicament contient du paracétamol. Il est indiqué dans les cas suivants : douleurs de tête, états grippaux, douleurs dentaires, rhumatismes, tendinites, douleurs articulaires, douleurs de l'arthrose.

Cette présentation est réservée à l'adulte (à partir de 15 ans) :

Lire attentivement la rubrique "Posologie".

Pour les enfants de moins de 15 ans, il existe d'autres présentations de paracétamol. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

QUELLES SONT LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT DE PRENDRE DOLIPRANE® 1000 mg, COMPRIMÉ ?

Contre-indications :

Ne pas prendre DOLIPRANE® 1000 mg, comprimé dans les cas suivants : allergie connue au paracétamol, maladie grave du foie, enfant de moins de 15 ans.

PRENDRE DES PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES AVEC DOLIPRANE® 1000 mg, COMPRIMÉ :

Précautions Particulières :

Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours ou en cas d'efficacité insuffisante ou de survenue de tout autre signe, ne pas continuer le traitement sans l'avis de votre médecin.

En cas de maladie grave du foie ou des reins, il est nécessaire de consulter votre médecin avant de prendre du paracétamol.

Mises en garde :

En cas de surdosage ou de prise par erreur d'une dose trop élevée, consultez immédiatement votre médecin.

Ce médicament contient du paracétamol. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée (cf. chapitre "Posologie").

Grossesse et allaitement :

Le Paracétamol, dans les conditions normales d'utilisation, peut être utilisé pendant la grossesse ainsi qu'en cas d'allaitement.

Doliprane® 1000 mg

PARACÉTAMOL

10 comprimés



6 118000 040972



ESIDREX® 25 mg, Comprimés sécables, Boîte de Hydrochlorothiazide

Pour les médicaments soumis à la prescription médicale :
Veuillez lire attentivement l'information suivante avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour vous.

* Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

* Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes, pour qu'il ne soit pas nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

* Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Que contient cette notice :

2. Qu'est-ce que l'ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables et dans quels cas est-il utilisé ?

3. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre l'ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

4. Comment prendre l'ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

5. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

6. Comment conserver l'ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

7. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE L'ESIDREX® 25 mg, COMPRIMÉS SÉCABLES ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

* Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :
ESIDREX appartient à une classe de médicaments appelée diurétiques thiazidiques. Ce médicament augmente la quantité d'eau éliminée par les urines.

(Code ATC : C03AA03)

* Indications thérapeutiques :

• Ce médicament est utilisé :

- Pour traiter des gonflements (ou œdèmes).

- Pour traiter une tension artérielle élevée. Dans ce cas il peut être prescrit seul ou en association avec un autre médicament.

2. COMMENT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE L'ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

* Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

* Conseils d'utilisation :

• Si vous prenez l'ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active (Hydrochlorothiazide) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

- Si vous êtes incapable d'uriner (présentez une anurie),

- Si vous avez une insuffisance rénale sévère,

- Si vous êtes allergique (hypersensible) au blé, en raison de la présence d'amidon de blé.

Si vous êtes dans une des situations décrites ci-dessus, prévenez votre médecin avant de prendre l'ESIDREX® 25 mg, comprimé sécable.

* Informations supplémentaires d'emploi :

Faites attention avec l'ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables :

Avant de prendre le traitement, prévenez votre médecin :

* Si vous avez une maladie grave des reins ou du foie.

* Si vous présentez une sténose de l'artère rénale (rétrécissement des vaisseaux sanguins irriguant les deux reins) ou un accident vasculaire cérébral.

* Si vous prenez un sirop contenant du sucre dans le sang).

* Votre taux sanguin de cholestérol ou de triglycérides est élevé.

* Si vous avez ou avez déjà eu une maladie appelée "lupus erythémateux" (appelée également "lupus" ou "LED").

* Si votre taux sanguin de potassium est trop bas (avec ou sans symptômes tels qu'une faiblesse musculaire, des spasmes musculaires ou un rythme cardiaque abnormal).

* Si votre taux sanguin de sodium est trop bas (avec ou sans symptômes tels de la fatigue, un état confusionnel, des contractions musculaires ou des convulsions).

* Si votre taux sanguin de calcium est élevé (avec ou sans symptômes tels que des nausées, des vomissements, une constipation, des douleurs à l'estomac, une envie d'uriner, une sensation de soif, une faiblesse musculaire ou des contractions musculaires).

* Si vous souffrez de crises de goutte (cristaux d'acide urique dans les articulations).

* Si vous ressentez une douleur dans l'œil ou une baisse de la vision. Ce pourrait être les symptômes d'une augmentation de la pression dans l'œil qui peuvent survier quelques semaines après la prise d'ESIDREX. Ceci peut entraîner des troubles permanents de la vision, en absence de traitement.

* Si vous souffrez d'allergie ou d'asthme.

* Si vous présentez des réactions cutanées telles qu'une éruption après une exposition au soleil.

* Si vous prenez tout autre médicament.

* Vous êtes enceinte ou désirez débuter une grossesse.

Exposition au soleil ou aux UV

Si vous avez déjà eu des réactions au soleil à cause de ce médicament et que votre médecin a souhaité poursuivre le traitement, vous devez protéger votre peau des rayons du soleil et des UV. Utilisez un préparatif solaire (protection solaire) contenant

Ce médicament contient du Li qui peuvent présenter un risque de malabsorption du syndrome de malabsorption du râres.

Ce médicament peut être ad d'absorption du gluten par l'intestin seullement ou de lait de trace, et est susceptible d'une malabsorption.

3. COMMENT PRENDRE ESIDREX

* Instruction pour un bon usage

Posologie et mode d'administration

Veuillez à toujours prendre ce médicament avec votre médecin ou pharmacien.

Vérifiez auprès de votre médecin

Posologie

Veuillez à toujours prendre ce méde cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien e

Edème

La dose habituelle en début de i

votre médecin peut décider de l

La dose sera ensuite réduite à

Hypertension artérielle.

La dose recommandée est de 1/2 à 1 comprimé

ML N° 90/18 par jour.

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin.

Mode d'administration

Ce médicament est à prendre par voie orale.

Avec ou sans aliments (s) sécable(s) avec un verre d'eau.

Fréquence d'administration

Ce médicament a un effet diurétique (c'est-à-dire que vous allez uriner plus souvent).

Compte tenu de cet effet, il est préférable de ne pas prendre la dernière dose tard dans la journée, afin d'éviter d'éventuels réveils la nuit.

Si vous devez prendre vos comprimés sécables en une seule fois, prenez le(s) le matin.

Durée du traitement

Votre médecin vous dira pendant combien de temps vous devez utiliser ce médicament.

Votre médecin fera régulièrement des contrôles afin de s'assurer que le traitement n'a pas d'effets atrophiés.

Si vous avez des questions sur la durée du traitement, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage :

Si vous avez pris plus de l'ESIDREX 25 mg, comprimé sécable que vous n'auriez

eu intention de prendre, consultez immédiatement votre médecin ou les urgences si vous ressentez des nausées, une somnolence, des contractions musculaires, des troubles du rythme cardiaque (arythmie cardiaque), une tension artérielle basse (reconnaisable par des vertiges), un état confusionnel ou des troubles urinaires.

Si vous avez dû prendre une dose trop forte, arrêtez immédiatement le traitement.

Même et continuez votre traitement normalement. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre l'ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

N'arrêtez pas de prendre l'ESIDREX 25 mg sauf si votre médecin vous le demande. Si vous

arrêtez de prendre l'ESIDREX 25 mg, votre tension artérielle ne sera plus contrôlée (voir aussi le paragraphe "Durée du traitement").

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Effets nécessitant l'arrêt du traitement

Vous devez interrompre le traitement et consulter un médecin ou les urgences

Effets indésirables très fréquents (peuvent affecter plus de 1 patient sur 10) :

* Aggravation de la maladie de l'œil (hypertonie oculaire).

* Diminution du taux de potassium dans le sang (hypopotasémie).

* Aggravation de la maladie de l'œil (hypertonie oculaire).

Effets indésirables fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 patient sur 10) :

* Eruption cutanée avec démangeaisons (urticaire) et autres formes d'éruptions cutanées.

* Troubles d'appétit, nausées, vomissements, diarrhées.

* Crute de la pression artérielle lors du passage de la position allongée à debout.

* Incapacité à obtenir ou à maintenir une érection (impotence).

* Diminution du taux de magnésium dans le sang (hypomagnésémie).

* Aggravation de la maladie de l'œil (hypertonie oculaire).

Effets indésirables peu fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 patient sur 100) :

* Insuffisance rénale aigüe (diminution importante du débit urinaire).

Effets indésirables rares (peuvent affecter jusqu'à 1 patient sur 1000) :

* Aggravation d'un diabète.

* Sensibilité augmentée de la peau au soleil.

* Aggravation d'une maladie cardiaque (maladie coronarienne).

ESIDREX 25 mg
Hydrochlorothiazide
20 comprimés sécables



6 118000 181194

PPV :

Exp :

N° Lot :

30,60

ESIDREX® 25 mg, Comprimés sécables, Boîte de Hydrochlorothiazide

Pour les médicaments soumis à la prescription médicale :
Veuillez lire attentivement l'information suivante avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour vous.

* Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

* Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes, pour qu'il ne soit pas nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

* Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Que contient cette notice :

2. Qu'est-ce que l'ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables et dans quels cas est-il utilisé ?

3. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre l'ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

4. Comment prendre l'ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

5. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

6. Comment conserver l'ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

7. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE L'ESIDREX® 25 mg, COMPRIMÉS SÉCABLES ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

* Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :
ESIDREX appartient à une classe de médicaments appelée diurétiques thiazidiques. Ce médicament augmente la quantité d'eau éliminée par les urines.

(Code ATC : C03AA03)

* Indications thérapeutiques :

• Ce médicament est utilisé :

- Pour traiter des gonflements (ou œdèmes).

- Pour traiter une tension artérielle élevée. Dans ce cas il peut être prescrit seul ou en association avec un autre médicament.

2. COMMENT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE L'ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

* Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

* Conseils d'utilisation :

• Si vous prenez l'ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active (Hydrochlorothiazide) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

- Si vous êtes incapable d'uriner (présentez une anurie),

- Si vous avez une insuffisance rénale sévère,

- Si vous êtes allergique (hypersensible) au blé, en raison de la présence d'amidon de blé.

Si vous êtes dans une des situations décrites ci-dessus, prévenez votre médecin avant de prendre l'ESIDREX® 25 mg, comprimé sécable.

* Informations supplémentaires d'emploi :

Faites attention avec l'ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables :

Avant de prendre le traitement, prévenez votre médecin :

* Si vous avez une maladie grave des reins ou du foie.

* Si vous présentez une sténose de l'artère rénale (rétrécissement des vaisseaux sanguins irriguant les deux reins) ou un accident vasculaire cérébral.

* Si vous prenez un sirop contenant du sucre dans le sang).

* Votre taux sanguin de cholestérol ou de triglycérides est élevé.

* Si vous avez ou avez déjà eu une maladie appelée "lupus erythémateux" (appelée également "lupus" ou "LED").

* Si votre taux sanguin de potassium est trop bas (avec ou sans symptômes tels qu'une faiblesse musculaire, des spasmes musculaires ou un rythme cardiaque abnormal).

* Si votre taux sanguin de sodium est trop bas (avec ou sans symptômes tels de la fatigue, un état confusionnel, des contractions musculaires ou des convulsions).

* Si votre taux sanguin de calcium est élevé (avec ou sans symptômes tels que des nausées, des vomissements, une constipation, des douleurs à l'estomac, une envie d'uriner, une sensation de soif, une faiblesse musculaire ou des contractions musculaires).

* Si vous souffrez de crises de goutte (cristaux d'acide urique dans les articulations).

* Si vous ressentez une douleur dans l'œil ou une baisse de la vision. Ce pourrait être les symptômes d'une augmentation de la pression dans l'œil qui peuvent survier quelques semaines après la prise d'ESIDREX. Ceci peut entraîner des troubles permanents de la vision, en absence de traitement.

* Si vous souffrez d'allergie ou d'asthme.

* Si vous présentez des réactions cutanées telles qu'une éruption après une exposition au soleil.

* Si vous prenez tout autre médicament.

* Vous êtes enceinte ou désirez débuter une grossesse.

Exposition au soleil ou aux UV

Si vous avez déjà eu des réactions au soleil à cause de ce médicament et que votre médecin a souhaité poursuivre le traitement, vous devez protéger votre peau des rayons du soleil et des UV. Utilisez un préparatif solaire (protection solaire) contenant

Ce médicament contient du Li qui peuvent présenter un risque de malabsorption du syndrome de malabsorption du râres.

Ce médicament peut être ad d'absorption du gluten par l'intestin seullement ou de lait de trace, et est susceptible d'une malabsorption.

3. COMMENT PRENDRE ESIDREX

* Instruction pour un bon usage

Posologie et mode d'administration

Veuillez à toujours prendre ce médicament avec votre médecin ou pharmacien.

Vérifiez auprès de votre médecin

Posologie

Veuillez à toujours prendre ce méme cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien e

Edème

La dose habituelle en début de i

votre médecin peut décider de l

La dose sera ensuite réduite à

Hypertension artérielle.

La dose recommandée est de 1/2 à 1 comprimé

ML N° 90/18 par jour.

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin.

Mode d'administration

Ce médicament est à prendre par voie orale.

Avec ou sans aliments (s) sécable(s) avec un verre d'eau.

Fréquence d'administration

Ce médicament a un effet diurétique (c'est-à-dire que vous allez uriner plus souvent).

Compte tenu de cet effet, il est préférable de ne pas prendre la dernière dose tard dans la journée, afin d'éviter d'éventuels réveils la nuit.

Si vous devez prendre vos comprimés sécables en une seule fois, prenez le(s) le matin.

Durée du traitement

Votre médecin vous dira pendant combien de temps vous devez utiliser ce médicament.

Votre médecin fera régulièrement des contrôles afin de s'assurer que le traitement n'a pas d'effets atrophiés.

Si vous avez des questions sur la durée du traitement, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage :

Si vous avez pris plus de l'ESIDREX 25 mg, comprimé sécable que vous n'auriez

eu intention de prendre, consultez immédiatement votre médecin ou les urgences si vous ressentez des nausées, une somnolence, des contractions musculaires, des troubles du rythme cardiaque (arythmie cardiaque), une tension artérielle basse (reconnaisable par des vertiges), un état confusionnel ou des troubles urinaires.

Si vous avez dû prendre une dose trop forte, arrêtez immédiatement le traitement.

Même si vous avez pris une dose trop forte, il est généralement possible le jour même et continuez votre traitement normalement. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre l'ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

N'arrêtez pas de prendre l'ESIDREX 25 mg sauf si votre médecin vous le demande. Si vous

arrêtez de prendre l'ESIDREX 25 mg, votre tension artérielle ne sera plus contrôlée (voir aussi le paragraphe "Durée du traitement").

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES ÉVENTUELS ?

Ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Effets nécessitant l'arrêt du traitement

Vous devez interrompre le traitement et consulter un médecin ou les urgences

Effets indésirables très fréquents (peuvent affecter plus de 1 patient sur 10) :

* Aggravation de la maladie de l'œil (hypertonie oculaire).

* Diminution du taux de potassium dans le sang (hypopotasémie).

* Aggravation de la maladie de l'œil (hypertonie oculaire).

* Effets indésirables fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 patient sur 10) :

* Eruption cutanée avec démangeaisons (urticaire) et autres formes d'éruptions cutanées.

* Troubles d'appétit, nausées, vomissements, diarrhées.

* Crute de la pression artérielle lors du passage de la position allongée à debout.

* Incapacité à obtenir ou à maintenir une érection (impotence).

* Diminution du taux de magnésium dans le sang (hypomagnésémie).

* Aggravation de la maladie de l'œil (hypertonie oculaire).

* Effets indésirables peu fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 patient sur 100) :

* Insuffisance rénale aigüe (diminution importante du débit urinaire).

* Effets indésirables rares (peuvent affecter jusqu'à 1 patient sur 1000) :

* Aggravation d'un diabète.

* Sensibilité augmentée de la peau au soleil.

* Aggravation d'une maladie cardiaque (maladie coronarienne).

ESIDREX 25 mg
Hydrochlorothiazide
20 comprimés sécables



6 118000 181194

PPV :

Exp :

N° Lot :

30,60

ESIDREX® 25 mg, Comprimés sécables, Boîte de Hydrochlorothiazide

Pour les médicaments soumis à la prescription médicale :
Veuillez lire attentivement l'information suivante avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour vous.

* Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

* Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes, pour qu'il ne soit pas nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

* Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Que contient cette notice :

2. Qu'est-ce que l'ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables et dans quels cas est-il utilisé ?

3. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre l'ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

4. Comment prendre l'ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

5. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

6. Comment conserver l'ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

7. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE L'ESIDREX® 25 mg, COMPRIMÉS SÉCABLES ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

* Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :
ESIDREX appartient à une classe de médicaments appelée diurétiques thiazidiques. Ce médicament augmente la quantité d'eau éliminée par les urines.

(Code ATC : C03AA03)

* Indications thérapeutiques :

• Ce médicament est utilisé :

- Pour traiter des gonflements (ou œdèmes).

- Pour traiter une tension artérielle élevée. Dans ce cas il peut être prescrit seul ou en association avec un autre médicament.

2. COMMENT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE L'ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

* Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

* Conseils d'utilisation :

• Si vous prenez l'ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active (Hydrochlorothiazide) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

- Si vous êtes incapable d'uriner (présentez une anurie),

- Si vous avez une insuffisance rénale sévère,

- Si vous êtes allergique (hypersensible) au blé, en raison de la présence d'amidon de blé.

Si vous êtes dans une des situations décrites ci-dessus, prévenez votre médecin avant de prendre l'ESIDREX® 25 mg, comprimé sécable.

* Informations supplémentaires d'emploi :

Faites attention avec l'ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables :

Avant de prendre le traitement, prévenez votre médecin :

* Si vous avez une maladie grave des reins ou du foie.

* Si vous présentez une sténose de l'artère rénale (rétrécissement des vaisseaux sanguins irriguant les deux reins) ou un accident vasculaire cérébral (AVC).

* Si vous prenez un sirop contenant du sucre dans le sang),

* Votre taux sanguin de cholestérol ou de triglycérides est élevé.

* Si vous avez ou avez déjà eu une maladie appelée "lupus erythémateux" (appelée également "lupus" ou "LED").

* Si votre taux sanguin de potassium est trop bas (avec ou sans symptômes tels qu'une faiblesse musculaire, des spasmes musculaires ou un rythme cardiaque abnormal).

* Si votre taux sanguin de sodium est trop bas (avec ou sans symptômes tels de la fatigue, un état confusionnel, des contractions musculaires ou des convulsions).

* Si votre taux sanguin de calcium est élevé (avec ou sans symptômes tels que des nausées, des vomissements, une constipation, des douleurs à l'estomac, une envie d'uriner, une sensation de soif, une faiblesse musculaire ou des contractions musculaires).

* Si vous souffrez de crises de goutte (cristaux d'acide urique dans les articulations).

* Si vous ressentez une douleur dans l'œil ou une baisse de la vision. Ce pourrait être les symptômes d'une augmentation de la pression dans l'œil qui peuvent survier quelques semaines après la prise d'ESIDREX. Ceci peut entraîner des troubles permanents de la vision, en absence de traitement.

* Si vous souffrez d'allergie ou d'asthme.

* Si vous présentez des réactions cutanées telles qu'une éruption après une exposition au soleil.

* Si vous prenez tout autre médicament.

* Vous êtes enceinte ou désirez débuter une grossesse.

Exposition au soleil ou aux UV

Si vous avez déjà eu des réactions au soleil à cause de ce médicament et que votre médecin a souhaité poursuivre le traitement, vous devez protéger votre peau des rayons du soleil et éviter les exposés solaires excessifs.

Ce médicament contient du Li qui peuvent présenter un risque de malabsorption du syndrome de malabsorption du rânes.

Ce médicament peut être ad d'absorption du gluten par l'intestin seullement ou de lait de trace, et est susceptible d'une malabsorption.

3. COMMENT PRENDRE ESIDREX

* Instruction pour un bon usage

Posologie et mode d'administration

Veuillez à toujours prendre ce médicament avec votre médecin ou pharmacien.

Vérifiez auprès de votre médecin

* Posologie

Veuillez à toujours prendre ce mérite notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien e

* Edème

La dose habituelle en début de i

votre médecin peut décider de l

La dose sera ensuite réduite à

Hypertension artérielle.

La dose recommandée est de 1/2 à 1 comprimé

ml N° 90/18 par jour.

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin en cas de doute.

* Mode d'administration

Ce médicament est à prendre par voie orale.

Avec ou sans aliments (s) sécable(s) avec un verre d'eau.

* Fréquence d'administration

Ce médicament a un effet diurétique (c'est-à-dire que vous allez uriner plus souvent).

Compte tenu de cet effet, il est préférable de ne pas prendre la dernière dose tard dans la journée, afin d'éviter d'éventuels réveils la nuit.

Si vous devez prendre vos comprimés sécables en une seule fois, prenez le(s) le matin.

* Durée du traitement

Votre médecin vous dira pendant combien de temps vous devez utiliser ce médicament.

Votre médecin fera régulièrement des contrôles afin de s'assurer que le traitement n'a pas d'effets atrophiés.

* Si vous avez des questions sur la durée du traitement, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

* Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage :

Si vous avez pris plus de l'ESIDREX 25 mg, comprimé sécable que vous n'auriez

eu intention de prendre, consultez immédiatement votre médecin ou les urgences si vous ressentez des nausées, une somnolence, des contractions musculaires, des troubles du rythme cardiaque (arythmie cardiaque), une tension artérielle basse (reconnaisable par des vertiges), un état confusionnel ou des troubles urinaires.

* Conseils à tenir en cas d'interrompre le traitement ou de plusieurs doses :

Si vous continuez de prendre une dose quotidienne, il est généralement possible le jour même et continuer votre traitement normalement. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

* Si vous arrêtez de prendre l'ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

N'arrêtez pas de prendre ESIDREX 25 mg sauf si votre médecin vous le demande. Si vous interrompez votre traitement, la tension artérielle ne sera plus contrôlée (voir aussi le paragraphe "Durée du traitement").

* Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

* Effets nécessitant l'arrêt du traitement

Vous devez interrompre le traitement et consulter un médecin ou les urgences

* Effets indésirables très fréquents (peuvent affecter plus de 1 patient sur 10) :

• Aggravation de l'acidose (hypokaliémie).

• Diminution du taux de potassium dans le sang (hypopotasémie).

• Aggravation de l'acidose (hyperventilation).

* Effets indésirables fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 patient sur 10) :

• Eruption cutanée avec démangeaisons (urticaire) et autres formes d'éruptions cutanées.

• Troubles d'appétit, nausées, vomissements, diarrhées.

• Crise de la pression artérielle lors du passage de la position allongée à debout.

• Incapacité à obtenir ou à maintenir une érection (impotissance).

• Diminution du taux de magnésium dans le sang (hypomagnésémie).

• Aggravation de l'acidose (hyperventilation).

* Effets indésirables peu fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 patient sur 100) :

• Insuffisance rénale aigüe (diminution importante du débit urinaire).

* Effets indésirables rares (peuvent affecter jusqu'à 1 patient sur 1000) :

• Aggravation d'un diabète.

• Sensibilité augmentée de la peau au soleil.

• Aggravation d'une maladie cardiaque (hypertension artérielle).

ESIDREX 25 mg
Hydrochlorothiazide
20 comprimés sécables



ML N° 90/18 par jour.

6 118000 181194

ESIDREX® 25 mg, Comprimés sécables, Boîte de Hydrochlorothiazide

Pour les médicaments soumis à la prescription médicale :
Veuillez lire attentivement l'information suivante avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour vous.

* Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

* Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes, pour qu'il ne soit pas nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

* Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Que contient cette notice :

2. Qu'est-ce que l'ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables et dans quels cas est-il utilisé ?

3. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre l'ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

4. Comment prendre l'ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

5. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

6. Comment conserver l'ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

7. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE L'ESIDREX® 25 mg, COMPRIMÉS SÉCABLES ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

* Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :
ESIDREX appartient à une classe de médicaments appelée diurétiques thiazidiques. Ce médicament augmente la quantité d'eau éliminée par les urines.

(Code ATC : C03AA03)

* Indications thérapeutiques :

• Ce médicament est utilisé :

- Pour traiter des gonflements (ou œdèmes).

- Pour traiter une tension artérielle élevée. Dans ce cas il peut être prescrit seul ou en association avec un autre médicament.

2. COMMENT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE L'ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

* Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucrex, contactez-le avant de prendre ce médicament.

* Conseils d'utilisation :

• Si vous prenez l'ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active (Hydrochlorothiazide) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

- Si vous êtes incapable d'uriner (présentez une anurie),

- Si vous avez une insuffisance rénale sévère,

- Si vous êtes allergique (hypersensible) au blé, en raison de la présence d'amidon de blé.

Si vous êtes dans une des situations décrites ci-dessus, prévenez votre médecin avant de prendre l'ESIDREX® 25 mg, comprimé sécable.

* Informations supplémentaires d'emploi :

Faites attention avec l'ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables :

Avant de prendre le traitement, prévenez votre médecin :

* Si vous avez une maladie grave des reins ou du foie.

* Si vous présentez une sténose de l'artère rénale (rétrécissement des vaisseaux sanguins irriguant les deux reins) ou un accident vasculaire cérébral.

* Si vous prenez un sirop contenant du sucre dans le sang).

* Votre taux sanguin de cholestérol ou de triglycérides est élevé.

* Si vous avez ou avez déjà eu une maladie appelée "lupus erythémateux" (appelée également "lupus" ou "LED").

* Si votre taux sanguin de potassium est trop bas (avec ou sans symptômes tels qu'une faiblesse musculaire, des spasmes musculaires ou un rythme cardiaque abnormal).

* Si votre taux sanguin de sodium est trop bas (avec ou sans symptômes tels de la fatigue, un état confusionnel, des contractions musculaires ou des convulsions).

* Si votre taux sanguin de calcium est élevé (avec ou sans symptômes tels que des nausées, des vomissements, une constipation, des douleurs à l'estomac, une envie d'uriner, une sensation de soif, une faiblesse musculaire ou des contractions musculaires).

* Si vous souffrez de crises de goutte (cristaux d'acide urique dans les articulations).

* Si vous ressentez une douleur dans l'œil ou une baisse de la vision. Ce pourrait être les symptômes d'une augmentation de la pression dans l'œil qui peuvent survier quelques semaines après la prise d'ESIDREX. Ceci peut entraîner des troubles permanents de la vision, en absence de traitement.

* Si vous souffrez d'allergie ou d'asthme.

* Si vous présentez des réactions cutanées telles qu'une éruption après une exposition au soleil.

* Si vous prenez tout autre médicament.

* Vous êtes enceinte ou désirez débuter une grossesse.

Exposition au soleil ou aux UV

Si vous avez déjà eu des réactions au soleil à cause de ce médicament et que votre médecin a souhaité poursuivre le traitement, vous devez protéger votre peau des rayons du soleil et des UV. Utilisez un préparatif solaire (protection solaire) contenant

Ce médicament contient du Li qui peuvent présenter un risque de malabsorption du syndrome de malabsorption du râres.

Ce médicament peut être ad d'absorption du gluten par l'intestin seullement ou de lait de trace, et est susceptible d'une malabsorption.

3. COMMENT PRENDRE ESIDREX

* Instruction pour un bon usage

Posologie et mode d'administration

Veuillez à toujours prendre ce médicament avec votre médecin ou pharmacien.

Vérifiez auprès de votre médecin

Posologie

Veuillez à toujours prendre ce méde cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien e

Edème

La dose habituelle en début de i

votre médecin peut décider de l

La dose sera ensuite réduite à

Hypertension artérielle.

La dose recommandée est de 1/2 à 1 comprimé

ML N° 90/18 par jour.

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin.

Mode d'administration

Ce médicament est à prendre par voie orale.

Avec ou sans aliments (s) sécable(s) avec un verre d'eau.

Fréquence d'administration

Ce médicament a un effet diurétique (c'est-à-dire que vous allez uriner plus souvent).

Compte tenu de cet effet, il est préférable de ne pas prendre la dernière dose tard dans la journée, afin d'éviter d'éventuels réveils la nuit.

Si vous devez prendre vos comprimés sécables en une seule fois, prenez le(s) le matin.

Durée du traitement

Votre médecin vous dira pendant combien de temps vous devez utiliser ce médicament.

Votre médecin fera régulièrement des contrôles afin de s'assurer que le traitement n'a pas d'effets atrophiés.

Si vous avez des questions sur la durée du traitement, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage :

Si vous avez pris plus de l'ESIDREX 25 mg, comprimé sécable que vous n'auriez

eu intention de prendre, consultez immédiatement votre médecin ou les urgences si vous ressentez des nausées, une somnolence, des contractions musculaires, des troubles du rythme cardiaque (arythmie cardiaque), une tension artérielle basse (reconnaisable par des vertiges), un état confusionnel ou des troubles urinaires.

Si vous avez dû prendre une dose supérieure à celle recommandée, mais que cela n'a pas entraîné de surdosage, continuez à prendre le médicament comme il a été recommandé.

Même si vous avez pris une dose supérieure à celle recommandée, mais que cela n'a pas entraîné de surdosage, continuez à prendre le médicament comme il a été recommandé.

Si vous avez吞é l'ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

N'arrêtez pas de prendre l'ESIDREX 25 mg sauf si votre médecin vous le demande. Si vous n'arrêtez pas de prendre l'ESIDREX 25 mg, votre tension artérielle ne sera plus contrôlée (voir aussi le paragraphe "Durée du traitement").

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Effets nécessitant l'arrêt du traitement

Vous devez interrompre le traitement et consulter un médecin ou les urgences

Effets indésirables très fréquents (peuvent affecter plus de 1 patient sur 10) :

* Aggravation de la maladie de l'œil (hypertonie oculaire).

* Diminution du taux de potassium dans le sang (hypopotasémie).

* Aggravation de la maladie de l'œil (hypertonie oculaire).

Effets indésirables fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 patient sur 10) :

* Eruption cutanée avec démangeaisons (urticaire) et autres formes d'éruptions cutanées.

* Troubles d'appétit, nausées, vomissements, diarrhées.

* Crute de la pression artérielle lors du passage de la position assise à debout.

* Incapacité à obtenir ou à maintenir une érection (impotence).

* Diminution du taux de magnésium dans le sang (hypomagnésémie).

* Aggravation de la maladie de l'œil (hypertonie oculaire).

Effets indésirables peu fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 patient sur 100) :

* Insuffisance rénale aigüe (diminution importante du débit urinaire).

Effets indésirables rares (peuvent affecter jusqu'à 1 patient sur 1000) :

* Aggravation d'un diabète.

* Sensibilité augmentée de la peau au soleil.

* Aggravation d'une maladie cardiaque (maladie coronarienne).

ESIDREX 25 mg
Hydrochlorothiazide
20 comprimés sécables



ML N° 90/18

6 118000 181194

ESIDREX® 25 mg, Comprimés sécables, Boîte de Hydrochlorothiazide

Pour les médicaments soumis à la prescription médicale :
Veuillez lire attentivement l'information suivante avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour vous.

* Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

* Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes, pour qu'il ne soit pas nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

* Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Que contient cette notice :

2. Qu'est-ce que l'ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables et dans quels cas est-il utilisé ?

3. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre l'ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

4. Comment prendre l'ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

5. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

6. Comment conserver l'ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

7. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE L'ESIDREX® 25 mg, COMPRIMÉS SÉCABLES ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

* Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :
ESIDREX appartient à une classe de médicaments appelée diurétiques thiazidiques. Ce médicament augmente la quantité d'eau éliminée par les urines.

(Code ATC : C03AA03)

* Indications thérapeutiques :

• Ce médicament est utilisé :

- Pour traiter des gonflements (ou œdèmes).

- Pour traiter une tension artérielle élevée. Dans ce cas il peut être prescrit seul ou en association avec un autre médicament.

2. COMMENT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE L'ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

* Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

* Conseils d'utilisation :

• Si vous prenez l'ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active (Hydrochlorothiazide) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

- Si vous êtes incapable d'uriner (présentez une anurie),

- Si vous avez une insuffisance rénale sévère,

- Si vous êtes allergique (hypersensible) au blé, en raison de la présence d'amidon de blé.

Si vous êtes dans une des situations décrites ci-dessus, prévenez votre médecin avant de prendre l'ESIDREX® 25 mg, comprimé sécable.

* Informations supplémentaires d'emploi :

Faites attention avec l'ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables :

Avant de prendre le traitement, prévenez votre médecin :

* Si vous avez une maladie grave des reins ou du foie.

* Si vous présentez une sténose de l'artère rénale (rétrécissement des vaisseaux sanguins irriguant les deux reins) ou un accident vasculaire cérébral.

* Si vous prenez un sirop contenant du sucre dans le sang).

* Votre taux sanguin de cholestérol ou de triglycérides est élevé.

* Si vous avez ou avez déjà eu une maladie appelée "lupus erythémateux" (appelée également "lupus" ou "LED").

* Si votre taux sanguin de potassium est trop bas (avec ou sans symptômes tels qu'une faiblesse musculaire, des spasmes musculaires ou un rythme cardiaque abnormal).

* Si votre taux sanguin de sodium est trop bas (avec ou sans symptômes tels de la fatigue, un état confusionnel, des contractions musculaires ou des convulsions).

* Si votre taux sanguin de calcium est élevé (avec ou sans symptômes tels que des nausées, des vomissements, une constipation, des douleurs à l'estomac, une envie d'uriner, une sensation de soif, une faiblesse musculaire ou des contractions musculaires).

* Si vous souffrez de crises de goutte (cristaux d'acide urique dans les articulations).

* Si vous ressentez une douleur dans l'œil ou une baisse de la vision. Ce pourrait être les symptômes d'une augmentation de la pression dans l'œil qui peuvent survier quelques semaines après la prise d'ESIDREX. Ceci peut entraîner des troubles permanents de la vision, en absence de traitement.

* Si vous souffrez d'allergie ou d'asthme.

* Si vous présentez des réactions cutanées telles qu'une éruption après une exposition au soleil.

* Si vous prenez tout autre médicament.

* Vous êtes enceinte ou désirez débuter une grossesse.

* Exposition au soleil ou aux UV.

Si vous avez déjà eu des réactions au soleil à cause de ce médicament et que votre médecin a souhaité poursuivre le traitement, vous devez protéger votre peau des rayons du soleil et utiliser un préparatif solaire (protection solaire) comme recommandé.

Ce médicament contient du Li qui peuvent présenter un risque de malabsorption du syndrome de malabsorption du rânes.

Ce médicament peut être ad d'absorption du gluten par l'intestin seullement ou de lait de trace, et est susceptible d'une malabsorption.

3. COMMENT PRENDRE ESIDREX

* Instruction pour un bon usage

Posologie et mode d'administration

Veuillez à toujours prendre ce médicament avec votre médecin ou pharmacien.

Vérifiez auprès de votre médecin

* Posologie

Veuillez à toujours prendre ce mérite notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien e

* Edème

La dose habituelle en début de i

votre médecin peut décider de l

La dose sera ensuite réduite à

Hypertension artérielle.

La dose recommandée est de 1/2 à 1 comprimé

à prendre 1 fois par jour.

MJ N° 90/18 par jour.

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin en cas de doute.

* Mode d'administration

Ce médicament est à prendre par voie orale.

Avec un verre d'eau ou(s) sécable(s) avec un verre d'eau.

* Fréquence d'administration

Ce médicament a un effet diurétique (c'est-à-dire que vous allez uriner plus souvent).

Compte tenu de cet effet, il est préférable de ne pas prendre la dernière dose tard dans la journée, afin d'éviter d'éventuels réveils la nuit.

S'il vous devez prendre vos comprimés sécables en une seule fois, prenez le(s) le matin.

* Durée du traitement

Votre médecin vous dira pendant combien de temps vous devez utiliser ce médicament.

Votre médecin fera régulièrement des contrôles afin de s'assurer que le traitement n'a pas d'effets atrophiés.

* Si vous avez des questions sur la durée du traitement, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

* Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage :

Si vous avez pris plus de l'ESIDREX 25 mg, comprimé sécable que vous n'auriez

eu intention de prendre.

Consultez immédiatement votre médecin ou les urgences si vous ressentez des nausées, une somnolence, des contractions musculaires, des troubles du rythme cardiaque (arythmie cardiaque), une tension artérielle basse (reconnaisable par des vertiges), un état confusionnel ou des troubles urinaires.

* Conseils à tenir en cas d'interrompre la prise ou de plusieurs doses :

Si vous avez décidé de prendre une dose supplémentaire, il est généralement possible le jour même et continuer votre traitement normalement. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

* Si vous arrêtez de prendre l'ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

N'arrêtez pas de prendre ESIDREX 25 mg sauf si votre médecin vous le demande. Si vous

arrêtez de prendre ESIDREX 25 mg, votre tension artérielle ne sera plus contrôlée (voir aussi le paragraphe "Durée du traitement").

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

* Effets nécessitant l'arrêt du traitement

Vous devez interrompre le traitement et consulter un médecin ou les urgences

* Effets indésirables très fréquents (peuvent affecter plus de 1 patient sur 10) :

• Aggravation de la maladie de l'œil (hypertonie oculaire).

• Diminution du taux de potassium dans le sang (hypopotasémie).

• Aggravation de la maladie de l'œil (hypertonie oculaire).

* Effets indésirables fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 patient sur 10) :

• Eruption cutanée avec démangeaisons (urticaire) et autres formes d'éruptions cutanées.

• Troubles d'appétit, nausées, vomissements, diarrhées.

• Crise de la pression artérielle lors du passage de la position allongée à debout.

• Incapacité à obtenir ou à maintenir une érection (impotence).

• Diminution du taux de magnésium dans le sang (hypomagnésémie).

• Aggravation de la maladie de l'œil (hypertonie oculaire).

* Effets indésirables peu fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 patient sur 100) :

• Insuffisance rénale aigüe (diminution importante du débit urinaire).

* Effets indésirables rares (peuvent affecter jusqu'à 1 patient sur 1000) :

• Aggravation d'un diabète.

• Sensibilité augmentée de la peau au soleil.

• Aggravation d'une maladie cardiaque (maladie coronarienne).

ESIDREX 25 mg
Hydrochlorothiazide
20 comprimés sécables



6 118000 181194

ESIDREX® 25 mg, Comprimés sécables, Boîte de Hydrochlorothiazide

Pour les médicaments soumis à la prescription médicale :
Veuillez lire attentivement l'information suivante avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour vous.

* Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

* Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes, pour qu'il ne soit pas nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

* Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Que contient cette notice :

2. Qu'est-ce que l'ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables et dans quels cas est-il utilisé ?

3. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre l'ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

4. Comment prendre l'ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

5. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

6. Comment conserver l'ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

7. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE L'ESIDREX® 25 mg, COMPRIMÉS SÉCABLES ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

* Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :
ESIDREX appartient à une classe de médicaments appelée diurétiques thiazidiques. Ce médicament augmente la quantité d'eau éliminée par les urines.

(Code ATC : C03AA03)

* Indications thérapeutiques :

• Ce médicament est utilisé :

- Pour traiter des gonflements (ou œdèmes).

- Pour traiter une tension artérielle élevée. Dans ce cas il peut être prescrit seul ou en association avec un autre médicament.

2. COMMENT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE L'ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

* Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucrex, contactez-le avant de prendre ce médicament.

* Conseils d'utilisation :

• Si vous prenez l'ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active (Hydrochlorothiazide) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

- Si vous êtes incapable d'uriner (présentez une anurie),

- Si vous avez une insuffisance rénale sévère,

- Si vous êtes allergique (hypersensible) au blé, en raison de la présence d'amidon de blé.

Si vous êtes dans une des situations décrites ci-dessus, prévenez votre médecin avant de prendre l'ESIDREX® 25 mg, comprimé sécable.

* Informations supplémentaires d'emploi :

Faites attention avec l'ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables :

Avant de prendre le traitement, prévenez votre médecin :

* Si vous avez une maladie grave des reins ou du foie.

* Si vous présentez une sténose de l'artère rénale (rétrécissement des vaisseaux sanguins irriguant les deux reins) ou un accident vasculaire cérébral.

* Si vous prenez un sirop contenant du sucre dans le sang).

* Votre taux sanguin de cholestérol ou de triglycérides est élevé.

* Si vous avez ou avez déjà eu une maladie appelée "lupus erythémateux" (appelée également "lupus" ou "LED").

* Si votre taux sanguin de potassium est trop bas (avec ou sans symptômes tels qu'une faiblesse musculaire, des spasmes musculaires ou un rythme cardiaque abnormal).

* Si votre taux sanguin de sodium est trop bas (avec ou sans symptômes tels de la fatigue, un état confusionnel, des contractions musculaires ou des convulsions).

* Si votre taux sanguin de calcium est élevé (avec ou sans symptômes tels que des nausées, des vomissements, une constipation, des douleurs à l'estomac, une envie d'uriner, une sensation de soif, une faiblesse musculaire ou des contractions musculaires).

* Si vous souffrez de crises de goutte (cristaux d'acide urique dans les articulations).

* Si vous ressentez une douleur dans l'œil ou une baisse de la vision. Ce pourrait être les symptômes d'une augmentation de la pression dans l'œil qui peuvent survier quelques semaines après la prise d'ESIDREX. Ceci peut entraîner des troubles permanents de la vision, en absence de traitement.

* Si vous souffrez d'allergie ou d'asthme.

* Si vous présentez des réactions cutanées telles qu'une éruption après une exposition au soleil.

* Si vous prenez tout autre médicament.

* Vous êtes enceinte ou désirez débuter une grossesse.

Exposition au soleil ou aux UV

Si vous avez déjà eu des réactions au soleil à cause de ce médicament et que votre médecin a souhaité poursuivre le traitement, vous devez protéger votre peau des rayons du soleil et des UV. Utilisez un préparatif solaire (protection solaire) contenant

Ce médicament contient du Li qui peuvent présenter un risque de malabsorption du syndrome de malabsorption du râres.

Ce médicament peut être ad d'absorption du gluten par l'intestin seullement ou de lait de trace, et est susceptible d'une malabsorption.

3. COMMENT PRENDRE ESIDREX

* Instruction pour un bon usage

Posologie et mode d'administration

Veuillez à toujours prendre ce médicament avec votre médecin ou pharmacien.

Vérifiez auprès de votre médecin

* Posologie

Veuillez à toujours prendre ce mérite notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien e

* Edème

La dose habituelle en début de i

votre médecin peut décider de l

La dose sera ensuite réduite à

Hypertension artérielle.

La dose recommandée est de 1/2 à 1 comprimé

à prendre tous les jours.

Le comprimé contient 25 mg de

Hydrochlorothiazide.

Il est recommandé de prendre ce

comprimé avec un verre d'eau.

* Fréquence d'administration

Ce médicament a un effet diurétique (c'est-à-dire que vous allez uriner plus souvent).

Compte tenu de cet effet, il est préférable de ne pas prendre la dernière dose tard

dans la journée, afin d'éviter d'éventuels réveils la nuit.

Si vous devez prendre vos comprimés sécables en une seule fois, prenez le(s) le matin.

* Durée du traitement

Votre médecin vous dira pendant combien de temps vous devez utiliser ce médicament.

Votre médecin fera régulièrement des contrôles afin de s'assurer que le traitement n'a pas d'effets atrophiés.

Si vous avez des questions sur la durée du traitement, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

* Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage :

Si vous avez pris plus de l'ESIDREX 25 mg, comprimé sécable que vous n'auriez

eu intention de prendre.

Consultez immédiatement votre médecin ou les urgences si vous ressentez des

nausées, une somnolence, des contractions musculaires, des troubles du rythme

cardiaque (arythmie cardiaque), une tension artérielle basse (reconnaissable par des

coups), ou à tenir en cas d'ingestion d'une ou de plusieurs doses :

Si vous avez décidé de prendre une dose supplémentaire, mais seulement possible le jour

même et continuez votre traitement normalement. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

* Si vous arrêtez de prendre l'ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

N'arrêtez pas de prendre ESIDREX 25 mg sauf si votre médecin vous le demande. Si vous

arrêtez de prendre ESIDREX 25 mg, votre tension artérielle ne sera plus contrôlée (voir aussi le

paragraphe "Durée du traitement").

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus

d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

* Effets nécessitant l'arrêt du traitement

Vous devez interrompre le traitement et consulter un médecin ou les urgences

médicales si vous faites une réaction aux rayons du soleil (réaction sur la peau).

* Effets indésirables très fréquents (peuvent affecter plus de 1 patient sur 10) :

• Aggravation de la maladie de l'œil (hypertonie oculaire).

• Diminution du taux de potassium dans le sang (hypopotasémie).

• Aggravation de la maladie de l'œil (hypertonie oculaire).

* Effets indésirables fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 patient sur 10) :

• Eruption cutanée avec démangeaisons (urticaire) et autres formes d'éruptions cutanées.

• Troubles d'appétit, nausées, vomissements, diarrhées.

• Crute de la pression artérielle lors du passage de la position allongée à debout.

• Incapacité à obtenir ou à maintenir une érection (impotissance).

• Diminution du taux de magnésium dans le sang (hypomagnésémie).

• Aggravation de la maladie de l'œil (hypertonie oculaire).

* Effets indésirables peu fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 patient sur 100) :

• Insuffisance rénale aigüe (diminution importante du débit urinaire).

* Effets indésirables rares (peuvent affecter jusqu'à 1 patient sur 1000) :

• Aggravation d'un diabète.

• Sensibilité augmentée de la peau au soleil.

• Aggravation d'une maladie cardiaque.

PPV :

Exp :

N° Lot :

ESIDREX 25 mg
Hydrochlorothiazide
20 comprimés sécables



6 118000 181194

INN N° 90/18 par jour.

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin en cas de doute.

* Mode d'administration

Ce médicament est à prendre par voie orale.

Ajoutez du jus de citron à votre comprimé(s) avec un verre d'eau.

* Fréquence d'administration

Ce médicament a un effet diurétique (c'est-à-dire que vous allez uriner plus souvent).

Compte tenu de cet effet, il est préférable de ne pas prendre la dernière dose tard

dans la journée, afin d'éviter d'éventuels réveils la nuit.

Si vous devez prendre vos comprimés sécables en une seule fois, prenez le(s) le matin.

* Durée du traitement

Votre médecin vous dira pendant combien de temps vous devez utiliser ce médicament.

Votre médecin fera régulièrement des contrôles afin de s'assurer que le traitement

n'a pas d'effets atrophiés.

Si vous avez des questions sur la durée du traitement, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

* Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage :

Si vous avez pris plus de l'ESIDREX 25 mg, comprimé sécable que vous n'auriez

eu intention de prendre.

N'arrêtez pas de prendre ESIDREX 25 mg sauf si votre médecin vous le demande. Si vous

arrêtez de prendre ESIDREX 25 mg, votre tension artérielle ne sera plus contrôlée (voir aussi le

paragraphe "Durée du traitement").

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus

d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

5. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

* Effets nécessitant l'arrêt du traitement

Vous devez interrompre le traitement et consulter un médecin ou les urgences

médicales si vous faites une réaction aux rayons du soleil (réaction sur la peau).

* Effets indésirables très fréquents (peuvent affecter plus de 1 patient sur 10) :

• Aggravation de la maladie de l'œil (hypertonie oculaire).

• Diminution du taux de potassium dans le sang (hypopotasémie).

• Aggravation de la maladie de l'œil (hypertonie oculaire).

* Effets indésirables fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 patient sur 10) :

• Eruption cutanée avec démangeaisons (urticaire) et autres formes d'éruptions

cutanées.

• Troubles d'appétit, nausées, vomissements, diarrhées.

• Crute de la pression artérielle lors du passage de la position allongée à debout.

• Incapacité à obtenir ou à maintenir une érection (impotence).

• Diminution du taux de magnésium dans le sang (hypomagnésémie).

• Aggravation de la maladie de l'œil (hypertonie oculaire).

* Effets indésirables peu fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 patient sur 100) :

• Insuffisance rénale aigüe (diminution importante du débit urinaire).

* Effets indésirables rares (peuvent affecter jusqu'à 1 patient sur 1000) :

• Aggravation d'un diabète.

• Sensibilité augmentée de la peau au soleil.

• Aggravation d'une maladie cardiaque.

ESIDREX® 25 mg, Comprimés sécables, Boîte de Hydrochlorothiazide

Pour les médicaments soumis à la prescription médicale :
Veuillez lire attentivement l'information suivante avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour vous.

* Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

* Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes, pour qu'il ne soit pas nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

* Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Que contient cette notice :

2. Qu'est-ce que l'ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables et dans quels cas est-il utilisé ?

3. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre l'ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

4. Comment prendre l'ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

5. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

6. Comment conserver l'ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

7. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE L'ESIDREX® 25 mg, COMPRIMÉS SÉCABLES ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

* Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :
ESIDREX appartient à une classe de médicaments appelée diurétiques thiazidiques. Ce médicament augmente la quantité d'eau éliminée par les urines.

(Code ATC : C03AA03)

* Indications thérapeutiques :

• Ce médicament est utilisé :

- Pour traiter des gonflements (ou œdèmes).

- Pour traiter une tension artérielle élevée. Dans ce cas il peut être prescrit seul ou en association avec un autre médicament.

2. COMMENT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE L'ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

* Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

* Conseils d'utilisation :

• Si vous prenez l'ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active (Hydrochlorothiazide) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

- Si vous êtes incapable d'uriner (présentez une anurie),

- Si vous avez une insuffisance rénale sévère,

- Si vous êtes allergique (hypersensible) au blé, en raison de la présence d'amidon de blé.

Si vous êtes dans une des situations décrites ci-dessus, prévenez votre médecin avant de prendre l'ESIDREX® 25 mg, comprimé sécable.

* Informations supplémentaires d'emploi :

Faites attention avec l'ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables :

Avant de prendre le traitement, prévenez votre médecin :

* Si vous avez une maladie grave des reins ou du foie.

* Si vous présentez une sténose de l'artère rénale (rétrécissement des vaisseaux sanguins irriguant les deux reins) ou un accident vasculaire cérébral (AVC).

* Si vous prenez un sirop contenant du sucre dans le sang),

* Votre taux sanguin de cholestérol ou de triglycérides est élevé.

* Si vous avez ou avez déjà eu une maladie appelée "lupus erythémateux" (appelée également "lupus" ou "LED").

* Si votre taux sanguin de potassium est trop bas (avec ou sans symptômes tels qu'une faiblesse musculaire, des spasmes musculaires ou un rythme cardiaque abnormal).

* Si votre taux sanguin de sodium est trop bas (avec ou sans symptômes tels de la fatigue, un état confusionnel, des contractions musculaires ou des convulsions).

* Si votre taux sanguin de calcium est élevé (avec ou sans symptômes tels que des nausées, des vomissements, une constipation, des douleurs à l'estomac, une envie d'uriner, une sensation de soif, une faiblesse musculaire ou des contractions musculaires).

* Si vous souffrez de crises de goutte (cristaux d'acide urique dans les articulations).

* Si vous ressentez une douleur dans l'œil ou une baisse de la vision. Ce pourrait être les symptômes d'une augmentation de la pression dans l'œil qui peuvent survier quelques semaines après la prise d'ESIDREX. Ceci peut entraîner des troubles permanents de la vision, en absence de traitement.

* Si vous souffrez d'allergie ou d'asthme.

* Si vous présentez des réactions cutanées telles qu'une éruption après une exposition au soleil.

* Si vous prenez tout autre médicament.

* Vous êtes enceinte ou désirez débuter une grossesse.

Exposition au soleil ou aux UV

Si vous avez déjà eu des réactions au soleil à cause de ce médicament et que votre médecin a souhaité poursuivre le traitement, vous devez protéger votre peau des rayons du soleil et des UV. Utilisez un préparatif solaire (protection solaire) contenant

Ce médicament contient du Li qui peuvent présenter un risque de malabsorption du syndrome de malabsorption du râres.

Ce médicament peut être ad d'absorption du gluten par l'intestin seullement ou de lait de trace, et est susceptible d'une malabsorption.

3. COMMENT PRENDRE ESIDREX

* Instruction pour un bon usage

Posologie et mode d'administration

Veuillez à toujours prendre ce médicament avec votre médecin ou pharmacien.

Vérifiez auprès de votre médecin

Posologie

Veuillez à toujours prendre ce méme cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien e

Edème

La dose habituelle en début de i

votre médecin peut décider de l

La dose sera ensuite réduite à

Hypertension artérielle.

La dose recommandée est de 1/2 à 1 comprimé

ML N° 90/18 par jour.

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin.

Mode d'administration

Ce médicament est à prendre par voie orale.

Avec ou sans aliments (s) sécable(s) avec un verre d'eau.

Fréquence d'administration

Ce médicament a un effet diurétique (c'est-à-dire que vous allez uriner plus souvent).

Compte tenu de cet effet, il est préférable de ne pas prendre la dernière dose tard dans la journée, afin d'éviter d'éventuels réveils la nuit.

Si vous devez prendre vos comprimés sécables en une seule fois, prenez le(s) le matin.

Durée du traitement

Votre médecin vous dira pendant combien de temps vous devez utiliser ce médicament.

Votre médecin fera régulièrement des contrôles afin de s'assurer que le traitement n'a pas d'effets atrophiés.

Si vous avez des questions sur la durée du traitement, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage :

Si vous avez pris plus de l'ESIDREX 25 mg, comprimé sécable que vous n'auriez

eu intention de prendre, consultez immédiatement votre médecin ou les urgences si vous ressentez des nausées, une somnolence, des contractions musculaires, des troubles du rythme cardiaque (arythmie cardiaque), une tension artérielle basse (reconnaisable par des vertiges), un état confusionnel ou des troubles urinaires.

Si vous avez dû prendre une dose trop forte, arrêtez immédiatement le traitement.

Même si vous avez pris une dose trop forte, il est généralement possible le jour même et continuez votre traitement normalement. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre l'ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

N'arrêtez pas de prendre l'ESIDREX 25 mg sauf si votre médecin vous le demande. Si vous

arrêtez de prendre l'ESIDREX 25 mg, votre tension artérielle ne sera plus contrôlée (voir aussi le paragraphe "Durée du traitement").

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES ÉVENTUELS ?

Ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Effets nécessitant l'arrêt du traitement

Vous devez interrompre le traitement et consulter un médecin ou les urgences

Effets indésirables très fréquents (peuvent affecter plus de 1 patient sur 10) :

* Aggravation de la maladie de l'œil (hypertonie oculaire).

* Diminution du taux de potassium dans le sang (hypopotasémie).

* Aggravation de la maladie de l'œil (hypertonie oculaire).

Effets indésirables fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 patient sur 10) :

* Eruption cutanée avec démangeaisons (urticaire) et autres formes d'éruptions cutanées.

* Troubles d'appétit, nausées, vomissements, diarrhées.

* Crute de la pression artérielle lors du passage de la position allongée à debout.

* Incapacité à obtenir ou à maintenir une érection (impotissance).

* Diminution du taux de magnésium dans le sang (hypomagnésémie).

* Aggravation de la maladie de l'œil (hypertonie oculaire).

Effets indésirables peu fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 patient sur 100) :

* Insuffisance rénale aigüe (diminution importante du débit urinaire).

Effets indésirables rares (peuvent affecter jusqu'à 1 patient sur 1000) :

* Aggravation d'un diabète.

* Sensibilité augmentée de la peau au soleil.

* Aggravation d'une maladie cardiaque (angine de poitrine).

ESIDREX 25 mg
Hydrochlorothiazide
20 comprimés sécables



6 118000 181194

ESIDREX® 25 mg, Comprimés sécables, Boîte de Hydrochlorothiazide

Pour les médicaments soumis à la prescription médicale :
Veuillez lire attentivement l'information suivante avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour vous.

* Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

* Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes, pour qu'il ne soit pas nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

* Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Que contient cette notice :

2. Qu'est-ce que l'ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables et dans quels cas est-il utilisé ?

3. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre l'ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

4. Comment prendre l'ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

5. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

6. Comment conserver l'ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

7. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE L'ESIDREX® 25 mg, COMPRIMÉS SÉCABLES ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

* Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :
ESIDREX appartient à une classe de médicaments appelée diurétiques thiazidiques. Ce médicament augmente la quantité d'eau éliminée par les urines.

(Code ATC : C03AA03)

* Indications thérapeutiques :

• Ce médicament est utilisé :

- Pour traiter des gonflements (ou œdèmes).

- Pour traiter une tension artérielle élevée. Dans ce cas il peut être prescrit seul ou en association avec un autre médicament.

2. COMMENT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE L'ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

* Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

* Conseils d'utilisation :

• Si vous prenez l'ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active (Hydrochlorothiazide) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

- Si vous êtes incapable d'uriner (présentez une anurie),

- Si vous avez une insuffisance rénale sévère,

- Si vous êtes allergique (hypersensible) au blé, en raison de la présence d'amidon de blé.

Si vous êtes dans une des situations décrites ci-dessus, prévenez votre médecin avant de prendre l'ESIDREX® 25 mg, comprimé sécable.

* Informations supplémentaires d'emploi :

Faites attention avec l'ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables :

Avant de prendre le traitement, prévenez votre médecin :

* Si vous avez une maladie grave des reins ou du foie.

* Si vous présentez une sténose de l'artère rénale (rétrécissement des vaisseaux sanguins irriguant les deux reins) ou un accident vasculaire cérébral (AVC).

* Si vous prenez un sirop contenant du sucre dans le sang),

* Votre taux sanguin de cholestérol ou de triglycérides est élevé.

* Si vous avez ou avez déjà eu une maladie appelée "lupus erythémateux" (appelée également "lupus" ou "LED").

* Si votre taux sanguin de potassium est trop bas (avec ou sans symptômes tels qu'une faiblesse musculaire, des spasmes musculaires ou un rythme cardiaque abnormal).

* Si votre taux sanguin de sodium est trop bas (avec ou sans symptômes tels de la fatigue, un état confusionnel, des contractions musculaires ou des convulsions).

* Si votre taux sanguin de calcium est élevé (avec ou sans symptômes tels que des nausées, des vomissements, une constipation, des douleurs à l'estomac, une envie d'uriner, une sensation de soif, une faiblesse musculaire ou des contractions musculaires).

* Si vous souffrez de crises de goutte (cristaux d'acide urique dans les articulations).

* Si vous ressentez une douleur dans l'œil ou une baisse de la vision. Ce pourrait être les symptômes d'une augmentation de la pression dans l'œil qui peuvent survier quelques semaines après la prise d'ESIDREX. Ceci peut entraîner des troubles permanents de la vision, en absence de traitement.

* Si vous souffrez d'allergie ou d'asthme.

* Si vous présentez des réactions cutanées telles qu'une éruption après une exposition au soleil.

* Si vous prenez tout autre médicament.

* Vous êtes enceinte ou désirez débuter une grossesse.

Exposition au soleil ou aux UV

Si vous avez déjà eu des réactions au soleil à cause de ce médicament et que votre médecin a souhaité poursuivre le traitement, vous devez protéger votre peau des rayons du soleil et éviter les exposés solaires excessifs.

Ce médicament contient du Li qui peuvent présenter un risque de malabsorption du syndrome de malabsorption du rânes.

Ce médicament peut être ad d'absorption du gluten par l'intestin seullement ou de lait de trace, et est susceptible d'une malabsorption.

3. COMMENT PRENDRE ESIDREX

* Instruction pour un bon usage

Posologie et mode d'administration

Veuillez à toujours prendre ce médicament avec votre médecin ou pharmacien.

Vérifiez auprès de votre médecin

* Posologie

Veuillez à toujours prendre ce médicament ou les indications de votre médecin ou pharmacien e

* Edème

La dose habituelle en début de i

votre médecin peut décider de l

La dose sera ensuite réduite à

Hypertension artérielle.

La dose recommandée est de 1/2 à 1 comprimé

ML N° 90/18 par jour.

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin.

* Mode d'administration

Ce médicament est à prendre par voie orale.

Avec ou sans aliments(s) sécable(s) avec un verre d'eau.

* Fréquence d'administration

Ce médicament a un effet diurétique (c'est-à-dire que vous allez uriner plus souvent).

Compte tenu de cet effet, il est préférable de ne pas prendre la dernière dose tard dans la journée, afin d'éviter d'éventuels réveils la nuit.

Si vous devez prendre vos comprimés sécables en une seule fois, prenez le(s) le matin.

* Durée du traitement

Votre médecin vous dira pendant combien de temps vous devez utiliser ce médicament.

Votre médecin fera régulièrement des contrôles afin de s'assurer que le traitement n'a pas d'effets atrophiés.

Si vous avez des questions sur la durée du traitement, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

* Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage :

Si vous avez pris plus de l'ESIDREX 25 mg, comprimé sécable que vous n'auriez

eu intention de prendre, consultez immédiatement votre médecin ou les urgences si vous ressentez des nausées, une somnolence, des contractions musculaires, des troubles du rythme cardiaque (arythmie cardiaque), une tension artérielle basse (reconnaisable par des vertiges), un état confusionnel ou des troubles urinaires.

* Conseils à tenir en cas d'interrompre la prise ou de plusieurs doses :

Si vous continuez de prendre une dose quotidienne, il est généralement possible le jour même et continuer votre traitement normalement. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

* Si vous arrêtez de prendre l'ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

N'arrêtez pas de prendre l'ESIDREX 25 mg sauf si votre médecin vous le demande. Si vous interrompez brusquement la prise de l'ESIDREX 25 mg, votre tension artérielle ne sera plus contrôlée (voir aussi le paragraphe "Durée du traitement").

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

* Effets nécessitant l'arrêt du traitement

Vous devez interrompre le traitement et consulter un médecin ou les urgences

* Effets indésirables très fréquents (peuvent affecter plus de 1 patient sur 10) :

• Aggravation de l'acidose urinaire.

• Diminution du taux de magnésium dans le sang (hypomagnésémie).

• Augmentation du taux de sodium dans le sang (hypernatrémie).

• Diminution du taux de potassium dans le sang (hypopotasémie).

* Effets indésirables fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 patient sur 10) :

• Eruption cutanée avec démangeaisons (urticaire) et autres formes d'éruptions cutanées.

• Troubles d'appétit, nausées, vomissements, diarrhées.

• Crise de la pression artérielle lors du passage de la position allongée à debout.

• Incapacité à obtenir ou à maintenir une érection (impotissance).

• Diminution du taux de magnésium dans le sang (hypomagnésémie).

• Aggravation de l'acidose urinaire (acidose urinaire).

* Effets indésirables peu fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 patient sur 100) :

• Insuffisance rénale aigüe (diminution importante du débit urinaire).

* Effets indésirables rares (peuvent affecter jusqu'à 1 patient sur 1000) :

• Aggravation d'un diabète.

• Sensibilité augmentée de la peau au soleil.

• Allongement de la phase de sommeil.

PPV :

Exp :

N° Lot :

ESIDREX 25 mg
Hydrochlorothiazide
20 comprimés sécables



6 118000 181194

ML N° 90/18 par jour.

ESIDREX® 25 mg, Comprimés sécables, Boîte de Hydrochlorothiazide

Pour les médicaments soumis à la prescription médicale :
Veuillez lire attentivement l'information suivante avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour vous.

* Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

* Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes, pour qu'il ne soit pas nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

* Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Que contient cette notice :

2. Qu'est-ce que l'ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables et dans quels cas est-il utilisé ?

3. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre l'ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

4. Comment prendre l'ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

5. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

6. Comment conserver l'ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

7. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE L'ESIDREX® 25 mg, COMPRIMÉS SÉCABLES ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

* Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :
ESIDREX appartient à une classe de médicaments appelée diurétiques thiazidiques. Ce médicament augmente la quantité d'eau éliminée par les urines.

(Code ATC : C03AA03)

* Indications thérapeutiques :

• Ce médicament est utilisé :

- Pour traiter des gonflements (ou œdèmes).

- Pour traiter une tension artérielle élevée. Dans ce cas il peut être prescrit seul ou en association avec un autre médicament.

2. COMMENT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE L'ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

* Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucrex, contactez-le avant de prendre ce médicament.

* Conseils d'utilisation :

• Si vous prenez l'ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active (Hydrochlorothiazide) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

- Si vous êtes incapable d'uriner (présentez une anurie),

- Si vous avez une insuffisance rénale sévère,

- Si vous êtes allergique (hypersensible) au blé, en raison de la présence d'amidon de blé.

Si vous êtes dans une des situations décrites ci-dessus, prévenez votre médecin avant de prendre l'ESIDREX® 25 mg, comprimé sécable.

* Informations supplémentaires d'emploi :

Faites attention avec l'ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables :

Avant de prendre le traitement, prévenez votre médecin :

* Si vous avez une maladie grave des reins ou du foie.

* Si vous présentez une sténose de l'artère rénale (rétrécissement des vaisseaux sanguins irriguant les deux reins) ou un accident vasculaire cérébral.

* Si vous prenez un sirop contenant du sucre dans le sang).

* Votre taux sanguin de cholestérol ou de triglycérides est élevé.

* Si vous avez ou avez déjà eu une maladie appelée "lupus erythémateux" (appelée également "lupus" ou "LED").

* Si votre taux sanguin de potassium est trop bas (avec ou sans symptômes tels qu'une faiblesse musculaire, des spasmes musculaires ou un rythme cardiaque abnormal).

* Si votre taux sanguin de sodium est trop bas (avec ou sans symptômes tels de la fatigue, un état confusionnel, des contractions musculaires ou des convulsions).

* Si votre taux sanguin de calcium est élevé (avec ou sans symptômes tels que des nausées, des vomissements, une constipation, des douleurs à l'estomac, une envie d'uriner, une sensation de soif, une faiblesse musculaire ou des contractions musculaires).

* Si vous souffrez de crises de goutte (cristaux d'acide urique dans les articulations).

* Si vous ressentez une douleur dans l'œil ou une baisse de la vision. Ce pourrait être les symptômes d'une augmentation de la pression dans l'œil qui peuvent survier quelques semaines après la prise d'ESIDREX. Ceci peut entraîner des troubles permanents de la vision, en absence de traitement.

* Si vous souffrez d'allergie ou d'asthme.

* Si vous présentez des réactions cutanées telles qu'une éruption après une exposition au soleil.

* Si vous prenez tout autre médicament.

* Vous êtes enceinte ou désirez débuter une grossesse.

Exposition au soleil ou aux UV

Si vous avez déjà eu des réactions au soleil à cause de ce médicament et que votre médecin a souhaité poursuivre le traitement, vous devez protéger votre peau des rayons du soleil et des UV. Utilisez un préparatif solaire (protection solaire) contenant

Ce médicament contient du Li qui peuvent présenter un risque de malabsorption du syndrome de malabsorption du râres.

Ce médicament peut être ad d'absorption du gluten par l'intestin seullement ou de lait de trace, et est susceptible d'une malabsorption.

3. COMMENT PRENDRE ESIDREX

* Instruction pour un bon usage

Posologie et mode d'administration

Veuillez à toujours prendre ce médicament avec votre médecin ou pharmacien.

Vérifiez auprès de votre médecin

* Posologie

Veuillez à toujours prendre ce mérite notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien e

* Edème

La dose habituelle en début de i

votre médecin peut décider de l

La dose sera ensuite réduite à

Hypertension artérielle.

La dose recommandée est de ¼ ou 1 comprimé

ML N° 90/18 par jour.

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin en cas de doute.

* Mode d'administration

Ce médicament est à prendre par voie orale.

Avec ou sans aliments (s) sécable(s) avec un verre d'eau.

* Fréquence d'administration

Ce médicament a un effet diurétique (c'est-à-dire que vous allez uriner plus souvent).

Compte tenu de cet effet, il est préférable de ne pas prendre la dernière dose tard dans la journée, afin d'éviter d'éventuels réveils la nuit.

Si vous devez prendre vos comprimés sécables en une seule fois, prenez le(s) le matin.

* Durée du traitement

Votre médecin vous dira pendant combien de temps vous devez utiliser ce médicament.

Votre médecin fera régulièrement des contrôles afin de s'assurer que le traitement n'a pas d'effets atrophiés.

Si vous avez des questions sur la durée du traitement, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

* Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage :

Si vous avez pris plus de l'ESIDREX 25 mg, comprimé sécable que vous n'auriez

eu intention de prendre, consultez immédiatement votre médecin ou les urgences si vous ressentez des nausées, une somnolence, des contractions musculaires, des troubles du rythme cardiaque (arythmie cardiaque), une tension artérielle basse (reconnaisable par des vertiges), un état confusionnel ou des troubles urinaires.

* Conseils à tenir en cas d'interrompre la prise ou de plusieurs doses :

Si vous avez décidé de prendre une dose supplémentaire, il est généralement possible le jour même et continuer votre traitement normalement. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

* Si vous arrêtez de prendre l'ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

N'arrêtez pas de prendre l'ESIDREX 25 mg sauf si votre médecin vous le demande. Si vous interrompez votre traitement, la tension artérielle ne sera plus contrôlée (voir aussi le paragraphe "Durée du traitement").

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES ÉVENTUELS ?

Ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

* Effets nécessitant l'arrêt du traitement

Vous devez interrompre le traitement et consulter un médecin ou les urgences

* Effets indésirables très fréquents (peuvent affecter plus de 1 patient sur 10) :

• Aggravation de l'acidose urinaire.

• Diminution du taux de magnésium dans le sang (hypomagnésémie).

• Augmentation du taux de sodium dans le sang (hypernatrémie).

• Diminution du taux de potassium dans le sang (hypopotasémie).

* Effets indésirables fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 patient sur 10) :

• Eruption cutanée avec démangeaisons (urticaire) et autres formes d'éruptions cutanées.

• Troubles d'appétit, nausées, vomissements, diarrhées.

• Chute de la pression artérielle lors du passage de la position allongée à debout.

• Incapacité à obtenir ou à maintenir une érection (impotissance).

• Diminution du taux de magnésium dans le sang (hypomagnésémie).

• Aggravation de l'acidose urinaire (acidose urinaire).

• Effets indésirables peu fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 patient sur 100) :

• Insuffisance rénale aigüe (diminution importante du débit urinaire).

* Effets indésirables rares (peuvent affecter jusqu'à 1 patient sur 1000) :

• Aggravation d'un diabète.

• Sensibilité augmentée de la peau au soleil.

• Réaction cutanée sévère (érythème polymorphe).

ESIDREX 25 mg
Hydrochlorothiazide
20 comprimés sécables



6 118000 181194

ML N° 90/18

par jour.

ML N° 90/18

<

ESIDREX® 25 mg, Comprimés sécables, Boîte de Hydrochlorothiazide

Pour les médicaments soumis à la prescription médicale :
Veuillez lire attentivement l'information suivante avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour vous.

* Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

* Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes, pour qu'il ne soit pas nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

* Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Que contient cette notice :

2. Qu'est-ce que l'ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables et dans quels cas est-il utilisé ?

3. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre l'ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

4. Comment prendre l'ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

5. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

6. Comment conserver l'ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

7. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE L'ESIDREX® 25 mg, COMPRIMÉS SÉCABLES ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

* Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :
ESIDREX appartient à une classe de médicaments appelée diurétiques thiazidiques. Ce médicament augmente la quantité d'eau éliminée par les urines.

(Code ATC : C03AA03)

* Indications thérapeutiques :

• Ce médicament est utilisé :

- Pour traiter des gonflements (ou œdèmes).

- Pour traiter une tension artérielle élevée. Dans ce cas il peut être prescrit seul ou en association avec un autre médicament.

2. COMMENT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE L'ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

* Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucrex, contactez-le avant de prendre ce médicament.

* Conseils d'utilisation :

• Si vous prenez l'ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active (Hydrochlorothiazide) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

- Si vous êtes incapable d'uriner (présentez une anurie),

- Si vous avez une insuffisance rénale sévère,

- Si vous êtes allergique (hypersensible) au blé, en raison de la présence d'amidon de blé.

Si vous êtes dans une des situations décrites ci-dessus, prévenez votre médecin avant de prendre l'ESIDREX® 25 mg, comprimé sécable.

* Informations supplémentaires d'emploi :

Faites attention avec l'ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables :

Avant de prendre le traitement, prévenez votre médecin :

* Si vous avez une maladie grave des reins ou du foie.

* Si vous présentez une sténose de l'artère rénale (rétrécissement des vaisseaux sanguins irriguant les deux reins) ou un accident vasculaire cérébral.

* Si vous prenez un sirop contenant du sucre dans le sang).

* Votre taux sanguin de cholestérol ou de triglycérides est élevé.

* Si vous avez ou avez déjà eu une maladie appelée "lupus erythémateux" (appelée également "lupus" ou "LED").

* Si votre taux sanguin de potassium est trop bas (avec ou sans symptômes tels qu'une faiblesse musculaire, des spasmes musculaires ou un rythme cardiaque abnormal).

* Si votre taux sanguin de sodium est trop bas (avec ou sans symptômes tels de la fatigue, un état confusionnel, des contractions musculaires ou des convulsions).

* Si votre taux sanguin de calcium est élevé (avec ou sans symptômes tels que des nausées, des vomissements, une constipation, des douleurs à l'estomac, une envie d'uriner, une sensation de soif, une faiblesse musculaire ou des contractions musculaires).

* Si vous souffrez de crises de goutte (cristaux d'acide urique dans les articulations).

* Si vous ressentez une douleur dans l'œil ou une baisse de la vision. Ce pourrait être les symptômes d'une augmentation de la pression dans l'œil qui peuvent survier quelques semaines après la prise d'ESIDREX. Ceci peut entraîner des troubles permanents de la vision, en absence de traitement.

* Si vous souffrez d'allergie ou d'asthme.

* Si vous présentez des réactions cutanées telles qu'une éruption après une exposition au soleil.

* Si vous prenez tout autre médicament.

* Vous êtes enceinte ou désirez débuter une grossesse.

Exposition au soleil ou aux UV

Si vous avez déjà eu des réactions au soleil à cause de ce médicament et que votre médecin a souhaité poursuivre le traitement, vous devez protéger votre peau des rayons du soleil et des UV. Utilisez un préparatif solaire (protection solaire) contenant

Ce médicament contient du Li qui peuvent présenter un risque de malabsorption du syndrome de malabsorption du râres.

Ce médicament peut être ad d'absorption du gluten par l'intestin seullement ou de lait de trace, et est susceptible d'une malabsorption.

3. COMMENT PRENDRE ESIDREX

* Instruction pour un bon usage

Posologie et mode d'administration

Veuillez à toujours prendre ce médicament avec votre médecin ou pharmacien.

Vérifiez auprès de votre médecin

Posologie

Veuillez à toujours prendre ce méde cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien e

Edème

La dose habituelle en début de i

votre médecin peut décider de l

La dose sera ensuite réduite à

Hypertension artérielle.

La dose recommandée est de 1/2 à 1 comprimé

ML N° 90/18 par jour.

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin.

Mode d'administration

Ce médicament est à prendre par voie orale.

Avec ou sans aliments (s) sécable(s) avec un verre d'eau.

Fréquence d'administration

Ce médicament a un effet diurétique (c'est-à-dire que vous allez uriner plus souvent).

Compte tenu de cet effet, il est préférable de ne pas prendre la dernière dose tard dans la journée, afin d'éviter d'éventuels réveils la nuit.

Si vous devez prendre vos comprimés sécables en une seule fois, prenez le(s) le matin.

Durée du traitement

Votre médecin vous dira pendant combien de temps vous devez utiliser ce médicament.

Votre médecin fera régulièrement des contrôles afin de s'assurer que le traitement n'a pas d'effets atrophiés.

Si vous avez des questions sur la durée du traitement, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage :

Si vous avez pris plus de l'ESIDREX 25 mg, comprimé sécable que vous n'auriez

eu intention de prendre, consultez immédiatement votre médecin ou les urgences si vous ressentez des nausées, une somnolence, des contractions musculaires, des troubles du rythme cardiaque (arythmie cardiaque), une tension artérielle basse (reconnaisable par des vertiges), un état confusionnel ou des troubles urinaires.

Si vous avez dû prendre une dose supérieure à celle recommandée, mais que cela n'a pas entraîné de surdosage, continuez à prendre le médicament comme il a été recommandé.

Même si vous avez pris une dose supérieure à celle recommandée, mais que cela n'a pas entraîné de surdosage, continuez à prendre le médicament comme il a été recommandé.

Si vous avez吞é l'ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

N'arrêtez pas de prendre l'ESIDREX 25 mg sauf si votre médecin vous le demande. Si vous n'arrêtez pas de prendre l'ESIDREX 25 mg, votre tension artérielle ne sera plus contrôlée (voir aussi le paragraphe "Durée du traitement").

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Effets nécessitant l'arrêt du traitement

Vous devez interrompre le traitement et consulter un médecin ou les urgences

Effets indésirables très fréquents (peuvent affecter plus de 1 patient sur 10) :

* Aggravation de la maladie de l'œil (hypertonie oculaire).

* Diminution du taux de potassium dans le sang (hypopotasémie).

* Aggravation de la maladie de l'œil (hypertonie oculaire).

Effets indésirables fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 patient sur 10) :

* Eruption cutanée avec démangeaisons (urticaire) et autres formes d'éruptions cutanées.

* Troubles d'appétit, nausées, vomissements, diarrhées.

* Crute de la pression artérielle lors du passage de la position assise à debout.

* Incapacité à obtenir ou à maintenir une érection (impotence).

* Diminution du taux de magnésium dans le sang (hypomagnésémie).

* Aggravation de la maladie de l'œil (hypertonie oculaire).

Effets indésirables peu fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 patient sur 100) :

* Insuffisance rénale aigüe (diminution importante du débit urinaire).

Effets indésirables rares (peuvent affecter jusqu'à 1 patient sur 1000) :

* Aggravation d'un diabète.

* Sensibilité augmentée de la peau au soleil.

* Aggravation d'une maladie cardiaque (maladie coronarienne).

ESIDREX 25 mg
Hydrochlorothiazide
20 comprimés sécables



6 118000 181194

ESIDREX® 25 mg, Comprimés sécables, Boîte de Hydrochlorothiazide

Pour les médicaments soumis à la prescription médicale : Veillez lire attentivement l'information ci-dessous avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour vous.

• Guidez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

• Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

• Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes, pour qu'il ne soit pas nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

• Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Que contient cette notice :

2. Qu'est-ce que l'ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables et dans quels cas est-il utilisé ?

3. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre l'ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

4. Comment prendre l'ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

5. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

6. Comment conserver l'ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

7. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE L'ESIDREX® 25 mg, COMPRIMÉS SÉCABLES ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

• Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

ESIDREX appartient à une classe de médicaments appelée diurétiques thiazidiques. Ce médicament augmente la quantité d'eau éliminée par les urines.

(Code ATC : C03AA03)

• Indications thérapeutiques :

• Ce médicament est utilisé :

- Pour traiter des gonflements (ou œdèmes).

- Pour traiter une tension artérielle élevée. Dans ce cas il peut être prescrit seul ou en association avec un autre médicament.

2. COMMENT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE L'ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

• Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

• Conseils d'utilisation :

• Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active (Hydrochlorothiazide) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

• Si vous êtes incapable d'uriner (présentez une anurie),

• Si vous avez une insuffisance rénale sévère,

• Si vous êtes allergique (hypersensible) au blé, en raison de la présence d'amidon de blé.

Si vous êtes dans une des situations décrites ci-dessus, prévenez votre médecin avant de prendre l'ESIDREX® 25 mg, comprimé sécable.

• Informations supplémentaires d'emploi :

Faites attention avec l'ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables :

Avant de prendre le traitement, prévenez votre médecin :

• Si vous avez une maladie grave des reins ou du foie.

• Si vous présentez une sténose de l'artère rénale (rétrécissement des vaisseaux sanguins irriguant les deux reins) ou un accident vasculaire cérébral (AVC).

• Si vous prenez un sirop contenant du sucre dans le sang),

• Votre taux sanguin de cholestérol ou de triglycérides est élevé,

• Si vous avez ou avez déjà eu une maladie appelée "lupus erythémateux" (appelée également "lupus" ou "LED").

• Si votre taux sanguin de potassium est trop bas (avec ou sans symptômes tels qu'une faiblesse musculaire, des spasmes musculaires ou un rythme cardiaque anormal).

• Si votre taux sanguin de sodium est trop bas (avec ou sans symptômes tels de la fatigue, un état confusionnel, des contractions musculaires ou des convulsions),

• Si votre taux sanguin de calcium est élevé (avec ou sans symptômes tels que des nausées, des vomissements, une constipation, des douleurs à l'estomac, une envie d'uriner, une sensation de soif, une faiblesse musculaire ou des contractions musculaires).

• Si vous souffrez de crises de goutte (cristaux d'acide urique dans les articulations),

• Si vous ressentez une douleur dans l'œil ou une baisse de la vision. Ce pourrait être les symptômes d'une augmentation de la pression dans l'œil qui peuvent survier quelques semaines après la prise d'ESIDREX. Ceci peut entraîner des troubles permanents de la vision, en absence de traitement.

• Si vous souffrez d'allergie ou d'asthme,

• Si vous présentez des réactions cutanées telles qu'une éruption après une exposition au soleil.

• Si vous pensez tout autre médicament,

• Vous êtes enceinte ou désirez débuter une grossesse.

Exposition au soleil ou aux UV

Si vous avez déjà eu des réactions au soleil à cause de ce médicament et que votre médecin a souhaité poursuivre le traitement, vous devez protéger votre peau des rayons du soleil et des UV. Utilisez un préparé solaire (protection solaire) contenant

Ce médicament contient du Li. Les personnes présentant une intolérance syndromique de malabsorption du rânes.

Ce médicament peut être ad d'absorption du gluten par l'intestin, mais pas de lait de trace, et est également associé à une maladie de Crohn.

3. COMMENT PRENDRE ESIDREX

• Instruction pour un bon usage

Posologie et mode d'administration

Veuillez à toujours prendre ce mé

comme prescrit par votre médecin.

Vérifiez auprès de votre médecin

Posologie

Veuillez à toujours prendre ce mé

comme prescrit par votre médecin ou pharmacien e

Edème

La dose habituelle en début de i

votre médecin peut décider de l

La dose sera ensuite réduite à

Hypertension artérielle.

La dose recommandée est de 1/2 à 1 comprimé

à prendre tous les jours.

• Instruction pour un bon usage

PPV : 138,30 DH
LOT : 648296
PER : 12/23

AUGMENTIN 1 g/125 mg, ADULTES, poudre pour suspension buvable en sachet-dose

AUGMENTIN 500 mg/62,5 mg ADULTES, comprimé pelliculé

Amoxicilline/acide clavulanique

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'information au médecin ou au pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit (ou a été prescrit à votre enfant). Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en au médecin ou au pharmacien.

Quel contenu cette notice ?

1. Qu'est-ce que l'AUGMENTIN et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre l'AUGMENTIN ?
3. Comment prendre l'AUGMENTIN ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver l'AUGMENTIN ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE AUGMENTIN ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Association de pénicillines, y compris inhibiteurs de la bêta-lactamase

l'AUGMENTIN est un antibiotique qui tue les bactéries responsables des infections. Il contient deux molécules différentes, appelées amoxicilline et acide clavulanique. L'amoxicilline appartient à un groupe de médicaments appelés « pénicillines », qui peuvent parfois arrêter d'être efficaces (être inactivés). L'autre constituant actif (l'acide clavulanique) empêche cette inactivation.

AUGMENTIN est utilisé chez l'adulte et chez l'enfant pour traiter les infections suivantes :

- infections de l'oreille moyenne et des sinus,
- infections des voies respiratoires,
- infections des voies urinaires,
- infections de la peau et des tissus mous, incluant les infections dentaires,
- infections des os et des articulations.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAIRE AVANT DE PRENDRE AUGMENTIN ?

- Augmentin 1g/125mg, ADULTES, poudre pour suspension buvable en sachet-dose :

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sures, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais l'AUGMENTIN :

- si vous êtes allergique à l'amoxicilline, à l'acide clavulanique, à la pénicilline ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionné dans la rubrique 5,
- si vous avez déjà présenté une réaction allergique grave (d'hypersensibilité) à un autre antibiotique. Ceci peut inclure une éruption cutanée ou un gonflement du visage ou du cou, si vous avez déjà eu des problèmes au foie ou développé un ictere (jaunissement de la peau) lors de la prise d'un antibiotique.

→ Ne prenez pas AUGMENTIN si vous êtes dans l'une des situations mentionnées ci-dessus.

En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AUGMENTIN.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre l'AUGMENTIN 1 g/125 mg, poudre pour suspension buvable en sachet-dose si vous :

- souffrez de mononucléose infectieuse,
- êtes traité(e) pour des problèmes au foie ou aux reins,
- n'urinez pas régulièrement.

En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre l'AUGMENTIN.

Dans certains cas, votre médecin pourra rechercher le type de bactérie responsable de l'infection. Selon les résultats, il pourra vous prescrire un dosage différent d'AUGMENTIN ou un autre médicament.

Réactions nécessitant une attention particulière

AUGMENTIN peut provoquer certaines maladies ou engendrer des effets secondaires graves, notamment des réactions allergiques, des convulsions et une inflammation du gros intestin. lorsque vous prenez AUGMENTIN, vous devez surveiller certains symptômes afin de réduire ces risques. Voir « Réactions nécessitant une attention particulière », à la rubrique 4.

Tests sanguins et urinaires

Si vous effectuez des analyses de sang (nombre de globules rouges ou explorations fonctionnelles hépatiques) ou des analyses d'urine (dosage du glucose), vous devez informer le médecin ou l'infirmier(e) que vous prenez AUGMENTIN. En effet, AUGMENTIN peut influer sur les résultats de ces types de tests.

Autres médicaments et AUGMENTIN :

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourrez prendre tout autre médicament.

Si vous prenez de l'allopurinol (en cas de réaction cutanée allergique) est plus. Si vous prenez du probénécide (en) d'ajuster votre dose d'AUGMENTIN. Si des médicaments destinés à être pris avec AUGMENTIN, des analyses AUGMENTIN peut influer sur l'acide cancer ou les maladies rhumatismaux AUGMENTIN peut influer sur l'acide rejet de greffe d'organes).

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous une grossesse, demandez conseil médicamente.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

AUGMENTIN peut provoquer des effets indésirables susceptibles de réduire la capacité à conduire. Ne conduisez pas et n'utilisez pas de machines si vous ne vous sentez pas bien.

AUGMENTIN 1 g/125 mg, ADULTES, poudre pour suspension buvable en sachet-dose contient de l'aspartam (E951) et de la maltodextrose (glucose) :

- L'aspartam (E951) qui est une source de phénylalanine. Celle-ci peut être nocive chez les patients nés avec une maladie appelée « phénylcetonurie ».
- Maltodextrine (glucose) : Si votre médecin vous a dit que vous avez une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

3. COMMENT PRENDRE AUGMENTIN ?

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Pédiatrie

Adultes et enfants de 40 kg et plus

- Dose habituelle : 1 sachet de 1g/125mg ou 2 comprimés de 500mg/62,5mg trois fois par jour
- Dose inférieure : 1 sachet de 1g/125mg ou 2 comprimés de 500mg/62,5mg deux fois par jour.

Enfants pesant moins de 40 kg

Les sachets AUGMENTIN 1 g/125 mg ne sont pas recommandés.

Les enfants âgés de 6ans ou moins doivent de préférence être traités avec Augmentin en suspension buvable ou sous forme de sucre 500mg/62,5mg.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien si vous devez donner des comprimés d'Augmentin à des enfants pesant moins de 40 kg.

Patients souffrant de problèmes rénaux et hépatiques

- En cas de problèmes rénaux, une adaptation de la posologie peut être nécessaire. Le médecin pourra prescrire un dosage différent ou un autre médicament.
- En cas de problèmes au foie, des analyses de sang plus fréquentes pourront être nécessaires afin de vérifier le fonctionnement de votre foie.

Mode d'administration

- Répartissez les prises de manière régulière au cours de la journée ; elles doivent être espacées d'au moins 4 heures. Ne prenez pas 2 doses en 1 heure.
- Ne prenez pas AUGMENTIN pendant plus de 2 semaines. Si vos symptômes persistent, consultez de nouveau un médecin.

Augmentin 1g/125mg sachets :

- Juste avant la prise d'AUGMENTIN, ouvrez le sachet et mélangez son contenu dans un demi-verre d'eau.
- Avez le mélange au début d'un repas ou un peu avant.

Augmentin 500mg/62,5mg comprimés :

- Avez les comprimés entiers avec un verre d'eau au début d'un repas ou un peu avant.
- Si vous avez pris plus d'AUGMENTIN que vous n'en aviez dû :

La prise d'une quantité excessive d'AUGMENTIN peut entraîner des maux de ventre (hauςées, vomissements ou diarrhée) ou des convulsions. Parlez-en à votre médecin le plus tôt possible. Montrez la boîte de médicament au médecin.

Si vous oubliez de prendre AUGMENTIN :

Si vous avez oublié une dose, prenez-la dès que vous y pensez. Attendez ensuite environ 4 heures avant de prendre la dose suivante.

Si vous arrêtez de prendre AUGMENTIN :

Vous devez continuer de prendre AUGMENTIN jusqu'à la fin du traitement, même si vous vous sentez mieux. Toutes les doses sont importantes pour combattre l'infection. Si certaines bactéries devaient survivre, elles pourraient être à l'origine d'une réapparition de l'infection. Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

AUGMENTIN 500 mg/62,50 mg

32 comprimés pelliculés



6 118000 161288

Notice : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

**CRESTOR 5 mg, comprimé pelliculé
CRESTOR 10 mg, comprimé pelliculé
CRESTOR 20 mg, comprimé pelliculé**

Rosuvastatine

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que CRESTOR, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CRESTOR, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre CRESTOR, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CRESTOR, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE CRESTOR, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Inhibiteur de l'HMG-CoA réductase -
code ATC : C10A A07

CRESTOR appartient au groupe des médicaments appelés statines.

CRESTOR vous a été prescrit parce que :

- Vous avez un taux élevé de cholestérol ce qui signifie que vous présentez un risque de faire une attaque cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. CRESTOR est utilisé chez les adultes, les enfants de 6 ans et plus pour réduire le taux

Maphar
Bd Alkmia N° 6, Ql,
Sidi Bernoussi, Casablanca
Crestor 10mg cp pell b30
P.P.V : 185,70 DH



6 118001 183111

Ne prenez jamais CRESTOR, comprimé pelliculé :

- Si vous êtes allergique à la rosuvastatine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous êtes enceinte, si vous allaitez, arrêtez immédiatement le traitement et prévenez votre médecin ; il convient de prendre un contraceptif approprié pour éviter d'être enceinte pendant le traitement par CRESTOR.
- Si vous avez actuellement des problèmes hépatiques.
- Si vous avez des problèmes rénaux graves (si vous avez un doute, demandez à votre médecin).
- Si vous avez des troubles musculaires appelés myopathie (douleurs musculaires répétées ou inexpliquées).
- Si vous prenez de la cyclosporine (utilisée par exemple lors de greffes d'organes).

Si vous êtes concernés par l'une de ces situations (ou si vous avez un doute), parlez-en à votre médecin.

De plus, vous ne devez pas prendre 40 mg de CRESTOR (dosage le plus élevé) si :

- Vous avez une insuffisance rénale modérée (en cas de doute, demandez à votre médecin) ;
- Vous avez des troubles de la thyroïde ;
- Vous avez des douleurs musculaires répétées ou inexpliquées, des antécédents personnels ou familiaux de problèmes musculaires ou si vous avez déjà présenté des douleurs musculaires avec un autre médicament abaissant les taux de cholestérol ;
- Vous consommez régulièrement des quantités importantes d'alcool ;
- Vous êtes d'origine asiatique (japonais, chinois, philippin, vietnamien, coréen et indien) ;
- Vous êtes déjà traité par un autre médicament abaissant les taux de cholestérol appelé fibrate.

Si vous êtes concernés par l'une de ces situations (ou si vous avez un doute), parlez-en à votre médecin.

Notice : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

**CRESTOR 5 mg, comprimé pelliculé
CRESTOR 10 mg, comprimé pelliculé
CRESTOR 20 mg, comprimé pelliculé**

Rosuvastatine

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que CRESTOR, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CRESTOR, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre CRESTOR, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CRESTOR, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE CRESTOR, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Inhibiteur de l'HMG-CoA réductase -
code ATC : C10A A07

CRESTOR appartient au groupe des médicaments appelés statines.

CRESTOR vous a été prescrit parce que :

- Vous avez un taux élevé de cholestérol ce qui signifie que vous présentez un risque de faire une attaque cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. CRESTOR est utilisé chez les adultes, les enfants de 6 ans et plus pour réduire le taux

Maphar
Bd Alkmia N° 6, Ql,
Sidi Bernoussi, Casablanca
Crestor 10mg cp pell b30
P.P.V : 185,70 DH



6 118001

183111

Ne prenez jamais CRESTOR, comprimé pelliculé :

- Si vous êtes allergique à la rosuvastatine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous êtes enceinte, si vous allaitez, arrêtez immédiatement le traitement et prévenez votre médecin ; il convient de prendre un contraceptif approprié pour éviter d'être enceinte pendant le traitement par CRESTOR.
- Si vous avez actuellement des problèmes hépatiques.
- Si vous avez des problèmes rénaux graves (si vous avez un doute, demandez à votre médecin).
- Si vous avez des troubles musculaires appelés myopathie (douleurs musculaires répétées ou inexpliquées).
- Si vous prenez de la cyclosporine (utilisée par exemple lors de greffes d'organes).

Si vous êtes concernés par l'une de ces situations (ou si vous avez un doute), parlez-en à votre médecin.

De plus, vous ne devez pas prendre 40 mg de CRESTOR (dosage le plus élevé) si :

- Vous avez une insuffisance rénale modérée (en cas de doute, demandez à votre médecin) ;
- Vous avez des troubles de la thyroïde ;
- Vous avez des douleurs musculaires répétées ou inexpliquées, des antécédents personnels ou familiaux de problèmes musculaires ou si vous avez déjà présenté des douleurs musculaires avec un autre médicament abaissant les taux de cholestérol ;
- Vous consommez régulièrement des quantités importantes d'alcool ;
- Vous êtes d'origine asiatique (japonais, chinois, philippin, vietnamien, coréen et indien) ;
- Vous êtes déjà traité par un autre médicament abaissant les taux de cholestérol appelé fibrate.

Si vous êtes concernés par l'une de ces situations (ou si vous avez un doute), parlez-en à votre médecin.

Notice : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

**CRESTOR 5 mg, comprimé pelliculé
CRESTOR 10 mg, comprimé pelliculé
CRESTOR 20 mg, comprimé pelliculé**

Rosuvastatine

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que CRESTOR, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CRESTOR, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre CRESTOR, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CRESTOR, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE CRESTOR, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Inhibiteur de l'HMG-CoA réductase -
code ATC : C10A A07

CRESTOR appartient au groupe des médicaments appelés statines.

CRESTOR vous a été prescrit parce que :

- Vous avez un taux élevé de cholestérol ce qui signifie que vous présentez un risque de faire une attaque cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. CRESTOR est utilisé chez les adultes, les enfants de 6 ans et plus pour réduire le taux

Maphar
Bd Alkmia N° 6, Ql,
Sidi Bernoussi, Casablanca
Crestor 10mg cp pell b30
P.P.V : 185,70 DH



6 118001 183111

Ne prenez jamais CRESTOR, comprimé pelliculé :

- Si vous êtes allergique à la rosuvastatine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous êtes enceinte, si vous allaitez, arrêtez immédiatement le traitement et prévenez votre médecin ; il convient de prendre un contraceptif approprié pour éviter d'être enceinte pendant le traitement par CRESTOR.
- Si vous avez actuellement des problèmes hépatiques.
- Si vous avez des problèmes rénaux graves (si vous avez un doute, demandez à votre médecin).
- Si vous avez des troubles musculaires appelés myopathie (douleurs musculaires répétées ou inexpliquées).
- Si vous prenez de la cyclosporine (utilisée par exemple lors de greffes d'organes).

Si vous êtes concernés par l'une de ces situations (ou si vous avez un doute), parlez-en à votre médecin.

De plus, vous ne devez pas prendre 40 mg de CRESTOR (dosage le plus élevé) si :

- Vous avez une insuffisance rénale modérée (en cas de doute, demandez à votre médecin) ;
- Vous avez des troubles de la thyroïde ;
- Vous avez des douleurs musculaires répétées ou inexpliquées, des antécédents personnels ou familiaux de problèmes musculaires ou si vous avez déjà présenté des douleurs musculaires avec un autre médicament abaissant les taux de cholestérol ;
- Vous consommez régulièrement des quantités importantes d'alcool ;
- Vous êtes d'origine asiatique (japonais, chinois, philippin, vietnamien, coréen et indien) ;
- Vous êtes déjà traité par un autre médicament abaissant les taux de cholestérol appelé fibrate.

Si vous êtes concernés par l'une de ces situations (ou si vous avez un doute), parlez-en à votre médecin.