

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
 Prise en charge : pec@mupras.com
 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

14788

1014

Société :

Matricule : 1014

Actif Pensionné(e) Autre :

Nom & Prénom : BENAISSA Abdelkader

Date de naissance : 1947

Adresse : 41 boulevard Attalaoui ECOLE FA
CASA

Tél. : 06 62 74 40 52 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Dr BOUDAD Latifa
Médecin Général
Lot Annaim Iman, A20 N°3 Oulfa
CASABLANCA Tél: 05 22 91 32 44

Date de consultation : 02 NOV 2022

Nom et prénom du malade : Benaiissa Abdelkader Age:

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : Asthme + HTA + Diabète

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent(e) :



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Nature des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
02 NOV 2022	C	—	150	DR BOUDJEDDA Médecin Interniste Dr. ANNALIA BELABANCA Tunisie

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE RESIDENCE ANNAIN Dr. M'hamed CHERRAOUI Docteur en Pharmacie Residence Annain - Oulfa 22 89 43 09 - Casablanca	02/11/2022	T: 441,00 DH

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				Coefficient des travaux
				Montants des soins
				Début d'exécution
				Fin d'exécution
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	$ \begin{array}{r l} 25533412 & 21433552 \\ 00000000 & 00000000 \\ \hline 00000000 & 00000000 \\ 35533411 & 11433553 \end{array} $ <p>[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession</p>			Coefficient des travaux
				Montants des soins
				Date du devis
				Date de l'exécution

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Médecine Générale
Diplôme U. en Diabétologie
Diplômée de la Faculté de Médecine
de Casablanca

الطب العام
دبلوم جامعي في داء السكري
خريجة كلية الطب العام
بالدار البيضاء

Casablanca, le : الدار البيضاء، في :

02 NOV 2022

Bienvenue Abdelkader

PHARMACIE RÉSIDENCE ANNAIM
Siham GUERRAOUI
Docteur en Pharmacie
Résidante : 05 22 89 43 09 - Casablanca

PHARMACIE RÉSIDENCE ANNAIM
Siham GUERRAOUI
Docteur en Pharmacie
4, Résidence Annaim - Oulfa
Tél: 05 22 89 43 09 - Casablanca

25,00 DRAOU
Colle de 15
20,80 DRAOU. Egypt 317
Glycophage 300
Egypt 217



DL de 03 mois

T: 441,100 DH

Dr BOUDAD Latifa
Résidante à la résidence Annaim
N°3 Oulfa
Tél: 05 22 91 32 44

COCCIDIN® 2%, Pommade
(Fusidate de Sodium)
Tube de 15 g

LOT: 221313
PER: 10/2025
PPV: 25.000H

Intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament, si vous avez un doute, demandez plus ou à votre pharmacien. personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à une personne ayant des symptômes identiques, cela pourrait lui être

s devient grave ou si vous remarquez un effet dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre

CONTENU

..... 2 g
e, Alcool cétyle, Lanoline, Paraffine liquide

Excipients à effet notable: Alcool cétyle, Lanoline.

2. CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE OU LE TYPE D'ACTIVITE

Ce médicament est un antibiotique.

3. INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Infections de la peau à *staphylococco* et *streptococco* (exemple : impétigo, désinfections de foyers microbien).

4. POSOLOGIE et MODE D'ADMINISTRATION

- Applications locales avec ou sans pansement, une ou deux fois par jour, après nettoyage de la surface infectée. Evitez l'application en couche épaisse.
- Ne pas utiliser sur les lésions suintantes macérées, ni dans les plis ni sur les ulcères de jambes.

5. CONTRE-INDICATIONS

N'utilisez jamais COCCIDIN 2 %, Pommade dans les cas suivants:

- Allergies au fusidate de sodium ou à l'un des constituants.
- En cas d'allaitement, ne pas appliquer sur le sein.

6. EFFETS INDESIRABLES

Comme tous les médicaments, COCCIDIN 2 %, pommade est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

- Possibilité d'eczéma allergique.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

7. MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS PARTICULIERES D'EMPLOI

Faites attention avec COCCIDIN 2 %, Pommade:

- La pommade ne doit pas être appliquée sur l'œil.
- Ne pas utiliser plus d'une semaine ni sur de trop grandes surfaces, en particulier chez le nourrisson.
- Ce médicament contient de l'alcool cétyle et de lanoline et peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple: eczéma).

8. INTERACTIONS

Interactions avec d'autres médicaments :

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Interactions avec les aliments et les boissons :

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives.

Sans objet.

9. UTILISATION EN CAS DE GROSSESSE ET D'ALLAITEMENT

Ce médicament dans les conditions normales d'utilisation, peut être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement.

D'une façon générale, il convient de demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

10. LES EFFETS POSSIBLES DU TRAITEMENT SUR LA CAPACITE A CONDUIRE UN VEHICULE OU A UTILISER CERTAINES MACHINES

Sans objet.

11. SYMPTOMES ET CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSAGE

Si vous avez utilisé plus de COCCIDIN 2%, pommade que vous n'auriez dû : La survenue d'un surdosage est peu probable.

Cependant, en cas d'application excessive et sur une grande étendue de peau,

notamment celle des nourrissons, un surdosage peut être exclue.

Si vous avez utilisé plus de COCCIDIN 2%, pommade, contactez votre médecin ou votre pharmacien.

12. CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSAGE

Sans objet.

13. MENTION, SI NECESSAIRE, D'UN EFFET

Sans objet.

Conditions de prescription et de conseil

Liste I.

Précaution particulières de conseil

A conserver 6 mois après l'ouverture.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption.

Les médicaments ne doivent pas être conservés dans les placards de ménagers. Demandez à votre pharmacien de les utiliser.

La dernière date à laquelle cette notice

CECI EST

UN MEDICAMENT N'EST PAS

Il vous conseille

Le médicament

Une longue recherche a permis de démontrer

pas tout.

Il ne faut jamais

Il ne faut utiliser les

Utiliser les médicaments prescrits

Il sait quels sont les médicaments

Exécutez exactement les

Suivez le traitement prescrit, ne l'arrêtez pas

VOTRE PHARMACIEN

suivez

Il ne s'agit pas pour vous de prendre

Il s'agit pour vous de prendre

Faites

41, Rue Mohamed DIOUR

COCCIDIN

(Sodium fusidate)

Tu

Read this entire leaflet carefully before use.

• Keep this leaflet. You may need to refer to it later.

• If you have any other questions, or if you are not sure about anything, ask your doctor or pharmacist.

• This medicine has been prescribed for you. It may not be the right medicine for them even if they have the same condition as you.

• If any of the side effects get serious, or if the effects last a long time, stop taking this medicine, please tell your doctor or pharmacist.

1- COMPOSITION OF MEDICINAL PREPARATION

Sodium fusidate (INN)

Excipients: White soft paraffin, Cetyl Alcohol

Excipients with known effects: Cetyl Alcohol

2- PHARMACO-THERAPEUTIC CLASSIFICATION

This medicine is antibiotic.

3- THERAPEUTIC INDICATIONS

Staphylococcal and streptococcal skin infections (of households).

4- POSOLOGY AND ADMINISTRATION

- Topical application with or without dressing the infected area. Avoid application in the eye.

- Do not use on macerated oozing lesions.

5- CONTRAINDICATIONS

Never use COCCIDIN 2% Ointment in:

- If you are allergic to Sodium fusidate or

GLUCOPHAGE 500 mg, comprimé pelliculé
GLUCOPHAGE 850 mg, comprimé pelliculé

Chlorhydrate de metformine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice.	entre ce médicament.
Gr	tez plus d'information à votre
Si	z jamais à quelqu'un d'autre.
ce	un effet indésirable non mentionné
me	
Si	
de	
Qu	cas est-il utilisé ?
1.	OPHAGE, comprimé pelliculé ?
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
6. Contenu	
1. QU'EST-CE QUE GLUCOPHAGE, comprimé pelliculé ?	
Classe pharmacothérapeutique - code ATC : A10BA02.	
Indication thérapeutique	
Fic pour traiter le diabète. Il	

Il est pour traiter le diabète. Il
est à votre corps de récupérer le
suc pour produire de l'énergie ou le
faisant d'insuline ou votre corps
qui aboutit à un taux de glucose
de glucose sanguin jusqu'à un
niveau permet également d'aider à
ce qui est associé à une stabilité
« diabète non
sique seuls n'ont pas suffi à
les patients en surpoids.
« diabète (des médicaments à avaler ou de l'insuline)
Les enfants de 10 ans et plus et les adultes de moins de 25 ans. Glucophage seul ou avec

COMMENT ET DE QUOI DE PRENDRE GLUCOPHAGE

interventions chirurgicales. Votre médecin décidera si vous avez besoin ou non d'un traitement de remplacement pendant cette période. Il est important que vous suiviez précisément les instructions de votre médecin.

Mises en garde spéciales et précautions d'emploi

Avertissements et précautions

Risque d'acidose lactique

Gлюкозе peut provoquer un effet indésirable rare, mais très grave, appelé « acidose lactique », en particulier si vos reins ne fonctionnent pas correctement. Le risque de développer une acidose lactique augmente également en cas de diabète mal contrôlé, d'infections graves, de jeûn prolongé ou de consommation d'alcool, de déshydratation (voir informations complémentaires ci-dessous), ou au fil de toutes autres affections médicales pour lesquelles une partie du corps reçoit un apport réduit en oxygène (les maladies cardiaques aiguës sévères, par exemple). Si l'une de ces situations s'applique à vous, adressez-vous à votre médecin pour recevoir des instructions supplémentaires.

Arrêtez de prendre Glucophage pendant une courte période si vous souffrez d'une affection susceptible d'être associée à une déshydratation (perte importante de liquides corporels) tels que les vomissements sévères, de la diarrhée, de la fièvre, une exposition à la chaleur ou si vous buvez moins de liquides que d'habitude. Adressez-vous à votre médecin pour obtenir des instructions supplémentaires.

Arrêtez de prendre Glucophage et contactez immédiatement un médecin ou l'hôpital le plus proche si vous présentez les symptômes d'une acidose lactique, car cette affection peut entraîner un coma.

Les symptômes de l'acidose lactique comprennent :

- vomissements
 - maux d'estomac (douleurs abdominales)
 - crampes musculaires
 - sensation générale de malaise associée à une grande fatigue
 - difficultés à respirer

- diminution de la température corporelle et au rythme cardiaque

L'acidose lactique est une urgence médicale qui doit être traitée à l'hôpital.

Si vous devez subir une opération chirurgicale importante, arrêtez de prendre Glucophage au moment de l'opération et pendant un certain temps après l'intervention. Votre médecin décidera du moment où vous devrez arrêter et reprendre votre traitement par Glucophage.

Gluophage à lui seul ne provoque pas d'hypoglycémie (taux de sucre dans le sang trop faible). Cependant, si vous prenez Gluophage en même temps que d'autres médicaments pour traiter le diabète qui peuvent engendrer une hypoglycémie (comme les sulfamides hypoglycémiants, l'insuline, les méglitinides), il y a un risque d'hypoglycémie. Si vous ressentez des symptômes d'hypoglycémie, tels que des faiblesses, des vertiges, une augmentation de la transpiration, des battements de cœur rapides, des troubles de la vision ou des difficultés à vous concentrer, boire ou manger quelque chose contenant du sucre devrait vous aider à vous sentir mieux.

Pendant votre traitement par Glucophage, votre médecin contrôlera votre fonction rénale au moins une fois par an ou plus fréquemment si vous êtes âgé(e) et/ou si votre fonction rénale s'est détériorée. Enfants : Sans objet.

Liste des excipients à effet notoire : Sans objet

Interactions:

Autres médicaments et GLUCOPHAGE, comprimé pelliculé :
Si vous devez recevoir une injection d'un produit de contraste contenant de l'iode, par exemple, pour une radiographie ou un scanner, vous devrez arrêter de prendre Glucophage avant ou au moment de l'injection. Votre médecin décidera le moment où vous devrez arrêter et reprendre la prise de votre traitement par Glucophage.

Informez votre médecin si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament. Vous devrez peut-être passer plus fréquemment des tests de la glycémie ou de la fonction rénale ou votre médecin devra peut-être ajuster la posologie de Glucophage. Il est particulièrement important de signaler les médicaments suivants :

- Les médicaments qui augmentent la production d'utine (tritacères).
 - Des médicaments utilisés pour traiter la douleur et l'inflammation (AINS ou inhibiteurs de la COX-2), tels que l'ibuprofène et le célocoxib.
 - Certains médicaments utilisés pour traiter l'hypertension artérielle (inhibiteurs de l'ECA et antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II).
 - Agonistes des récepteurs bêta-2-adrénergiques comme le salbutamol ou la terbutaline (utilisés pour traiter l'asthme).
 - Corticostéroïdes (utilisés pour traiter diverses affections, notamment des inflammations sévères de la peau ou l'asthme).
 - Les médicaments qui peuvent modifier la quantité de Glucophage dans le sang, en particulier si vous avez une fonction rénale réduite (comme le verapamil, la flamiclamine, la cimétidine, le diazépavir, la ranitidine, le triméthoprime, le vandatadé, l'isavuconazole, le crizolifib et l'olaparib).
 - Autres médicaments utilisés pour traiter le diabète.

GLUCOPHAGE, nomméda, némoril, avec du sucre d'aloé :

Évitez une consommation excessive d'alcool pendant la

Éviter une consommation excessive d'alcool pendant la phase de Cicatrisage, car cela peut augmenter le risque d'acidose lactique (voir la rubrique « Avertissements et précautions »).

Utilisation en cas de grossesse et d'allaitement

Pendant la grossesse, vous avez besoin d'insuline pour traiter votre diabète. Informez votre médecin si vous êtes enceinte, pensez l'être ou prévoyez de l'être, afin qu'il/elle puisse modifier votre traitement. Ce médicament n'est pas recommandé si vous allaitez votre enfant ou si vous avez l'intention de le faire.

