

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 0 Réclamation | : contact@mupras.com |
| 0 Prise en charge | : pec@mupras.com |
| 0 Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

N° W21-686910

148653

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Maladie | <input type="checkbox"/> Dentaire | <input type="checkbox"/> Optique | <input type="checkbox"/> Autres |
| Cadre réservé à l'adhérent (e) | | | |
| Matricule : 2800 Société : | | | |
| <input type="checkbox"/> Actif | <input type="checkbox"/> Pensionné(e) | <input type="checkbox"/> Autre : ARchane | <input type="checkbox"/> Sed Saadia |
| Nom & Prénom : | | | |
| Date de naissance : | | | |
| Adresse : | | | |
| Tél. : | Total des frais engagés : _____ Dhs | | |

Autorisation CNDP N° : A-A-215/2019

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation :


Nom et prénom du malade :

Lien de parenté :

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.



J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent(e) :

Le _____ / _____ / _____



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

| Dates des Actes | Natures des Actes | Nombre et Coefficient | Montant détaillé des Honoraires | Cachet et signature du Médecin attestant le Relaisement des Actes |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---|
| 6-2-23 | ord + bij Paul, 1st opératoire | 150 | 100 DT | INPE : 0910457821 Docteur Bouchair Générale BD Dakha Residence Espace Chifa - Aïn Chok - Casablanca Tél: 0522 50 76 22 - GSM 0661 95 72 88 |

EXECUTION DES ORDONNANCES

| Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur | Date | Montant de la Facture |
|---|--------|-----------------------|
| PHARMACIE LUMIERES LAHRICHI SARL AU Bd. Al Qods, Inara, Ain Chok Casablanca - INPE : 09204072 Tel.: 05 22 52 40 29 | 6/2/23 | 278,20 |

ANALYSES - RADIographies


| Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue | Date | Désignation des Coefficients | Montant des Honoraires |
|---|------|------------------------------|------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

AUXILIAIRES MEDICAUX


| Cachet et signature du Particulier | Date des Soins | Nombre | | | | Montant détaillé des Honoraires |
|------------------------------------|----------------|--------|----|----|----|---------------------------------|
| | | AM | PC | IM | IV | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

VOLET ADHERENT

* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.



O.D.F PROTHESES DENTAIRES



DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

| | |
|----------|----------|
| 25533412 | 21433552 |
| 00000000 | 00000000 |
| D | G |
| 00000000 | 00000000 |
| 35533411 | 11433553 |
| B | |

[Création, remont, adjonction]

Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DEBUT D'EXECUTION

FIN D'EXECUTION

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DATE DU DEVIS

DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Bouchaib DYANI

MEDECINE GENERALE

ECHOGRAPHIE

ELECTROCARDIOGRAMME

CIRCONCISION

Bd Dakhla - Résidence Espace Chrifa

Imm. A - Appt. N° 2 - 1er Etage

Hay Chrifa - Ain Chok - Casablanca

Tél. : 05.22.50.70.22 - GSM : 06.61.95.72.88

Résidence Avec Ascenseur

الدكتور بوشعيب الديانج

الطب العام

الفحص بالصدري

تخطيط القلب

ختانة الأطفال

PHARMACIE LUMIERES
LA FRICHI SARL AU
350, Bd Al Qods, Inara, Ain Chok
Casablanca - INPE : 092040427
Tél: 05 22 52 40 29

شارع الداخلة - إقامة فضاء الشريفة - عمارة A - الشقة رقم 2

الطريق الأول . حي الشريفة . عين الشق . الدار البيضاء

الهاتف : 05.22.50.70.22 . المحمول : 06.61.95.72.88

إقامة بالمصعد

E-mail : dr.dryani@gmail.com

Casablanca, le 6 - 9 - 93 الدار البيضاء في

Nom & Prénom : Mme Aicha Saadai

120,00

m

ofit en 200 mg (5)

Mpx 2 g av aut Nerg

6 8 J

139,50

a.

Lovamie 500 mg (5)

1cp g av aut Nerg

10 J

68,70

z.

Tr amal 100 mg (5)

Mpx x 2 g apres
Nerg 2 semaines

378,20

w.

Spasfon

2cp x 2 g av aut Nerg

1cp au més

Docteur Bouchaïb DYANI
Médecine Générale
BD Dakhla Résidence Espace Chrifa Im A Appt N° 2
1er étage Hay Chrifa - Ain Chok - Casablanca
Tél 0522 50 70 22 - GSM 0661 95 72 88

globules blancs (neutropénie).
sécrétée (hypersensibilité).
ans le sang (hypoglycémie). Ceci est important pour les personnes diabétiques.
auditives non réelles (hallucinations, paranoïa), modification de votre opinion et de vos pensées (réactions psychotiques) avec
daires et de passage à l'acte.
problèmes mentaux, agitation, rêves anormaux ou cauchemars.
ts dans les mains et les pieds (paresthesies).
ourdonnement d'oreille) ou de vision (vision trouble).
tements rapides du cœur (tachycardie) ou tension artérielle basse (hypotension).
ceci est important chez les personnes atteintes de myasthénie (une maladie rare du système nerveux).
onnement des reins et insuffisance rénale occasionnelle qui peut être due à une réaction allergique au niveau du rein appelée néphrite

irables sont notamment :

ouges (anémie) : ceci peut provoquer une pâleur de la peau ou lui donner une couleur jaune à la suite à d'une atteinte des globules
nombre de tous les types de cellules sanguines (pancytopénie).

treuse et sensation générale d'être souffrant qui persiste Ceci peut être la conséquence d'une baisse du nombre de globules blancs

roc de type anaphylactique).

taux de sucre dans le sang (hyperglycémie) ou baisse du taux de sucre dans le sang entraînant un coma (coma hypoglycémique).
pour les personnes diabétiques.

lorat, perte de l'odorat ou du goût (parosmie, anosmie, aguesie).

ouger et marcher (dyskinésie, troubles extra-pyramidaux).

e la conscience (syncope).

de la vision.

e l'audition.

é anormalement rapide, rythme cardiaque irrégulier grave y compris arrêt cardiaque, altération du rythme cardiaque (appelée « allongement
o, observée sur l'ECG, qui est l'enregistrement de l'activité électrique du cœur).

pirer ou respiration avec sifflements (bronchospasme).

ues pulmonaires.

ole (hépatite).

e de votre peau au soleil et à la lumière ultraviolette (photosensibilité).

s vaisseaux qui transportent le sang dans votre corps suite à une réaction allergique (vasculite).

s tissus à l'intérieur de la bouche (stomatite).

cles et destruction musculaire (rhabdomyolyse).

ement des articulations (arthrite).

ment dans le dos, le thorax et les extrémités.

rie chez les personnes souffrant déjà de porphyrie (une maladie métabolique très rare)

sistantes avec ou sans vision trouble (hypertension intra-crânienne bénigne).

un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou pharmacien. Cen

139,50 le aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas
uite notice.

CONSERVER LOVANIC COMPRIMÉS

ent hors de la vue et de la portée des enfants.

e nécessite pas de conditions de conservation particuli

e dans un endroit sec.

Conserver Lovanic comprimés dans les plaquettes

L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Lovanic comprimés

est la levofloxacin. Chaque comprimé de Lovanic 250 mg contient 250 mg de levofloxacin et chaque comprimé sécable
g contient 500 mg de levofloxacin.

sants sont : crospovidone, hypromellose, cellulose microcristalline et stéarylumate de sodium. *Pelliculage* : hypromellose, dioxyde
crogol, oxyde de fer jaune, oxyde de fer rouge et oxyde de fer noir.

Lovanic comprimés et contenu de l'emballage extérieur

vanic sont des comprimés pelliculés.

es comprimés sont présentés en conditionnement de 10 comprimés.

es comprimés sont sécables et sont présentés en conditionnements de 5 et 10 comprimés sécables.

/Fabricant : Laboratoires SOTHEMA

iskoura - Maroc

livrance du médicament : Tableau A (Liste I).

à laquelle cette notice a été révisée : Septembre 2012

OFIKEN®

Céfixime

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Elle contient des informations importantes sur votre traitement.
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

DENOMINATION :

OFIKEN® 200 mg, comprimés pelliculés.

OFIKEN® 100 mg/5 ml, poudre pour suspension.

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE :

OFIKEN® 200 mg, comprimés pelliculés.

Céfixime trihydraté, quantité correspondante :

Excipients.....

OFIKEN® 100 mg/5 ml, poudre pour suspension.

Céfixime trihydraté, quantité correspondante :

Excipients.....

FORME PHARMACEUTIQUE ET PRÉSENTATION :

OFIKEN® 200 mg, comprimé pelliculé, boîte

OFIKEN® 100 mg/5 ml :

Poudre pour suspension buvable en flacon d.....

Poudre pour suspension buvable en flacon de soit 300 doses/kg

Poudre pour suspension buvable en flacon de 100 ml soit 500 doses/kg

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

Antibiotiques de la famille des bêta-lactamines du groupe des céphalosporines de 3^{ème} génération.

DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Comprimé pelliculé :

Ce médicament est indiqué dans le traitement des :

- Otites et sinusites aiguës,
- Infections bronchiques et pulmonaires,
- Certaines infections urogénitales.

Poudre pour suspension buvable :

Ce médicament est indiqué chez l'enfant de plus de 6 mois, dans le traitement des :

- Infections bronchiques et pulmonaires,
- Otites moyennes aiguës,
- Certaines infections urinaires.

ATTENTION !

a) Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament ?

Poudre pour suspension buvable et comprimé pelliculé :

• Allergie connue aux antibiotiques du groupe des céphalosporines, ou à l'un des excipients de ces médicaments.

Comprimé pelliculé :

- Enfant de moins de 12 ans.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

b) Mises en garde spéciales et précautions d'emploi :

Mises en garde spéciales :

Toute manifestation allergique (éruption cutanée, démangeaison...) en cours de traitement doit être signalée immédiatement à votre médecin. En effet, la survenue d'une réaction allergique impose l'arrêt du traitement. Il existe une possibilité d'allergie (5 à 10 % des cas) chez les sujets allergiques aux pénicillines ou autres bêta-lactamines. Signaler à votre médecin toute allergie ou manifestations allergiques survenues lors de traitement par les antibiotiques du groupe des pénicillines.

En cas de diarrhée survenant au cours du traitement, prenez rapidement avis auprès de votre médecin. Ne prenez pas de traitement antidiarrhéique sans prescription médicale.

Si vous avez déjà eu une anémie hémolytique après la prise d'un antibiotique de la famille des céphalosporines y compris OFIKEN (diminution des globules rouges, ce qui peut entraîner une pâleur, une faiblesse ou un essoufflement), vous devez prévenir votre médecin avant de prendre ce médicament.

Si vous avez une réaction cutané sévère de type éruption de bulles avec décollement de la peau pouvant rapidement s'étendre à tout le corps et vous mettre en danger (Syndrome de Lyell, syndrome de Stevens-Johnson) ou un syndrome d'hypersensibilité médicamenteuse (DRESS), pendant ou après le traitement, vous devez informer immédiatement votre médecin.

Poudre pour suspension buvable : En raison de la présence de saccharose, ce m

utilisé en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption des sucre

et de crise isomaltose, de certains troubles métaboliques rares).

Tramal® L.P. 100mg

Chlorhydrate de tramadol

Comprimé à libération prolongée

MÉDICAMENTS POUVANT ÊTRE OBTENUS UNIQUEMENT SUR ORDONNANCE

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes sur votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau.

DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT

TRAMAL® L.P. 100 mg, comprimé à libération prolongée

LISTE COMPLÈTE DES SUBSTANCES ACTIVES ET DES EXCIPIENTS

La substance active est: chlorhydrate de tramadol (100 mg)

Excipients : q.s.p. 1 comprimé.

I. QU'EST CE QUE TRAMAL® L.P. 100 mg, comprimé à libération prolongée ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ?

FORME PHARMACEUTIQUE ET CONTENU; CLASSE PHARMACOTHÉRAPEUTIQUE

Comprimé à libération prolongée, de forme ronde et de couleur blanche : boîte de 10 et 30.

Le tramadol, principe actif contenu dans TRAMAL® L.P. 100 mg, est un antalgique (substance calmant la douleur) qui appartient à la classe des opiacés. Il agit sur le système nerveux central et soulage la douleur en agissant sur des cellules nerveuses particulières de la moelle épinière et du cerveau.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

TRAMAL® L.P. 100 mg, est utilisé pour les douleurs modérées à intenses

II. QUELLES SONT LES AVANT DE PRENDRE TRAMAL® L.P. 100 mg, libération prolongée?

LISTE DES INFORMATIONS DU MÉDICAMENT

CONTRE-INDICATIONS

Ne prenez pas TRAMAL® L.P. 100 mg, libération prolongée:

- Si vous êtes allergique (hypersensible) au tramadol ou à l'un des autres composants de TRAMAL® L.P. 100 mg.
- En cas d'intoxication aiguë par l'alcool, des somnifères, d'autres médicaments contre la douleur ou des médicaments psychotropes (médicaments qui agissent sur l'humeur et les émotions)
- Si vous prenez en même temps des inhibiteurs de la MAO (médicaments utilisés pour le traitement de la dépression) ou si vous en avez pris au cours des deux semaines précédant le traitement par TRAMAL® L.P. 100 mg (voir «Utilisation d'autres médicaments»)
- Si vous êtes épileptique et que vos crises ne sont pas bien contrôlées par le traitement;
- Comme traitement de substitution dans le cadre du sevrage d'une toxicomanie.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI / MISES EN GARDE SPÉCIALES

Prendre des précautions particulières avec TRAMAL® L.P. 100 mg, comprimé à libération prolongée

- Si vous estimatez que vous êtes dépendant à d'autres antalgiques (opiacés)
- Si vous souffrez de troubles de la conscience (si vous avez l'impression que vous allez vous évanouir)
- Si vous êtes en état de choc (ce qui peut se manifester par des sueurs froides)
- Si vous souffrez d'une augmentation de la pression dans le cerveau (par exemple après un traumatisme crânien ou une maladie cérébrale)
- Si vous avez des difficultés respiratoires
- Si vous présentez une tendance à l'épilepsie ou aux convulsions
- Si vous souffrez d'une maladie hépatique ou rénale.

Dans ces cas, consultez votre médecin avant de prendre ce médicament.

Notez bien que TRAMAL® L.P. 100 mg peut provoquer une dépendance physique et psychique. Quand TRAMAL® L.P. 100 mg est pris pendant une durée prolongée, son effet peut s'atténuer, si bien qu'il faut augmenter les doses (développement d'un phénomène d'accoutumance). Les patients qui ont tendance à abuser des médicaments ou qui sont dépendants de certains médicaments ne doivent utiliser TRAMAL® L.P. 100 mg que pendant de courtes durées et sous surveillance médicale stricte.

Veuillez également informer votre médecin si l'un de ces problèmes survient pendant le traitement par TRAMAL® L.P. 100 mg ou est survenu par le passé.

INTERACTIONS AVEC LES ALIMENTS ET LES BOISSONS

Prise de TRAMAL® L.P. 100 mg, comprimé à libération prolongée avec des aliments et boissons.

Ne consommez pas d'alcool pendant le traitement par TRAMAL® L.P. 100 mg, car cela accentuerait son effet.

UTILISATION PENDANT LA GROSSESSE ET L'ALLAITEMENT

Grossesse

Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Il n'existe que très peu d'informations concernant la sécurité d'emploi du tramadol chez la femme enceinte. Vous ne devez donc pas utiliser TRAMAL® L.P. 100 mg, si vous êtes enceinte.

D'une manière générale, l'emploi du tramadol est déconseillé pendant l'allaitement. De faibles quantités de tramadol passent dans le lait maternel. Après une prise unique, il n'est généralement pas nécessaire d'interrompre l'allaitement. Demandez conseil à votre médecin.

EFFETS SUR L'APTITUDE À CONDUIRE DES VÉHICULES OU À UTILISER DES MACHINES

Conduite de véhicules et utilisation de machines :

TRAMAL® L.P. 100 mg, peut provoquer une somnolence, des sensations vertigineuses et une vision floue, et, donc, perturber votre capacité de réaction. Si vous sentez que vos réactions sont perturbées, ne conduisez pas de voiture ou un autre véhicule, n'utilisez pas d'outils électriques ou de machines et ne travaillez pas sans appui solide.

LISTE DES EXCIPIENTS À EFFET NOTOIRE

Information importante concernant certains composants de TRAMAL® L.P. 100 mg, comprimé à libération prolongée : Si votre médecin vous a dit que vous présentez une intolérance à certains sucres, consultez-le avant de prendre ce médicament.

INTEGRALE

ITRES MEDICAMENTS

amments

idéen ou votre pharmacien si vous prenez tout autre médicament, y compris les médicaments vendus sans ordonnance. Il ne faut pas prendre TRAMAL® L.P. 100 mg avec des inhibiteurs de la MAO (treatment de la dépression).

TRAMAL® L.P. 100 mg peut être atténué si vous prenez des

• La carbamazépine (un antépileptique) ;

• La pentazocine, de la nalbuphine ou de la buprénorphine (des antalgiques) ;

• L'ondansétron (pour prévenir les nausées) .

Votre médecin vous dira si vous pouvez prendre TRAMAL® L.P. 100 mg et à quelle posologie

Le risque d'effets indésirables augmente

• Si vous prenez en même temps que TRAMAL® L.P. 100 mg, des médicaments qui ont un effet dépresseur sur le système nerveux comme les tranquillisants, les somnifères, d'autres antalgiques tels que la morphine et la codéine (également si ces médicaments sont prescrits pour traiter la toux), ainsi que l'alcool, vous risquez de vous sentir plus somnolent ou d'avoir l'impression que vous allez vous évanouir. Si cela se produit, parlez-en à votre médecin.

• Si vous prenez des médicaments susceptibles de provoquer des convulsions (crises d'épilepsie), par exemple des médicaments destinés au traitement de maladies psychologiques (comme certains antidépresseurs). Le risque de crise d'épilepsie peut augmenter si vous prenez TRAMAL® L.P. 100 mg en même temps. Votre médecin vous dira si TRAMAL® L.P. 100 mg vous convient.

• Si vous prenez des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (souvent appelés IRESS) ou des inhibiteurs de la MAO (pour le traitement de la dépression), TRAMAL® L.P. 100 mg peut interagir avec leur effet ce qui peut, rarement, conduire à un «syndrome sérotoninergique». Ce syndrome peut se manifester, par exemple, par une confusion, une agitation, de la fièvre, des sueurs, des mouvements non coordonnés des membres ou yeux, des saccades musculaires incontrôlables ou une diarrhée.

• Si vous prenez des anticoagulants dérivés de la coumarine (médicaments fluidifiant le sang), par exemple de la warfarine, en même temps que TRAMAL® L.P. 100 mg, l'effet des médicaments sur la coagulation peut s'en trouver modifié et survenir des hémorragies.

III. COMMENT UTILISER TRAMAL® L.P. 100 mg, comprimé à libération prolongée ?

INSTRUCTIONS POUR UN BON USAGE

POSÉLOGIE, FRÉQUENCE D'ADMINISTRATION ET DU TRAITEMENT MODE ET/OU VOIE(S) D'ADMINISTRA-

Prenez toujours TRAMAL® L.P. 100 mg en respectant les instructions de votre médecin. En cas d'incertitude, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Il faut ajuster la posologie en fonction de l'intensité de votre douleur et de votre sensibilité personnelle à la douleur. D'une manière générale, il faut prendre la dose minimale qui soulage la douleur. Sauf prescription contraire de votre médecin, la posologie est la suivante :

P Y 68 D H 70
P E R 12 / 27
L O T 13992

