

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 12655 Société : RAM

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : SEFRAOUI KHALID

Date de naissance : 17/06/1987

Adresse : Boulevard Goffily - VS3 - 42

Tél. : 066 1880353 Total des frais engagés : 1471,00 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 22/06/2019

Nom et prénom du malade : ENES SEFRAOUI Age : 2 ans

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie :

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casa Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
22/12/2022	Consultation	1	300,00	Dr. BENKHADRA Hafid Pédiatre 415, Bd Attaloumien Anjia 9d 4 ^e étage Anoual Capital Center Rue 22 Et 12, 1er Etage Bureau N° 2 06 03 03 28 16 - Casablanca
22/12/2022	Consultation	1	300,00	Dr. BENKHADRA Hafid Pédiatre 415, Bd Attaloumien Anjia 9d 4 ^e étage Anoual Capital Center Rue 22 Et 12, 1er Etage Bureau N° 2 06 03 03 28 16 - Casablanca

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Pharmacie Jawhara BELMABIB - S. Dr. en Pharmacie Rue Léonardis France Ville H Tel et Fax : 08.88.34 - Casablanca	22/12/22	1171,00

ANALYSES - RADIOPHARMACIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :


Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				Coefficient des travaux
				Montants des soins
				Début d'exécution
				Fin d'exécution

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
D	G
00000000	00000000
35533411	11433553



(Création, remont, adjonction)
fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS


VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr Hanane Benkhadra Benabderrazik
pédiatre spécialiste

diplômée de la faculté de médecine de Liège Belgique,



الدكتورة حنان بنخضرة بنعبد الرزاق
احصاصية في امراض الاطفال والرضيع
خريجة كلية الطب بلجيك (بلجيكا)



CASABLANCA, le 22.12.2022

Enfant SEFRAOUI Ines

Age : 2 ans

Poids : 10,40 Kg

1 HEXAXIM VACCIN

760/00

2 PREVENAR 13 susp inj : 1Ser avec aig/0,5ml

3 SERUM BICARBONATE 14

1 le matin et le soir, pendant 7 jours.

Dr Hanane BENKHADRA

416, أنوال كابطال ساتر شارع عبد المؤمن زاوية شارع أنوال المدخل A المكتب رقم 9 الطابق الأول - الهاتف : 05 22 86 37 27 - بالموعد .
416, Anoual Capital center, Bd abdelmoumen angle Bd. Anoual entrée A, Bureau N° 9 1^{er} étage - Tél : 05 22 86 37 27 / Cabinet: 06 59 93 11 11
— benkhadrahanan@gmail.com — Urgence : 06.63.05.28.12 — المستعجلات : Sur rendez-vous —

Hexaxim

Suspension injectable en seringue préremplie

Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux (acellulaire, multicomposé), de l'hépatite B (ADNr), poliomylétilque (inactivé) et conjugué de *Haemophilus influenzae* type b, adsorbé

Veuillez lire attentivement les informations importantes pour la sécurité de votre enfant :

- Gardez cette notice.
- Si vous avez d'autre question, contactez votre infirmier/ère ou votre pharmacien.
- Si votre enfant ressent des symptômes de fatigue, de fièvre ou de malaise, contactez votre infirmier/ère ou votre pharmacien.

Sanofi-aventis Maroc

Route de Rabat - R.P.1,
Ain sebaâ Casablanca

HEXAXIM 0.5ML 1F 2

AIG SP

P.P.V: 411,00



5 118001 082063

nt car elle contient des informations

n ou votre infirmier/ère, votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Voir les mentions dans cette notice.

Que contient cette notice ?

- Qu'est-ce qu'HEXAXIM ?
- Quelles sont les informations à connaître avant qu'HEXAXIM ne soit administré à votre enfant
- Comment utiliser HEXAXIM
- Quels sont les effets indésirables éventuels
- Comment conserver HEXAXIM
- Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce qu'HEXAXIM et dans quel cas est-il utilisé ?

HEXAXIM (DTaP-IPV-HB-Hib) est un vaccin utilisé pour se protéger contre les maladies infectieuses.

HEXAXIM contribue à protéger contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l'hépatite B, la poliomylérite et les maladies graves à *Haemophilus influenzae* type b. HEXAXIM peut être donné aux enfants dès l'âge de six semaines.

Le vaccin agit de manière à ce que le corps développe sa propre protection (anticorps) contre les bactéries et virus responsables des maladies suivantes :

- La diphtérie, maladie infectieuse qui commence généralement par tousser la gorge, provoquant des douleurs et un gonflement pouvant entraîner une suffocation. La bactérie responsable de la maladie produit également une toxine (poison) pouvant endommager le cœur, les reins et les nerfs.
- Le tétanos, généralement causé par la pénétration de la bactérie du tétanos par une plaie profonde. La bactérie produit une toxine (poison) qui provoque des spasmes musculaires entraînant une incapacité à respirer et un risque de suffocation.
- La coqueluche est une maladie hautement infectieuse qui touche les voies respiratoires. Elle provoque une toux sévère susceptible de provoquer des difficultés à respirer. Cette toux ressemble au bruit que fait le coq lorsqu'il chante. La toux peut persister pendant un à deux mois, voire plus longtemps. La coqueluche peut aussi provoquer des infections des oreilles, des infections des bronches (bronchite) qui peuvent durer longtemps, des infections pulmonaires (pneumonie), des convulsions, des lésions cérébrales et même le décès.
- L'hépatite B est provoquée par le virus de l'hépatite B. Elle entraîne un gonflement du foie (une inflammation). Chez certaines personnes, le virus peut subsister dans le corps pendant longtemps et il peut finir par entraîner de graves problèmes de foie, y compris un cancer du foie.
- La poliomylérite (souvent appelée polio), causée par des virus qui affectent les nerfs. La poliomylérite peut entraîner la paralysie ou une faiblesse musculaire, le plus souvent des jambes. La paralysie des muscles contrôlant la respiration et la déglutition peut être fatale.
- Les infections à *Haemophilus influenzae* type b (souvent appelé Hib), infections bactériennes graves pouvant entraîner une méningite (inflammation de l'enveloppe externe du cerveau) susceptible d'entraîner des lésions cérébrales, une surdité, une épilepsie ou rendre partiellement aveugle. L'infection peut provoquer une inflammation et un gonflement de la gorge entraînant des difficultés à avaler ou à respirer. L'infection peut toucher d'autres parties du corps comme le sang, les poumons, la peau, les os et les articulations.

Informations importantes concernant la protection conférée

- HEXAXIM aide à prévenir ces maladies uniquement si elles sont causées par les bactéries ou les virus ciblés par le vaccin. Votre enfant peut attraper des maladies dont les symptômes sont similaires, si elles sont dues à d'autres bactéries ou à d'autres virus.
- Ce vaccin ne contient pas de bactérie vivante ou de virus vivant et ne peut pas provoquer les maladies infectieuses contre lesquelles il protège.
- Ce vaccin ne protège pas contre les infections invasives dues à d'autres types d'*Haemophilus influenzae*. Il ne protège pas contre les méningites causées par d'autres micro-organismes.
- HEXAXIM ne protège pas contre les infections hépatiques causées par d'autres agents pathogènes, telles que ceux de l'hépatite A, l'hépatite C, l'hépatite E.
- Étant donné que les symptômes de l'hépatite B se développent lentement, il est possible qu'une infection non détectée soit présente lors de la vaccination. Dans ce cas, il se peut que le vaccin ne protège pas contre l'hépatite B.
- Comme pour tout autre vaccin, HEXAXIM ne peut pas garantir la protection de 100 % des enfants vaccinés.

2. Quelles sont les informations à connaître avant qu'HEXAXIM ne soit administré à votre enfant ?

Pour être sûr qu'HEXAXIM convient bien à votre enfant, il est important de dire à votre médecin ou à votre infirmier/ère si l'un des cas ci-dessous s'applique à votre enfant. S'il y a quoi que ce soit que vous ne comprenez pas, demandez à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre infirmier/ère de vous l'expliquer.

N'utilisez jamais HEXAXIM si votre enfant :

- a présenté un trouble respiratoire ou un gonflement du visage (réaction anaphylactique) après l'administration d'HEXAXIM.
- a eu une réaction allergique
 - aux substances actives,
 - à l'un des excipients mentionnés dans la rubrique 6.

- au glutaraldéhyde, utilisées pendant la fabrication.
- suite à une précédente vaccination contre la poliomylérite, l'enfant souffre d'une réaction d'administration d'un autre vaccin.
- à une maladie non connue d'une épilepsie.

Avertissements et précautions

Avant la vaccination, adressez-vous à votre infirmier/ère, présentant une température élevée, il est possible de faire une vaccination.

- à présent l'un des vaccins d'administrer d'autres :
 - fièvre supérieure ou égale à 38,5 °C
 - collapsus (malaise brusque d'hypotonie-hypotension)
 - pleurs persistants, intenses
 - convulsions avec ou sans fièvre
- a présenté précédemment une douleur, une paralysie, une réduction de la mobilité ou une forme inactive de l'anatoxine tétanique.
- suit actuellement un enfant souffrant d'une maladie qui peut empêcher de vacciner. Les enfants peuvent toutefois recevoir celle observée chez l'enfant souffrant d'une maladie qui peut empêcher de fonctionner correctement.
- souffre d'une maladie qui peut empêcher de vacciner. Les enfants peuvent toutefois recevoir celle observée chez l'enfant souffrant d'une maladie qui peut empêcher de fonctionner correctement.
- a, après des blessures, durent longtemps. Veuillez consulter votre infirmier/ère.

Un événissement peu courant peut survenir chez votre infirmier/ère.

Autres médicaments ou substances

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez d'autres médicaments ou vaccins. HEXAXIM peut être administré avec d'autres vaccins conjugués, vaccins rouges et bleus. Lorsqu'il est administré en même temps qu'avec d'autres vaccins, HEXAXIM contient de la phénylalanine.

HEXAXIM contient 85 mg de phénylalanine par dose. Les personnes atteintes de phénylalanine-uridylate transaminase (PAUT) doivent éviter d'avoir des doses de phénylalanine supérieures à 100 mg/jour. HEXAXIM contient moins de 100 mg de phénylalanine par dose, qu'il est considéré comme sûre.

3. Comment utiliser HEXAXIM

HEXAXIM sera administré par injection intramusculaire dans la cuisse ou l'abdomen. Il sera administré par une personne entraînée à l'injection. Le schéma posologique est indiqué dans la rubrique 4 * Effets indésirables.

Le schéma posologique est indiqué dans la rubrique 4 * Effets indésirables. HEXAXIM s'administre en deux doses, une à l'âge de 2 mois et une deuxième à l'âge de 4 mois.

Votre enfant recevra soit une dose unique ou deux doses.

d'au moins 4 semaines entre les deux doses.

Après la première dose, une dose supplémentaire sera administrée à l'âge de 4 mois.

Il est important de suivre le schéma posologique recommandé. Dans le cas où votre enfant ne reçoit pas toutes les doses recommandées, il est important de suivre le schéma posologique recommandé.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si votre enfant manque une dose, il (elle) devra prendre une dose supplémentaire.

Il est important de suivre le schéma posologique recommandé.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.

Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien.