

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
 Prise en charge : pec@mupras.com
 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 19300 Société :

Actif Pensionné(e) Autre :

Nom & Prénom : Boutaleb Grabi


Date de naissance : 03/01/2002

Adresse : Résidence d'Avignon California Casablanca

Tél. : 06 61 80 36 38 Total des frais engagés : 640 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation :

Nom et prénom du malade : Boutaleb Grabi Age :

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : Boutaleb Grabi

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : 26/11/14

Signature de l'adhérent(e) :



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Nature des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
26/12/22	22		320,20	<i>DR TRIAME PECHEUR ST CLOUD</i>

EXECUTION DES ORDONNANCES



Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	COEFFICIENT DES TRAVAUX	
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE				MONTANTS DES SOINS
	H	25533412 00000000 35533411	G	21433552 00000000 11433553	
D	00000000	B	00000000		
B	35533411		11433553		
(Création, remont, adjonction)	Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession				DATE DU DEVIS
D					
B					
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS	VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION				DATE DE L'EXECUTION

Dr Hanane Benkhadra Benabderrazik
pédiatre spécialiste

diplômée de la faculté de médecine de Liège Belgique,

Cabinet



de pédiatrie

الدكتورة حناء بنخضرة بنعبد الرزاق
اختصاصية في أمراض الأطفال والولادة
خريجة كلية الطب بلجيكا (بلجيكا)

CASABLANCA, le 26.12.2022

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat-R.P.1,
Ain sebâ Casablanca
Enterogermina 2 milliards
susp b 10 fl 6 ml
P.P.V : 60,00 DH
5 118001 081653

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat-R.P.1,
Ain sebâ Casablanca
Enterogermina 2 milliards
susp b 10 fl 6 ml
P.P.V : 60,00 DH
5 118001 081653

Nourrisson BOUTALEB Ghali

Age : 11 mois 23 jours

Poids : 12,00 Kg



1 CLAVULIN SIROP ENFANT

2 boites

Prendre 1 dose/ kg, le matin, le midi et le soir, pendant 8 jours


2 ENTEROGERMINA

Prendre 1 dose le matin et le soir, pendant 8 jours.



Dr Hanane BENKHADRA

261,20



Casablanca, le

416، أنوال كابيتال ساينتر شارع عبد المؤمن زاوية شارع أنوال المدخل A المكتب رقم 9 الطابق الأول - الهاتف : 05 22 86 37 27 - بالموعد .

416, Anoual Capital center, Bd abdelmoumen angle Bd. Anoual entrée A, Bureau N° 9 1^{er} étage - Tél : 05 22 86 37 27 / Cabinet: 06 59 93 11 11

— benkhadrahanan@gmail.com — Urgence : 06.63.05.28.12 — المستعجلات : Sur rendez-vous —

PPV : 70,60 DH
LOT : 649295
PER : 03/2024

CLAVULIN 100mg/12,50mg par ml Nourrisson, pe
buvable en flacon de 30 ml

CLAVULIN 100mg/12,50mg par ml Enfant, poudre pour suspension
buvable en flacon de 60 ml

CLAVULIN 500mg/62,5mg Enfant, poudre pour suspension buvab
sachet-dose, boîte de 12 sachets.

Amoxicilline/Acide clavulanique

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce
car elle contient des informations importantes pour vous.

Gardez cette notice. Vous pourrez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'information au médecin ou à
Ce médicament vous a été personnellement prescrit (ou a été prescrit à vous
le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les s
maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet inc
mentionné dans cette notice, parlez-en au médecin ou au pharmacien.

Que contient cette notice ?

- Qu'est-ce que CLAVULIN et dans quels cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CLAVULIN ?
- Comment prendre CLAVULIN ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver CLAVULIN ?
- Contenu de l'emballage et autres informations.

QU'EST-CE QUE CLAVULIN ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Association de pénicillines, y compris inhibiteurs de la
beta-lactamase - code ATC : J01CR02.

CLAVULIN est un antibiotique qui tue les bactéries responsables des infections. Il contient
deux molécules différentes, appelées amoxicilline et acide clavulanique. L'amoxicilline
appartient à un groupe de médicaments appelés « pénicillines », qui peuvent parfois arrêter
d'être efficaces (être inactives). L'autre constituant actif (l'acide clavulanique) empêche
cette inactivation.

CLAVULIN est utilisé chez l'adulte et chez l'enfant pour traiter les infections suivantes :

- infections de l'oreille moyenne et des sinus,
- infections des voies respiratoires,
- infections des voies urinaires,
- infections de la peau et des tissus mous, incluant les infections dentaires,
- infections des os et des articulations.

QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE CLAVULIN ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sures, contactez-le avant
de prendre ce médicament.

Ne donnez jamais CLAVULIN à votre enfant :

- s'il est allergique à l'amoxicilline, à l'acide clavulanique, à la pénicilline ou à l'un des
autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- s'il a déjà présenté une réaction allergique grave (d'hypersensibilité) à un autre antibiotique.
- Ceci peut inclure une éruption cutanée ou un gonflement du visage ou de la gorge.
- s'il a déjà eu des problèmes au foie ou développé un ictere (jaunissement de la peau) lors
de la prise d'un antibiotique.

→ Ne donnez pas CLAVULIN à votre enfant s'il est dans l'une des situations
mentionnées ci-dessus.

En cas de doute, demandez conseil à son médecin ou au pharmacien avant d'administrer
CLAVULIN.

Avertissements et précautions

Demandez conseil au médecin de votre enfant ou au pharmacien avant de lui administrer
CLAVULIN s'il :

- souffre de mononucléose infectieuse,
- est traité(e) pour des problèmes au foie ou aux reins,
- n'urine pas régulièrement.

En cas de doute, demandez conseil au médecin de votre enfant ou au pharmacien avant de
lui administrer CLAVULIN.

Dans certains cas, le médecin de votre enfant pourra rechercher le type de bactérie
responsable de l'infection.

Selon les résultats, il pourra prescrire à votre enfant un dosage différent de CLAVULIN ou
un autre médicament.

Réactions nécessitant une attention particulière

CLAVULIN peut aggraver certaines maladies ou engendrer des effets secondaires graves,
notamment des réactions allergiques, des convulsions et une inflammation du gros intestin.
Lorsque votre enfant prend CLAVULIN, vous devez surveiller certains symptômes afin de
réduire les risques. Voir « Réactions nécessitant une attention particulière », à la rubrique 4.

Tests sanguins et urinaires

Si votre enfant effectue des analyses de sang (nombre de globules rouges ou explorations
fonctionnelles sanguines) ou des analyses d'urine (dosage du glucose), vous devez informer
le médecin ou l'infirmière(r) qui prend CLAVULIN. En effet, CLAVULIN peut influer sur les
résultats de ces types de tests.

Autres médicaments et CLAVULIN :

Si votre enfant prend ou a récemment pris un autre médicament, parlez-en à son médecin
ou au pharmacien.

Si votre enfant prend l'allopurinol (en traitement de la goutte) avec CLAVULIN, le risque de
réaction cutanée allergique est plus élevé.

Si votre enfant prend l'aspirine (en traitement de la goutte), son médecin peut décider de
l'arrêter ou de le remplacer.

Si des médicaments destinés à empêcher la coagulation du sang (tels que la warfarine) sont
pris avec CLAVULIN, des analyses sanguines supplémentaires peuvent être requises.

CLAVULIN peut influer sur l'action du méthotrexate (un médicament utilisé pour traiter le
cancer ou les maladies rhumatismales).

CLAVULIN peut influer sur l'action du mycophénolate moétil (traitement pour prévenir le
reflet de greffe d'organes).

Grossesse, allaitement et fertilité

Si votre enfant, devant recevoir ce médicament, est enceinte ou allaite, ou si elle pense
être enceinte, demandez conseil à son médecin ou son pharmacien avant de prendre ce
médicament.

UN contenu:

CLAVULIN
100mg/12,50mg/1ml
poudre suspension buvable, 60ml



6 118000 160526

est une source de phénylalanine. Celle-ci peut être nocive chez

maladie appelée « phénylcétonurie ».

Si votre enfant a une intolérance à certains sures,
il doit administrer ce médicament.

chez les enfants suivant un régime pauvre en potassium.
chez les enfants suivent un régime pauvre en sel, strict.

FULIM ?
à médicament à votre enfant en suivant exactement les
pharmacien. Vérifiez auprès du médecin ou du pharmacien

plus :

lement pas recommandées pour les adultes et les enfants
conseil au médecin ou au pharmacien.

mg en flacon et CLAVULIN 500 mg/62,50 mg en sachet :

- toutes les doses sont établies en fonction du poids de l'enfant en kilogrammes.
- Dose recommandé : 40 mg/5 mg à 80 mg/10 mg par kg de poids corporel et par jour, en trois fois.
- Votre médecin vous indiquera la quantité de CLAVULIN à administrer à votre bébé ou enfant.

CLAVULIN 100 mg/12,50 mg en flacon :

- Une seringue graduée vous est fournie. Vous devez l'utiliser pour administrer la dose
graduée sont fournies à la fin de la notice.

Pour le CLAVULIN en flacon, La seringue doseuse fournie avec ce médicament est
graduée en

kilogrammes et est uniquement réservée à l'usage de CLAVULIN. Chaque graduation
représente 0,267 ml (ou 26,7 mg d'amoxicilline), sur la base de la posologie de
80 mg/10 mg/kg/jour en trois prises.

Lorsque la posologie de 80 mg/10 mg/kg/jour est prescrite, la graduation sur la seringue
correspondra au poids de l'enfant (par exemple, pour un enfant pesant 4 kg, administrer
la dose correspondant à la graduation 4 kg sur la seringue 3 fois par jour).

Pour les posologies autres que 80 mg/10 mg/kg/jour, les graduations sur la seringue ne
correspondront plus au poids de l'enfant. Vous devez utiliser la graduation indiquée par le
médecin ou le pharmacien.

Patients souffrant de problèmes rénaux et hépatiques :

- Si votre enfant a des problèmes rénaux, une adaptation de la dose peut être nécessaire.
Le médecin pourra prescrire un dosage différent ou un autre médicament.
- Si votre enfant a des problèmes au foie, des analyses de sang plus fréquentes pourront
être nécessaires afin de vérifier le fonctionnement de son foie.

Mode d'administration :

- Répartissez les prises de manière régulière au cours de la journée ; elles doivent être
espacées d'au moins 4 heures. N'administrez pas 2 doses en 1 heure.
- Ne donnez pas CLAVULIN à votre enfant pendant plus de 2 semaines. Si les symptômes
persistent, consultez de nouveau un médecin.

CLAVULIN 100 mg/12,50 mg en flacon :

- Agitez bien le flacon, avant l'ouverture et avant la reconstitution, afin de détacher la
poudre des parois.
- Agitez toujours le flacon avant chaque utilisation.
- Donnez ce médicament à votre enfant au cours d'un repas.

CLAVULIN 500 mg/62,50 mg en sachet :

- Juste avant la prise de CLAVULIN, ouvrez le sachet et mélangez son contenu dans un
demi-verre d'eau.

- Donnez ce mélange à votre enfant au début d'un repas ou un peu avant.

Si vous avez administré plus de CLAVULIN que vous n'auriez dû :

Consultez immédiatement le médecin ou le pharmacien.

La prise d'une quantité excessive de CLAVULIN par votre enfant peut entraîner des maux de
ventre (nausées, vomissements ou diarrhée) ou des convulsions. Parlez-en au médecin le
plus tôt possible. Montrez la boîte de médicament au médecin.

Si vous oubliez de donner CLAVULIN à votre enfant :

Si vous avez oublié de donner une dose à votre enfant, administrerez-la dès que vous y pensez.
Attendez ensuite environ 4 heures avant d'administrer la dose suivante. N'administrez pas
de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de lui administrer.

Si votre enfant arrête de prendre CLAVULIN :

Vous devrez continuer de donner CLAVULIN à votre enfant jusqu'à la fin du traitement, même
si elles sont temporairement. Toutes les doses sont importantes pour combattre l'infection. Si certaines
bactéries devraient survivre, elles pourraient être à l'origine d'une réapparition de l'infection.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus
d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.

QUELLES SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais
ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Réactions nécessitant une attention particulière.

- Réactions allergiques
- inflammation des vaisseaux sanguins (vascularité) pouvant apparaître sous la forme de
taches rouges ou violettes sur la peau, mais pouvant également toucher d'autres parties
du corps,
- fièvre, douleurs articulaires, gânglion dans le cou, l'aisselle et laine,
- gonflement, parfois du visage ou de la gorge (angio-oedème), entraînant des difficultés
respiratoires,
- malaise brutal avec chute de la pression artérielle.

→ Si votre enfant présente un de ces symptômes, contactez un médecin immédiatement.

Arrêtez l'administration de CLAVULIN.

Inflammation du gros intestin

Inflammation du gros intestin, entraînant une diarrhée aqueuse avec du sang et du mucus,
des douleurs gastriques et/ou une fièvre.

→ Si votre enfant présente ces symptômes, demandez conseil le plus tôt possible au
médecin.

PPV : 70,60 DH
LOT : 649295
PER : 03/2024

CLAVULIN 100mg/12,50mg par ml Nourrisson, pe
buvable en flacon de 30 ml

CLAVULIN 100mg/12,50mg par ml Enfant, poudre pour suspension
buvable en flacon de 60 ml

CLAVULIN 500mg/62,5mg Enfant, poudre pour suspension buvab
sachet-dose, boîte de 12 sachets.

Amoxicilline/Acide clavulanique

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce
car elle contient des informations importantes pour vous.

Gardez cette notice. Vous pourrez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'information au médecin ou à
Ce médicament vous a été personnellement prescrit (ou a été prescrit à vous
le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les s
maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet inc
mentionné dans cette notice, parlez-en au médecin ou au pharmacien.

Que contient cette notice ?

- Qu'est-ce que CLAVULIN et dans quels cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CLAVULIN ?
- Comment prendre CLAVULIN ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver CLAVULIN ?
- Contenu de l'emballage et autres informations.

QU'EST-CE QUE CLAVULIN ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Association de pénicillines, y compris inhibiteurs de la
beta-lactamase - code ATC : J01CR02.

CLAVULIN est un antibiotique qui tue les bactéries responsables des infections. Il contient
deux molécules différentes, appelées amoxicilline et acide clavulanique. L'amoxicilline
appartient à un groupe de médicaments appelés « pénicillines », qui peuvent parfois arrêter
d'être efficaces (être inactives). L'autre constituant actif (l'acide clavulanique) empêche
cette inactivation.

CLAVULIN est utilisé chez l'adulte et chez l'enfant pour traiter les infections suivantes :

- infections de l'oreille moyenne et des sinus,
- infections des voies respiratoires,
- infections des voies urinaires,
- infections de la peau et des tissus mous, incluant les infections dentaires,
- infections des os et des articulations.

QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE CLAVULIN ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sures, contactez-le avant
de prendre ce médicament.

Ne donnez jamais CLAVULIN à votre enfant :

- s'il est allergique à l'amoxicilline, à l'acide clavulanique, à la pénicilline ou à l'un des
autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- s'il a déjà présenté une réaction allergique grave (d'hypersensibilité) à un autre antibiotique.
- Ceci peut inclure une éruption cutanée ou un gonflement du visage ou de la gorge.
- s'il a déjà eu des problèmes au foie ou développé un ictere (jaunissement de la peau) lors
de la prise d'un antibiotique.

→ Ne donnez pas CLAVULIN à votre enfant s'il est dans l'une des situations
mentionnées ci-dessus.

En cas de doute, demandez conseil à son médecin ou au pharmacien avant d'administrer
CLAVULIN.

Avertissements et précautions

Demandez conseil au médecin de votre enfant ou au pharmacien avant de lui administrer
CLAVULIN s'il :

- souffre de mononucléose infectieuse,
- est traité(e) pour des problèmes au foie ou aux reins,
- n'urine pas régulièrement.

En cas de doute, demandez conseil au médecin de votre enfant ou au pharmacien avant de
lui administrer CLAVULIN.

Dans certains cas, le médecin de votre enfant pourra rechercher le type de bactérie
responsable de l'infection.

Selon les résultats, il pourra prescrire à votre enfant un dosage différent de CLAVULIN ou
un autre médicament.

Réactions nécessitant une attention particulière

CLAVULIN peut aggraver certaines maladies ou engendrer des effets secondaires graves,
notamment des réactions allergiques, des convulsions et une inflammation du gros intestin.
Lorsque votre enfant prend CLAVULIN, vous devez surveiller certains symptômes afin de
réduire les risques. Voir « Réactions nécessitant une attention particulière », à la rubrique 4.

Tests sanguins et urinaires

Si votre enfant effectue des analyses de sang (nombre de globules rouges ou explorations
fonctionnelles sanguines) ou des analyses d'urine (dosage du glucose), vous devez informer
le médecin ou l'infirmière(r) qui prend CLAVULIN. En effet, CLAVULIN peut influer sur les
résultats de ces types de tests.

Autres médicaments et CLAVULIN :

Si votre enfant prend ou a récemment pris un autre médicament, parlez-en à son médecin
ou au pharmacien.

Si votre enfant prend l'allopurinol (en traitement de la goutte) avec CLAVULIN, le risque de
réaction cutanée allergique est plus élevé.

Si votre enfant prend l'aspirine (en traitement de la goutte), son médecin peut décider de
l'arrêter ou de le remplacer.

Si des médicaments destinés à empêcher la coagulation du sang (tels que la warfarine) sont
pris avec CLAVULIN, des analyses sanguines supplémentaires peuvent être requises.

CLAVULIN peut influer sur l'action du méthotrexate (un médicament utilisé pour traiter le
cancer ou les maladies rhumatismales).

CLAVULIN peut influer sur l'action du mycophénolate moétil (traitement pour prévenir le
reflet de greffe d'organes).

Grossesse, allaitement et fertilité

Si votre enfant, devant recevoir ce médicament, est enceinte ou allaite, ou si elle pense
être enceinte, demandez conseil à son médecin ou son pharmacien avant de prendre ce
médicament.

UN contenu:

CLAVULIN
100mg/12,50mg/1ml
poudre suspension buvable, 60ml



6 118000 160526

est une source de phénylalanine. Celle-ci peut être nocive chez

maladie appelée « phénylcétonurie ».

Si votre enfant a une intolérance à certains sures,
il doit administrer ce médicament.

chez les enfants suivant un régime pauvre en potassium.
chez les enfants suivent un régime pauvre en sel, strict.

FULIM ?
à médicament à votre enfant en suivant exactement les
pharmacien. Vérifiez auprès du médecin ou du pharmacien

plus :

lement pas recommandées pour les adultes et les enfants
conseil au médecin ou au pharmacien.

mg en flacon et CLAVULIN 500 mg/62,50 mg en sachet :

- toutes les doses sont établies en fonction du poids de l'enfant en kilogrammes.
- Dose recommandé : 40 mg/5 mg à 80 mg/10 mg par kg de poids corporel et par jour, en trois fois.
- Votre médecin vous indiquera la quantité de CLAVULIN à administrer à votre bébé ou enfant.

CLAVULIN 100 mg/12,50 mg en flacon :

- Une seringue graduée vous est fournie. Vous devez l'utiliser pour administrer la dose
graduée sont fournies à la fin de la notice.

Pour le CLAVULIN en flacon, La seringue doseuse fournie avec ce médicament est
graduée en

kilogrammes et est uniquement réservée à l'usage de CLAVULIN. Chaque graduation
représente 0,267 ml (ou 26,7 mg d'amoxicilline), sur la base de la posologie de
80 mg/10 mg/kg/jour en trois prises.

Lorsque la posologie de 80 mg/10 mg/kg/jour est prescrite, la graduation sur la seringue
correspondra au poids de l'enfant (par exemple, pour un enfant pesant 4 kg, administrer
la dose correspondant à la graduation 4 kg sur la seringue 3 fois par jour).

Pour les posologies autres que 80 mg/10 mg/kg/jour, les graduations sur la seringue ne
correspondront plus au poids de l'enfant. Vous devez utiliser la graduation indiquée par le
médecin ou le pharmacien.

Patients souffrant de problèmes rénaux et hépatiques :

- Si votre enfant a des problèmes rénaux, une adaptation de la dose peut être nécessaire.
Le médecin pourra prescrire un dosage différent ou un autre médicament.
- Si votre enfant a des problèmes au foie, des analyses de sang plus fréquentes pourront
être nécessaires afin de vérifier le fonctionnement de son foie.

Mode d'administration :

- Répartissez les prises de manière régulière au cours de la journée ; elles doivent être
espacées d'au moins 4 heures. N'administrez pas 2 doses en 1 heure.
- Ne donnez pas CLAVULIN à votre enfant pendant plus de 2 semaines. Si les symptômes
persistent, consultez de nouveau un médecin.

CLAVULIN 100 mg/12,50 mg en flacon :

- Agitez bien le flacon, avant l'ouverture et avant la reconstitution, afin de détacher la
poudre des parois.
- Agitez toujours le flacon avant chaque utilisation.
- Donnez ce médicament à votre enfant au cours d'un repas.

CLAVULIN 500 mg/62,50 mg en sachet :

- Juste avant la prise de CLAVULIN, ouvrez le sachet et mélangez son contenu dans un
demi-verre d'eau.

- Donnez ce mélange à votre enfant au début d'un repas ou un peu avant.

Si vous avez administré plus de CLAVULIN que vous n'auriez dû :

Consultez immédiatement le médecin ou le pharmacien.

La prise d'une quantité excessive de CLAVULIN par votre enfant peut entraîner des maux de
ventre (nausées, vomissements ou diarrhée) ou des convulsions. Parlez-en au médecin le
plus tôt possible. Montrez la boîte de médicament au médecin.

Si vous oubliez de donner CLAVULIN à votre enfant :

Si vous avez oublié de donner une dose à votre enfant, administrerez-la dès que vous y pensez.
Attendez ensuite environ 4 heures avant d'administrer la dose suivante. N'administrez pas
de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de lui administrer.

Si votre enfant arrête de prendre CLAVULIN :

Vous devrez continuer de donner CLAVULIN à votre enfant jusqu'à la fin du traitement, même
si elles sont temporairement. Toutes les doses sont importantes pour combattre l'infection. Si certaines
bactéries devraient survivre, elles pourraient être à l'origine d'une réapparition de l'infection.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus
d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.

QUELLES SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais
ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Réactions nécessitant une attention particulière.

- Réactions allergiques
- inflammation des vaisseaux sanguins (vascularité) pouvant apparaître sous la forme de
taches rouges ou violettes sur la peau, mais pouvant également toucher d'autres parties
du corps,
- fièvre, douleurs articulaires, gânglion dans le cou, l'aisselle et laine,
- gonflement, parfois du visage ou de la gorge (angio-oedème), entraînant des difficultés
respiratoires,
- malaise brutal avec chute de la pression artérielle.

→ Si votre enfant présente un de ces symptômes, contactez un médecin immédiatement.

Arrêtez l'administration de CLAVULIN.

Inflammation du gros intestin

Inflammation du gros intestin, entraînant une diarrhée aqueuse avec du sang et du mucus,
des douleurs gastriques et/ou une fièvre.

→ Si votre enfant présente ces symptômes, demandez conseil le plus tôt possible au
médecin.

Dr Hanane Benkhadra Benabderrazik
pédiatre spécialiste

diplômée de la faculté de médecine de Liège Belgique,

Cabinet



de pédiatrie

الدكتورة حنان بنخضرة بنعبد الرزاق
احصائية في امراض الاطفال والرضيع
خريجة كلية الطب بلجيك (بلجيكا)

CASABLANCA, le 26.12.2022

Nourrisson BOUTALEB Ghali

Age : 11 mois 23 jours

Poids : 12,00 Kg

1 DOLIPRANE 200 mg suppos : B/10

un suppo toutes les 6 heures pendant 2 jours

2 NURODOL SIRGP

Prendre 1 dose/kg le matin, à midi et le soir, pendant 2 jours.

3 STERIMAR BABY

Faire 1 pulvérisation le matin, à 10h, à midi, à 16h et le soir, pendant 7 jours.

4 BELLADONNA9 CH

5 granules le matin, à midi et le soir, pendant 5 jours.

5 PROSPAN SANS SUCRE sirop : FI/100ml

1 cuillère à café le matin et le soir, pendant 5 jours.

Dr Hanane BENKHADRA

Casablanca, le

416. أنوال كابطال سانتر شارع عبد المؤمن زاوية شارع أنوال المدخل A المكتب رقم 9 الطابق الأول - الهاتف : 05 22 86 37 27 - بالموعد.
416, Anoual Capital center, Bd abdelmoumen angle Bd. Anoual entrée A, Bureau N° 9 1^{er} étage - Tél : 05 22 86 37 27 / Cabinet: 06 59 93 11 11

— benkhadrahanan@gmail.com — Urgence : 06.63.05.28.12 — المستعجلات : 06.63.05.28.12 — Sur rendez-vous —

PROSPAN®

Sirop Traitement de la toux

PROSPAN Sirop 100 ml

PPV : 30,00 DH



6118000300052

Sans sucre • Sans alcool • Sans colorant
mucolytique • spasmolytique • soulage la toux
Adultes et Enfants



	pour 100 ml
.....	0,700 g
.....	55,000 g
.....	0,134 g

Eau purifiée, arôme cerise, gomme xanthane, acide citrique anhydre.

PRÉSENTATION : Flacon de 200ml et 100 ml.

CLASSE PHARMACO - THÉRAPEUTIQUE : Médicament de Phytothérapie à visée expectorante.

PROPRIÉTÉS : • Mucolytique • Spasmolytique • Soulage la toux.

INDICATIONS : Le sirop PROSPAN est traditionnellement utilisé :

- Dans le traitement symptomatique de la toux.
- Au cours des affections bronchiques aiguës bénignes.

ATTENTION ! En raison de la présence de sorbitol, ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ en cas d'intolérance au fructose (maladie héréditaire rare).

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

MISES EN GARDES SPÉCIALES :

ATTENTION : Si les symptômes persistent plus de cinq jours, consulter votre médecin.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS : L'utilisation simultanée du Prospan avec d'autres médicaments n'a pas d'effet nuisible, c'est pourquoi ce médicament peut être pris avec aucun autre médicament.

Nurodol®

20mg/ml

1- IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

a - FORME PHARMACEUTIQUE ET PRÉ-

Suspension buvable pédiatrique à 2 % : fl

b - COMPOSITION QUALITATIVE ET QU-

Ibuprofène.....

Excipients.....

c - LISTE DES EXCIPIENTS À EFFET N

Saccharose, sorbitol, glycérol, rouge coch

d - CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUT

Anti-inflammatoire non stéroïdien, doué d

2- Indications thérapeutiques :

Traitements de la fièvre et ou des douleurs

3. ATTENTION !

a) CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser ce médicament dans les

- À partir du 6^{ème} mois de grossesse,

- Antécédents d'allergie ou d'asthme dé

notamment autres anti-inflammatoires r

- Antécédents d'allergie à l'un des cons

- Ulcère de l'estomac ou du duodénum en évolution,

- Maladie grave du foie,

- Maladie grave des reins,

- Maladie grave du cœur,

- Lupus érythémateux disséminé,

b) MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

AVANT D'UTILISER CE MEDICAMENT, CONSULTER VOTRE MEDECIN, EN CAS :

- d'antécédent d'asthme associé à une rhinite chronique, une sinusite chronique ou des polypes dans

le nez. L'administration de cette spécialité peut entraîner une crise d'asthme, notamment chez cer

tains sujets allergiques à l'aspirine ou à un anti-inflammatoire non stéroïdien (cf.contre-indications),

- lors de la varicelle, il est prudent d'éviter l'utilisation de ce médicament.

- de traitement anticoagulant concomitant : Ce médicament peut entraîner des hémorragies gastro-intestinales ou des

ulcères/perforations.

- d'antécédents digestifs (hernie hiatale, hémorragie digestive, ulcère de l'estomac ou du duodénum ancien),

- de maladie du cœur, du foie ou du rein,

- d'intolérance au fructose, syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou déficit en sucrase-isomai

tase (maladies métaboliques rares).Dans ce cas; ce médicament est contre-indiqué en raison de la présence de

saccharose et de sorbitol.

AU COURS DU TRAITEMENT :

- en cas de troubles de la vue, PREVENIR VOTRE MEDECIN,

- en cas d'hémorragie gastro-intestinale, ARRETER LE TRAITEMENT ET CONTACTER IMMEDIATEMENT UN

MEDECIN OU UN SERVICE MEDICAL D'URGENCE.

En cas de diabète ou de régime hypoglucidique (pauvre en sucre), tenir compte de la teneur en saccharose (0,5

g par ml).

c) CONDUITE DE VEHICULES ET UTILISATION DE MACHINES

Dans de rares cas, la prise de ce médicament peut entraîner des vertiges et des troubles de la vue.

d) INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre

traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION

Voie orale

RESERVÉ AU NOURRISSON ET À L'ENFANT, DE 6 MOIS À 12 ANS (SOIT ENVIRON 40 KG),

19,00



Doliprane® 200 mg
PARACETAMOL

10 SUPPOSITOIRES



6 118000 040309

DOLIPRANE®

100 mg suppositoire sécable (de 3 à 8 kg)

150 mg suppositoire (de 8 à 12 kg)

200 mg suppositoire (de 12 à 16 kg)

300 mg suppositoire (de 15 à 24 kg)



PPV 11DHT
PER 09/25
LOT 131130
MM, 70

Pour un suppositoire

... 100 mg

... 150 mg

... 200 mg

... 300 mg

ppositores
ippositoires

Doliprane 200 mg suppositoire

Boîte de 10 suppositoires

Doliprane 300 mg suppositoire

Boîte de 10 suppositoires

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

ANTALGIQUE – ANTIPYRETIQUE

(N : Système nerveux central)

DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament est indiqué en cas de douleurs et/ou fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures.

DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- Allergie connue au paracétamol
- Maladie grave du foie
- Inflammation récente anale ou rectale ou saignement récent du rectum
- En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

MISES EN GARDE SPECIALES

Ce médicament contient du paracétamol. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée (cf. chapitre « posologie »)

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours, ou en cas d'efficacité insuffisante ou de survenue de tout autre signe, ne pas continuer le traitement sans l'avis de votre médecin.

En cas de doute ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

Signaler la prise de Doliprane à votre médecin en cas de prescription de dosage de l'acide urique sanguin ou de glycémie.