

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

M22- 0028926

Optique **149415** Autres

Maladie Dentaire

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : **2538**, Société : **Ret RAM**

Actif Pensionné(e) Autre :

Nom & Prénom : **KACHANI MUSTAPHA**

Date de naissance : **JAMILA 5 Rue 187 N° 28 C/D CASA**

Adresse : **01/01/1951**

Tél. : **0667 08 88 96**, Total des frais engagés : **342,60** Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr. BENBOUBKER KAZMANE Adiba
Médecine générale - Diabetologie
Permis de Conduire
Jamila 5 Rue 145 N° 110 C/D - Casa
Tel: 05 22 37 16 61

Date de consultation : / /

Nom et prénom du malade : **KACHANI KHADISIA** Age:

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : **HTA**


Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie :


En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : / /

Signature de l'adhérent(e) : 



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
10/03/2013	C		150	DR. BENDOUBKER KAZMANE Adiba Médecine générale - Diabetologie Perrois de l'Est Jamila 5 Rue 145 N° 110 C.D - Casa Tel: 06 22 37 16 61

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE 106, Bd Mokdad Hay El Béddaa Cité Djennas Casablanca - Tél : 05 22 57 88 98 Sous AT Rachid Dr. en Pharmacie	AD/1/23	192,60

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MÉDICAUX

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				Coefficient des travaux
				Montants des soins
				Début d'exécution
				Fin d'exécution

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
D	G
00000000	00000000
35533411	11433553

[Création, remont, adjonction]

The diagram illustrates a dental arch (maxilla) with teeth numbered 1 through 8 on both the upper and lower arches. Each tooth is accompanied by a symbol representing its orthodontic record:

- Upper Arch:**
 - Tooth 1: H
 - Tooth 2: 2
 - Tooth 3: 3
 - Tooth 4: 4
 - Tooth 5: 5
 - Tooth 6: 6
 - Tooth 7: 7
 - Tooth 8: 8
- Lower Arch:**
 - Tooth 1: 1
 - Tooth 2: 2
 - Tooth 3: 3
 - Tooth 4: 4
 - Tooth 5: 5
 - Tooth 6: 6
 - Tooth 7: 7
 - Tooth 8: 8

The symbols include:

- H:** High record (apical)
- 2:** Second record (mesial)
- 3:** Third record (distal)
- 4:** Fourth record (distobuccal)
- 5:** Fifth record (distolingual)
- 6:** Sixth record (mesiolingual)
- 7:** Seventh record (mesial)
- 8:** Eighth record (apical)
- 1:** First record (distobuccal)

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr. Benboubker Kazmane Adiba

MEDECINE GENERALE

Echographie

Expert Assermentée



الدكتورة بنبوبكر قزمان أديبة

الطب العام

الايكوغرافي

خبيرة لدى المحاكم

Casablanca, le 10/01/2023

Mme KACHANI KHADISA

64901) Anane plus sang/125 n° 3

15260 10/1 100 ml rd 3 mois

PHARMACIE AL AHRAM
106, Bd Makdad Iahrizi
Hay El houda Cité Djemaa
Casa - Tél : 05 22 57 88 98
SEKKAT Rachid Dr. en Pharmacie

Dr. BENBOUBKER KAZMANE Adiba
Médecine générale - Diabetologie
Permis de Conduire
Jamila 5 Rue 145 N° 110 C.D - Casa
Tel : 05 22 37 16 61

Jamila 5 - Rue 145 N°110 Cité Djemaa - Casablanca - Tél : 05 22 37 16 61

جميلة 5 زنقة 145 رقم 110 قرية الجماعة - الدار البيضاء - الهاتف : 05 22 37 16 61

ANCINE PLUS

Losartan - Hydrochlorothiazide

ACTIONS ET COMPOSITION :

Tablettes à 100mg/25mg, boîtes de 15 et de 30 sous plaquettes thermoformées.
exprimé en losartan potassique.

100mg

25mg

un comprimé

Hydrochlorothiazide

Excipient q.s.p.

Comprimés pelliculés à 50mg/12,5mg, boîtes de 15 et de 30 sous plaquettes thermoformées.

50mg

12,5mg

un comprimé

Losartan (exprimé en losartan potassique).

Hydrochlorothiazide

Excipient q.s.p.

Excipients : microcristalline cellulose, lactose monohydraté, amidon prégalatiné, magnésium stearate, opadry OY jaune

Excipient q.s.p.

Excipient : effet notable : Lactose.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

Antihypertenseur, association d'un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II et d'un diurétique.

INDICATIONS :

- Traitement de l'hypertension artérielle essentielle chez les patients dont la pression artérielle n'est pas suffisamment contrôlée par le losartan ou l'hydrochlorothiazide en monothérapie.

CONTRE - INDICATIONS :

- Hypersensibilité à l'un des constituants du médicament. Au cours du 2ème et 3ème trimestres de la grossesse. En cas d'allaitement. Insuffisance rénale et hépatique sévère. hyponatrémie réfractaire. Hypokaliémie. Hypercalcémie.

Goutte. Anuria.

MODE, VOIE D'ADMINISTRATION ET POSOLOGIE :

Voie orale.

- Dose initiale : 50mg/12,5mg une fois par jour chez certains patients ne répondant pas de façon adéquate, la posologie peut être augmentée à 2 comprimés de ANCINE PLUS (50mg/12,5mg) en une ou 2 prises quotidiennes ou à 1 comprimé de ANCINE PLUS (100mg/25mg). Une posologie supérieure à 1 comprimé / jour de ANCINE PLUS (100mg/25mg) n'est pas recommandée. ANCINE PLUS peut être pris pendant ou à distance des repas. La posologie initiale (losartan 50mg/Hydrochlorothiazide 12,5mg) chez les patients âgés de 65 ans ou plus est inchangée. Le Losartan/Hydrochlorothiazide ne doit pas être utilisé chez l'enfant et l'adolescent (en dessous de 18 ans). Pour que ANCINE PLUS, comprimés pelliculés soit pleinement efficace, suivez attentivement l'ordonnance de votre médecin et respectez la dose prescrite sans l'augmenter ni la diminuer. Si vous oubliez de prendre ANCINE PLUS, comprimé pelliculé ne prenez pas une dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou susceptible de devenir) enceinte. ANCINE PLUS est déconseillé en début de grossesse, et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois. Il est important de prévenir votre médecin avant de prendre ANCINE PLUS.

- si vous avez déjà eu un gonflement du visage, des lèvres, de la gorge ou de la langue, si vous prenez des diurétiques, si vous faites un régime sans sel, si vous avez ou avez eu des vomissements importants et/ou des diarrhées, si vous avez une insuffisance cardiaque, si votre fonction hépatique est altérée, si vous avez un rétrécissement des artères rénales (sténose artérielle rénale) ou avec un rein fonctionnel unique, si vous avez une sténose des valves aortique ou mitrale (rétrécissement des valves du cœur) ou une cardiopathie hypertonique (une maladie induisant un épaisissement du muscle cardiaque), si vous avez de la goutte, si vous avez un taux élevé de calcium ou bas de potassium, ou si vous suivez un régime pauvre en potassium vous êtes sportif et allez subir un contrôle anti-dopage, prévenez votre médecin car ANCINE PLUS contient des principes actifs qui peuvent entraîner des résultats positifs aux tests.

Il est possible que ANCINE PLUS soit moins efficace chez les personnes de race noire. En raison de la présence de lactose ce médicament est contre indiqué en cas de galactosémié congénital, de syndrome de mal absorption du glucose et du galactose, ou de déficit en lactase.

Risque du cancer de la peau non-mélanome :

Les patients qui prennent de l'hydrochlorothiazide seul ou en association avec d'autres médicaments doivent être informés de ce risque et de la nécessité de vérifier régulièrement l'état de leur peau afin de détecter toute nouvelle lésion ou modification de lésion existante et à signaler toute lésion cutanée suspecte.

Les lésions cutanées suspectes doivent être examinées. Le recours à la biopsie peut être nécessaire pour le diagnostic histologique.

Afin de réduire le risque de cancer de la peau, il sera conseillé aux patients de limiter l'exposition au soleil et aux rayons UV et d'avoir une protection adéquate en cas d'exposition solaire.

L'utilisation d'Hydrochlorothiazide doit aussi être réexamnée avec attention chez les patients présentant un antécédent de cancer de la peau.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Chez les patients subissant une chirurgie majeure, ou durant l'anesthésie, avec des agents causant l'hypotension, losartan bloque l'action d'angiotensine II après une sécrétion de rénine compensatoire.
- Chez les patients sous hémodialyse, une dose faible de ANCINE PLUS doit être considérée.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :

D'une façon générale, signaler à votre médecin ou à votre pharmacien tout médicament pris pendant le traitement par ANCINE PLUS.

- les anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent être un antagoniste des effets antihypertenseurs de ANCINE PLUS en causant la rétention hydro sodique et / ou l'inhibition de la synthèse des prostaglandines rénales comme avec d'autres médicaments qui inhibent l'angiotensine II ou ses effets, l'administration concomitante de diurétiques égarneurs de potassium, de suppléments polassiums ou de substituts de sel contenant du potassium peut provoquer une hyperkaliémie. Un contrôle de la kaliémie est recommandé. ANCINE PLUS réduit l'excrétion du lithium, entraînant une augmentation de la lithémie pouvant atteindre des valeurs toxiques. Les produits d'antalgiques peuvent interagir avec les diurétiques thiazidiques en cas de prise concomitante : D'autres médicaments pour abaisser la pression sanguine. Des corticoïdes. Des médicaments pour le traitement de la goutte. Des antidiabétiques. Des médicaments contenant de la carbamazépine, de la codiprosat ou un sel de calcium. Certains neuroleptiques. Cholestyramines. Des médicaments myorelaxants. L'adrénaline ou autre médicaments de la même classe. Des médicaments pour le traitement du diabète. Des produits de contraste iodés. Alcool

EFFECTS INDESIRABLES :

Comme tous les médicaments, ANCINE PLUS peut provoquer des effets indésirables, bien qu'ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Les effets indésirables rapportés sont les suivants :

Fréquents

- Insomnie, céphalées, étourdissements.Toux, infection des voies respiratoires supérieures, congestion du nez, sinusite, problèmes de sinus.Diarrhée, douleur abdominale, nausées, indigestion.Crampes musculaires, douleur de la jambe, douleur lombaire. Faiblesse, fatigue, douleurs thoraciques. Hyperkaliémie, diminution de l'hématurie et de l'hémoglobine.

Peu Fréquents

- Anémie, purpura rhumatoïde, ecchymoses, hémolyse. Anorexie, goutte. Anxiété, peur panique, confusion, dépression, rêves anormaux, troubles du sommeil, somnolence, troubles de la mémoire.Nervosité, paresthésie, neuropathie périphérique, tremblement, migraine, syncope.Vision trouble, sensation de brûlure ou de picotement dans les yeux, conjonctivite, baisse de l'acuité visuelle. Accuphénies, vertiges. Hypotension, hypertension orthostatique, angor, accident vasculaire cérébral, infarctus du myocarde, palpitations, arythmie. Gêne pharyngée, pharyngite, laryngite, dyspnée, bronchite, ronflement, congestion pulmonaire. Constipation, flatulence, gastrite, vomissements, sécheresse de la bouche, douleur dentaire. Sécheresse de la peau, alopécie, dermatite, érythème, boutfissures de cheveux, chaleur, transpiration, prurit, rash, urticaire, sudation. Douleur du bras, les épaules, les hanches, les genoux ou autres articulations, gonflement des articulations, raideur, faiblesse musculaire.Mictions fréquentes, nycturie, infection des voies urinaires. Baisse de la libido, impuissance.Odème du visage, fièvre.

Rare

- Hépatite.

Fréquence indéterminée

- Anomalies de la fonction hépatique.

Risque de cancer de la peau non-mélanome :

Si vous ressentez un des effets mentionnés comme grave ou si vous présentez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

Par mesure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser ANCINE PLUS pendant le 1er trimestre de la grossesse.L'administration de ANCINE PLUS est contre indiquée pendant le 2ième et le 3ième trimestre de la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consulter votre médecin car lui seul pourra adapter le traitement à votre état.

Allaitement :

L'allaitement est contre indiqué au cours du traitement.

SURDOSE :

Les symptômes possibles de surdosage par ANCINE PLUS incluent la bradycardie due à la stimulation vagale, hypotension avec tachycardie. Le traitement doit être symptomatique et de soutien. Les symptômes possibles de surdosage par Hydrochlorothiazide ont été liés à des désordres hydrolytiques (hypokaliémie, hyponatrémie). Ni le Losartan ni son métabolite actif ne peuvent être éliminés par hémodialyse.

CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINES :

Les conducteurs de véhicules ou utilisateurs de machines doivent être avertis que les traitements antihypertenseurs peuvent parfois provoquer des étourdissements ou une somnolence, en particulier en début de traitement ou lors d'une augmentation de la posologie.

CONDITIONS PARTICULIERS DE CONSERVATION :

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

Ne pas dépasser la date limite figurant sur le conditionnement extérieur.

Date d'approbation de la notice :

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 25/11/14.


Liste !

CECI EST UN MEDICAMENT

- Un médicament est un produit, mais pas comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous expose a prescrit.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et ses contre-indications.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- Ne le reprenez pas, n'en augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.
- Ne laissez jamais les médicaments à la portée des enfants.



Fabriqué par le laboratoire Pharmaceutique NOVOPHARMA
Z.I.I. Tit Mellil - Casablanca



ANCINE PLUS

Losartan - Hydrochlorothiazide

ACTIONS ET COMPOSITION :

Tablettes à 100mg/25mg, boîtes de 15 et de 30 sous plaquettes thermoformées.
exprimé en losartan potassique.

100mg

25mg

un comprimé

Hydrochlorothiazide

Excipient q.s.p.

Comprimés pelliculés à 50mg/12,5mg, boîtes de 15 et de 30 sous plaquettes thermoformées.

50mg

12,5mg

un comprimé

Losartan (exprimé en losartan potassique).

Hydrochlorothiazide

Excipient q.s.p.

Excipients : microcristalline cellulose, lactose monohydraté, amidon prégalatiné, magnésium stearate, opadry OY jaune

Excipient q.s.p.

Excipient : effet notable : Lactose.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

Antihypertenseur, association d'un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II et d'un diurétique.

INDICATIONS :

- Traitement de l'hypertension artérielle essentielle chez les patients dont la pression artérielle n'est pas suffisamment contrôlée par le losartan ou l'hydrochlorothiazide en monothérapie.

CONTRE - INDICATIONS :

- Hypersensibilité à l'un des constituants du médicament. Au cours du 2ème et 3ème trimestres de la grossesse. En cas d'allaitement. Insuffisance rénale et hépatique sévère. hyponatrémie réfractaire. Hypokaliémie. Hypercalcémie.

Goutte. Anuria.

MODE, VOIE D'ADMINISTRATION ET POSOLOGIE :

Voie orale.

- Dose initiale : 50mg/12,5mg une fois par jour chez certains patients ne répondant pas de façon adéquate, la posologie peut être augmentée à 2 comprimés de ANCINE PLUS (50mg/12,5mg) en une ou 2 prises quotidiennes ou à 1 comprimé de ANCINE PLUS (100mg/25mg). Une posologie supérieure à 1 comprimé / jour de ANCINE PLUS (100mg/25mg) n'est pas recommandée. ANCINE PLUS peut être pris pendant ou à distance des repas. La posologie initiale (losartan 50mg/Hydrochlorothiazide 12,5mg) chez les patients âgés de 65 ans ou plus est inchangée. Le Losartan/Hydrochlorothiazide ne doit pas être utilisé chez l'enfant et l'adolescent (en dessous de 18 ans). Pour que ANCINE PLUS, comprimés pelliculés soit pleinement efficace, suivez attentivement l'ordonnance de votre médecin et respectez la dose prescrite sans l'augmenter ni la diminuer. Si vous oubliez de prendre ANCINE PLUS, comprimé pelliculé ne prenez pas une dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou susceptible de devenir) enceinte. ANCINE PLUS est déconseillé en début de grossesse, et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois. Il est important de prévenir votre médecin avant de prendre ANCINE PLUS.

- si vous avez déjà eu un gonflement du visage, des lèvres, de la gorge ou de la langue, si vous prenez des diurétiques, si vous faites un régime sans sel, si vous avez ou avez eu des vomissements importants et/ou des diarrhées, si vous avez une insuffisance cardiaque, si votre fonction hépatique est altérée, si vous avez un rétrécissement des artères rénales (sténose artérielle rénale) ou avec un rein fonctionnel unique, si vous avez une sténose des valves aortique ou mitrale (rétrécissement des valves du cœur) ou une cardiopathie hypertonique (une maladie induisant un épaisissement du muscle cardiaque), si vous avez de la goutte, si vous avez un taux élevé de calcium ou bas de potassium, ou si vous suivez un régime pauvre en potassium vous êtes sportif et allez subir un contrôle anti-dopage, prévenez votre médecin car ANCINE PLUS contient des principes actifs qui peuvent entraîner des résultats positifs aux tests.

Il est possible que ANCINE PLUS soit moins efficace chez les personnes de race noire. En raison de la présence de lactose ce médicament est contre indiqué en cas de galactosémié congénital, de syndrome de mal absorption du glucose et du galactose, ou de déficit en lactase.

Risque du cancer de la peau non-mélanome :

Les patients qui prennent de l'hydrochlorothiazide seul ou en association avec d'autres médicaments doivent être informés de ce risque et de la nécessité de vérifier régulièrement l'état de leur peau afin de détecter toute nouvelle lésion ou modification de lésion existante et à signaler toute lésion cutanée suspecte.

Les lésions cutanées suspectes doivent être examinées. Le recours à la biopsie peut être nécessaire pour le diagnostic histologique.

Afin de réduire le risque de cancer de la peau, il sera conseillé aux patients de limiter l'exposition au soleil et aux rayons UV et d'avoir une protection adéquate en cas d'exposition solaire.

L'utilisation d'Hydrochlorothiazide doit aussi être réexamnée avec attention chez les patients présentant un antécédent de cancer de la peau.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Chez les patients subissant une chirurgie majeure, ou durant l'anesthésie, avec des agents causant l'hypotension, losartan bloque l'action d'angiotensine II après une sécrétion de rénine compensatoire.
- Chez les patients sous hémodialyse, une dose faible de ANCINE PLUS doit être considérée.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :

D'une façon générale, signaler à votre médecin ou à votre pharmacien tout médicament pris pendant le traitement par ANCINE PLUS.

- les anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent être un antagoniste des effets antihypertenseurs de ANCINE PLUS en causant la rétention hydro sodique et / ou l'inhibition de la synthèse des prostaglandines rénales comme avec d'autres médicaments qui inhibent l'angiotensine II ou ses effets, l'administration concomitante de diurétiques égarneurs de potassium, de suppléments polassiums ou de substituts de sel contenant du potassium peut provoquer une hyperkaliémie. Un contrôle de la kaliémie est recommandé. ANCINE PLUS réduit l'excrétion du lithium, entraînant une augmentation de la lithémie pouvant atteindre des valeurs toxiques. Les produits d'antalgiques peuvent interagir avec les diurétiques thiazidiques en cas de prise concomitante : D'autres médicaments pour abaisser la pression sanguine. Des corticoïdes. Des médicaments pour le traitement de la goutte. Des antidiabétiques. Des médicaments contenant de la carbamazépine, de la codiprosat ou un sel de calcium. Certains neuroleptiques. Cholestyramines. Des médicaments myorelaxants. L'adrénaline ou autre médicaments de la même classe. Des médicaments pour le traitement du diabète. Des produits de contraste iodés. Alcool

EFFECTS INDESIRABLES :

Comme tous les médicaments, ANCINE PLUS peut provoquer des effets indésirables, bien qu'ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Les effets indésirables rapportés sont les suivants :

Fréquents

- Insomnie, céphalées, étourdissements.Toux, infection des voies respiratoires supérieures, congestion du nez, sinusite, problèmes de sinus.Diarrhée, douleur abdominale, nausées, indigestion.Crampes musculaires, douleur de la jambe, douleur lombaire. Faiblesse, fatigue, douleurs thoraciques. Hyperkaliémie, diminution de l'hématurie et de l'hémoglobine.

Peu Fréquents

- Anémie, purpura rhumatoïde, ecchymoses, hémolyse. Anorexie, goutte. Anxiété, peur panique, confusion, dépression, rêves anormaux, troubles du sommeil, somnolence, troubles de la mémoire.Nervosité, paresthésie, neuropathie périphérique, tremblement, migraine, syncope.Vision trouble, sensation de brûlure ou de picotement dans les yeux, conjonctivite, baisse de l'acuité visuelle. Accuphénies, vertiges. Hypotension, hypertension orthostatique, angor, accident vasculaire cérébral, infarctus du myocarde, palpitations, arythmie. Gêne pharyngée, pharyngite, laryngite, dyspnée, bronchite, ronflement, congestion pulmonaire. Constipation, flatulence, gastrite, vomissements, sécheresse de la bouche, douleur dentaire. Sécheresse de la peau, alopécie, dermatite, érythème, boutfissures de cheveux, chaleur, transpiration, prurit, rash, urticaire, sudation. Douleur du bras, les épaules, les hanches, les genoux ou autres articulations, gonflement des articulations, raideur, faiblesse musculaire.Mictions fréquentes, nycturie, infection des voies urinaires. Baisse de la libido, impuissance.Odème du visage, fièvre.

Rare

- Hépatite.

Fréquence indéterminée

- Anomalies de la fonction hépatique.

Risque de cancer de la peau non-mélanome :

Si vous ressentez un des effets mentionnés comme grave ou si vous présentez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

Par mesure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser ANCINE PLUS pendant le 1er trimestre de la grossesse.L'administration de ANCINE PLUS est contre indiquée pendant le 2ième et le 3ième trimestre de la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consulter votre médecin car lui seul pourra adapter le traitement à votre état.

Allaitement :

L'allaitement est contre indiqué au cours du traitement.

SURDOSE :

Les symptômes possibles de surdosage par ANCINE PLUS incluent la bradycardie due à la stimulation vagale, hypotension avec tachycardie. Le traitement doit être symptomatique et de soutien. Les symptômes possibles de surdosage par Hydrochlorothiazide ont été liés à des désordres hydrolytiques (hypokaliémie, hyponatrémie). Ni le Losartan ni son métabolite actif ne peuvent être éliminés par hémodialyse.

CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINES :

Les conducteurs de véhicules ou utilisateurs de machines doivent être avertis que les traitements antihypertenseurs peuvent parfois provoquer des étourdissements ou une somnolence, en particulier en début de traitement ou lors d'une augmentation de la posologie.

CONDITIONS PARTICULIERS DE CONSERVATION :

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

Ne pas dépasser la date limite figurant sur le conditionnement extérieur.

Date d'approbation de la notice :

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 25/11/14.


Liste !

CECI EST UN MEDICAMENT

- Un médicament est un produit, mais pas comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous expose a prescrit.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et ses contre-indications.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- Ne le reprenez pas, n'en augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.
- Ne laissez jamais les médicaments à la portée des enfants.



Fabriqué par le laboratoire Pharmaceutique NOVOPHARMA
Z.I.I. Tit Mellil - Casablanca



ANCINE PLUS

Losartan - Hydrochlorothiazide

ACTIONS ET COMPOSITION :

Tablettes à 100mg/25mg, boîtes de 15 et de 30 sous plaquettes thermoformées.
exprimé en losartan potassique.

100mg

25mg

un comprimé

Hydrochlorothiazide

Excipient q.s.p.

Comprimés pelliculés à 50mg/12,5mg, boîtes de 15 et de 30 sous plaquettes thermoformées.

50mg

12,5mg

un comprimé

Losartan (exprimé en losartan potassique).

Hydrochlorothiazide

Excipient q.s.p.

Excipients : microcristalline cellulose, lactose monohydraté, amidon prégalatiné, magnésium stearate, opadry OY jaune

Excipient q.s.p.

Excipient : effet notable : Lactose.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

Antihypertenseur, association d'un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II et d'un diurétique.

INDICATIONS :

- Traitement de l'hypertension artérielle essentielle chez les patients dont la pression artérielle n'est pas suffisamment contrôlée par le losartan ou l'hydrochlorothiazide en monothérapie.

CONTRE - INDICATIONS :

- Hypersensibilité à l'un des constituants du médicament. Au cours du 2ème et 3ème trimestres de la grossesse. En cas d'allaitement. Insuffisance rénale et hépatique sévère. hyponatrémie réfractaire. Hypokaliémie. Hypercalcémie.

Goutte. Anuria.

MODE, VOIE D'ADMINISTRATION ET POSOLOGIE :

Voie orale.

- Dose initiale : 50mg/12,5mg une fois par jour chez certains patients ne répondant pas de façon adéquate, la posologie peut être augmentée à 2 comprimés de ANCINE PLUS (50mg/12,5mg) en une ou 2 prises quotidiennes ou à 1 comprimé de ANCINE PLUS (100mg/25mg). Une posologie supérieure à 1 comprimé / jour de ANCINE PLUS (100mg/25mg) n'est pas recommandée. ANCINE PLUS peut être pris pendant ou à distance des repas. La posologie initiale (losartan 50mg/Hydrochlorothiazide 12,5mg) chez les patients âgés de 65 ans ou plus est inchangée. Le Losartan/Hydrochlorothiazide ne doit pas être utilisé chez l'enfant et l'adolescent (en dessous de 18 ans). Pour que ANCINE PLUS, comprimés pelliculés soit pleinement efficace, suivez attentivement l'ordonnance de votre médecin et respectez la dose prescrite sans l'augmenter ni la diminuer. Si vous oubliez de prendre ANCINE PLUS, comprimé pelliculé ne prenez pas une dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou susceptible de devenir) enceinte. ANCINE PLUS est déconseillé en début de grossesse, et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois. Il est important de prévenir votre médecin avant de prendre ANCINE PLUS.

- si vous avez déjà eu un gonflement du visage, des lèvres, de la gorge ou de la langue, si vous prenez des diurétiques, si vous faites un régime sans sel, si vous avez ou avez eu des vomissements importants et/ou des diarrhées, si vous avez une insuffisance cardiaque, si votre fonction hépatique est altérée, si vous avez un rétrécissement des artères rénales (sténose artérielle rénale) ou avec un rein fonctionnel unique, si vous avez une sténose des valves aortique ou mitrale (rétrécissement des valves du cœur) ou une cardiopathie hypertonique (une maladie induisant un épaisissement du muscle cardiaque), si vous avez de la goutte, si vous avez un taux élevé de calcium ou bas de potassium, ou si vous suivez un régime pauvre en potassium vous êtes sportif et allez subir un contrôle anti-dopage, prévenez votre médecin car ANCINE PLUS contient des principes actifs qui peuvent entraîner des résultats positifs aux tests.

Il est possible que ANCINE PLUS soit moins efficace chez les personnes de race noire. En raison de la présence de lactose ce médicament est contre indiqué en cas de galactosémié congénital, de syndrome de mal absorption du glucose et du galactose, ou de déficit en lactase.

Risque du cancer de la peau non-mélanome :

Les patients qui prennent de l'hydrochlorothiazide seul ou en association avec d'autres médicaments doivent être informés de ce risque et de la nécessité de vérifier régulièrement l'état de leur peau afin de détecter toute nouvelle lésion ou modification de lésion existante et à signaler toute lésion cutanée suspecte.

Les lésions cutanées suspectes doivent être examinées. Le recours à la biopsie peut être nécessaire pour le diagnostic histologique.

Afin de réduire le risque de cancer de la peau, il sera conseillé aux patients de limiter l'exposition au soleil et aux rayons UV et d'avoir une protection adéquate en cas d'exposition solaire.

L'utilisation d'Hydrochlorothiazide doit aussi être réexamnée avec attention chez les patients présentant un antécédent de cancer de la peau.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Chez les patients subissant une chirurgie majeure, ou durant l'anesthésie, avec des agents causant l'hypotension, losartan bloque l'action d'angiotensine II après une sécrétion de rénine compensatoire.
- Chez les patients sous hémodialyse, une dose faible de ANCINE PLUS doit être considérée.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :

D'une façon générale, signaler à votre médecin ou à votre pharmacien tout médicament pris pendant le traitement par ANCINE PLUS.

- les anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent être un antagoniste des effets antihypertenseurs de ANCINE PLUS en causant la rétention hydro sodique et / ou l'inhibition de la synthèse des prostaglandines rénales comme avec d'autres médicaments qui inhibent l'angiotensine II ou ses effets, l'administration concomitante de diurétiques égarneurs de potassium, de suppléments polassiums ou de substituts de sel contenant du potassium peut provoquer une hyperkaliémie. Un contrôle de la kaliémie est recommandé. ANCINE PLUS réduit l'excrétion du lithium, entraînant une augmentation de la lithémie pouvant atteindre des valeurs toxiques. Les produits d'antalgiques peuvent interagir avec les diurétiques thiazidiques en cas de prise concomitante : D'autres médicaments pour abaisser la pression sanguine. Des corticoïdes. Des médicaments pour le traitement de la goutte. Des antidiabétiques. Des médicaments contenant de la carbamazépine, de la codiprosat ou un sel de calcium. Certains neuroleptiques. Cholestyramines. Des médicaments myorelaxants. L'adrénaline ou autre médicaments de la même classe. Des médicaments pour le traitement du diabète. Des produits de contraste iodés. Alcool

EFFECTS INDESIRABLES :

Comme tous les médicaments, ANCINE PLUS peut provoquer des effets indésirables, bien qu'ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Les effets indésirables rapportés sont les suivants :

Fréquents

- Insomnie, céphalées, étourdissements.Toux, infection des voies respiratoires supérieures, congestion du nez, sinusite, problèmes de sinus.Diarrhée, douleur abdominale, nausées, indigestion.Crampes musculaires, douleur de la jambe, douleur lombaire. Faiblesse, fatigue, douleurs thoraciques. Hyperkaliémie, diminution de l'hématurie et de l'hémoglobine.

Peu Fréquents

- Anémie, purpura rhumatoïde, ecchymoses, hémolyse. Anorexie, goutte. Anxiété, peur panique, confusion, dépression, rêves anormaux, troubles du sommeil, somnolence, troubles de la mémoire.Nervosité, paresthésie, neuropathie périphérique, tremblement, migraine, syncope.Vision trouble, sensation de brûlure ou de picotement dans les yeux, conjonctivite, baisse de l'acuité visuelle. Accuphénies, vertiges. Hypotension, hypertension orthostatique, angor, accident vasculaire cérébral, infarctus du myocarde, palpitations, arythmie. Gêne pharyngée, pharyngite, laryngite, dyspnée, bronchite, ronflement, congestion pulmonaire. Constipation, flatulence, gastrite, vomissements, sécheresse de la bouche, douleur dentaire. Sécheresse de la peau, alopécie, dermatite, érythème, boutfissures de cheveux, chaleur, transpiration, prurit, rash, urticaire, sudation. Douleur du bras, les épaules, les hanches, les genoux ou autres articulations, gonflement des articulations, raideur, faiblesse musculaire.Mictions fréquentes, nycturie, infection des voies urinaires. Baisse de la libido, impuissance.Odème du visage, fièvre.

Rare

- Hépatite.

Fréquence indéterminée

- Anomalies de la fonction hépatique.

Risque de cancer de la peau non-mélanome :

Si vous ressentez un des effets mentionnés comme grave ou si vous présentez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

Par mesure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser ANCINE PLUS pendant le 1er trimestre de la grossesse.L'administration de ANCINE PLUS est contre indiquée pendant le 2ième et le 3ième trimestre de la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consulter votre médecin car lui seul pourra adapter le traitement à votre état.

Allaitement :

L'allaitement est contre indiqué au cours du traitement.

SURDOSE :

Les symptômes possibles de surdosage par ANCINE PLUS incluent la bradycardie due à la stimulation vagale, hypotension avec tachycardie. Le traitement doit être symptomatique et de soutien. Les symptômes possibles de surdosage par Hydrochlorothiazide ont été liés à des désordres hydrolytiques (hypokaliémie, hyponatrémie). Ni le Losartan ni son métabolite actif ne peuvent être éliminés par hémodialyse.

CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINES :

Les conducteurs de véhicules ou utilisateurs de machines doivent être avertis que les traitements antihypertenseurs peuvent parfois provoquer des étourdissements ou une somnolence, en particulier en début de traitement ou lors d'une augmentation de la posologie.

CONDITIONS PARTICULIERS DE CONSERVATION :

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

Ne pas dépasser la date limite figurant sur le conditionnement extérieur.

Date d'approbation de la notice :

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 25/11/14.

Liste !

CECI EST UN MEDICAMENT

- Un médicament est un produit, mais pas comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous expose a prescrit.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et ses contre-indications.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- Ne le reprenez pas, n'en augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.
- Ne laissez jamais les médicaments à la portée des enfants.



Fabriqué par le laboratoire Pharmaceutique NOVOPHARMA
Z.I.I. Tit Mellil - Casablanca

