

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



Déclaration de Maladie

M22- 0030900

Optique *14 9749* Autres

Maladie

Dentaire

Cadre réservé à l'adhérent [e]

Matricule : *a000 657*

Société :

R.A.M.

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

Mr MZHOUA Salah

Date de naissance :

Adresse :

*El massoudia Rue 29 N°15 cité D'jamra
Casablanca*

Tél. :

Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

*Dr Mohamed AIBENNANI
Spécialiste des Maladies du Coeur
des Vaissieux et de l'hypertension Artérielle
1.Rue 4 Ahd El Jadid et Bd Rida Guedira
1er Etage Tél/Fax: 05 22 59 59 00*

091236521

Date de consultation :

08 Fevr 2023

Age :

Nom et prénom du malade :

MZHOUA 2070000

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

Pathologie :

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : / /

Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhession@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
08 FEVR 2023	Dr Mohamed Ali BENNANI	Spécialiste des Maladies du Coeur des Vaisseaux et de l'Hyper tension Artérielle	Montant détaillé des Honoraires	Dr Mohamed Ali BENNANI
			1 Rue 4 Ahd El Jadid et Bd Rida Guedira	1er Etage Tél/Fax: 05 22 59 59 00

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE D'ALOUBIA	08/02/23	374,00

ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES	13/2/23	B 100	850 DH

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	Coefficient des Travaux
<img alt="Diagram of the dental arch showing numbered teeth from 1 to				

Dr. Mohamed Ali BENNANI
Cardiologue

Spécialiste des maladies
du cœur, des vaisseaux
et de l'hypertension artérielle
Echocardiographie doppler - Holter
tensionnel - Holter rythmique
Epreuve d'effort
Traitement des varices
Sur Rendez-vous



مركز فحوصات القلب والشرايين
CENTRE D'EXPLORATIONS
CARDIOVASCULAIRES
08/02/2023

الدكتور محمد علي بناني
اختصاصي في أمراض القلب والشرايين
وارتفاع الضغط الدموي

التشخيص بالأمواج فوق الصوتية والدوبлер
تسجيل مستمر لضغط الدم لمدة 24 ساعة
تسجيل مستمر لخطط القلب لمدة 24 ساعة
تخطيط القلب عند المجهود
علاج الدوالي (العروق المنتفخة بالساق)
بالموعد

Casablanca, le :

Mme MAZHOUR ZITOUNIA

Nom :

13.40 x 02
COLCHICINE OPOCALCIUM 4mg, Comprimé : 1 comprimé le soir pendant 1 mois

27.70
CARDIOASPIRINE 100mg, Comprimé : 1 comprimé à midi - pendant 1 mois

41,80
AVLOCARDYL 40 mg : 1/4 comprimé matin, midi et soir pendant 1 mois

71.30 x 03
TANAKAN 40 mg, Comprimé enrobé : 1 comprimé matin, midi et soir pendant 1 mois

PHARMACIE KOUTOUBIA
Mohamed AARAB
Docteur d'Etat en Pharmacie
Lotissement Messaoudia Rue 24 N°104
Cité Djamaa - Casablanca
Tél: 05 22 37 31 07 - 05 22 57 39 24
INPE: #236904

PHARMACIE KOUTOUBIA
Mohamed AARAB
Docteur d'Etat en Pharmacie
Lotissement Messaoudia Rue 24 N°104
Cité Djamaa - Casablanca
Tél: 05 22 37 31 07 - 05 22 57 39 24
INPE: 92036904

Docteur Mohamed Ali BENNANI

Dr. Mohamed Ali BENNANI
Spécialiste des Maladies du Coeur, des
Vaisseaux et de l'hypertension artérielle
1, Rue 4, Ahd El Jadid, et Bd. Reda Guedira
1er Etage - Tél/Fax: 0522 59 59 00 - Casa

374,20

عدم توقيف الوصفة حتى الموعد المقدر
Mercredi 08 Mars 2023

1، زنقة 4 العهد الجديد وشارع رضى اكديرة (النيل سابقا) - الطابق الأول (قرب حمام الفن) - ابن امسيك - الدار البيضاء
1, Rue 4 Ahd El Jadid et Bd. Reda Guedira (Ex. Nil) - 1 Etage - (à Côté de Hammam El Fane) - Ben M'sik - Casablanca
Tél./Fax : 0522 59 59 00 - GSM : 0636 36 61 36 - E-mail : bennanimedali@yahoo.fr

ANCINE®

Losartan

COMPOSITION :

Losartan (exprimé en losartan potassique)

Etant donné à 50 mg

EXCIPIENTS :

Lactose, cellulose microcristalline, amidon de maïs prégalatinisé, stéarate de magnésium, hydroxypropyl methyl cellulose type 2910(E5), polyéthylène glycol 400, dioxyde de titane.

50 mg
un comprimé enrobé

EXCIPIENT A EFFET NOTOIRE : Lactose.

FORME PHARMACEUTIQUE ET PRÉSENTATIONS :

Boîte de 30 comprimés enrobés sécables

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

Antagoniste de l'angiotensine II, non associé.

INDICATIONS :

Traitement de l'hypertension artérielle essentielle chez les adultes et les enfants et adolescents âgés de 6 à 18 ans.

- Traitement de l'hypertension artérielle chez les patients adultes présentant un diabète de type 2 hyperémétabolique, avec protéinurie >= 5 g/jour, dans le cadre d'un traitement antihypertenseur.

- Traitement de l'insuffisance cardiaque chronique chez les patients adultes, lorsque le traitement par inhibiteur de l'enzyme de conversion (IEC) est inadéquat en raison d'une intolérance (en particulier, la toux) ou d'une contre-indication.

Le losartan ne doit pas être utilisé en traitement de relais chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque, stabilisés par un IEC.

Les patients doivent avoir une fraction d'éjection ventriculaire gauche <= 40% et doivent être cliniquement stabilisés et sous un traitement régulier pour l'insuffisance cardiaque chronique.

- Réduction du risque d'accident vasculaire cérébral chez les patients adultes hypertendus présentant une hypertrophie ventriculaire gauche à l'électrocardiogramme.

CONTRE-INDICATIONS :

- Hypersensibilité à l'un des constituants du médicament.

- Au cours des 2ème et 3ème trimestres de la grossesse.

- En cas d'allaitement.

- Insuffisance hépatique sévère.

POSÉDAGE ET MODE D'ADMINISTRATION :

Voir ci-dessous

Les comprimés doivent être avalés avec un verre d'eau.

ANCINE peut être pris lors ou en dehors des repas.

Hypertension :

La posologie initiale et d'entretien habituelle est de 50 mg une fois par jour chez la plupart des patients. L'effet antihypertenseur maximal est atteint dans les 3 à 6 semaines suivant la pose de la posologie. A 100 mg une fois par jour (le matin) peut permettre d'accroître l'efficacité thérapeutique. Le losartan peut être administré avec d'autres antihypertenseurs (hydrochlorothiazide par exemple).

Patients diabétiques de type 2 hypertendus avec protéinurie > 0,5 g/jour :

La posologie initiale habituelle est de 50 mg une fois par jour. En fonction de la réponse tensionnelle, la dose pourra être augmentée à 100 mg une fois par jour, un mois après le début d'utilisation.

Insuffisance cardiaque chronique :

La posologie initiale et d'entretien habituelle est de 12,5 mg une fois par jour. La posologie sera généralement augmentée chaque semaine (à sa dose maximale) jusqu'à la dose d'entretien habituelle de 50 mg une fois par jour, si elle est tolérée par le patient.

Réduction du risque d'accident vasculaire cérébral chez les patients hypertendus présentant une hypertrophie ventriculaire gauche :

La posologie initiale habituelle est de 50 mg de losartan une fois par jour. Une faible dose d'hydrochlorothiazide sera ajoutée et/ou la dose de losartan sera augmentée à 100 mg une fois par jour.

Populations particulières :

Utilisation chez les patients présentant une hypovolémie : Chez les patients présentant une hypovolémie (par exemple ceux recevant des diurétiques à fortes doses), il convient d'augmenter la posologie.

Utilisation chez les patients insuffisants rénaux et les patients hépatiques : Aucune adaptation de la posologie initiale n'est nécessaire chez les patients atteints d'insuffisance rénale.

Utilisation chez les patients insuffisants hépatiques : Une dose plus faible doit être envisagée chez les patients ayant des antécédents d'insuffisance hépatique. Le losartan est contre-indiqué.

Utilisation chez les enfants et adolescents : Les données concernant l'efficacité et la sécurité d'emploi du losartan dans le traitement de l'hypertension chez les enfants et adolescents capables d'avaler des comprimés, la posologie recommandée est de 25 mg une fois par jour pour un poids corporel compris entre 20 et 50 kg. (Dans des cas exceptionnels, la posologie de 50 mg une fois par jour.) La posologie doit être adaptée en fonction de la réponse tensionnelle. Chez les patients de plus de 50 kg, la dose habituelle est de 50 mg une fois par jour, une dose maximale de 100 mg une fois par jour. Les doses supérieures à 1,4 mg/kg (ou supérieures à 100 mg) par jour n'ont pas été étudiées chez l'enfant et l'adolescent. Le losartan est également recommandé chez les enfants présentant une insuffisance hépatique.

Utilisation chez les sujets âgés :

Une posologie initiale de 25 mg une fois par jour peut être envisagée chez les patients de plus de 75 ans.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Le rapport bénéfice/risque doit être considéré lorsque les problèmes médicaux suivants existent :

- Insuffisance hépatique : risque d'augmentation des concentrations plasmatiques en Losartan. Une dose faible de ANCINE est recommandée.

- Sténose artérielle rénale bilatérale ou les patients ayant un seul rein (l'augmentation du risque d'existence d'insuffisance rénale).

- Les patients ayant une dépression de la vésicule ou de l'estomac (insuffisance rénale récente).

- Hypersensibilité : risque d'angio-oedème.

- Cardiopathie schématique et maladie vasculaire cérébrale.

- Insuffisance cardiaque congestive : risque d'hypotension artérielle brutale et d'insuffisance rénale parfois aigüe.

- Hypotension artérielle : risque d'effets secondaires (vertiges, étourdissements, céphalées, troubles du sommeil, hypertension orthostatique, douleurs abdominales, constipation persistante, asthénie, fatigue, œdème, dyspnée, diarrhées, nausées, vomissements, urticaire, prurit, rash, des éruptions cutanées).

- Grossesse :

En raison de la présence de lactose, ce médicament est contre-indiqué en cas de galactosemie congénitale, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose, ou de déficit en lactase.

Comme avec les autres enzymes de l'enzyme de conversion, le Losartan et les autres antagonistes des récepteurs de l'angiotensine semblent être moins efficaces pour diminuer la pression artérielle chez les patients de race noire que chez les patients de race blanche. D'autres raisons peuvent entraîner en raison d'une prévalence plus élevée des concentrations en rénine basse dans la population hypertendue de race noire.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES :

Il pourra se produire une interaction entre le losartan et l'un des agents ci-après :

- La rifampicine, le flunarizine ;

- Les diurétiques équilibrés de potassium (par ex. amilorida, triamterène, spironolactone) ;

- Les diurétiques qui augmentent le taux de potassium dans le sang (par ex. l'éphédrine) ;

- Les suppléments de potassium ou de substituts de sel contenant du potassium ;

- Les antidiépresseurs tricycliques, les antipsychotiques ;

- Le lithium ;

- Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine ou IECA.

- Les anti-inflammatoires non stéroïdiens.

Si vous prenez l'un de ces médicaments, consultez votre médecin ou un pharmacien.

EFFETS INDÉSIRABLES :

Les effets indésirables rapportés au cours des études cliniques chez les patients traités par losartan ont été :

- Fréquents : étourdissements, vertiges, hypotension, hypoglycémie, hyperkaliémie, fatigue,

- Peu fréquent :

- Somnolence, céphalées, troubles du sommeil, hypertension orthostatique, douleurs abdominales, constipation persistante, asthénie, fatigue, œdème, dyspnée, diarrhées, nausées, vomissements, urticaire, prurit, rash, des éruptions cutanées.

- Rares : syncope, tachycardie, fibrillation auriculaire et accident vasculaire cérébral.

Fréquence indéterminée :

- Anémie, Palpitations, douleur dorsale, infection des voies urinaires, syndrome pseudo-gripal, diarrhée.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

Par mesure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser ANCINE pendant le 1er trimestre de la grossesse. L'administration de ANCINE est contre-indiquée pendant le 2ème et 3ème trimestre de la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de la poursuite.

Allaitement :

L'allaitement est déconseillé au cours du traitement.

SURDOSAGE :

Les symptômes possibles de surdosage par Losartan incluent la bradycardie due à la stimulation vagale, hypotension avec tachycardie. Le traitement doit être symptomatique et de soutien. Ni le Losartan ni son métabolite actif ne peuvent être éliminé par hémodialyse.

Si vous oubliez de prendre ANCINE :

Prenez une dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINES :

Tous les conducteurs de véhicules ou utilisateurs de machines doivent être avertis que les traitements antihypertenseurs peuvent parfois provoquer des étourdissements ou une somnolence, en particulier en début de traitement ou lors d'une augmentation de la posologie.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION :

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C

Date de péremption :

Ne pas utiliser ANCINE, comprimés enrobés sécables après la date de péremption mentionnée sur la boîte. La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois indiqué.

Ne pas dépasser la date de la notice.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 25/11/2014.

Liste 1.

CECI EST UN MEDICAMENT

- Un médicament est un produit, mais pas comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respectez les instructions de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit.
- Suivez les conseils de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et ses contre-indications.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- Ne le reprenez pas, n'en augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.
- Ne laissez jamais les médicaments à la portée des enfants.

LOT : 410
PER : 11/24
PPV : 64,00 DH

ANCINE® 50mg

30 comprimés en obés



tanakan® 40mg

EXTRAIT DE GINKGO BILOBA

comprimé enrobé

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
 - Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
 - Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez votre médecin.
 - Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé ?
 3. COMMENT PRENDRE TANAKAN 40 mg comprimé enrobé ?
 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
 5. COMMENT CONSERVER TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé ?
 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

**1. QU'EST-CE QUE TANAKAN 40 mg,
comprimé enrobé ET DANS QUELS CAS
EST-IL UTILISÉ ?**

VASODILATATEUR PERIPHERIQUE
(C : système cardio-vasculaire)

2. QUELLES SONT A CONNAITRE A TANAKAN 40 mg Ne prenez jamais

ne prenez jamais
comprimé enrobé
antécédent d'allergie
du comprimé.

EN CAS DE DOUTE, IL EST
INDISPENSABLE DE DEMAN-
DÉ VOTRE MEDECIN OU DE
PHARMACIEN.

Faites attention avec comprimé enrobé :

Mises en garde spéciales

En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).

Précautions d'emploi

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament

71,30
tanakan 40 mg (X)
30 COMPRIMÉS ENROBÉS

6 118000 011545



tanakan® 40mg

EXTRAIT DE GINKGO BILOBA

comprimé enrobé

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
 - Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
 - Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez votre médecin.
 - Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé ?
 3. COMMENT PRENDRE TANAKAN 40 mg comprimé enrobé ?
 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
 5. COMMENT CONSERVER TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé ?
 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

**1. QU'EST-CE QUE TANAKAN 40 mg,
comprimé enrobé ET DANS QUELS CAS
EST-IL UTILISÉ ?**

VASODILATATEUR PERIPHERIQUE
(C : système cardio-vasculaire)

2. QUELLES SONT A CONNAITRE A TANAKAN 40 mg Ne prenez jamais

comprimé enrobé
antécédent d'allergie
du comprimé.

EN CAS DE DOUTE, IL EST
INDISPENSABLE DE DEMAN-
DÉ VOTRE MÉDECIN OU DE
PHARMACIEN.

Faites attention avec comprimé enrobé :

Mises en garde spéciales

En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).

Précautions d'emploi

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament

71,30
tanakan 40 mg (X)
30 COMPRIMÉS ENROBÉS



tanakan® 40mg

EXTRAIT DE GINKGO BILOBA

comprimé enrobé

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
 - Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
 - Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez votre médecin.
 - Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé ?
 3. COMMENT PRENDRE TANAKAN 40 mg comprimé enrobé ?
 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
 5. COMMENT CONSERVER TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé ?
 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

**1. QU'EST-CE QUE TANAKAN 40 mg,
comprimé enrobé ET DANS QUELS CAS
EST-IL UTILISÉ ?**

ETAT STABILE :
VASODILATATEUR PERIPHERIQUE
(C : système cardio-vasculaire)

Ce médicament est indiqué dans le traitement symptomatique de certains troubles cognitifs du sujet âgé (en parti troubles de la mén type de démence secondaires à des dépression ou à d

2. QUELLES SONT A CONNAITRE A TANAKAN 40 mg Ne prenez jamais

ne prenez jamais
comprimé enrobé
antécédent d'allergie
du comprimé.

EN CAS DE DOUTE, IL EST
INDISPENSABLE DE DEMAN-
DÉ VOTRE MEDECIN OU DE
PHARMACIEN.

Faites attention avec comprimé enrobé :

Mises en garde spéciales

En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).

Précautions d'emploi

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament

71,30
tanakan 40 mg (X)
30 COMPRIMÉS ENROBÉS

6 118000 011545



AVLOCARDYL®

PROPRANOLOL

40 mg

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

• Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire. • Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, ou votre pharmacien. • Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres. • Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

1. QU'EST-CE QUE AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament contient une substance active, le propranolol qui appartient à la famille des bêta-bloquants. Il agit en diminuant la tension artérielle, en réduisant les troubles du rythme cardiaque et en ralentissant le cœur.

Ce médicament est utilisé principalement : • pour traiter une tension artérielle élevée, • pour éviter des douleurs au niveau de la poitrine (crises douloureuses de l'angine de poitrine), • après une crise cardiaque (infarctus du myocarde), • pour des maladies du cœur et des vaisseaux causées par un taux élevé d'hormones thyroïdiennes dans le sang, • pour traiter certaines maladies du cœur et notamment certains troubles du rythme cardiaque, • pour éviter des migraines, • pour traiter certains types de tremblements, • pour éviter des palpitations liées par une situation stressante (tel que le trac), • pour éviter des saignements digestifs chez les personnes qui souffrent d'une maladie grave du foie (cirrhose).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable ?

Ne prenez jamais AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active (le propranolol) ou à l'un des composants contenus dans ce médicament. Vous trouverez la liste des composants à la section 6. • Si vous êtes asthmatique ou si vous avez un encombrement des bronches et des poumons (bronchopneumopathie chronique obstructive). • Si vous souffrez d'insuffisance cardiaque non contrôlée par un traitement. • Si vous avez eu un problème cardiaque grave (choc cardiogénique). • Si votre tension artérielle élevée est causée par une maladie d'une glande située au-dessus du rein (phéochromocytome non traité). • Si vous souffrez d'une certaine forme d'angine de poitrine appelée angor de Prinzmetal (reconnaissable par des douleurs au niveau de la poitrine). • Si votre cœur bat trop lentement (moins de 45-50 battements par minute). • Si vous souffrez de troubles de la conduction : blocs auriculo-ventriculaires des second et troisième

degrés, bloc sino-auriculaire. • Si vous avez des problèmes de circulation du sang au niveau des doigts avec des engourdissements (maladie de Raynaud). • Si vous avez une maladie très grave du foie. • Si vous avez une tension artérielle basse. • Si vous avez une prédisposition à faire de l'hypoglycémie (taux de sucre trop bas dans le sang).

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable. Vous devez prévenir vo^{tre} médecin si votre taux de sucre dans le sang est élevé dans le sang (diabète) et/ou du rein. • Si vous avez déjà eu de la circulation sanguine dans l'utérus ou si vous êtes enceinte ou si vous avez des cardiaques.

Vous ne devez jamais arrêter de prendre ce médicament sans demander, au préalable, l'avis de votre médecin.

• Si vous devez subir une opération, vous devez prévenir votre anesthésiste que vous prenez ce médicament.

Patients devant faire attention au risque d'hypoglycémie

Une hypoglycémie est un taux trop bas de sucre dans le sang. Ce médicament peut aggraver une hypoglycémie en particulier, chez les personnes souffrant de diabète et les personnes non diabétiques mais qui sont prédisposées à l'hypoglycémie (le nourrisson, l'enfant, la personne âgée, les personnes souffrant d'une maladie du foie, les personnes sous dialyse, les personnes qui ont fait un jeûne ou les personnes qui ont pris trop de comprimés).

Cette hypoglycémie peut conduire à des convulsions ou un coma. Vous reconnaîtrez les signes annonciateurs d'une hypoglycémie par une faiblesse, des sueurs, une fringale, des tremblements, une somnolence, des vertiges, des maux de tête, des troubles de la vision, mangez ou buvez quelque chose de sucré. Si l'un de ces signes survient, mangez ou buvez quelque chose de sucré et contactez votre médecin.

La substance active de ce médicament (le propranolol) peut provoquer un test positif lors d'un contrôle antidopage.

Autres médicaments et AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable

Sauf avis contraire de votre médecin, n'utilisez pas AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable avec certains médicaments pour le cœur (les antagonistes du calcium : bépridil, diltiazem, vérapamil et fingolimod). Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse

En cas de besoin, ce médicament peut être pris durant votre grossesse.

Si ce traitement est pris en fin de grossesse, une surveillance médicale du nouveau-né est nécessaire pendant quelques jours, si certains effets du traitement se manifestent aussi chez l'enfant.

Allaitement

Ce médicament passe dans le lait maternel. En conséquence,

101-223036
118000010227

AVLOCARDYL 40 MG
CP SEC 850

P.P.V: 41DH80



Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez en à votre médecin ou à votre pharmacien.



CARDIOASPIRINE®

100 mg, comprimés gastro-résistants

Dans cette notice :

1. Qu'est ce que CardioAspirine 100 mg et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations nécessaires à connaître avant de prendre CardioAspirine
3. Comment prendre CardioAspirine 100 mg ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CardioAspirine 100 mg ?
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST CE QUE CARDIOASPIRINE 100 MG ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

CardioAspirine contient comme principe actif l'acide acétylsalicylique. Ce dernier inhibe, à doses réduites déjà, l'agrégation des plaquettes sanguines. Grâce à un enrobage résistant à l'acidité gastrique, le comprimé ne se dissout que dans l'intestin grêle. C'est pour cette raison que CardioAspirine ménage la muqueuse gastrique.

CardioAspirine ne doit être pris que selon la prescription du médecin.

CardioAspirine est indiqué pour :

- la prévention des thromboses artérielles après des opérations sur les artères coronaires (pontage et suppression d'une sténose des artères coronaires);
- la prévention des attaques cérébrales, suite à l'apparition de signes précurseurs (accidents ischémiques transitoires, AIT);
- la prévention des thromboses artérielles (caillots sanguins dans les vaisseaux coronaires) suite à un infarctus (prophylaxie secondaire de l'infarctus);
- la prévention de l'infarctus du myocarde chez les patients chez lesquels le médecin a constaté un risque élevé. Les affections concomitantes telles que hypertension artérielle, diabète sucré, taux de lipides élevés, doivent également être traitées. De plus, il faut arrêter de fumer;
- le traitement de l'angine de poitrine instable;
- le traitement de l'infarctus du myocarde aigu;
- la prévention des thromboses artérielles après des opérations sur des vaisseaux;

Cardioaspirine 100 mg/30cps
Acide acétylsalicylique

P.P.V. : 27,70 DH
Bayer S.A.



6 118001 090280

COLCHICINE OPACALCIUM 1mg, comprimé sécable, boîte de 20 (Colchicine cristallisée)

MISE EN GARDE SPECIALES

L'apparition de diarrhées (selles liquides plus de 3 fois par jour) pendant le traitement, accompagnées ou non de nausées et de vomissements, peuvent être les premiers signes de surdosage, pouvant être grave. Si vous constatez ces signes, prenez rapidement contact avec votre médecin qui sera amené à diminuer la dose ou à suspendre le traitement par la colchicine.

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg, comprimé sécable et dans quelles formes ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg, comprimé sécable ?
3. Comment prendre COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg, comprimé sécable ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg, comprimé sécable ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE Colchicine Opocalcium 1 mg, comprimé sécable ET DANS QUELLES FORMES ?

Classe pharmacothérapeutique : ANTIGOUTTEUX, Anti-inflammatoire. - code ATC : C09AB01

Ce médicament est préconisé dans :

- Le traitement et la prévention des crises de goutte.
- La maladie périodique,
- La maladie de Behcet,
- Autres accès aigus microcristallins.
- Traitement de la péricardite aiguë idiopathique en association aux traitements d'un premier épisode de péricardite ou d'une récidive.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CE MÉDICAMENT ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, consultez la rubrique 4.

Ne prenez jamais COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg, comprimé sécable

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à un médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous avez une maladie rénale grave (défaillance du fonctionnement rénal),
- Si vous avez une maladie grave du foie (défaillance du fonctionnement hépatique),
- Si vous prenez un traitement par des antibiotiques comme la pristinamycine (l'exception de la spiramycine).
- Si vous êtes enceinte (dans l'indication péricardite).

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg, comprimé sécable.

Mises en garde spéciales

L'apparition de diarrhées (selles liquides plus de 3 fois par jour) pendant le traitement, accompagnées ou non de nausées et de vomissements, peuvent être les premiers signes de surdosage, pouvant être grave. Si vous constatez ces signes, prenez rapidement contact avec votre médecin qui sera amené à diminuer la dose ou à suspendre le traitement par la colchicine.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, ou un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

La prise concomitante de colchicine avec certains antibiotiques (voir rubrique «Autres médicaments et COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg, comprimé sécable») est contre-indiquée.

Précautions d'emploi

En cas de traitement au long cours, surveiller la formule sanguine régulièrement.

En cas de maladie du foie et du rein, CONSULTER VOTRE MEDECIN.

EN CAS DE DOUCE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Autres médicaments et COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg, comprimé sécable

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez pris récemment ou pourriez prendre tout autre médicament. Ce médicament ne doit pas être pris en même temps que certains antibiotiques (comme la pristinamycine ou ceux de la famille des macrolides (à l'exception de la spiramycine)).

Si vous prenez l'un de ces médicaments, vous ne devez pas prendre de la colchicine en même temps. Parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg, comprimé sécable avec des aliments et boissons

Sans objet.

Grossesse, allaitement et fertilité

En cas de péricardite survenant au cours de la grossesse, la colchicine est contre-indiquée compte-tenu de l'association avec les AINS. Dans les autres indications, si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg, comprimé sécable contient du lactose et du saccharose



6 118 000 082 156

13,40

COLCHICINE OPACALCIUM 1mg, comprimé sécable, boîte de 20 (Colchicine cristallisée)

MISE EN GARDE SPECIALES

L'apparition de diarrhées (selles liquides plus de 3 fois par jour) pendant le traitement, accompagnées ou non de nausées et de vomissements, peuvent être les premiers signes de surdosage, pouvant être grave. Si vous constatez ces signes, prenez rapidement contact avec votre médecin qui sera amené à diminuer la dose ou à suspendre le traitement par la colchicine.

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg, comprimé sécable et dans quelles formes ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg, comprimé sécable ?
3. Comment prendre COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg, comprimé sécable ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg, comprimé sécable ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE Colchicine Opocalcium 1 mg, comprimé sécable ET DANS QUELLES FORMES ?

Classe pharmacothérapeutique : ANTIGOUTTEUX, Anti-inflammatoire. - code ATC : C09AB01

Ce médicament est préconisé dans :

- Le traitement et la prévention des crises de goutte.
- La maladie périodique,
- La maladie de Behcet,
- Autres accès aigus microcristallins.
- Traitement de la péricardite aiguë idiopathique en association aux traitements d'un premier épisode de péricardite ou d'une récidive.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CE MÉDICAMENT ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, consultez la rubrique 6.

Ne prenez jamais COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg, comprimé sécable

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à un médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous avez une maladie rénale grave (défaillance du fonctionnement rénal),
- Si vous avez une maladie grave du foie (défaillance du fonctionnement hépatique),
- Si vous prenez un traitement par des antibiotiques comme la pristinamycine (l'exception de la spiramycine).
- Si vous êtes enceinte (dans l'indication péricardite).

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg, comprimé sécable.

Mises en garde spéciales

L'apparition de diarrhées (selles liquides plus de 3 fois par jour) pendant le traitement, accompagnées ou non de nausées et de vomissements, peuvent être les premiers signes de surdosage, pouvant être grave. Si vous constatez ces signes, prenez rapidement contact avec votre médecin qui sera amené à diminuer la dose ou à suspendre le traitement par la colchicine.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, ou un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

La prise concomitante de colchicine avec certains antibiotiques (voir rubrique «Autres médicaments et COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg, comprimé sécable») est contre-indiquée.

Précautions d'emploi

En cas de traitement au long cours, surveiller la formule sanguine régulièrement.

En cas de maladie du foie et du rein, CONSULTER VOTRE MEDECIN.

EN CAS DE DOUCE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Autres médicaments et COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg, comprimé sécable

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez pris récemment ou pourriez prendre tout autre médicament. Ce médicament ne doit pas être pris en même temps que certains antibiotiques (comme la pristinamycine ou ceux de la famille des macrolides (à l'exception de la spiramycine)).

Si vous prenez l'un de ces médicaments, vous ne devez pas prendre de la colchicine en même temps. Parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg, comprimé sécable avec des aliments et boissons

Sans objet.

Grossesse, allaitement et fertilité

En cas de péricardite survenant au cours de la grossesse, la colchicine est contre-indiquée compte-tenu de l'association avec les AINS. Dans les autres indications, si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg, comprimé sécable contient du lactose et du saccharose



6 118 000 082 156

13,40

Dr. Mohamed Ali BENNANI
Cardiologue

Spécialiste des maladies
du cœur, des vaisseaux
et de l'hypertension artérielle
Echocardiographie doppler - Holter
tensionnel - Holter rythmique
Epreuve d'effort
Traitement des varices
Sur Rendez-vous



مركز فحوصات القلب والشرايين
CENTRE D'EXPLORATIONS
CARDIOVASCULAIRES

الدكتور محمد علي بناني
اختصاصي في أمراض القلب والشرايين
وارتفاع الضغط الدموي

التخفيض بالأمواج فوق الصوتية والدوبلر
تسجيل مستمر لضغط الدم لمدة 24 ساعة
تسجيل مستمر لخطيط القلب لمدة 24 ساعة
تخطيط القلب عند المجهود
علاج الدوالي (العروق المنتفخة بالساق)
بالموعد

Casablanca, le :
Mme MAZHOOUR ZITOUNIA

الدار البيضاء، في :
le : 13/02/2023


Nom :

Ordonnance

- Troponine
- Creatininémie
- NFS

EL OUBE

Docteur Mohamed Ali BENNAN.



Traitement à ne pas arrêter jusqu'au prochain rendez-vous le : **عدم توقيف الوصفة حتى الموعد المقبل في :**

1, زنقة 4 العهد الجديد وشارع رضى اكديرة (النيل سابقا) - الطابق الأول (قرب حمام الفن) - ابن امسيك - الدار البيضاء
1, Rue 4 Ahd El Jadid et Bd. Reda Guedira (Ex. Nil) - 1 Etage - (à Côté de Hammam El Fane) - Ben M'sik - Casablanca
Tél./Fax : 0522 59 59 00 - GSM : 0636 36 61 36 - E-mail : bennanimedali@yahoo.fr

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES IBNOU SINA
576, Bd Driss El Harti 1er étage - Casablanca -
Téléphone :05 22 56 91 48 / Fax :05 22 56 91 82

Facture

Casablanca , le 14/02/2023

N° facture 2023-000217


Date 13/02/2023 16:02:00

Mme MAZHOUR EZITOUNIA

Code Acte	Designation Acte	Montant
TROPL	Troponine	
Montant Prélèvement		37,50
Total des cotations B		250
Total à payer en dirhams		250,00

Arrêtée la présente facture à la somme de : Deux cent cinquante dirhams***

IBNOU SINA
576 Bd Driss El Harti Casablanca
Téléphone : 05 22 56 91 48 / Fax : 05 22 56 91 82
LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES IBNOU SINA



مختبر التحاليل الطبية ابن سينا

LABORATOIRE D'ANALYSES MÉDICALES IBNOU SINA

Cyto-Hématologie Viro-Bactériologie Myco-Parasitologie Immunologie Hormonologie Biochimie

Dr. Alami Ouajjou Hanae
Diplômée U.L.B Bruxelles

د. علمي واجوهناء
خريجة جامعة بروكسل

576، شارع ادريس الحارثي
الطابق الأول، الدار البيضاء

576, Bd Driss El Harti
1^{er} étage - Casablanca

Tél. : 05 22 56 91 48
Fax : 05 22 56 91 82
E-mail : secretariat.lis@gmail.com



Patient(e) : Mme MAZHOUR EZITOUNIA

Dossier ouvert le : 13/02/2023 16:02:00

Pvt du: 13/02/2023 16:02

Edité le : 13/02/2023

Prescripteur : DR.

Dossier N° : 130223-022

Date de naissance: 01/01/1932

Age : 91 Ans

Page : 1 / 1

ANALYSES DE BIOCHIMIE (SANG)

Troponine I

0,068 ng/ml

Valeurs Usuelles

Antériorité

(Inférieur à 0,1)

LABORATOIRE D'ANALYSES MÉDICALES
IBNOU SINA
Dr. ALAMI OUAJJOU Hanae
576, Bd Idriss El Harti Casablanca
Tél. 05 22 56 91 48. Fax 05 22 56 91 82



ZITOUNI A

Dr BENNANI Ali

Ref ID: 134

Specimen ID No.

Age: Date: 08/02/2023 12:01:49

SN 000460 Section

Cli No. CaseNo.:

PR Interval	128ms	P Axis	33.90,â
P Interval	129ms	QRS Axis	35.90,â
QRS Interval	96ms	T Axis	-8.90,â
T Interval	354ms	RV5/SV1	2.42/0.69mV
PR Interval	198ms	RV5+SV1	3.10mV

134 131
88 87
87 81

Docteur:

