

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 2461

Société : RAM

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

AMR TAHAR

Date de naissance :

23/08/1951

Adresse :

Tél. : 0661325783

Total des frais engagés :

Dhs

Cadre réservé au Médecin

Professeur BENI NASSER
Chirurgien Urologue
42, Bd. Abdelmoumen - Casa
Tél: 0522 23 10 23 / 0522 23 10 73

Cachet du médecin :

06 FEV. 2023

Date de consultation :

AMR TAHAR

Age:

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

prostatism

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca

Le : 6/2/22

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
00 FEV. 2023		C3	380,00	Professeur <i>SEMMANI</i> Chirurgien <i>Spécialisé</i> 42, Bd. Abdelkader - 1000 Tunis - Tunisie Tél: 0522 23 10 23 10 73

PHARMACIE ROUTIERE

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
N°3 - Casablanca - Tél 05 22 91 01 50	06/02/23	688,20
PHARMACIE ROUTIERE Dr. Noura EL MDAOUFI Bd. Mohammed VI Km.9.5 (Route de Médouia) Tél. 05 22 91 01 50	06/02/23	99.20

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
Professeur BERNARD DURON Chirurgien Radiologue 42, Bd. Anatole France Tél: 0522 23 10 23 / 0522 23 10 13	06 FEV. 2023	Z35 + Z35	500,00

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins

Important:

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000

(Création, remont, adjonction)

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE REVIS

VISA ET SACHEZ DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Professeur BENNANI Saâd

Chirurgien Urologue

Membre de l'European Association of Urology
et de l'Association Française d'Urologie



الدكتور بناني سعد

أستاذ جامعي

جراحة المسالك البولية والتناسلية

عضو الجمعية الأوروبية والفرنسية
لجراحة المسالك البولية والتناسلية

06 FEV. 2023

Casablanca, le :

Mr AMR Tahar

121.40 x 3

② UMAX 0.4 mg LP

S.V

1 gel/j le soir + 3 mois

108.00 x 3

② VECA 5 mg

S.V

1 g/j le matin + 3 mois

~~PHARMACIE ROUTIERE~~
Dr. Noura El MDAOUI
Bd. Mohammed V Km 9.5 (Route de Médina)
N°3 - Casablanca - Tél: 05 22 97 01 50

PHARMACIE ROUTIERE
Dr. Noura El MDAOUI
Bd. Mohammed V Km 9.5 (Route de Médina)
N°3 - Casablanca - Tél: 05 22 97 01 50

Professeur BENNANI Saâd
Chirurgien Urologue
42, Bd. Abdelmoumen - Casablanca
Tél: 0522 23 10 23 / 0522 23 10 73

42، شارع عبد المؤمن - إقامة وليلي - الطابق الخامس - الدار البيضاء

42, Boulevard Abdelmoumen - Résidence Walili - 5^{ème} étage - Casablanca

Tél.: 05 22 23 10 23 - Fax : 05 22 23 10 73 - GSM : 06 61 16 65 16

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que Veca®, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Veca®, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre Veca®, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Veca®, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE Veca®, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Médicaments urologiques, médicaments de l'incontinence urinaire.

La solvénacine succinate (la substance active de Veca®) appartient à la classe pharmaco-thérapeutique des anticholinergiques. Ces médicaments sont utilisés pour réduire les contractions de la vessie lorsque celle-ci est hyperactive. Ceci vous permettra d'attendre plus longtemps avant de devoir aller aux toilettes et augmentera le volume des urines que peut retenir votre vessie.

Veca®, comprimé pelliculé est indiqué dans le traitement des symptômes de la vessie hyperactive (incontinence urinaire). Les symptômes incluent : un besoin pressant et soudain d'uriner sans signe précurseur, des envies fréquentes d'uriner ainsi que des émissions involontaires d'urine sans que vous ayez eu le temps d'aller aux toilettes.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE Veca®, comprimé pelliculé ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais Veca®, comprimé pelliculé :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.
- Si vous avez des difficultés pour uriner ou si votre vessie ne se vide pas complètement quand vous urinez (réention urinaire).
- Si vous souffrez d'une affection gastro-intestinale grave (notamment un mégacôlon toxique, complication associée à la rectocolite hémorragique).
- Si vous souffrez d'une maladie des muscles appelée myasténie, caractérisée par une faiblesse musculaire excessive.
- Si vous souffrez d'une augmentation de la pression à l'intérieur de l'œil, ayant une pression oculaire de plus de 25 mmHg.

de pompage du cœur insuffisante) ou une maladie du rein). Si vous avez une infection urinaire, votre médecin vous prescrira un antibiotique (traitement contre certaines infections bactériennes).

Autres médicaments et Veca®, comprimé pelliculé

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament. Il est particulièrement important que vous préveniez votre médecin si vous prenez :

- D'autres médicaments anticholinergiques, car les effets et les effets indésirables des deux médicaments peuvent être accentués.
- Des médicaments cholinergiques, car ils peuvent réduire l'effet de Veca®, comprimé pelliculé.
- Des médicaments tels que le métoclopramide ou le cisapride, qui accélèrent le fonctionnement du tube digestif. Veca®, comprimé pelliculé peut réduire les effets de ces médicaments.
- Des médicaments tels que le kétocozaole, le ritonavir, le neflénavir, l'itraconazole, le vérapamil ou le diltiazem, qui ralentissent la dégradation de Veca®, comprimé pelliculé dans l'organisme.
- Des médicaments tels que la rifampicine, la phénytoïne ou la carbamazépine, car ils peuvent accélérer la dégradation de Veca®, comprimé pelliculé dans l'organisme.
- Des médicaments tels que les bisphosphonates, qui peuvent déclencher ou aggraver une œsophagite (inflammation de l'œsophage).

Veca®, comprimé pelliculé contient du lactose :

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

Veca®, comprimé pelliculé avec des aliments et boissons

Veca®, comprimé pelliculé peut être pris indifféremment pendant ou en dehors des repas.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament. Il n'est pas recommandé d'utiliser Veca®, comprimé pelliculé pendant la grossesse, sauf nécessité absolue. N'utilisez pas Veca®, comprimé pelliculé si vous allaitez car la solvénacine succinate pourrait passer dans le lait maternel. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Veca®, comprimé pelliculé peut provoquer une vision trouble et parfois une somnolence ou une fatigue. Si vous souffrez de l'un de ces effets indésirables, ne conduisez pas et n'utilisez pas de machine.

3. COMMENT PRENDRE Veca®, comprimé pelliculé ?

Veillez toujours à prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

La dose recommandée est de 5 mg par jour, sauf si votre médecin vous demande de prendre 10 mg par jour.

Avalez le comprimé en entier avec du liquide. Il peut être pris indifféremment, pendant ou en dehors des repas. Ne pas croquer le comprimé.

Utilisation chez les enfants et adolescents

Veca® ne doit pas être utilisé chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans.

Le comprimé de Veca®, comprimé pelliculé que vous

succincte. En cas d'arrivée d'un angioédème, la solvénacine succinat doit être immédiatement arrêté et un traitement et/ou des mesures appropriées doivent être pris.

Veca®, comprimé pelliculé peut provoquer les autres effets indésirables suivants :

Très fréquents (peut affecter plus de 1 personne sur 10)

- Sécheresse de la bouche.

Fréquents (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10)

- Vision trouble.

- Constipation, nausées, indigestion avec des symptômes tels qu'un lourdeur abdominale, douleur abdominale, régurgitations, nausées et brûlures.

l'esto

Peu

- Infé

- Son

- Per

- Séc

- Séc

- Refl

- Séc

- Séc

- Diffi

- Fatig

- Accu

Rares (peu

- Accumulat

- gros intestin (f

- Accumulation d'ur

- dans la vessie par impossibilité de vider la

- vessie (réten

- Sensations vertig

- maux de tête.

- Vomissements.

- Démangeaisons, r

- a

Très rares (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10 000)

- Hallucinations, confusion.

- Eruption cutanée aig

- gique.

Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles)

- Diminution de l'appétit, niveaux élevés de potassium dans le

- sang qui peuvent causer des anomalies du rythme cardiaque.

- Augmentation de la pression intraoculaire.

- Modifications de l'activité électrique du cœur (ECG), battements

- cardiaques irréguliers Perception de vos battements cardiaques,

- accélération du rythme cardiaque.

- Troubles de la voix.

- Troubles hépatiques.

- Faiblesses musculaires.

- Troubles rénaux.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

Vous pouvez déclarer les effets indésirables directement ou via le centre national de pharmacovigilance. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVÉR Veca®, comprimé pelliculé ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

N'utiliser pas ce médicament après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

A conserver à une température inférieure à 30 °C.

Ne pas conserver dans un endroit exposé aux rayons du soleil ou dans un endroit où la température peut dépasser 30 °C.

Ne pas conserver dans un endroit où la température peut dépasser 30 °C.

LOT : 2685
PER : 08-25
P.V : 108 DH 00

A18780

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que Veca®, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Veca®, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre Veca®, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Veca®, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE Veca®, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Médicaments urologiques, médicaments de l'incontinence urinaire.

La solvénacine succinate (la substance active de Veca®) appartient à la classe pharmaco-thérapeutique des anticholinergiques. Ces médicaments sont utilisés pour réduire les contractions de la vessie lorsque celle-ci est hyperactive. Ceci vous permettra d'attendre plus longtemps avant de devoir aller aux toilettes et augmentera le volume des urines que peut retenir votre vessie.

Veca®, comprimé pelliculé est indiqué dans le traitement des symptômes de la vessie hyperactive (incontinence urinaire). Les symptômes incluent : un besoin pressant et soudain d'uriner sans signe précurseur, des envies fréquentes d'uriner ainsi que des émissions involontaires d'urine sans que vous ayez eu le temps d'aller aux toilettes.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE Veca®, comprimé pelliculé ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais Veca®, comprimé pelliculé :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.
- Si vous avez des difficultés pour uriner ou si votre vessie ne se vide pas complètement quand vous urinez (réention urinaire).
- Si vous souffrez d'une affection gastro-intestinale grave (notamment un mégacôlon toxique, complication associée à la rectocolite hémorragique).
- Si vous souffrez d'une maladie des muscles appelée myasténie, caractérisée par une faiblesse musculaire excessive.
- Si vous souffrez d'une augmentation de la pression à l'intérieur de l'œil, ayant une pression oculaire de plus de 25 mmHg.

de pompage du cœur insuffisante) ou une maladie du rein). Si vous avez une infection urinaire, votre médecin vous prescrira un antibiotique (traitement contre certaines infections bactériennes).

Autres médicaments et Veca®, comprimé pelliculé

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament. Il est particulièrement important que vous préveniez votre médecin si vous prenez :

- D'autres médicaments anticholinergiques, car les effets et les effets indésirables des deux médicaments peuvent être accentués.
- Des médicaments cholinergiques, car ils peuvent réduire l'effet de Veca®, comprimé pelliculé.
- Des médicaments tels que le métoclopramide ou le cisapride, qui accélèrent le fonctionnement du tube digestif. Veca®, comprimé pelliculé peut réduire les effets de ces médicaments.
- Des médicaments tels que le kétocozaole, le ritonavir, le neflifavir, l'itraconazole, le vérapamil ou le diltiazem, qui ralentissent la dégradation de Veca®, comprimé pelliculé dans l'organisme.
- Des médicaments tels que la rifampicine, la phénytoïne ou la carbamazépine, car ils peuvent accélérer la dégradation de Veca®, comprimé pelliculé dans l'organisme.
- Des médicaments tels que les bisphosphonates, qui peuvent déclencher ou aggraver une œsophagite (inflammation de l'œsophage).

Veca®, comprimé pelliculé contient du lactose :

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

Veca®, comprimé pelliculé avec des aliments et boissons

Veca®, comprimé pelliculé peut être pris indifféremment pendant ou en dehors des repas.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament. Il n'est pas recommandé d'utiliser Veca®, comprimé pelliculé pendant la grossesse, sauf nécessité absolue. N'utilisez pas Veca®, comprimé pelliculé si vous allaitez car la solvénacine succinate pourrait passer dans le lait maternel. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Veca®, comprimé pelliculé peut provoquer une vision trouble et parfois une somnolence ou une fatigue. Si vous souffrez de l'un de ces effets indésirables, ne conduisez pas et n'utilisez pas de machine.

3. COMMENT PRENDRE Veca®, comprimé pelliculé ?

Veillez toujours à prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

La dose recommandée est de 5 mg par jour, sauf si votre médecin vous demande de prendre 10 mg par jour.

Avalez le comprimé en entier avec du liquide. Il peut être pris indifféremment, pendant ou en dehors des repas. Ne pas croquer le comprimé.

Utilisation chez les enfants et adolescents

Veca® ne doit pas être utilisé chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans.

Le comprimé de Veca®, comprimé pelliculé que vous

succincte. En cas d'arrivée d'un angioédème, la solvénacine succinat doit être immédiatement arrêté et un traitement et/ou des mesures appropriées doivent être pris.

Veca®, comprimé pelliculé peut provoquer les autres effets indésirables suivants :

Très fréquents (peut affecter plus de 1 personne sur 10)

- Sécheresse de la bouche.

Fréquents (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10)

- Vision trouble.

- Constipation, nausées, indigestion avec des symptômes tels qu'un lourdeur abdominale, douleur abdominale, régurgitations, nausées et brûlures.

l'esto

Peu

- Inf

- Son

- Per

- Séc

- Séc

- Refl

- Séc

- Séc

- Diffi

- Fatig

- Accu

Rares (p

- Accumulat

- gros intestin (f

- Accumulation d'ur

- dans la vessie par impossibilité de vider la

- vessie (réention urin

- Sensations vertigines, maux de tête.

- Vomissements.

- Démangeaisons, r

- a

Très rares (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10 000)

- Hallucinations, confusion.

- Eruption cutanée aig

- gique.

Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles)

- Diminution de l'appétit, niveaux élevés de potassium dans le sang qui peuvent causer des anomalies du rythme cardiaque.

- Augmentation de la pression intraoculaire.

- Modifications de l'activité électrique du cœur (ECG), battements cardiaques irréguliers. Perception de vos battements cardiaques, accélération du rythme cardiaque.

- Troubles de la voix.

- Troubles hépatiques.

- Faiblesses musculaires.

- Troubles rénaux.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

Vous pouvez déclarer les effets indésirables directement ou via le centre national de pharmacovigilance. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVÉR Veca®, comprimé pelliculé ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

N'utiliser pas ce médicament après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

A conserver à une température inférieure à 30 °C.

Ne pas laisser tomber ou écraser la boîte. Ne pas laisser tomber ou écraser la boîte.

LOT : 2685
PER : 08-25
P.V : 108 DH 00

A18780

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que Veca®, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Veca®, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre Veca®, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Veca®, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE Veca®, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Médicaments urologiques, médicaments de l'incontinence urinaire.

La solvénacine succinate (la substance active de Veca®) appartient à la classe pharmaco-thérapeutique des anticholinergiques. Ces médicaments sont utilisés pour réduire les contractions de la vessie lorsque celle-ci est hyperactive. Ceci vous permettra d'attendre plus longtemps avant de devoir aller aux toilettes et augmentera le volume des urines que peut retenir votre vessie.

Veca®, comprimé pelliculé est indiqué dans le traitement des symptômes de la vessie hyperactive (incontinence urinaire). Les symptômes incluent : un besoin pressant et soudain d'uriner sans signe précurseur, des envies fréquentes d'uriner ainsi que des émissions involontaires d'urine sans que vous ayez eu le temps d'aller aux toilettes.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE Veca®, comprimé pelliculé ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais Veca®, comprimé pelliculé :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.
- Si vous avez des difficultés pour uriner ou si votre vessie ne se vide pas complètement quand vous urinez (réention urinaire).
- Si vous souffrez d'une affection gastro-intestinale grave (notamment un mégacôlon toxique, complication associée à la rectocolite hémorragique).
- Si vous souffrez d'une maladie des muscles appelée myasténie, caractérisée par une faiblesse musculaire excessive.
- Si vous souffrez d'une augmentation de la pression à l'intérieur de l'œil, ayant une pression oculaire de plus de 25 mmHg.

de pompage du cœur insuffisante) ou une maladie du rein). Si vous avez une infection urinaire, votre médecin vous prescrira un antibiotique (traitement contre certaines infections bactériennes).

Autres médicaments et Veca®, comprimé pelliculé

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament. Il est particulièrement important que vous préveniez votre médecin si vous prenez :

- D'autres médicaments anticholinergiques, car les effets et les effets indésirables des deux médicaments peuvent être accentués.
- Des médicaments cholinergiques, car ils peuvent réduire l'effet de Veca®, comprimé pelliculé.
- Des médicaments tels que le métoclopramide ou le cisapride, qui accélèrent le fonctionnement du tube digestif. Veca®, comprimé pelliculé peut réduire les effets de ces médicaments.
- Des médicaments tels que le kétocozaole, le ritonavir, le neflavinavir, l'itraconazole, le vérapamil ou le diltiazem, qui ralentissent la dégradation de Veca®, comprimé pelliculé dans l'organisme.
- Des médicaments tels que la rifampicine, la phénytoïne ou la carbamazépine, car ils peuvent accélérer la dégradation de Veca®, comprimé pelliculé dans l'organisme.
- Des médicaments tels que les bisphosphonates, qui peuvent déclencher ou aggraver une œsophagite (inflammation de l'œsophage).

Veca®, comprimé pelliculé contient du lactose :

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

Veca®, comprimé pelliculé avec des aliments et boissons

Veca®, comprimé pelliculé peut être pris indifféremment pendant ou en dehors des repas.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament. Il n'est pas recommandé d'utiliser Veca®, comprimé pelliculé pendant la grossesse, sauf nécessité absolue. N'utilisez pas Veca®, comprimé pelliculé si vous allaitez car la solvénacine succinate pourrait passer dans le lait maternel. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Veca®, comprimé pelliculé peut provoquer une vision trouble et parfois une somnolence ou une fatigue. Si vous souffrez de l'un de ces effets indésirables, ne conduisez pas et n'utilisez pas de machine.

3. COMMENT PRENDRE Veca®, comprimé pelliculé ?

Veillez toujours à prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

La dose recommandée est de 5 mg par jour, sauf si votre médecin vous demande de prendre 10 mg par jour.

Avalez le comprimé en entier avec du liquide. Il peut être pris indifféremment, pendant ou en dehors des repas. Ne pas croquer le comprimé.

Utilisation chez les enfants et adolescents

Veca® ne doit pas être utilisé chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans.

Le comprimé de Veca®, comprimé pelliculé que vous

succincte. En cas d'arrivée d'un angioédème, la solvénacine succinat doit être immédiatement arrêté et un traitement et/ou des mesures appropriées doivent être pris.

Veca®, comprimé pelliculé peut provoquer les autres effets indésirables suivants :

Très fréquents (peut affecter plus de 1 personne sur 10)

- Sécheresse de la bouche.

Fréquents (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10)

- Vision trouble.

- Constipation, nausées, indigestion avec des symptômes tels qu'un lourdeur abdominale, douleur abdominale, régurgitations, nausées et brûlures.

l'esto

Peu

- Inf

- Son

- Per

- Séc

- Séc

- Refl

- Séc

- Séc

- Diffi

- Fatig

- Accu

Rares (p

- Accumulat

- gros intestin (f

- Accumulation d'ur

- dans la vessie par impossibilité de vider la

- vessie (réention urin

- Sensations vertigines, maux de tête.

- Vomissements.

- Démangeaisons, r

- a

Très rares (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10 000)

- Hallucinations, confusion.

- Eruption cutanée aig

- gique.

Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles)

- Diminution de l'appétit, niveaux élevés de potassium dans le sang qui peuvent causer des anomalies du rythme cardiaque.

- Augmentation de la pression intraoculaire.

- Modifications de l'activité électrique du cœur (ECG), battements cardiaques irréguliers. Perception de vos battements cardiaques, accélération du rythme cardiaque.

- Troubles de la voix.

- Troubles hépatiques.

- Faiblesses musculaires.

- Troubles rénaux.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

Vous pouvez déclarer les effets indésirables directement ou via le centre national de pharmacovigilance. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER Veca®, comprimé pelliculé ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

N'utiliser pas ce médicament après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

A conserver à une température inférieure à 30 °C.

Ne pas laisser tomber ou écraser la boîte. Ne pas laisser tomber ou écraser la boîte.

LOT : 2685
PER : 08-25
P.V : 108 DH 00

A18780

UMAX® 400 ug LP

Microgranules à libération prolongée en gélules - Boîte de 10,30 et de 60 (Chlorhydrate de tamsulosine)

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez d'autres questions demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que UMAX® 400 ug LP Gélule et dans quel cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre UMAX® 400 ug LP Gélule ?

3. Comment prendre UMAX® 400 ug LP Gélule ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver UMAX® 400 ug LP Gélule ?

6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE UMAX® 400 ug LP Gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Alpha-bloquants / Médicaments utilisés dans l'hypertrophie bénigne de la prostate - code ATC : G04CA02

UMAX® 400 ug LP Gélule contient de la tamsulosine, une substance qui appartient à une famille de médicaments appelée alpha-bloquants.

UMAX® 400 ug LP Gélule est utilisé dans le traitement de certains troubles qui peuvent vous empêcher d'uriner normalement suite à une augmentation de volume (hypertrophie) bénigne de votre prostate.

Ce médicament est utilisé uniquement chez l'homme dans le traitement des douleurs du bas appareil urinaire associé à un élargissement de la glande prostatique (hypertrophie bénigne de la prostate). Ces douleurs peuvent être des difficultés à uriner (débit urinaire faible), miction goutte à goutte, besoin urgent d'uriner et envie d'uriner fréquemment aussi bien la nuit que le jour.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE UMAX® 400 ug LP Gélule ?

Ne prenez jamais UMAX® 400 ug LP Gélule :

• Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active (la tamsulosine) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (vous trouverez la liste des composants à la rubrique 6).

• Si vous êtes allergique (hypersensible) à un médicament de la même famille (les alpha-bloquants).

• Si vous avez déjà eu des gonflements (œdèmes) du visage, des lèvres et de certaines parties de votre corps (les muqueuses) après avoir pris ce médicament.

• Si vous avez déjà eu auparavant une baisse de votre tension artérielle lors d'un passage de la position couchée à la position debout pouvant s'accompagner de vertiges et de malaises (hypotension orthostatique).

• Si vous avez une maladie sévère du foie (insuffisance hépatique sévère).

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre UMAX® 400 ug LP Gélule.

Vous devez prévenir votre médecin si :

• Vous prenez des médicaments pour traiter une tension artérielle élevée (antihypertenseurs).

• Vous avez déjà eu des malaises alors que vous urinez ou après avoir uriné (syncope mictionnelle).

• Vous avez une maladie des reins (insuffisance rénale chronique).

• Vous avez plus de 65 ans.

• Vous avez des maladies du cœur (patient coronarien). En cas d'aggravation d'un angor, le traitement par ce médicament devra être interrompu.

Pendant le traitement, si vous avez des gonflements (œdèmes) du visage, des lèvres et de certaines parties de votre corps (les muqueuses), cela peut être le signe d'une réaction allergique au médicament. Dans ce cas, vous devez arrêter le traitement et consulter immédiatement votre médecin.

Des malaises peuvent survenir rarement avec UMAX® 400 ug LP Gélule et des médicaments apparentés. Aux premiers signes de vertiges ou de faiblesse, vous devez vous asseoir ou vous allonger jusqu'à ce que les sensations de malaise disparaissent.

Si vous devez vous faire opérer de la cataracte ou du glaucome

Si vous devez vous faire opérer prochainement de la cataracte (opacité du cristallin) ou du glaucome, et si vous avez été ou êtes actuellement ou prévoyez d'être traité par UMAX® 400 ug LP Gélule, informez-en votre ophtalmologiste avant l'opération.

Le chirurgien pourra prendre des précautions appropriées en fonction de votre traitement au moment de l'intervention chirurgicale.

Recommandations concernant votre hygiène de vie

Durant le traitement vous devez respecter certaines mesures d'hygiène de vie et notamment :

• conservez une activité physique (marcher, courir).

• faites attention à votre alimentation : ne pas faire d'alcoolisés.

• ne buvez pas trop le soir.

• maintenez un transit intestinal régulier.

Enfants

Ne donnez pas ce médicament à des enfants ou pas d'effet thérapeutique dans cette population.

Mentions relatives aux excipients à effet notable

• Saccharose : L'utilisation de ce médicament est intolerance au fructose, un syndrome de malabsorption en sucre/ isomaltase (maladies héréditaires rares).

• Colorants azoïques (azurine, carmine) et des agents colorants azoïques et peut provoquer :

• Hydroxybenzoate de méthyle et de propyle : Ce effet peut provoquer des réactions allergiques.

Autres médicaments et UMAX® 400 ug LP Gélule

Ce médicament DOIT ETRE EVITE en association thérapeutique (alpha1-bloquants). Cette association artérielle.

Informez votre médecin ou à votre pharmacien pourriez prendre tout autre médicament, même ordonnance.

Il est important d'informer votre médecin si vous prenez des médicaments qui peuvent diminuer l'élimination ketoconazole, erythromycine).

UMAX® 400 ug LP Gélule avec des aliments et Sans objet.

Grossesse, allaitement et fertilité

UMAX® 400 ug LP Gélule n'est pas indiqué chez cours de la grossesse et son passage dans le lait.

Chez l'homme, une éjaculation anormale a été rapportée. Cela signifie que le sperme ne sort pas par l'urètre (rétrécie) ou bien le volume d'éjaculation est diminué. Ce phénomène est sans gravité.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Conduite de véhicules et utilisation de machin

Ce médicament peut provoquer une baisse de la tension artérielle, des vertiges ou des malaises, notamment en déconseillé de conduire un véhicule ou d'utiliser effets.

3. COMMENT PRENDRE UMAX® 400 ug LP Gélule

Prenez toujours prendre ce médicament en suivre ou les indications de votre médecin ou votre pharmacien en cas de doute.

Posologie

La dose recommandée est de 1 gélule par jour.

Mode d'administration

Le médicament est à utiliser par voie orale. La gélule est croquée ni machée.

Fréquence d'administration

• Vous devez prendre votre dose quotidienne en déjeuner. Si le matin, vous ne prenez pas de petit déjeuner.

• Vous devez prendre votre gélule chaque jour au petit déjeuner.

• Au cas où vous auriez oublié de prendre la gélule, repas de la journée.

Durée du traitement

Ce traitement nécessite une surveillance médical poursuivre plusieurs mois.

Habituellement, UMAX® 400 ug LP Gélule est prescrit et les réactions sont maintenues pendant 3 mois.

Si vous avez pris plus de UMAX® 400 ug LP Gélule, contactez rapidement un médecin et allongez-vous.

Si vous oubliiez de prendre UMAX® 400 ug LP Gélule, prenez le traitement, le lendemain, au rythme d'une gélule.

Ne prenez pas de dose double pour compenser la gélule oubliée.

Si vous arrêtez de prendre UMAX® 400 ug LP Gélule, vous arrêtez de prendre votre traitement de l'hypertrophie bénigne de la prostate peuvent réapparaître.

C'est pourquoi il est impératif de poursuivre votre traitement, même si les troubles dont vous souffrez.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES ?

Comme tous les médicaments, ce médicament

او ملحوظ

LOT 221421
EXP 04/2024
PPV 121.40DH

الاصدار

لечение اعتماد عدسة العين او الجلووكوما

الدورة المائية من العين (الاعاجم اعتماد عدسة العين او الجلووكوما). فقد تنسق قذف العين
الدورة المائية من العين (الاعاجم اعتماد عدسة العين او الجلووكوما) في القسم 2.

يتم شبهها بعد التصرير بهذا الدواء امرا ضروري وبالغ الأهمية. لذلك يسمح
بخطوات الدورة.

مكثف 400 مللي

الحقن

25 مللي.

الصرف الصحي او مع النفيات المنزلية.

من الآية لا ينادي إلها بهذه النافع سوف تساهم في حماية البيئة.

مكثف 400 مللي

هيروهيدرو بروبيل سيليلسلولوز 15. ذلك منقى بروبيل جيلوكول. بولي

CPS. الشفط المائي بروبيل سلولوز 4. لاصق مائي ايثيل سترات.

301DS. بيكروز (دواء السكر). أصصنة أزوية (اوروجين. كاربوزين. وأصصنة برتقالي (FCF).

جيرو.

الدرال بيتا

2020. شهادة

COOPER PHARMA

زنقة محمد دبوري - 11010 الدار البيضاء

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

031055

UMAX® 400 ug LP

Microgranules à libération prolongée en gélules - Boîte de 10,30 et de 60 (Chlorhydrate de tamsulosine)

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez d'autres questions demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que UMAX® 400 ug LP Gélule et dans quel cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre UMAX® 400 ug LP Gélule ?

3. Comment prendre UMAX® 400 ug LP Gélule ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver UMAX® 400 ug LP Gélule ?

6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE UMAX® 400 ug LP Gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Alpha-bloquants / Médicaments utilisés dans l'hypertrophie bénigne de la prostate - code ATC : G04CA02

UMAX® 400 ug LP Gélule contient de la tamsulosine, une substance qui appartient à une famille de médicaments appelée alpha-bloquants.

UMAX® 400 ug LP Gélule est utilisé dans le traitement de certains troubles qui peuvent vous empêcher d'uriner normalement suite à une augmentation de volume (hypertrophie) bénigne de votre prostate.

Ce médicament est utilisé uniquement chez l'homme dans le traitement des douleurs du bas appareil urinaire associé à un élargissement de la glande prostatique (hypertrophie bénigne de la prostate). Ces douleurs peuvent être des difficultés à uriner (débit urinaire faible), miction goutte à goutte, besoin urgent d'uriner et envie d'uriner fréquemment aussi bien la nuit que le jour.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE UMAX® 400 ug LP Gélule ?

Ne prenez jamais UMAX® 400 ug LP Gélule :

• Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active (la tamsulosine) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (vous trouverez la liste des composants à la rubrique 6).

• Si vous êtes allergique (hypersensible) à un médicament de la même famille (les alpha-bloquants).

• Si vous avez déjà eu des gonflements (œdèmes) du visage, des lèvres et de certaines parties de votre corps (les muqueuses) après avoir pris ce médicament.

• Si vous avez déjà eu auparavant une baisse de votre tension artérielle lors d'un passage de la position couchée à la position debout pouvant s'accompagner de vertiges et de malaises (hypotension orthostatique).

• Si vous avez une maladie sévère du foie (insuffisance hépatique sévère).

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre UMAX® 400 ug LP Gélule.

Vous devez prévenir votre médecin si :

• Vous prenez des médicaments pour traiter une tension artérielle élevée (antihypertenseurs).

• Vous avez déjà eu des malaises alors que vous urinez ou après avoir uriné (syncope mictionnelle).

• Vous avez une maladie des reins (insuffisance rénale chronique).

• Vous avez plus de 65 ans.

• Vous avez des maladies du cœur (patient coronarien). En cas d'aggravation d'un angor, le traitement par ce médicament devra être interrompu.

Pendant le traitement, si vous avez des gonflements (œdèmes) du visage, des lèvres et de certaines parties de votre corps (les muqueuses), cela peut être le signe d'une réaction allergique au médicament. Dans ce cas, vous devez arrêter le traitement et consulter immédiatement votre médecin.

Des malaises peuvent survenir rarement avec UMAX® 400 ug LP Gélule et des médicaments apparentés. Aux premiers signes de vertiges ou de faiblesse, vous devez vous asseoir ou vous allonger jusqu'à ce que les sensations de malaise disparaissent.

Si vous devez vous faire opérer de la cataracte ou du glaucome

Si vous devez vous faire opérer prochainement de la cataracte (opacité du cristallin) ou du glaucome, et si vous avez été ou êtes actuellement ou prévoyez d'être traité par UMAX® 400 ug LP Gélule, informez-en votre ophtalmologiste avant l'opération.

Le chirurgien pourra prendre des précautions appropriées en fonction de votre traitement au moment de l'intervention chirurgicale.

Recommandations concernant votre hygiène de vie

Durant le traitement vous devez respecter certaines mesures d'hygiène de vie et notamment :

• conservez une activité physique (marcher, courir).

• faites attention à votre alimentation : ne pas faire d'alcoolisés.

• ne buvez pas trop le soir.

• maintenez un transit intestinal régulier.

Enfants

Ne donnez pas ce médicament à des enfants ou pas d'effet thérapeutique dans cette population.

Mentions relatives aux excipients à effet notable

• Saccharose : L'utilisation de ce médicament est intolerance au fructose, un syndrome de malabsorption en sucre/ isomaltase (maladies héréditaires rares).

• Colorants azoïques (azurine, carmine) et des agents colorants azoïques et peut provoquer :

• Hydroxybenzoate de méthyle et de propyle : Ce effet peut provoquer des réactions allergiques.

Autres médicaments et UMAX® 400 ug LP Gélule

Ce médicament DOIT ETRE EVITE en association thérapeutique (alpha1-bloquants). Cette association artérielle.

Informez votre médecin ou à votre pharmacien pourriez prendre tout autre médicament, même ordonnance.

Il est important d'informer votre médecin si vous prenez des médicaments qui peuvent diminuer l'élimination ketoconazole, erythromycine).

UMAX® 400 ug LP Gélule avec des aliments et Sans objet.

Grossesse, allaitement et fertilité

UMAX® 400 ug LP Gélule n'est pas indiqué chez cours de la grossesse et son passage dans le lait.

Chez l'homme, une éjaculation anormale a été rapportée. Cela signifie que le sperme ne sort pas par l'urètre (rétrécie) ou bien le volume d'éjaculation est diminué. Ce phénomène est sans gravité.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien. Conduite de véhicules et utilisation de machin

Ce médicament peut provoquer une baisse de la tension artérielle et peut entraîner des vertiges ou des malaises, notamment en déconseillé de conduire un véhicule ou d'utiliser effets.

3. COMMENT PRENDRE UMAX® 400 ug LP Gélule

Buvez à toujours prendre ce médicament en suivre ou les indications de votre médecin ou votre pharmacien en cas de doute.

Posologie

La dose recommandée est de 1 gélule par jour.

Mode d'administration

Le médicament est à utiliser par voie orale. La gélule est croquée ni machée.

Fréquence d'administration

• Vous devez prendre votre dose quotidienne en déjeuner. Si le matin, vous ne prenez pas de petit déjeuner, prenez votre dose au repas.

• Vous devez prendre votre gélule chaque jour au petit déjeuner.

• Au cas où vous auriez oublié de prendre la gélule, repas de la journée.

Durée du traitement

Ce traitement nécessite une surveillance médical poursuivre plusieurs mois.

Habituellement, UMAX® 400 ug LP Gélule est prescrit et les réactions sont maintenues pendant 12 mois.

Si vous avez pris plus de UMAX® 400 ug LP Gélule.

Contactez rapidement un médecin et allongez-vous.

Si vous oubliiez de prendre UMAX® 400 ug LP Gélule.

Si vous avez oublié 1 jour de traitement, ne prenez pas de double dose pour compenser la dose oubliée.

Si vous arrêtez de prendre UMAX® 400 ug LP Gélule.

Si vous arrêtez de prendre votre traitement de l'hypertrophie bénigne de la prostate peuvent réapparaître.

C'est pourquoi il est impératif de poursuivre votre traitement.

Recommandations concernant votre hygiène de vie

Durant le traitement vous devez respecter certaines mesures d'hygiène de vie et notamment :

أو ملحوظ

LOT 221421
EXP 04/2024
PPV 121.40DH

الاصدار

لечение اعتماد عدسة العين او الجلووكوما

الدورة المائية من العين (الاعاجم اعتماد عدسة العين او الجلووكوما). فقد تنسق قذفة العين
الدورة المائية من العين (الاعاجم اعتماد عدسة العين او الجلووكوما) في القسم 2.

يتم شطبها بعد التصریح بها او ضرورياً وباخراجها.

الخطأ

IMPIMEPEL

زنقة محمد دبوري - 11010 الدار البيضاء

الخطأ

الخطأ

الخطأ

الخطأ

الخطأ

الخطأ

الخطأ

الخطأ

UMAX® 400 ug LP

Microgranules à libération prolongée en gélules - Boîte de 10,30 et de 60 (Chlorhydrate de tamsulosine)

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez d'autres questions demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que UMAX® 400 ug LP Gélule et dans quel cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre UMAX® 400 ug LP Gélule ?

3. Comment prendre UMAX® 400 ug LP Gélule ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver UMAX® 400 ug LP Gélule ?

6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE UMAX® 400 ug LP Gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Alpha-bloquants / Médicaments utilisés dans l'hypertrophie bénigne de la prostate - code ATC : G04CA02

UMAX® 400 ug LP Gélule contient de la tamsulosine, une substance qui appartient à une famille de médicaments appelée alpha-bloquants.

UMAX® 400 ug LP Gélule est utilisé dans le traitement de certains troubles qui peuvent vous empêcher d'uriner normalement suite à une augmentation de volume (hypertrophie) bénigne de votre prostate.

Ce médicament est utilisé uniquement chez l'homme dans le traitement des douleurs du bas appareil urinaire associé à un élargissement de la glande prostatique (hypertrophie bénigne de la prostate). Ces douleurs peuvent être des difficultés à uriner (débit urinaire faible), miction goutte à goutte, besoin urgent d'uriner et envie d'uriner fréquemment aussi bien la nuit que le jour.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE UMAX® 400 ug LP Gélule ?

Ne prenez jamais UMAX® 400 ug LP Gélule :

• Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active (la tamsulosine) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (vous trouverez la liste des composants à la rubrique 6).

• Si vous êtes allergique (hypersensible) à un médicament de la même famille (les alpha-bloquants).

• Si vous avez déjà eu des gonflements (œdèmes) du visage, des lèvres et de certaines parties de votre corps (les muqueuses) après avoir pris ce médicament.

• Si vous avez déjà eu auparavant une baisse de votre tension artérielle lors d'un passage de la position couchée à la position debout pouvant s'accompagner de vertiges et de malaises (hypotension orthostatique).

• Si vous avez une maladie sévère du foie (insuffisance hépatique sévère).

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre UMAX® 400 ug LP Gélule.

Vous devez prévenir votre médecin si :

• Vous prenez des médicaments pour traiter une tension artérielle élevée (antihypertenseurs).

• Vous avez déjà eu des malaises alors que vous urinez ou après avoir uriné (syncope mictionnelle).

• Vous avez une maladie des reins (insuffisance rénale chronique).

• Vous avez plus de 65 ans.

• Vous avez des maladies du cœur (patient coronarien). En cas d'aggravation d'un angor, le traitement par ce médicament devra être interrompu.

Pendant le traitement, si vous avez des gonflements (œdèmes) du visage, des lèvres et de certaines parties de votre corps (les muqueuses), cela peut être le signe d'une réaction allergique au médicament. Dans ce cas, vous devez arrêter le traitement et consulter immédiatement votre médecin.

Des malaises peuvent survenir rarement avec UMAX® 400 ug LP Gélule et des médicaments apparentés. Aux premiers signes de vertiges ou de faiblesse, vous devez vous asseoir ou vous allonger jusqu'à ce que les sensations de malaise disparaissent.

Si vous devez vous faire opérer de la cataracte ou du glaucome

Si vous devez vous faire opérer prochainement de la cataracte (opacité du cristallin) ou du glaucome, et si vous avez été ou êtes actuellement ou prévoyez d'être traité par UMAX® 400 ug LP Gélule, informez-en votre ophtalmologiste avant l'opération.

Le chirurgien pourra prendre des précautions appropriées en fonction de votre traitement au moment de l'intervention chirurgicale.

Recommandations concernant votre hygiène de vie

Durant le traitement vous devez respecter certaines mesures d'hygiène de vie et notamment :

• conservez une activité physique (marcher, courir).

• faites attention à votre alimentation : ne pas faire d'alcoolisés.

• ne buvez pas trop le soir.

• maintenez un transit intestinal régulier.

Enfants

Ne donnez pas ce médicament à des enfants ou pas d'effet thérapeutique dans cette population.

Mentions relatives aux excipients à effet notable

• Saccharose : L'utilisation de ce médicament est intolerance au fructose, un syndrome de malabsorption en sucre/ isomaltase (maladies héréditaires rares).

• Colorants azoïques (azurine, carmine) et des agents colorants azoïques et peut provoquer :

• Hydroxybenzoate de méthyle et de propyle : Ce effet peut provoquer des réactions allergiques.

Autres médicaments et UMAX® 400 ug LP Gélule

Ce médicament DOIT ETRE EVITE en association thérapeutique (alpha1-bloquants). Cette association artérielle.

Informez votre médecin ou à votre pharmacien pourriez prendre tout autre médicament, même ordonnance.

Il est important d'informer votre médecin si vous prenez des médicaments qui peuvent diminuer l'élimination ketoconazole, erythromycine).

UMAX® 400 ug LP Gélule avec des aliments et Sans objet.

Grossesse, allaitement et fertilité

UMAX® 400 ug LP Gélule n'est pas indiqué chez cours de la grossesse et son passage dans le lait.

Chez l'homme, une éjaculation anormale a été rapportée. Cela signifie que le sperme ne sort pas par l'urètre (rétrécie) ou bien le volume d'éjaculation est diminué. Ce phénomène est sans gravité.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Conduite de véhicules et utilisation de machin

Ce médicament peut provoquer une baisse de la tension artérielle, des vertiges ou des malaises, notamment en déconseillé de conduire un véhicule ou d'utiliser effets.

3. COMMENT PRENDRE UMAX® 400 ug LP Gélule

Buvez à toujours prendre ce médicament en suivre ou les indications de votre médecin ou votre pharmacien en cas de doute.

Posologie

La dose recommandée est de 1 gélule par jour.

Mode d'administration

Le médicament est à utiliser par voie orale. La gélule est croquée ni machée.

Fréquence d'administration

• Vous devez prendre votre dose quotidienne en déjeuner. Si le matin, vous ne prenez pas de petit déjeuner d'un autre repas.

• Vous devez prendre votre gélule chaque jour au petit déjeuner.

• Au cas où vous auriez oublié de prendre la gélule, repas de la journée.

Durée du traitement

Ce traitement nécessite une surveillance médical poursuivre plusieurs mois.

Habituellement, UMAX® 400 ug LP Gélule est prescrit et les réactions sont maintenues pendant 12 mois.

Si vous avez pris plus de UMAX® 400 ug LP Gélule.

Contactez rapidement un médecin et allongez-vous.

Si vous oubliez de prendre UMAX® 400 ug LP Gélule.

Si vous avez oublié 1 jour de traitement, ne prenez pas de double dose pour compenser la dose oubliée.

Si vous arrêtez de prendre UMAX® 400 ug LP Gélule.

Si vous arrêtez de prendre votre traitement de façon

hypertrophie bénigne de la prostate peuvent réapparaître.

C'est pourquoi il est impératif de poursuivre votre traitement.

Recommandations concernant votre hygiène de vie

Durant le traitement vous devez respecter certaines mesures d'hygiène de vie et notamment :

أو ملحوظ

LOT 221421
EXP 04/2024
PPV 121.40DH

الاصلية

لечение اعتماد عدسة العين او الجلووكوما
أدواء جرعة العين (العاج) اعتماد عدسة العين او الجلووكوما، فقد تنسق قذف العين
الدروز من العين، من التصريح بهذا الدواء امرا ضروري وبالخط القلب، انتظار انتشار

عدهم العين او الجلووكوما في القسم 2،
يتم بشارة بذلك بعد التصريح بهذا الدواء امرا ضروري وبالخط القلب، انتظار انتشار

عدهم العين او الجلووكوما في القسم 2،
الصريح العين او مع النفيات المترتبة.

من الآية لا ينادي إلها بهذه النفيات سوف تساهم في حماية البيئة

مكتوب بمقدمة

400 مكروه، هيدروكسي بروبيل سيليلسليلوز 15، إلكل هنفي، بروبيل بروبيل جيلوكول، بولي

CPS، الشست المالي بروبيل سيليلسليلوز 15، إلبيت سترات،

301DS، بيكروز (دواء السكر)، أصصبة أزوية (اوروجين، كاربوزين، وأصصبة بروتغافيل، FCF).

جودة، مختبر، الدار البيضاء،

Professeur BENNANI Saâd

Chirurgien Urologue

Membre de l'European Association of Urology
et de l'Association Française d'Urologie

الدكتور بناني سعد

أستاذ جامعي

جراحة المصالك البولية والتناسلية

عضو الجمعية الأوروبية والفرنسية
لجراحة المصالك البولية والتناسلية



Casablanca, le : 06-2-2023

Mr AMR Tahar

49,60 x 2

① D-Cure forte

ampoule tous les 15 jours.

pendant 3 mois.

99,20

PHARMACIE ROUTIERE
Dr. Noura EL MDAOUI
Bd. Mohammed VI Km 9,5 (Route de Medina)
N°3, Casablanca. Tél: 05 22 91 01 50

Professeur BENNANI Saâd
Chirurgien Urologue
42, Bd. Abdelmoumen - Casablanca
Tél: 0522 23 10 73 / 0522 23 10 73

42، شارع عبد المؤمن - إقامة وليلي - الطابق الخامس - الدار البيضاء

42, Boulevard Abdelmoumen -Résidence Walili - 5^{ème} étage - Casablanca

Tél.: 05 22 23 10 23 - Fax : 05 22 23 10 73 - GSM : 06 61 16 65 16

Professeur BENNANI Saâd

Chirurgien Urologue

Membre de l'European Association of Urology
et de l'Association Française d'Urologie



الدكتور بناني سعد

أستاذ جامعي

جراح المسالك البولية والتناسلية

عضو الجمعية الأوروبية والفرنسية

لجراحة المسالك البولية والتناسلية

06 FEV. 2023

Casablanca, le :

Mr AMR Tahar

Faire :

Echographie rénale
et vésico - prostataque

(prostatisme)

Professeur BENNANI Saâd
Chirurgien Urologue
42, Bd. Abdelmoumen - Casablanca
Tél: 0522 23 10 23 / 0522 23 10 73

42، شارع عبد المؤمن - إقامة وليلي - الطابق الخامس - الدار البيضاء

42, Boulevard Abdelmoumen -Résidence Walili - 5^{ème} étage - Casablanca

Tél.: 05 22 23 10 23 - Fax : 05 22 23 10 73 - GSM : 06 61 16 65 16

Professeur BENNANI Saâd

Chirurgien Urologue

Membre de l'European Association of Urology
et de l'Association Française d'Urologie



الدكتور بناني سعد

أستاذ جامعي

جراح المسالك البولية والتناسلية

عضو الجمعية الأوروبية والفرنسية
لجراح المسالك البولية والتناسلية

Casablanca, le : 06/02/2023

COMPTE RENDU DE Mr AMR TAHAR ECHOGRAPHIE RENALE ET VESICO PROSTATIQUE

Les deux reins sont de taille normale, de contours réguliers et d'échostructure homogène, présentant une bonne différenciation cortico-médullaire.
Absence de dilatation des cavités pyélocalicielles.

Au niveau pelvien, la vessie est à paroi hypertrophiée, à plage homogène.

La prostate est augmentée de taille (46cc), ses contours sont réguliers et son échostructure est homogène
Résidu post-mictionnel minime (2,9cc).

AU TOTAL

Vessie de lutte, avec résidu post-mictionnel minime, sur hypertrophie prostatique homogène.

Pr. BENNANI
Professeur BENNANI Saâd
Chirurgien Urologue
42, Bd. Abdelmoumen - Casablanca
Tél: 0522 23 10 23 / 0522 23 10 73

42، شارع عبد المؤمن - إقامة وليلي - الطابق الخامس - الدار البيضاء

42, Boulevard Abdelmoumen -Résidence Walili - 5^{ème} étage - Casablanca

Tél.: 05 22 23 10 23 - Fax : 05 22 23 10 73 - GSM : 06 61 16 65 16

Professeur BENNANI Saâd

Chirurgien Urologue

Membre de l'European Association of Urology
et de l'Association Française d'Urologie



الدكتور بناني سعد

أستاذ جامعي

جراحة المسالك البولية والتناسلية

عضو الجمعية الأوروبية والفرنسية
لجراحة المسالك البولية والتناسلية

Casablanca, le : 06/02/2023

FACTURE N°950/02/2023

NOM ET PRENOM : AMR TAHAR

- Consultation : 300DH

- Echographie Rénale : 500DH
Et vésico prostatique

MONTANT GLOBAL : 800 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de :

Huit cent dirhams

Professeur BENNANI Saâd
Chirurgien Urologue
43, Bd. Abdelmoumen - Casablanca
Tél: 0522 23 10 23 / 0522 23 10 73

42, شارع عبد المومن - إقامة وليلي - الطابق الخامس - الدار البيضاء

42, Boulevard Abdelmoumen -Résidence Walili - 5^{ème} étage - Casablanca

Tél.: 05 22 23 10 23 - Fax : 05 22 23 10 73 - GSM : 06 61 16 65 16



