

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- 0 Réclamation : contact@mupras.com
- 0 Prise en charge : pec@mupras.com
- 0 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



MUPRAS

Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

N° W19-421555

151223

☐ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 11349 Société : RAM

☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre

Nom & Prénom : SARGER Mohamed

Date de naissance : 24/03/1973

Adresse : 12 RUE KARAWAN BELLE VUE

Tél. : 0620 717133 Total des frais engagés : 491,70 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 13/01/2023

Nom et prénom du malade : ESSAÏH Touia Age :

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☒ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : BE RRECH Le : 13/01/2023

Signature de l'adhérent(e) :


VOLET ADHERENT

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
13/04/23		CS	* 150 #	Dr. O. J. A. S. M. Diabétiologue Médical Generaliste RDC Quartier Layane Berre Tél : 05 22 03 07 72

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
13.01.23	13/01/23	240,00
13.01.23	13/01/23	101,90

[illegible][illegible]

* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.



	H	
	25533412	21433552
	00000000	00000000
D		G
	00000000	00000000
	35533411	11433553
	B	

(Création, remont, adjonction)
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

DIABETOLOGUE
NUTRITIONNISTE
GYNECOLOGIE, SUIVI DE GROSSESSE
ECHOGRAPHIE
ELECTROCARDIOGRAMME

الدكتورة سهام أوبهيا
الطب العام
خريجة كلية الطب والصيدلة
بالدار البيضاء

دبلوم جامعي في مرض السكري، كلية الطب و الصيدلة بالدار البيضاء
أخصائية التغذية
أمراض النساء و تتبع الحمل
الفحص بالصدى
التخطيط الكهربائي للقلب

Ordonnance

Berrechid, le 13/10/23

Nom.prénom: ESSAÏH Jendria

53,00

1 - boktoni gel bouc

48,70

2 - vitmag 86

101,70

app x2/ horla
bouc
le sou

Dr. OUBOUHIA Siham
Médecin Généraliste
Diabétologue
Quartier Layali - Berrechid
Tél : 05 22 03 07 72

RDV:

58 ، الطابق السفلي ، حي ليالي 2 (قرب مدرسة المذاهب) - برشيد

N°58-Rez de chaussée quartier Layali2 - Berrechid

FIXE | 05.22.03.07.72


E-mail | sihamoubouhia@gmail.com

UVIMAG B6

20 Ampoules de 10 ml



6 118000 020455



90 Bd. Ch...
Bette ind...
05 42 53 42

48,70

Daktarin® 2 %, gel buccal

Miconazole

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Maphar
Bd Alkimia N° 6, Ql,
Sidi Bernoussi, Casablanca
Daktarin gel buccal t40g
P.P.V : 53,00 DH



...notice. Vous pourriez avoir
...autres questions, interrogez
...votre pharmacien.
...vous a été personnellement
...ne donnez pas à d'autres
personnes. Il pourrait leur être nocif, même si
les signes de leur maladie sont identiques
aux vôtres.


- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que DAKTARIN 2 %, gel buccal et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre DAKTARIN 2 %, gel buccal ?
3. Comment prendre DAKTARIN 2 %, gel buccal ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver DAKTARIN 2 %, gel buccal ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE DAKTARIN 2 %, GEL BUCCAL ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : code ATC



Nourrissons :

remplir la cavité de mesure de **1,25 mL** jusqu'au bord supérieur.


Enfants :

remplir la cavité de mesure de **2,5 mL** jusqu'au bord supérieur.

Adultes :

remplir **deux fois** la cavité de mesure de **2,5 mL** jusqu'au bord supérieur pour obtenir la dose de **5 mL**.

• Etape 5 : Prélever de petites portions de gel



Prélevez une **petite portion** du gel de la cavité de mesure.

Le dispositif de mesure **ne doit pas** être placé dans la bouche pour appliquer le gel.

• Etape 6 : Appliquer le gel

⚠ En raison du risque de suffocation chez les nourrissons (âgés de 4 à 24 mois)

- Le gel ne doit **pas** être appliqué au fond de la gorge.
- Le gel doit être appliqué avec précaution en **petites portions** afin de ne pas obstruer la gorge.

DOCTEUR SIHAM OUBOUHIA
MEDECINE GENERALE
LAUREATE DE LA FACULTE DE MEDECINE
ET DE PHARMACIE DE CASABLANCA

DIABETOLOGUE
NUTRITIONNISTE
GYNECOLOGIE, SUIVI DE GROSSESSE
ECHOGRAPHIE
ELECTROCARDIOGRAMME

المدكتورة سهام أوبهيا
الطب العام
خريجة كلية الطب والصيدلة
بالدار البيضاء

دبلوم جامعي في مرض السكري، كلية الطب و الصيدلة بالدار البيضاء
أخصائية التغذية
أمراض النساء و تتبع الحمل
الفحص بالصدى
التخطيط الكهربائي للقلب

Ordonnance

Berrechid , le 12/10/123

Nom.prénom: Essor H. Tardieu

120,00

120 + 91,00

ON Call plus



240,00

Dr. OUBOUHIA Siham
Médecin Généraliste
Diabétologue
RDC Quartier Layali - Berrechid
Tel : 05 22 03 07 72



RDV:

58 ، الطابق السفلي ، حي ليالي 2 (قرب مدرسة المذاهب) - برشيد

N°58-Rez de chaussée quartier Layali2 - Berrechid

FIXE | 05.22.03.07.72

E-mail | sihamoubouhia@gmail.com

120100

On-Call Plus

Blood Glucose Test Strips Package Insert

REF G133-111,	REF G133-112,	REF G133-114	English
REF G133-118,	REF G133-119,	REF G133-211	

PRINCIPLE AND INTENDED USE

The *On-Call Plus* Blood Glucose Test Strips are thin strips with a chemical reagent system. They work with the *On-Call Plus* or *On-Call EZ II* Blood Glucose Meters to measure the glucose concentration in whole blood. Blood is applied to the end tip of the test strip, then automatically absorbed into the reaction cell where the reaction takes place. A transient electrical current is formed during the reaction and the blood glucose concentration is calculated based on the electrical current detected by the meter, then the result is shown on the meter display. The meters are calibrated to display plasma-like concentration results.

For *in vitro* diagnostic use. Test strips are to be used only outside the body for testing purposes. For self-testing and professional use. *On-Call Plus* Test Strips are used by people with diabetes at home and by healthcare professionals for the quantitative measurement of glucose in capillary whole blood from the finger, forearm, and palm.

COMPOSITION

Each test strip contains the following reactive chemicals: Glucose oxidase < 25 IU, Mediator < 300 µg. Each test strip vial contains a drying agent.

STORAGE AND HANDLING

- Test strips should be stored in their protective vial. The vial's cap must be tightly closed. This is to keep the test strips in good working condition.
- Store test strips in a cool, dry place at room temperature, 2-35°C (36-95°F). Store them away from heat and direct sunlight.
- Do not freeze or refrigerate.
- To ensure accurate results, use the test strips at room temperature.
- Do not store the test strips outside their protective vial. Test strips must be stored in the original vial with the cap tightly closed.
- Do not store or use the test strips in a humid place such as a bathroom.
- Do not store the meter, the test strips or control solution near bleach or cleaners that contain bleach.
- Do not transfer the test strips to a new vial or any other container.
- Replace the vial cap immediately after removing a test strip.
- Use the test strip immediately after removing it from the vial.
- Do not use your test strips past the unopened expiration date printed on the vial. Using test strips past the expiration date may produce incorrect test results.
- **Note:** All expiration dates are printed in Year-Month-Date format.
- Use a new vial of test strips for only 6 months after opening. The opened vial expiration date is 6 months after the vial was first opened. Write the opened vial expiration date on the vial label after you open it.

RANGE OF EXPECTED BLOOD GLUCOSE LEVELS FOR PEOPLE WITH DIABETES

Blood glucose monitoring requires the help of your own range of expected blood glucose values to give meaning to your blood glucose results. Expected blood glucose levels for people with diabetes are:

Time	Range
Fasting and Before Meals	70-130 mg/dL
2 Hours After Meal	< 180 mg/dL

CHECKING YOUR QUALITY CONTROL TEST RESULTS

Your blood glucose meter must be handled according to the instructions for meter care. The quality control test strips are working together properly. Follow the quality control test. Three ranges CTRL 0, CTRL 1, and CTRL 2 are on the vial label. Control Solution 1 is sufficient for most people or strips may not be working correctly, you may want to contact your dealer for information on purchasing Control Solution 1. For confirmation of results, Control Solution 1 tests should fall within the CTRL 1 range within the CTRL 2 range. When testing with Control Solution 1, the results to the CTRL 1 range on the vial label. CAUTION: If your quality control test results are outside the CTRL 1 range, DO NOT use the system to test your blood glucose. If you cannot correct the problem, contact your dealer.

LIMITATIONS

- The *On-Call Plus* and *On-Call EZ II* meters are not to be used for testing neonates.
- The *On-Call Plus* and *On-Call EZ II* Blood Glucose Meters have been tested and proven to work together for blood glucose measurements. Do not use components from other meters.
- Use only with whole blood. Do not use with plasma or serum.
- Do not use for testing neonates.
- Very high (above 60%) and very low (below 40%) blood glucose levels may affect the accuracy of the results. Talk to your healthcare professional to find out if your blood glucose levels are within the normal range.
- Abnormally high levels of vitamin C and other substances may affect blood glucose measurements.
- The system is tested to accurately read blood glucose levels in the range of 1.1-33.3 mmol/L (20 - 600 mg/dL).
- Fatty substances (triglycerides) up to 3.0 mmol/L may have a major effect on blood glucose test results.
- The *On-Call Plus* and *On-Call EZ II* Blood Glucose Meters are shown to work properly up to 10,000 mg/dL.
- Severely ill persons should not run the glucose monitoring system.
- Blood samples from patients in shock or with severe hypotension should not be used.

120100

On-Call Plus

Blood Glucose Test Strips Package Insert

REF G133-111,	REF G133-112,	REF G133-114	English
REF G133-118,	REF G133-119,	REF G133-211	

PRINCIPLE AND INTENDED USE

The *On-Call Plus* Blood Glucose Test Strips are thin strips with a chemical reagent system. They work with the *On-Call Plus* or *On-Call EZ II* Blood Glucose Meters to measure the glucose concentration in whole blood. Blood is applied to the end tip of the test strip, then automatically absorbed into the reaction cell where the reaction takes place. A transient electrical current is formed during the reaction and the blood glucose concentration is calculated based on the electrical current detected by the meter, then the result is shown on the meter display. The meters are calibrated to display plasma-like concentration results.

For *in vitro* diagnostic use. Test strips are to be used only outside the body for testing purposes. For self-testing and professional use. *On-Call Plus* Test Strips are used by people with diabetes at home and by healthcare professionals for the quantitative measurement of glucose in capillary whole blood from the finger, forearm, and palm.

COMPOSITION

Each test strip contains the following reactive chemicals: Glucose oxidase < 25 IU, Mediator < 300 µg. Each test strip vial contains a drying agent.

STORAGE AND HANDLING

- Test strips should be stored in their protective vial. The vial's cap must be tightly closed. This is to keep the test strips in good working condition.
- Store test strips in a cool, dry place at room temperature, 2-35°C (36-95°F). Store them away from heat and direct sunlight.
- Do not freeze or refrigerate.
- To ensure accurate results, use the test strips at room temperature.
- Do not store the test strips outside their protective vial. Test strips must be stored in the original vial with the cap tightly closed.
- Do not store or use the test strips in a humid place such as a bathroom.
- Do not store the meter, the test strips or control solution near bleach or cleaners that contain bleach.
- Do not transfer the test strips to a new vial or any other container.
- Replace the vial cap immediately after removing a test strip.
- Use the test strip immediately after removing it from the vial.
- Do not use your test strips past the unopened expiration date printed on the vial. Using test strips past the expiration date may produce incorrect test results.
- **Note:** All expiration dates are printed in Year-Month-Date format.
- Use a new vial of test strips for only 6 months after opening. The opened vial expiration date is 6 months after the vial was first opened. Write the opened vial expiration date on the vial label after you open it.

RANGE OF EXPECTED BLOOD GLUCOSE LEVELS FOR PEOPLE WITH DIABETES

Blood glucose monitoring requires the help of your own range of expected blood glucose values to give meaning to your blood glucose results. Expected blood glucose levels for people with diabetes are:

Time	Range
Fasting and Before Meals	70 - 130 mg/dL
2 Hours After Meal	Less than 200 mg/dL

CHECKING YOUR QUALITY CONTROL TEST RESULTS

Your blood glucose meter must be handled according to the instructions for meter care. The quality control test strips are working together properly. Follow the quality control test. Three ranges CTRL 0, CTRL 1, and CTRL 2 are on the vial label. Control Solution 1 is sufficient for most people or strips may not be working correctly, you may want to contact your dealer for information on purchasing Control Solution 1. For confirmation of results, Control Solution 1 tests should fall within the CTRL 1 range within the CTRL 2 range. When testing with Control Solution 1, the results to the CTRL 1 range on the vial label. CAUTION: If your quality control test results are outside the CTRL 1 range, DO NOT use the system to test your blood glucose. If you cannot correct the problem, contact your dealer.

LIMITATIONS

- The *On-Call Plus* and *On-Call EZ II* meters are not to be used for testing neonates.
- The *On-Call Plus* and *On-Call EZ II* Blood Glucose Meters have been tested and proven to work together for blood glucose measurements. Do not use components from other meters.
- Use only with whole blood. Do not use with plasma or serum.
- Do not use for testing neonates.
- Very high (above 60%) and very low (below 40%) blood glucose levels may affect the results. Talk to your healthcare professional to find out if your blood glucose levels are within the normal range.
- Abnormally high levels of vitamin C and other substances may affect blood glucose measurements.
- The system is tested to accurately read blood glucose levels in the range of 1.1-33.3 mmol/L (20 - 600 mg/dL).
- Fatty substances (triglycerides) up to 3.0 mmol/L may have a major effect on blood glucose test results.
- The *On-Call Plus* and *On-Call EZ II* Blood Glucose Meters are shown to work properly up to 10,000 mg/dL.
- Severely ill persons should not run the glucose monitoring system.
- Blood samples from patients in shock or with severe hypotension should not be used.