

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

N° W21-782534

AS1704

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 2503

Société : RAM

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

NABIL RACHIDA

Date de naissance :

01.07.54

Adresse : OULEFA ATADA HOUANE Rue 4 N° 9 CASA

Tél. :

Total des frais engagés :

Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

DR. ZIDI Mohamed
CLINIQUE NOUR D'OPHTALMOLOGIE
28, Angle Rue des Palmiers et Route
des Facultés Oasis - Casablanca
Tél : 05 22 23 49 89 LG / Fax : 05 22 23 49 87

Date de consultation :

NABIL RACHIDA

Age:


Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :



En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent(e) :

Le :



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
11.01.23	CS + CZ		gratuit	INP : 091141712

HARMACIE D'ANDIA
Saida KHALLAD
Docteur en Pharmacie
55, 1^{er} étage, Rue 33 El Wad
Casablanca - Tél.: 622.9342

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Formisseur	Date	Montant de la Facture
MACIE DAVIDI Itaa KHALLAD Sur en Pharmacie 11 Rue 13 El Wissa - Téle: 622.99.11	14/01/23	773.20

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Mohamed ZIDI

Ophthalmologiste

Spécialiste des Maladies et de la Chirurgie des yeux

CHIRURGIE VITRÉO-RETINIENNE

Diplômé des Universités de Médecine de Paris

Ancien Interne du CHNO des Quinze-Vingts

Ancien Assistant Spécialiste des Hôpitaux de Paris

Membre de la Société Européenne de Rétine

OCT - Angiographie (Fluo / ICG) - Laser - Echographie



الدكتور محمد الزيدي

اختصاصي في أمراض و جراحة العيون

جراحة الشبكية

خريج جامعات الطب بباريس

جراح سابق بمستشفيات باريس

عضو الجمعية الأوروبية للشبكية

تصوير الشبكية - الليزر - الفحص بالصدى

CNO

11 janvier 2023

Mme NABIL Rachida

H30

A instiller dans l'œil opéré : droit

Cloprame sirop, Une cuillère à soupe 30 min avant la prise des médicaments et avant les repas pendant 5 jours

- Sepcen 500mg comprimé : Un comprimé la veille de l'intervention le soir avec une gorgée d'eau puis 1 comprimé 2 fois par jour pendant 5 jours

- Tobradex collyre : Une goutte 4 fois par jour pendant 1 mois

3

- Ciloxan collyre : Une goutte 4 fois par jour pendant 15 jours

2

- Mydriaticum collyre : à instiller le jour de l'intervention à partir de 6h , Une goutte chaque 5 min puis Une goutte 3 fois par jour pendant 15 jours

1

- Aqualarm intensive collyre : Une goutte 4 fois par jour pendant 1 mois

146.00 x 2 = 292.00 + 145.00

S.V.

S.V.

S.V.

- Frakidex pommade: Une application le soir pendant 5 jours

- PHYLARM (sérum physiologique unidose) : Un lavage avant chaque instillation de goutte

+Compresses stériles

+ Rondelles oculaires stérifil

> Attention! Ne pas manger ni boire ni fumer pendant le jour de l'intervention

> Prendre un bain la veille de l'intervention

RENDEZ VOUS de l'intervention le = 11/ 01 / 2023 à 7 heure à clinique NOUR D'ophtalmologie de Casablanca

En cas d'urgence (douleur, baisse de la vue ou rougeur...), veuillez contacter :

> 7h-19h : 0522234989

>19h-7h : 0616160864 ou 0623247489

723.20

DR. ZIDI Mohamed
CLINIQUE NOUR D'OPHTALMOLOGIE
28, Angle Rue des Palmiers et Route
des Facultés Osis - Casablanca
Tél : 05 22 23 49 89 - Fax : 05 22 23 49 87





voie ophthalmique
EN INSTILLATION OCULAIRE

COMPOSITION :

1 ml de collyre contient 3,5 mg Chlormhydrate de Ciprofloxacine (3 mg de ciprofloxacine-base)

Excipient à effet notoire :

Chlorure de benzalkonium.

Lire attentivement la notice avant emploi.

A conserver à une température ambiante (15°-25°C), à l'abri de la lumière et de la chaleur.

TENIR HORS DE LA PORTEE ET DE LA VUE DES ENFANTS.

Ne pas mettre au réfrigérateur.

Ne pas congeler.

Ne pas utiliser au delà de 30 jours après la première ouverture du flacon.

Surveiller l'apparition d'un érythème (rougeur) ou d'une irritation dans les 24 heures suivant l'utilisation.

Si ce symptôme persiste ou s'aggrave, consulter un ophtalmologiste.

Si ce symptôme persiste ou s'aggrave, consulter un ophtalmologiste.

Si ce symptôme persiste ou s'aggrave, consulter un ophtalmologiste.

Si ce symptôme persiste ou s'aggrave, consulter un ophtalmologiste.

Si ce symptôme persiste ou s'aggrave, consulter un ophtalmologiste.

Si ce symptôme persiste ou s'aggrave, consulter un ophtalmologiste.

Si ce symptôme persiste ou s'aggrave, consulter un ophtalmologiste.

NE PAS AUBLER
RESPECTER LES MÊMES PRÉSÉNTATIONS

لابليغ

يجب احترام الجرعة الموصوفة

Tableau A (Liste I) - UNIQUEMENT SUR ORDONNANCE
جدول أ (الائحة ١): يصرف فقط
بوجوب وصفة طبية

Soyez prudent
Ne pas conduire
sans avoir lu la
notice



كن حذرا لا تقد السيارة دون قراءة
النشرة

صاحب رخصة التسويق بالتجزء
Titulaire d'AMM au Maroc:
Laboratoires SOTHEMA

B.P N°1 - 27182
Bouskoura-Maroc

المصنف:
Alcon-Couleur N. V.
Rijksweg 14, B2870-Puurs, Belgique

Alcon Cusi, S.A
Cami Fabra 56, 08320 El Masnou,
Espagne

6 118001070176

CILOXAN 0,3% Collyre, flacon de 5 ml

A.M.M. N° 151 DMP/21/NRQ

Laboratoires Sothema

Remboursable AMO

PPV : 45,90 DHS

406434

عن طريق العين. للتقطير في العين
التركيبة
يحتوي على: مل من سيلوكسان
العين عن: سيلوكسان
هيدروكloride (المادة الفعالة)، 3,5 مل (عـ
=) مل من سيلوكسان
سوان ذات ثانوية معروفة
كتوريد البراز (كونتيم).

يجب قراءة النشرة قبل استعمال الرواء
25-15 معتمدة بحدة حرارة معتدلة
بسخن في درجة حرارة معتدلة
درجة مئوية بعيدا عن الضوء والحرارة
وحفظه في الثلاجة.

برهانه بعدها عن الضوء والحرارة
وحفظه في الثلاجة ولا يبعد
لا يستخدم بعد مرور 30 يوم على اليوم
الذي قدم فيه بفتح القنة لأول مرة.

سيلوكسان
سيبروفلوكساسين

5 ml

5


NOVARTIS

BAUSCH + LOMB

Aqualarm® Intensive UD

Acide hyaluronique à 0,2%

ZENITH Pharma
PPC : 145,00 DH



Unidoses



30 x 0,5 ml de solution ophthalmique
en unidoses

Sans conservateur


- Procure un soulagement immédiat et durable aux yeux secs, fatigués et irrités
- Lubrifie les lentilles de contact souples et dures
- Améliore la tolérance et le confort des porteurs de lentilles de contact

BAUSCH + LOMB

Aqualarm® Intensive UD

Acide hyaluronique à 0,2%

ZENITH Pharma
PPC : 145,00 DH



Unidoses



30 x 0,5 ml de solution ophthalmique
en unidoses

Sans conservateur


- Procure un soulagement immédiat et durable aux yeux secs, fatigués et irrités
- Lubrifie les lentilles de contact souples et dures
- Améliore la tolérance et le confort des porteurs de lentilles de contact

BAUSCH + LOMB

Aqualarm® Intensive UD

Acide hyaluronique à 0,2%

ZENITH Pharma
PPC : 145,00 DH



Unidoses



30 x 0,5 ml de solution ophthalmique
en unidoses

Sans conservateur

- Procure un soulagement immédiat et durable aux yeux secs, fatigués et irrités
- Lubrifie les lentilles de contact souples et dures
- Améliore la tolérance et le confort des porteurs de lentilles de contact

SEPCEN[®] 5

ciprofloxacin

IBERMA

Voie orale

Ne pas dépasser

Boîte de 10

0 0 0
0 2 0
0 2 0
0 2 0
0 2 0
0 2 0
0 2 0
0 2 0
0 2 0
0 2 0

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Dénomination du médicament :

CILOXAN® 0,3 % Collyre
Ciprofloxacin

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez d'autres questions, si vous

d'informations à votre médecin, ou à vo

Ce médicament vous a été personnellement

quelqu'un d'autre, même en cas de syn

nocif, même si les signes de leur maladie

Si l'un des effets indésirables devient gr

indésirable non mentionné dans cette no

otre pharmacien.



6 118001 070176

CILOXAN 0,3% Collyre, flacon de 5 ml

A.M.M. N° 151 DMP/21/NRQ

Laboratoires Sothema

PPV : 45,90 DHS

Remboursable AMO

406434

à
ui être

ju à

Que contient cette notice :

- Qu'est-ce que **CILOXAN collyre** et dans quel cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser **CILOXAN collyre** ?
- Comment utiliser **CILOXAN collyre** ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver **CILOXAN collyre** ?
- Informations supplémentaires.

1 QU'EST-CE QUE CILOXAN collyre ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Le collyre Ciloxan contient le principe actif ciprofloxacin (un antibiotique) qui agit contre de nombreuses bactéries qui peuvent provoquer des infections oculaires. Ciloxan collyre est destiné

au traitement des conjonctivites, des blépharites ainsi que des ulcères cornéens d'origine bactérienne et s'utilise uniquement sur ordonnance médicale

2 QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE OU D'UTILISER CILOXAN collyre**Contre-indications :**

Ne pas utiliser CILOXAN 0,3 %, collyre

pharmacien si vous souffrez d'autres maladies, êtes allergique ou prenez déjà des médicaments (même en

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Dénomination du médicament :

CILOXAN® 0,3 % Collyre
Ciprofloxacin

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez d'autres questions, si vous

d'informations à votre médecin, ou à vo

Ce médicament vous a été personnellement

quelqu'un d'autre, même en cas de syn

nocif, même si les signes de leur maladie

Si l'un des effets indésirables devient gr

indésirable non mentionné dans cette no

otre pharmacien.



6 118001 070176

CILOXAN 0,3% Collyre, flacon de 5 ml

A.M.M. N° 151 DMP/21/NRQ

Laboratoires Sothema

PPV : 45,90 DHS

Remboursable AMO

406434

à
ui être

ju à

Que contient cette notice :

- Qu'est-ce que **CILOXAN collyre** et dans quel cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser **CILOXAN collyre** ?
- Comment utiliser **CILOXAN collyre** ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver **CILOXAN collyre** ?
- Informations supplémentaires.

1 QU'EST-CE QUE CILOXAN collyre ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Le collyre Ciloxan contient le principe actif ciprofloxacin (un antibiotique) qui agit contre de nombreuses bactéries qui peuvent provoquer des infections oculaires. Ciloxan collyre est destiné

au traitement des conjonctivites, des blépharites ainsi que des ulcères cornéens d'origine bactérienne et s'utilise uniquement sur ordonnance médicale

2 QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE OU D'UTILISER CILOXAN collyre**Contre-indications :**

Ne pas utiliser CILOXAN 0,3 %, collyre

pharmacien si vous souffrez d'autres maladies, êtes allergique ou prenez déjà des médicaments (même en

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Dénomination du médicament :

CILOXAN® 0,3 % Collyre
Ciprofloxacin

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez d'autres questions, si vous

d'informations à votre médecin, ou à vo

Ce médicament vous a été personnellement

quelqu'un d'autre, même en cas de syn

nocif, même si les signes de leur maladie

Si l'un des effets indésirables devient gr

indésirable non mentionné dans cette no

otre pharmacien.



6 118001 070176

CILOXAN 0,3% Collyre, flacon de 5 ml

A.M.M. N° 151 DMP/21/NRQ

Laboratoires Sothema

PPV : 45,90 DHS

Remboursable AMO

406434

à
ui être

ju à

Que contient cette notice :

- Qu'est-ce que **CILOXAN collyre** et dans quel cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser **CILOXAN collyre** ?
- Comment utiliser **CILOXAN collyre** ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver **CILOXAN collyre** ?
- Informations supplémentaires.

1 QU'EST-CE QUE CILOXAN collyre ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Le collyre Ciloxan contient le principe actif ciprofloxacin (un antibiotique) qui agit contre de nombreuses bactéries qui peuvent provoquer des infections oculaires. Ciloxan collyre est destiné

au traitement des conjonctivites, des blépharites ainsi que des ulcères cornéens d'origine bactérienne et s'utilise uniquement sur ordonnance médicale

2 QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE OU D'UTILISER CILOXAN collyre**Contre-indications :**

Ne pas utiliser CILOXAN 0,3 %, collyre

pharmacien si vous souffrez d'autres maladies, êtes allergique ou prenez déjà des médicaments (même en

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Dénomination du médicament :

CILOXAN® 0,3 % Collyre
Ciprofloxacin

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez d'autres questions, si vous

d'informations à votre médecin, ou à vo

Ce médicament vous a été personnellement

quelqu'un d'autre, même en cas de syn

nocif, même si les signes de leur maladie

Si l'un des effets indésirables devient gr

indésirable non mentionné dans cette no

otre pharmacien.



6 118001 070176

CILOXAN 0,3% Collyre, flacon de 5 ml

A.M.M. N° 151 DMP/21/NRQ

Laboratoires Sothema

PPV : 45,90 DHS

Remboursable AMO

406434

à
ui être

ju à

Que contient cette notice :

- Qu'est-ce que **CILOXAN collyre** et dans quel cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser **CILOXAN collyre** ?
- Comment utiliser **CILOXAN collyre** ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver **CILOXAN collyre** ?
- Informations supplémentaires.

1 QU'EST-CE QUE CILOXAN collyre ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Le collyre Ciloxan contient le principe actif ciprofloxacin (un antibiotique) qui agit contre de nombreuses bactéries qui peuvent provoquer des infections oculaires. Ciloxan collyre est destiné

au traitement des conjonctivites, des blépharites ainsi que des ulcères cornéens d'origine bactérienne et s'utilise uniquement sur ordonnance médicale

2 QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE OU D'UTILISER CILOXAN collyre**Contre-indications :**

Ne pas utiliser CILOXAN 0,3 %, collyre

pharmacien si vous souffrez d'autres maladies, êtes allergique ou prenez déjà des médicaments (même en