

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- O Réclamation : contact@mupras.com
- O Prise en charge : pec@mupras.com
- O Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

M22- 0044665 *152321*

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : *1053* Société :

Actif Pensionné(e) Autre :

Nom & Prénom : *Khitmoui, Khadija*

Date de naissance : *22/02/1948*

Adresse : *348 Bd oued our Rabii ouffa*

Tél. *0662256446* Total des frais engagés :

Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : *04/01/2023*

Nom et prénom du malade : *Khidja Khadja*

Age:

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : *HHT*

Pathologie :

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

08 MAR. 2023

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : *08 MAR. 2023* Le : */ /*

Signature de l'adhérent(e) :

[Signature]

Autorisation CNDP N° : AA-215 / 2019

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
04/01/2023	CEC6		3000hs	DR. M. BOUZOUA CARDIOLOGUE 13, Bd Ain Tadid, N°6 - Bourgogne - Casablanca Tél: 05 22 27 20 20 - Fax : 05 22 21 16

EXECUTION DES ORDONNANCES

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.


SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F ROTHESSES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE


H	
25533412	21433552
00000000	00000000
D	G
00000000	00000000
35533411	11433553

[Création, remont, adjonction]



VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE REVIS

VISA ET SACRET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EVOLUTION



CABINET DE CARDIOLOGIE ET D'EXPLORATIONS CARDIO-VASCULAIRES

Le 04/01/2023

باج (النافى)

الدكتور محمد بو زباع
أمراض القلب والشرايين

Dr. M. BOUZOUBAÂ
CARDIOLOGUE

Echocardiographie Doppler Couleur

Echo Doppler Veineux et Artériel

Holter Tensionel

Holter Rythmique

Epreuve d'Effort

Urgences Cardiologiques

50,70 x 6

1/ CARDENSIEL 2.5



1 CP / J Matin

68,80 x 3

2/ DIUREX



1 CP / J Matin

27,70 x 7

3/ CARDIO-APIRINE



1 CP / J Midi

4/ CALCINIB 5

1 CP / J Midi

97,60 x 5

5/ NOCOL 20



1 CP / J Soir

108,00 x 7

6/ RAMIPRIL WIN 10



1 CP / J Soir

Traitement de 3.... Mois

TRAITEMENT A NE PAS ARRETER JUSQU'A LA PROCHAINE VISITE.

1948,50

Dr. M. BOUZOUBAÂ
CARDIOLOGUE
13, Bd Ain Taoujتate (en face Clinique Badr)
Residence ILIAS, N°6 - Bourgogne - Casablanca
20050 Casablanca - Tél. : 05 22 27 20 20 - Fax : 05 22 27 15 15 - cardiobouzoubaa@gmail.com

13, Bd Ain Taoujتate (en face Clinique Badr)
Residence ILIAS, N°6 - Bourgogne - Casablanca
20050 Casablanca - Tél. : 05 22 27 20 20 - Fax : 05 22 27 15 15 - cardiobouzoubaa@gmail.com

CARDENSIEL®, comprimé pelliculé

6 118001 100859

Cardensiel® 2,5 mg

Comprimés pelliculés sécables B/30

PPV: 50,70 DHS

• Si l'un des effets indésirables

e

égalité de cette notice avant de prendre ce médicament.

rriez avoir besoin de la relire.

sion, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

ersonnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif. int grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

ns quel cas est-il utilisé ?
onnaire avant de prendre CARDENSIEL?éventuels ?
?**ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?**

tique

DENSIEL est le bisoprolol. Le bisoprolol appartient à la classe de médicaments appelés bêtabloquants.

en modifiant la réponse de l'organisme à certaines impulsions nerveuses, en particulier au niveau du cœur. Le bisoprolol ralentit ainsi et au cœur de pomper plus efficacement le sang dans l'ensemble du corps.

produit lorsque le muscle cardiaque est faible et incapable de pomper suffisamment de sang pour répondre aux besoins de l'organisme. traiter les patients présentant une insuffisance cardiaque chronique stable.. Ce produit est utilisé en association avec d'autres affection (tels que les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou IEC, les diurétiques et les glycosides cardiaques).

FORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CARDENSIEL ?

Ne prenez jamais CARDENSIEL en cas de :

soprolol ou à l'un des autres composants (voir rubrique 6),

sanguine périphérique (de type phénomène de Raynaud), pouvant entraîner des picotements dans les doigts et les orteils ou les faire

tumeur rare de la glande surréale,

re présence d'acide en excès dans le sang,

us présentez l'un des problèmes cardiaques suivants :

rdiaque nécessitant l'injection dans vos veines de médicaments amplifiant la force de contraction de votre cœur,

engendrant un rythme cardiaque lent ou irrégulier,

e cardiaque aigu aboutissant à une chute de la pression artérielle et une insuffisance de la circulation sanguine.

s suivantes, indiquez-le à votre médecin avant de prendre CARDENSIEL ; il/elle pourra décider des mesures de précaution (comme un traitement complémentaire ou réaliser des contrôles plus fréquents) :

ne les troubles du rythme cardiaque, ou les douleurs thoraciques sévères au repos (angor de Prinzmetal),

ulation sanguine périphérique,

s ou asthme moins sévère,

squameuse (psoriasis),

héochromocytome)

si vous devez subir :

l'en prévention du rhume des foins, par exemple) car CARDENSIEL peut augmenter les risques de réaction allergique ou

ins;

l'intervention chirurgicale, par exemple) car CARDENSIEL peut avoir des effets sur la façon dont votre organisme réagit dans une telle situation.

Si vous avez une maladie pulmonaire chronique ou l'asthme moins sévère s'il vous plaît informer votre médecin immédiatement si vous commencez à éprouver de

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Cardioaspirine 100 mg/30cps

Acide acétysalicylique

P.P.V. : 27,70 DH

Bayer S.A.



6 118001 090280

notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharma-

ent vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même si les symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Les effets indésirables deviennent grave ou si vous remarquez un effet indésirable non dans cette notice, parlez en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Cardioaspirine 100 mg/30cps

Acide acétysalicylique

P.P.V. : 27,70 DH

Bayer S.A.



6 118001 090280

CARDIOASPIRINE®

100 mg, comprimés gastro-résistants

Cardioaspirine 100 mg/30cps

Acide acétysalicylique

P.P.V. : 27,70 DH

Bayer S.A.



6 118001 090280

cardioAspirine 100 mg et dans quel cas est-il utilisé ?

Informations nécessaires à connaître avant de prendre CardioAspirine 100 mg ?

3. Comment prendre CardioAspirine 100 mg ?

Comment sont les effets indésirables éventuels ?

Comment prendre CardioAspirine 100 mg ?
Comment sont les effets indésirables éventuels ?

JE CARDIOASPIRINE 100 MG ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Tient comme principe actif l'acide acétysalicylique. Ce dernier inhibe, à doses réduites des plaquettes sanguines. Grâce à un enrobage résistant à l'acidité gastrique, le ménage l'intestin grêle. C'est pour cette raison que CardioAspirine ménage

l'effet peut être pris que selon la prescription du médecin.

Indiqué pour :

les thromboses artérielles après des opérations sur les artères coronaires (pontage et sténose des artères coronaires);

les attaques cardiaques, suite à l'apparition de signes précurseurs (accidents ischémiques

les thrombo-embolies dans les vaisseaux coronaires) suite à un

l'infarctus du myocarde aigu; les patients chez lesquels le médecin a constaté un risque

de hypertension artérielle, diabète sucré, taux de lipides plus, il faut arrêter de fumer;

l'angine de poitrine; l'infarctus du myocarde aigu;

- la prévention des thromboses artérielles après des opérations sur des vaisseaux;
- la prévention de l'aggravation d'une artériopathie oblitérante (artérite).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE CARDIOASPIRINE 100 MG ?

NOCOL®

1 comprimé pelliculé
20 mg

40 mg

97,60

stème cardiovasculaire).

chez les patients ayant des antécédents de maladie coronaire avérée, d'accident vasculaire cérébral, ou sans hyperlipidémie associée.

chez les patients diabétiques sans antécédents coronariens ni cérébro-vasculaires ayant un haut risque suivants (hypertension, âge ≥ 65 ans, créatinine élevée, tabagisme présent ou passé), avec ou

simvastatine a permis de réduire significativement la mortalité totale, le risque d'événements hémodynamiques.

Il b et III) en complément d'un régime adapté et assidu. Pour ces indications, la poursuite de la glycéridermie isolée (types I, IV et V) : la simvastatine n'est pas indiquée.

97,60

transaminases.
(cf interaction).

97,60

s de votre médecin ou de votre pharmacien.

et musculaires, augmentant avec la dose, une évaluation précise du rapport efficacité/sécurité sera notamment 80 mg.

La découverte d'une grossesse survenue sous traitement par NCOL nécessite d'interrompre le traitement (grossesse/allaitement)

à contre-indiqué en cas de galactosémie congénitale, de syndrome de malabsorption du glucose

97,60

des élévations modérées (inférieures à 3 fois la limite supérieure des valeurs normales) des transaminases avec la simvastatine. Ces élévations, survenues peu de temps après l'instauration du traitement, sont d'aucune symptomatologie clinique. L'interruption du traitement n'a pas été nécessaire. Une maladie doit conduire à l'arrêt du traitement. Il est recommandé de pratiquer des tests fonctionnels si indiqué cliniquement. Chez les patients dont la dose est augmentée à 80 mg, des tests posologique, 3 mois après l'ajustement à 80 mg, puis périodiquement ensuite (par exemple,

les transaminases augmentent ; chez ces patients, les dosages devront être répétés rapidement pour déterminer la limite supérieure de la normale et si cette patients consommant d'importantes quantités d'alcool et/ou présentant un antécédent de maladie hépatique.

97,60

types de créatine phosphokinase (CPK) d'origine musculaire sont communément observées chez les patients n'ayant pas de retentissement clinique.

Ce qui s'associe rarement à la survenue d'atteintes musculaires. Devant des signes cliniques évocateurs (ou faiblesses musculaires), un dosage de la CPK d'origine musculaire sera pratiqué. patient présentant des myalgies diffuses, une sensibilité musculaire douloureuse et/ou une élévation (jusqu'à 5 fois la normale) ; dans ces conditions, le traitement doit être arrêté.

Les inhibiteurs de l'HMG Co-A réductase sont augmentés par l'association à des médicaments qui

causent des myopathies sévères avec insuffisance rénale aiguë secondaire à la myoglobinurie ont été rapportées.

- Le traitement par inhibiteur de l'HMG Co-A réductase devra être interrompu ou arrêté en cas de survenue d'un facteur prédisposant à l'apparition d'une insuffisance rénale, secondaire à une rhabdomyolyse (infection aiguë sévère, hypotension, intervention chirurgicale majeure, traumatisme majeur, perturbations métaboliques, endocrinianes ou électrolytiques sévères, épilepsie non contrôlée).
- La simvastatine est métabolisée par l'isomére 3A4 du cytochrome P450. Le risque d'atteinte musculaire semble être augmenté lors de l'administration de simvastatine avec d'autres médicaments qui ont un effet inhibiteur puissant sur le CYP 3A4 aux doses thérapeutiques, car les taux plasmatiques de simvastatine peuvent être augmentés de façon importante dans cette situation (cf interaction).

Utilisation chez l'enfant :

La sécurité d'emploi et l'efficacité chez l'enfant n'ayant pas été établies, la simvastatine n'est pas recommandée chez l'enfant. De plus, il n'existe pas d'expérience disponible à ce jour chez des enfants souffrant d'hypercholestérolémie familiale homozygote.

Utilisation chez le sujet âgé :

En l'absence d'étude de tolérance spécifique à cet âge, l'utilisation d'une dose supérieure à 40 mg ne devrait être envisagée après 70 ans que sous une surveillance clinique et biologique étroite.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Associations contre-indiquées :

- Antiproteases (amprénavir, indinavir, neflavir, ritonavir, saquinavir) : risque majoré d'effets indésirables (dose-dépendants) à type de rhabdomyolyses (diminution du métabolisme hépatique de l'hypercholestérolémiant). Utiliser une autre statine.
- Itraconazole, kétocozaole (par extrapolation à partir de l'itraconazole) : risque majoré d'effets indésirables (dose-dépendants) à type de rhabdomyolyses par diminution du métabolisme hépatique de l'hypercholestérolémiant. Utiliser une autre statine ou interrompre le traitement hypercholestérolémiant pendant la durée du traitement par l'itraconazole (ou le kétocozaole).
- Delavirdine : risque majoré d'effets indésirables (dose-dépendants) à type de rhabdomyolyse (diminution du métabolisme hépatique de l'hypercholestérolémiant). Utiliser une autre statine.

DIUREX®

(Xipamide)

antihypertensif

Diurex® 20 comprimés

PPV 68DH80
EXP 05/2025
LOT 26073 2

Diurex® 20 comprimés

PPV 68DH80 EXP 08/2023
LOT 06085 1

Diurex® 20 comprimés

PPV 68DH80 EXP 01/2025
LOT 1D065 1

Suivant la réaction du patient, la dose peut éventuellement être diminuée à 1 comprimé par jour. Dans les cas graves, l'administration temporaire de 3-4 comprimés sous forme de dose unique matinale est recommandée.

Contre indications :

Troubles électrolytiques graves, précoma en cas de cirrhose du foie, insuffisance rénale grave. Comme avec tous les médicaments, le traitement devrait être évité au cours du premier trimestre de la grossesse.

Effets secondaires :

Dans quelques cas rares légers troubles gastro-intestinaux et légers vertiges.

Interactions : L'effet hypoglycémiant d'antidiabétiques oraux peut-être diminué. Il convient de tenir compte d'une possible potentiation de la cardio et neurotoxicité du lithium à doses élevées. Les glucocorticoïdes sont susceptibles d'augmenter l'excrétion de potassium. Une déplétion potassique potentialise l'effet des glucosides cardio toniques.

L'activité antihypertensive est augmentée lors de l'association avec d'autres anti-hypertenseurs.

Remarques spéciales :

Une baisse du taux de potassium peut se manifester au cours d'un traitement à long terme avec le Diurex tout comme dans le cas diurétiques. Pour cette raison un régime riche en potassium (fruits secs, bananes, pommes de terre légumes) ou une substitution de potassium peut s'avérer nécessaire pour compenser ces pertes chez les patients atteints d'oedèmes cardiaques, hépatiques ou rénales. En cas de diabète mellitus ou de prédisposition à la goutte il est indispensable de contrôler respectivement le métabolisme des glucides et de l'acide urique.

Les expériences sur l'animal ont démontré que le Diurex ne possède pas d'activité ou effets tératogénés sur la fertilité et la reproduction. Néanmoins, la prudence s'impose avant de permettre le traitement de patientes enceintes.

La survenue de réaction croisées du type allergique avec des composés sulfamidés est possible.

Présentation : 20 comprimés

Ranger les médicaments en endroit sûr et hors de portée des enfants !

FABRIQUE AU MAROC , SOUS LICENCE PAR LAPROPHAN S.A

21, Rue des Oudaya - CASABLANCA

030602F81078P110311

MEDA

راميبريل وين

راميبريل

21E003 12/25

108,00

عن

قرص قابل للكسر

Ramipril

Ramipril

Comprimé sécable

Veuillez lire attentivement ce médicament.

- Gardez cette notice, vous
- Si vous avez toute autre question, contactez votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit par un autre, même en cas de consultation d'urgence.
- Si l'un des effets indésirables mentionnés dans cette notice

1. ما هو راميبريل وين، قرص قابل للكسر وما الحالات التي يستعمل فيها؟
2. ما المعلومات الضرورية قبل تناول راميبريل وين، قرص، قابلاً.
3. كيف يمكن تناول راميبريل وين.
4. ما هي التأثيرات غير المرغوب فيها؟
5. كيف يحافظ راميبريل وين، قرص.
6. معلومات إضافية.

1. ما هو راميبريل وين، قرص قابل للكسر الصيدلي العلاجي
راميبريل وين، قرص، قابلاً.

أنتقام التحويل.

راميبريل وين، قرص.

* تقليل إنتاج الجسم

* استرخاء وتمدد الأوعية

* تسهيل ضخ الدم من

الإرشادات العلاجية

يُنصح باستعمال رام

2. لعلاج ضغط الدم المترافق مع ارتفاع الكوليسترول.

للوقاية من خطر الاصابة بنوبة

للتقليل من خطر أو تأخير تفاقم

لعلاج القلب حينما لا يستطيع ضغط

في العلاج إثر الاصابة بأزمة قلبية

2. ما المعلومات الضرورية

مضادات الاستعمال

يجب عدم استعمال رامي

إذا كنت تعاني من حساسية

الموجودة براميبريل وين

* علامات الحساسية يمك

اللسان.

إذا كنت قد عانيت من حساسية تسمى "دواء مونتيلوكارب" في

اليدين والقدمين والحلق، تورم في الحلق، اللسان، تورم حول العينين، والشفاه، صعوبات في

التنفس، إذا كنت تخضع لغسيل الكلى أو أي نوع آخر من تصفية الدم، اعتماداً على الجهاز الم

وين، قرص قابل للكسر قد لا تكون من

إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى

إذا كنت حاملاً لأكثر من 3 أشهر كما

بداية الحمل (انظر فقرة العمل والرعايا

1. QU'EST-CE QUE RAMIPIRIL WIN ET IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapie

Ramipril Win, comprimé sécable fait partie d'un groupe de médicaments.

Ramipril Win, comprimé sécable diminue la production de la substance qui cause la pression artérielle,

* Faisant se relâcher et se détendre les vaisseaux sanguins.

* Facilitant à votre cœur le travail et la relaxation.

Indications thérapeutiques

Ramipril Win, comprimé sécable est utilisé pour :

* Pour traiter une pression artérielle élevée.

* Pour réduire le risque d'accident cardiaque.

* Pour réduire le risque ou prévenir les complications diabétiques.

* Pour traiter votre cœur lorsque le reste de votre organisme (le corps) n'est pas en état de faire face à la charge cardiaque.

2. QUELLES SONT LES INDICATIONS DE RAMIPRIL WIN, comprimé sécable ?

Contre-indications

Ne prenez jamais Ramipril Win si :

* Si vous présentez une allergie connue à l'un ou plusieurs des autres composants contenus dans ce médicament.

* Les signes d'une réaction allergique ou d'un état de malaise (anaphylaxie) ou de symptômes de déglutition difficile ou de votre gorge ou de votre larynx.

* Si vous avez déjà présenté des symptômes de maladie de l'oreille interne (vertige, nausées, vomissements, douleur dans l'oreille), qui peuvent être causés par ce médicament.

* Si vous avez déjà présenté des symptômes de maladie de l'oreille interne (vertige, nausées, vomissements, douleur dans l'oreille), qui peuvent être causés par ce médicament.

* Si vous avez déjà présenté des symptômes de maladie de l'oreille interne (vertige, nausées, vomissements, douleur dans l'oreille), qui peuvent être causés par ce médicament.

* Si vous êtes enceinte ou si vous pensez être enceinte.

GEMS IT MAC1200 ST KHADIJA KHIDIQUI , EXPLORATION CARDIO-VASCULAIRE CASABLANCA DR BOUZOUBAA
74 Ans (22.02.1948)

FC 57/min

Résultats mesures:

QRS	:	ms
QT/QTcB	:	/ ms
PQ	:	ms
P	:	ms
RR/PP	:	/ ms
P/QRS/T	:	/ / degrés
QTD/QTcBD	:	ms
Sokolow	:	mU
NK	:	

Interprétation:

rapport non confirmé.

