

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
16/02/93	A			INP : [Signature]

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
[Signature]	16-02-93	

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP : [Signature]																					
				COEFFICIENT DES TRAVAUX [] MONTANTS DES SOINS [] DEBUT D'EXECUTION [] FIN D'EXECUTION []																					
O.D.F. PROTHESES DENTAIRES 	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE <table border="1"> <tr> <td>H</td> <td></td> <td>H</td> </tr> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>D</td> <td></td> <td>G</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			H		H	25533412	21433552		00000000	00000000		D		G	00000000	00000000		35533411	11433553		B			COEFFICIENT DES TRAVAUX [] MONTANTS DES SOINS [] DATE DU DEVIS [] DATE DE L'EXECUTION []
	H		H																						
	25533412	21433552																							
	00000000	00000000																							
	D		G																						
	00000000	00000000																							
	35533411	11433553																							
	B																								
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession																								

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

CLINIQUE ANOUAL

Médecine - Chirurgie - Maternité
Orthopédie - Réanimation



مصحة أنوال

الطب العام - الجراحة - الولادة
جراحة العظام والمفاصل - الإبتعاش

القنيطرة، في 16/02/23 كénitra, le

Dr Mourad ADIL

Anesthésiste - Réanimateur

Dr M'hamed

AI ECHEIKH ALAOU

Gynécologue - Obstétricien

Dr Aziz AQIRA

Chirurgien - Urologue

Dr Bahaa BENNANI

Gynécologue - Obstétricienne

Dr Abdellah KHLOUF

Chirurgien - Urologue

Dr Mustapha LEMRABETT

Chirurgien - Viscéraliste

33, Rue Ibn Abi Zarâa - Kénitra

Tél.: 05 37 36 67 67 / 05 37 37 67 68

Tél.: 05 37 37 70 72 - Fax: 05 37 36 11 05

anoualadm@gmail.com

INP: 050002310

ICE N°: 001678571000087

33, زقة ابن أبي زرع - القنيطرة

الهاتف: 05 37 36 67 67 / 05 37 37 67 68

هاتف: 05 37 37 70 72 - الفاكس: 05 37 36 11 05

anoualadm@gmail.com

Mr GRINE ACTRAF.

72.70 x 4 = 290.80

1/ Flonox 100 mg

14 x 3 j x 1 j

22.00

2/ Cefal

14 x 3 j

31 Dazen

47.80

2 x 2 j

4/ Novex 0.4

347.00 x 4 = 1388.00

1748.60



Pharmacie BENHADDOUCHE
Résidence Belle Vue mag
N° 58 Route de Mehoulia - Kénitra
Tél: 05 37 32 20 49
ICE: 000236881000005
INPE: 052096946

Docteur Karim EL KHADIME
Spécialiste en Chirurgie
Orthopédique Traumatologie
481 Avenue Mohamed V et Ibn Abi Zarâa
Bureau N° 10 Mahala 3, Kénitra - Tél: 05 37 327 327

Composition :

Ciprofloxacin (DCI).....500 mg

(Sous forme de ciprofloxacin chlorhydrate)

Excipients q.s.p 1 comprimé pelliculé.

Cet étui contient 12 comprimés pelliculés dosés chacun à 500 mg, soit 6 000 mg de ciprofloxacin.

Avant toute utilisation, lire attentivement la notice intérieure.

FLONOX 500 MG

12 Comprimés pelliculés



6 118000 280484

LOT: 22113 PER: 08/2025
PPV: 72,70 DH

AMM : 80/11/DMP/21/NNP

Fabriqué par les Laboratoires *Steripharma*

Z.I Lina N° 347 Sidi Maârouf, Casablanca

Amine TAHIRI, Pharmacien Responsable

^(م) **فلونكس**

سيبروفلوكساسين

عن طريق الفم

500 ملغ

12 قرصا مغلفا

Composition :

Ciprofloxacin (DCI).....500 mg

(Sous forme de ciprofloxacin chlorhydrate)

Excipients q.s.p 1 comprimé pelliculé.

Cet étui contient 12 comprimés pelliculés dosés chacun à 500 mg, soit 6 000 mg de ciprofloxacin.

Avant toute utilisation, lire attentivement la notice intérieure.

FLONOX 500 MG

12 Comprimés pelliculés



6 118000 280484

LOT: 22113 PER: 08/2025
PPV: 72,70 DH

AMM : 80/11/DMP/21/NNP

Fabriqué par les Laboratoires *Steripharma*

Z.I Lina N° 347 Sidi Maârouf, Casablanca

Amine TAHIRI, Pharmacien Responsable

فلونكس^(م)

سيبروفلوكساسين

عن طريق الفم

500 ملغ

12 قرصا مغلفا

Composition :

Ciprofloxacin (DCI).....500 mg

(Sous forme de ciprofloxacin chlorhydrate)

Excipients q.s.p 1 comprimé pelliculé.

Cet étui contient 12 comprimés pelliculés dosés chacun à 500 mg, soit 6 000 mg de ciprofloxacin.

Avant toute utilisation, lire attentivement la notice intérieure.

FLONOX 500 MG

12 Comprimés pelliculés



6 118000 280484

LOT: 22113 PER: 08/2025
PPV: 72,70 DH

AMM : 80/11/DMP/21/NNP

Fabriqué par les Laboratoires *Steripharma*

Z.I Lina N° 347 Sidi Maârouf, Casablanca

Amine TAHIRI, Pharmacien Responsable

^(م) **فلونكس**

سيبروفلوكساسين

عن طريق الفم

500 ملغ

12 قرصا مغلفا

Composition :

Ciprofloxacin (DCI).....500 mg

(Sous forme de ciprofloxacin chlorhydrate)

Excipients q.s.p 1 comprimé pelliculé.

Cet étui contient 12 comprimés pelliculés dosés chacun à 500 mg, soit 6 000 mg de ciprofloxacin.

Avant toute utilisation, lire attentivement la notice intérieure.

FLONOX 500 MG

12 Comprimés pelliculés



6 118000 280484

LOT: 22113 PER: 08/2025
PPV: 72,70 DH

AMM : 80/11/DMP/21/NNP

Fabriqué par les Laboratoires *Steripharma*

Z.I Lina N° 347 Sidi Maârouf, Casablanca

Amine TAHIRI, Pharmacien Responsable

^(م) **فلونكس**

سيبروفلوكساسين

عن طريق الفم

500 ملغ

12 قرصا مغلفا

صيدول

باراسيتامول / كودين

20 حبة

عن طريق الفم

Cédoï

20 Comprimés



6 118000 180913

سنتمديك

22,00

دازين 10.000 وحدة سرابتاز

08144

PPV :
EXP :
Lot N° :

40 قرصا دلبسا
معدى - مقاوم
عن طريق الفم



مختبرات ستيميك
22 - 20 زنفه زيمر بن العوام
الصخور السوداء - الدار البيضاء



40 Comprimés enrobés gastro-résistants

Serrapeptase

DASEN® 10 000 UI

COMPOSITION :

Une seringue pré-remplie de Novex® 4000 UI anti-Xa/0,4 ml contient 40 mg d'Enoxaparine sodique.
Contient également : hydroxyde de sodium, acide chlorhydrique et eau pour préparations injectables.

MODE, VOIE D'ADMINISTRATION ET POSOLOGIE :

Voie sous-cutanée.
Ne pas injecter par voie IM.

Lire attentivement la notice avant emploi.

MISES EN GARDE SPECIALES :

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Lire attentivement la notice avant emploi.

PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION :

A conserver à une température inférieure à 25°C dans l'emballage d'origine.

RESPECTER LES DORES PRESCRITES
احترسوا بالجرعات الموصوفة

Uniquement sur ordonnance - Liste I / Tableau A
يصرف بموجب وصفة طبية - قائمة I جدول أ

Novex®
Enoxaparine sodique


4000 UI anti - Xa/0,4 ml

6 seringues pré-remplies

4000 UI anti - Xa/0,4 ml
6 محقنات مملوءات مسبقا

4000 و.د. anti-Xa تعادل 40 ملغ
محلول قابل للحقن

سوطيما
Sothema



نوفيكس
إنوكسابارين صوديوم



تحذيرات خاصة :

يوضع هذا الدواء بعيدا عن متناول و مرمى الأطفال.
اقرأ النشرة الداخلية جيدا قبل الاستعمال.

احتياطات الحفظ :

يجب حفظ هذا الدواء في درجة حرارة دون 25°م
في العبوة الأصلية.



Fabricant/Titulaire de l'AMM
Laboratoires SOTHEMA
B.P. N° 1, 27182 Bouskoura - Maroc
Pharmacien Responsable, Dr. Lamia TAZI

التركيبية :

تحتوي كل محقنة نوفيكس® 4000 UI anti - Xa/0,4 ml على 40 ملغ

من الإنوكسابارين الصوديوم.

تحتوي المحقنة أيضا على هيدروكسيد الصوديوم، حامض الهيدروكلوريك و ماء للتحضيرات القابلة للحقن.

الجرعة و كيفية الاستعمال :

عن طريق الحقن تحت الجلد.

لا يحقن عن طريق العضل.

اقرأ النشرة الداخلية جيدا قبل الاستعمال.

Novex®
Enoxaparine sodique

4000 UI anti - Xa/0,4 ml

6 seringues pré-remplies

4000 UI anti-Xa correspondant à 40 mg
Solution injectable

DURÉE MATIN MIDI SOIR
☀ ☀ ☀

سوطيما
Sothema

E12377E00

145x55x45

COMPOSITION :

Une seringue pré-remplie de Novex® 4000 UI anti-Xa/0,4 ml contient 40 mg d'Enoxaparine sodique.
Contient également : hydroxyde de sodium, acide chlorhydrique et eau pour préparations injectables.

MODE, VOIE D'ADMINISTRATION ET POSOLOGIE :

Voie sous-cutanée.
Ne pas injecter par voie IM.

Lire attentivement la notice avant emploi.

MISES EN GARDE SPECIALES :

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Lire attentivement la notice avant emploi.

PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION :

A conserver à une température inférieure à 25°C dans l'emballage d'origine.

145x55x45

Novex®
Enoxaparine sodique


4000 UI anti - Xa/0,4 ml

6 seringues pré-remplies

4000 UI anti - Xa/0,4 ml
6 محقنات مملوءات مسبقا

4000 و.د. anti-Xa تعادل 40 ملغ
محلول قابل للحقن

سوطيما
Sothema



نوفيكس
إنوكسابارين صوديوم



تحذيرات خاصة :

يوضع هذا الدواء بعيدا عن متناول و مرمى الأطفال.
اقرأ النشرة الداخلية جيدا قبل الاستعمال.

احتياطات الحفظ :

يجب حفظ هذا الدواء في درجة حرارة دون 25°م
في العبوة الأصلية.



Fabricant/Titulaire de l'AMM
Laboratoires SOTHEMA
B.P. N° 1, 27182 Bouskoura - Maroc
Pharmacien Responsable, Dr. Lamia TAZI

التركيبية :

تحتوي كل محقنة نوفيكس® 4000 UI anti - Xa/0,4 ml على 40 ملغ

من الإنوكسابارين الصوديوم.

تحتوي المحقنة أيضا على هيدروكسيد الصوديوم، حامض الهيدروكلوريك و ماء للتحييزات القابلة للحقن.

الجرعة و كيفية الاستعمال :

عن طريق الحقن تحت الجلد.

لا يحقن عن طريق العضل.

اقرأ النشرة الداخلية جيدا قبل الاستعمال.

Novex®
Enoxaparine sodique

4000 UI anti - Xa/0,4 ml

6 seringues pré-remplies

4000 UI anti-Xa correspondant à 40 mg
Solution injectable

DURÉE MATIN MIDI SOIR
☀ ☀ ☀

سوطيما
Sothema

E12377E00

COMPOSITION :

Une seringue pré-remplie de Novex® 4000 UI anti-Xa/0,4 ml contient 40 mg d'Enoxaparine sodique.
Contient également : hydroxyde de sodium, acide chlorhydrique et eau pour préparations injectables.

MODE, VOIE D'ADMINISTRATION ET POSOLOGIE :

Voie sous-cutanée.
Ne pas injecter par voie IM.

Lire attentivement la notice avant emploi.

MISES EN GARDE SPECIALES :

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Lire attentivement la notice avant emploi.

PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION :

A conserver à une température inférieure à 25°C dans l'emballage d'origine.

RESPECTER LES DORES PRESCRITES
احترسوا بالجرعات الموصوفة

Uniquement sur ordonnance - Liste I / Tableau A
يصرف بموجب وصفة طبية - قائمة I جدول أ

Novex®
Enoxaparine sodique


4000 UI anti - Xa/0,4 ml

6 seringues pré-remplies

4000 UI anti - Xa/0,4 ml
6 محقنات مملوءات مسبقا

4000 و.د. anti-Xa تعادل 40 ملغ
محلول قابل للحقن

سوطيما
Sothema



نوفيكس
إنوكسابارين صوديوم



تحذيرات خاصة :

يوضع هذا الدواء بعيدا عن متناول و مرمى الأطفال.
اقرأ النشرة الداخلية جيدا قبل الاستعمال.

احتياطات الحفظ :

يجب حفظ هذا الدواء في درجة حرارة دون 25°م
في العبوة الأصلية.



Fabricant/Titulaire de l'AMM
Laboratoires SOTHEMA
B.P. N° 1, 27182 Bouskoura - Maroc
Pharmacien Responsable, Dr. Lamia TAZI

التركيبية :

تحتوي كل محقنة نوفيكس® 4000 UI anti - Xa/0,4 ml على 40 ملغ

من الإنوكسابارين الصوديوم.

تحتوي المحقنة أيضا على هيدروكسيد الصوديوم، حامض الهيدروكلوريك

و ماء للتحضيرات القابلة للحقن.

الجرعة و كيفية الاستعمال :

عن طريق الحقن تحت الجلد.

لا يحقن عن طريق العضل.

اقرأ النشرة الداخلية جيدا قبل الاستعمال.

Novex®
Enoxaparine sodique

4000 UI anti - Xa/0,4 ml

6 seringues pré-remplies

4000 UI anti-Xa correspondant à 40 mg
Solution injectable

DURÉE MATIN MIDI SOIR
☀ ☀ ☀

سوطيما
Sothema

E12377E00

145x55x45

COMPOSITION :

Une seringue pré-remplie de Novex® 4000 UI anti-Xa/0,4 ml contient 40 mg d'Enoxaparine sodique.
Contient également : hydroxyde de sodium, acide chlorhydrique et eau pour préparations injectables.

MODE, VOIE D'ADMINISTRATION ET POSOLOGIE :

Voie sous-cutanée.
Ne pas injecter par voie IM.

Lire attentivement la notice avant emploi.

MISES EN GARDE SPECIALES :

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Lire attentivement la notice avant emploi.

PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION :

A conserver à une température inférieure à 25°C dans l'emballage d'origine.

145x55x45

RESPECTER LES DORES PRESCRITES
احترسوا بالجرعات الموصوفة

Uniquement sur ordonnance - Liste I / Tableau A
يصرف بموجب وصفة طبية - قائمة I جدول أ

Novex®
Enoxaparine sodique


4000 UI anti - Xa/0,4 ml

6 seringues pré-remplies

4000 UI anti - Xa/0,4 ml
6 محقنات مملوءات مسبقا

4000 و.د. anti-Xa تعادل 40 ملغ
محلول قابل للحقن

سوطيما
Sothema



نوفيكس
إنوكسابارين صوديوم



تحذيرات خاصة :

يوضع هذا الدواء بعيدا عن متناول و مرمى الأطفال.
اقرأ النشرة الداخلية جيدا قبل الاستعمال.

احتياطات الحفظ :

يجب حفظ هذا الدواء في درجة حرارة دون 25°م
في العبوة الأصلية.



Fabricant/Titulaire de l'AMM
Laboratoires SOTHEMA
B.P. N° 1, 27182 Bouskoura - Maroc
Pharmacien Responsable, Dr. Lamia TAZI

التركيبية :

تحتوي كل محقنة نوفيكس® 4000 UI anti - Xa/0,4 ml على 40 ملغ

من الإنوكسابارين الصوديوم.

تحتوي المحقنة أيضا على هيدروكسيد الصوديوم، حامض الهيدروكلوريك و ماء للتحضيرات القابلة للحقن.

الجرعة و كيفية الاستعمال :

عن طريق الحقن تحت الجلد.

لا يحقن عن طريق العضل.

اقرأ النشرة الداخلية جيدا قبل الاستعمال.

Novex®
Enoxaparine sodique

4000 UI anti - Xa/0,4 ml

6 seringues pré-remplies

4000 UI anti-Xa correspondant à 40 mg
Solution injectable

دائمة
DURÉE MATIN MIDI SOIR
☀ ☀ ☀

سوطيما
Sothema

E12377E00