

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
07/03/23	CERTIFI	0	110.84	DR HADDOU Générateur Expert Assermenté Pres les Tribunaux SL. Ass. Union Africaine (Ex. Av. '93) Cité Diemou Casablanca Tél: 0522 55 37 11 16 52 06

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE AL FATH BERRADA Mohamed Docteur en Pharmacie 586, Bd. Oued El Makhazine Hassan II El Alla - Mohammedia - Tél : 05 22 28 09 71	07/03/23	203.90

ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
	7/3/23	103.730	0300.00

AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A	M	P	C	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient									
												
												
ODF PROTHESES DENTAIRES <table border="1"> <tr> <td>H</td> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> </table> <p>[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession</p>				H	25533412	21433552	D	00000000	00000000	B	35533411	11433553
H	25533412	21433552										
D	00000000	00000000										
B	35533411	11433553										
DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE <table border="1"> <tr> <td>H</td> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> </table>				H	25533412	21433552	D	00000000	00000000	B	35533411	11433553
H	25533412	21433552										
D	00000000	00000000										
B	35533411	11433553										
COEFFICIENT DES TRAVAUX												
MONTANTS DES SOINS												
DATE DU DEVIS												
DATE DE L'EXECUTION												

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur HADDOU BOUALEM

MEDECINE GENERALE

Expert Assermenté auprès Des Tribunaux

32, Avenue Union Africaine
(Ex Avenue "N") Cité Djemaâ
Casablanca - Tél: 05 22 55 22 11
GSM : 06 71 06 57 04

الدكتور حدو بوعلام
الطب العام
خبير محلل لدى المحاكم

شارع الوحدة الإفريقية
(شارع ن سابقا) - قرية الجماعة
البيضاء - الهاتف : 05 22 55 22 11
المحمول : 06 71 06 57 04

Casablanca , le : 07/03/2023

LOT : 221590
EXP : 12/2025
PPV : 99,00DH

99,00

LD - N°2 20

1 g/j ~~am 2~~ bd 30/j

Lasiliix

1 g/j le mat 125,90/j

Glucophage 1000

1 g/j bd 30/j

Tenazepine 2 mg
1 g/j - 600,2

1S

1S

1S

34,60

28,00

42,30

203,90

LOT : 12722002
PER : 01/2025
PPV : 42,30 DH
Boi

Tenir hors de la portée et de la vue de
Pas de précautions particulières de co
Sous ordonnance médicale.

Dr. HADDOU BOUALEM
Médecine Générale
Expert Assermenté près les Tribunaux
32, Av. Union Africaine (ex. Av. "N")
Cité Djemaâ Casablanca
Tél: 0522 55 22 11 - 06 71 06 57 04

PHARMACIE AL FATH
BERRADIA Mohammed
Docteur en Pharmacie
586, Bd Oued EL Makhazine Hassania 1
Alia - Mohammedia - Tél : 05 23 28 09 71

GLUCOPHAGE 500 mg, comprimé pelliculé

GLUCOPHAGE 850 mg, comprimé pelliculé

GLUCOPHAGE 1000 mg, comprimé pelliculé

Chlorhydrate de metformine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'information à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait l'être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que GLUCOPHAGE, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre GLUCOPHAGE, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre GLUCOPHAGE, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver GLUCOPHAGE, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE GLUCOPHAGE, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC : A10BA02.

Indications thérapeutiques :

Glucophage contient de la metformine. C'est un médicament utilisé pour traiter le diabète. Il appartient à la classe de médicaments appelés les biguanides.

L'insuline est une hormone produite par le pancréas et permettant à votre corps de récupérer le glucose (sucre) qui est dans le sang. Votre corps utilise le glucose pour produire de l'énergie ou le stocke pour l'utiliser plus tard.

Lorsque vous avez du diabète, votre pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline ou votre corps n'est pas capable d'utiliser correctement l'insuline qu'il produit. Ceci aboutit à un taux de glucose élevé dans votre sang. Glucophage aide à faire baisser votre taux de glucose sanguin jusqu'à un niveau aussi normal que possible.

Si vous êtes un adulte en surpoids, la prise de Glucophage à long terme permet également d'aider à limiter les risques de complications associées au diabète. Glucophage est associé à une stabilité pondérale ou une modeste perte de poids.

Glucophage est utilisé pour traiter le diabète de type 2 (aussi appelé « diabète non insulino-dépendant ») lorsque le régime alimentaire et l'exercice physique seuls n'ont pas suffi à contrôler le taux de glucose sanguin. Il est particulièrement utilisé chez les patients en surpoids. Les patients adultes pourront prendre Glucophage seul ou avec d'autres médicaments contre le diabète (des médicaments à avaler ou de l'insuline).

Les enfants de 10 ans et plus et les adolescents pourront prendre Glucophage seul ou avec l'insuline.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE GLUCOPHAGE, comprimé pelliculé ?

Contre indications :

Ne prenez jamais GLUCOPHAGE, comprimé pelliculé :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la metformine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous avez des problèmes hépatiques
- Si vous souffrez d'une détérioration sévère de la fonction rénale
- Si vous avez un diabète non contrôlé, par exemple, une hyperglycémie sévère (taux élevé de glucose dans le sang), des nausées, des vomissements, une diarrhée, une perte de poids rapide, une acidose lactique (voir « Risque d'acidose lactique ci-dessous ») ou une acidocétose. En cas d'acidocétose, les substances appelées « corps cétoniques » s'accumulent dans le sang ce qui peut conduire à un pré-coma diabétique. Les symptômes comprennent des douleurs à l'estomac, une respiration rapide et profonde, une somnolence ou si votre haleine présente une odeur fruitée inhabituelle
- Si vous avez perdu trop d'eau (déshydratation), par exemple suite à une diarrhée persistante ou sévère, ou si vous avez vomis plusieurs fois d'affilée. La déshydratation peut entraîner des problèmes de reins qui peuvent vous mettre en danger d'acidose lactique (voir « Avertissements et précautions »)
- Si vous avez une infection grave, par exemple une infection des poumons ou des bronches, ou une infection des reins. Des infections sévères peuvent entraîner des problèmes de reins qui peuvent vous mettre en danger d'acidose lactique (voir « Avertissements et précautions »)
- Si vous prenez un traitement contre l'insuffisance cardiaque aiguë ou si vous avez récemment eu une crise cardiaque, si vous souffrez de graves problèmes de circulation sanguine (tel le choc) ou si vous avez des difficultés respiratoires. Ceci peut entraîner un manque d'apport en oxygène des tissus, qui peut vous mettre en danger d'acidose lactique (voir « Avertissements et précautions »)
- Si vous consommez beaucoup d'alcool

Si l'un des cas ci-dessus s'applique à vous, parlez-en à votre médecin avant de commencer à prendre ce médicament.

Veuillez à demander conseil à votre médecin si :

- Vous devez passer un examen radiographique ou un scanner qui pourrait nécessiter l'injection d'un produit de contraste à base d'iode dans votre circulation sanguine
- Vous devrez subir une intervention chirurgicale majeure

Vous devrez arrêter de prendre Glucophage un certain temps avant et après de tels examens ou

interventions chirurgicales. Votre médecin décidera si vous avez besoin ou non d'un traitement de remplacement pendant cette période. Il est important que vous suiviez précisément les instructions de votre médecin.

Mises en garde spéciales et précautions d'emploi :

Avertissements et précautions

Risque d'acidose lactique.

Glucophage peut provoquer un effet indésirable rare, mais très grave, appelé « acidose lactique », en particulier si vos reins ne fonctionnent pas correctement. Le risque de développer une acidose lactique augmente en cas de diabète mal contrôlé, d'infections graves, de jeûne prolongé ou de consommation d'alcool, de déshydratation (voir informations complémentaires ci-dessous), de problèmes au foie et toutes autres affections médicales pour lesquelles une partie du corps reçoit un apport réduit en oxygène (les maladies cardiaques aiguës sévères, par exemple).

Si l'une de ces situations s'applique à vous, adressez-vous à votre médecin pour recevoir des instructions supplémentaires.

Arrêtez de prendre Glucophage pendant une courte période si vous souffrez d'une affection susceptible d'être associée à une déshydratation (perle importante de liquides corporels) tels des vomissements sévères, de la diarrhée, de la fièvre, une exposition à la chaleur ou si vous buvez moins de liquides que d'habitude. Adressez-vous à votre médecin pour obtenir des instructions supplémentaires.

Arrêtez de prendre Glucophage et contactez immédiatement un médecin ou l'hôpital le plus proche si vous présentez les symptômes d'une acidose lactique, car cette affection peut entraîner un coma.

Les symptômes de l'acidose lactique comprennent :

- vomissements
- maux d'estomac (douleurs abdominales)
- crampes musculaires
- sensation générale de malaise associée à une grande fatigue
- difficultés à respirer
- diminution de la température corporelle et du rythme cardiaque

L'acidose lactique est une urgence médicale qui doit être traitée à l'hôpital.

Si vous devez subir une opération chirurgicale importante, arrêtez de prendre Glucophage au moment de l'opération et pendant un certain temps après l'intervention. Votre médecin décidera du moment où vous devrez arrêter et reprendre votre traitement par Glucophage.

Glucophage à lui seul ne provoque pas d'hypoglycémie (taux de sucre dans le sang trop faible). Cependant, si vous prenez Glucophage en même temps que d'autres médicaments pour traiter le diabète qui peuvent engendrer une hypoglycémie (comme les sulfamides hypoglycémiants, l'insuline, les métildiazépines), il y a un risque d'hypoglycémie. Si vous ressentez des symptômes d'hypoglycémie, tels que des faiblesses, des vertiges, une augmentation de la transpiration, des battements de cœur rapides, des troubles de la vision ou des difficultés à vous concentrer, boire ou manger quelque chose contenant du sucre devrait vous aider à vous sentir mieux.

Pendant votre traitement par Glucophage, votre médecin contrôlera votre fonction rénale au moins une fois par an ou plus fréquemment si vous êtes âgée(e) et/ou si votre fonction rénale s'est détériorée.

Enfants : Sans objet.

Liste des excipients à effet notable : Sans objet.

Interactions :

Autres médicaments et GLUCOPHAGE, comprimé pelliculé :

Si vous devez recevoir une injection d'un produit de contraste contenant de l'iode, par exemple, pour une radiographie ou un scanner, vous devrez arrêter de prendre Glucophage avant ou au moment de l'injection. Votre médecin décidera du moment où vous devrez arrêter et reprendre la prise de votre traitement par Glucophage.

Informez votre médecin si vous prenez, avec récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament. Vous devrez peut-être passer plus fréquemment des tests de la glycémie ou de la fonction rénale ou votre médecin devra peut-être ajuster la posologie de Glucophage. Il est particulièrement important de signaler les médicaments suivants :

- Des médicaments qui augmentent la production d'urine (diurétiques).
- Des médicaments utilisés pour traiter la douleur et l'inflammation (AINS ou inhibiteurs de la COX-2, tels que l'ibuprofène et le cécloécotol).
- Certains médicaments utilisés pour traiter l'hypertension artérielle (inhibiteurs de l'ECA et antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II).
- Agonistes des récepteurs bêta-2-adrénergiques comme le salbutamol ou la terbutaline (utilisés pour traiter l'asthme).

• Corticoïdes (utilisés pour traiter diverses affections, notamment des inflammations sévères de la peau ou l'asthme).

• Les médicaments qui peuvent entraîner une fonction rénale déclégravir, la ranolazine, le

• Autres médicaments utilisés GLUCOPHAGE, comprimé

Éviter une consommation excessive et augmenter le risque d'acidose lactique.

Utilisation en cas de grossesse et allaitement :

Pendant la grossesse, vous devrez arrêter de prendre Glucophage.

Votre médecin si vous êtes enceinte, pensez l'ève ou prévoyez de l'être, afin qu'elle puisse modifier votre traitement.

Ce médicament n'est pas recommandé si vous allaitez votre enfant ou si vous avez l'intention de le faire.

LOT 221662

EXP 11/2025

PPV 28.00 DH

olaparib.

4. Q

Effe

Gl

00

0

Lasilix® 40 mg Lasilix® 20 mg/2 ml

nide

SANOFI

entièrement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

ent des informations importantes sur votre traitement.

avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à
de un médecin ou votre pharmacien.

lement vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un
même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif.

ette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire à nouveau.

INFORMATION DU MEDICAMENT

ion

0 mg comprimés :

de 40 mg/comprimé.

é : amidon de maïs, lactose, silice colloïdale, talc, stéarate de magnésium.

0 mg/2ml :

de 20 mg/2 ml.

é : chlorure de sodium, hydroxyde de sodium, eau pour préparations injectables.

Caractéristiques pharmaceutiques et présentations

mg : comprimés sécables dosés à 40 mg ; boîte de 20.

mg/2 ml : solution injectable,

de 2 ml ; boîte de 1.

QUEL CAS UTILISER CE MEDICAMENT

ne :

ment est indiqué dans le traitement :

mes d'origine cardiaque ou rénale,

mes d'origine hépatique, le plus souvent en association avec un diurétique épargneur de

ertension artérielle.

ctable :

ne est indiquée dans les cas suivants :

cardiologiques : œdème aigu du poumon, arrêt cardiaque,

hypertensives sévères (*élévation importante de la tension artérielle*),

ns sodées sévères d'origine cardiaque, rénale

du bas appareil urinaire et test de lavage

utilisé en réanimation pédiatrique.

ON !

ls cas ne pas utiliser ce médicament

ment NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les

LOT : 22E005
PER..04 2026

LASILIX 40MG
20CP SEC

P.P.V : 34DH60



Docteur HADDOU BOUALEM

MEDECINE GENERALE

Expert Assermenté auprès Des Tribunaux

32, Avenue Union Africaine
(Ex Avenue "N") Cité Djemaâ
Casablanca - Tél.: 05 22 55 22 11
GSM : 06 71 06 57 04

الدكتور حدو بوعلام

الطب العام

خبير محلل لدى المحاكم

32. شارع الوحدة الإفريقيبة

(شارع ن سابقا) - قرية الجماعة

البيضاء - الهاتف : 05 22 55 22 11

06 71 06 57 04

المحول :
.....

Casablanca , le : 07/03/2023

M² BOUJDOUN ABDEULKADER

- triglycerides
- transaminases
- PSA
- glycémie & Q
- HBsAg
- Acide urique

Urea

Creatinine

Clairance

cholestérol total + HDL + LDL

Dr. HADDOU BOUALEM
Médecine Générale
Expert Assermenté Pres les Tribunaux
32, Av. Union Africaine (Ex. Av. "N")
Cité Djemaâ Casablanca
Tél: 0522 55 22 11
06 71 06 57 04

LABORATOIRE CENTRAL D'ANALYSES MEDICALES

Dr. EL HAJAJI MOHAMED
Abderahmane serghni- Mohammedia.

ICE: 001855144000069

Pat: 39574999

IF: 20719572

INPE



093002509

FACTURE N° : 230300371

MOHAMMEDIA le 07-03-2023

Mr BOUJDOUN ABD ELKADER
2303070141

Récapitulatif des analyses

CN	Analyse	Val	Clefs
9105	Prélèvement sanguin	E25	E
0100	Acide urique	B30	B
0106	Cholestérol total	B30	B
0110	Cholestérol HDL+ L D L	B80	B
0111	Créatinine	B30	B
0118	Glycémie	B30	B
0119	Hémoglobine glycosylée	B100	B
0134	Triglycérides	B60	B
0135	Urée	B30	B
0361	PSA	B300	B
	TRANSAMINASES	B100	B
	MDRD	-	HN

Total des B : 790

TOTAL DOSSIER : 900.00 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de : neuf cents dirham s.





الختبر المركزي للتحاليل الطبية

LABORATOIRE CENTRAL ANALYSES MEDICALES



الحمدية - (في إتجاه باب القصبة)

Microbiologie - Hématologie - Toxicologie - Biochimie - Hormonologie - Immunologie - Fécondation in vitro

Dr. Mohamed EL HAJAJI

الدكتور محمد الحاججي

Date du prélèvement : 07-03-2023 à 17:56

Code patient : 1901110005

Né(e) le : 30-06-1952 (70 ans)

Edition du : 08-03-2023

Mr BOUJDOUN ABD ELKADER

Référence : 2303070141

Prescripteur :

15-09-2021

Acide Urique
(Photométrique enzymatique)

77.9 mg/l
463.5 µmol/l

(35.0-72.0)
(208.3-428.4)

75.9
451.6

Urée
(Enzymatique)

0.25 g/L
4.17 mmol/L

(0.18-0.55)
(3.00-9.17)

0.26
4.33

Créatinine
(Test cinétique)

13.30 mg/L
117.0 µmol/L

(7.00-13.00)
(61.6-114.4)

11.90
104.7

Clairance calculée:

(par méthode de filtration glomérulaire MDRD)

Interprétation (Selon l'ANAES):

>ou=60 :	Absence d'atteinte rénale si aucun marqueur anormal
>ou=60 :	Maladie rénale chronique si un ou plusieurs marqueurs(Stade 1)
30-59 :	Insuffisance rénale modérée (Stade2)
15-29 :	Insuffisance rénale severe (Stade 3)
<15 :	Insuffisance rénale terminale(Stade4)

57 ml/mn/1.73²

65

www.labocentral.ma



Dr. Mohamed EL HAJAJI

الطابق السفلي عمارة الدحر ، شارع عبدالرحمن السرغيني (في اتجاه القصبة) - المحمدية

RDC : 1 Immeuble EL HORE , Blv Abderahmane Serghini - Mohammedia - Maroc

Tél. : 05 23 31 20 31 / Fax : 05 23 31 01 46 - E-mail: lc2amohammedmedia@gmail.com

Pour le Prélèvement à Domicile Veuillez Contacter : 06 73 74 73 88



الختبر المركزي للتحليلات الطبية

LABORATOIRE CENTRAL ANALYSES MEDICALES

الحمدية - (في إتجاه باب القصبة)

Microbiologie - Hématologie - Toxicologie - Biochimie - Hormonologie - Immunologie - Fécondation in vitro



Dr. Mohamed EL HAJAJI

الدكتور محمد الحاجي

Date du prélèvement : 07-03-2023 à 17:56

Code patient : 1901110005

Né(e) le : 30-06-1952 (70 ans)

Édition du : 08-03-2023

Mr BOUJDOUN ABD ELKADER

Référence : 2303070141

Prescripteur :

15-09-2021

Triglycérides

(Test enzymatique photométrique)

1.88
2.14

g/l
mmol/l

(<1.50)
(<1.71)

1.97
2.25

Niveau de risque cardiovasculaire (NCEP ATP III)

Normal : < 1,5 g/L (1,7mmol/L)

Limite : 1,5 -1,99 g/L (1,7 -2,2mmol/L)

Elevé : 2,00- 4,99 g/L (42,3-5,69mmol/L)

Très élevé : > 5,0 g/L (>5,7 mmol/L)

Transaminases :

- SGOT :
- SGPT :

20.70 UI/l
26.70 UI/l

15-09-2021
18.40
21.00

MARQUEURS TUMORAUX

*ANTIGENE SPECIFIQUE DE LA PROSTATE

(Technique Chimiluminescence Access2)

PSA total

5.660 ng/mL

(0.000-4.000)

27-02-2020

NB :

Il est souhaitable de compléter le bilan par la PSA libre afin de calculer le rapport PSA libre /PSA total

www.labocentral.ma

Dr. Mohamed EL HAJAJI



الطابق السفلي عمارة الدرر ، شارع عبد الرحمن السرغيني (في اتجاه القصبة) - المحمدية

RDC : 1 Immeuble EL HORE , Biv Abderahmane Serghini - Mohammedia - Maroc

Tél. : 05 23 31 20 31 / Fax : 05 23 31 01 46 - E-mail: lc2amohammed@gmail.com

Pour le Prélèvement à Domicile Veuillez Contacter : **06 73 74 73 88**



المختبر المركزي للتحاليل الطبية

LABORATOIRE CENTRAL ANALYSES MEDICALES



الحمدية - (في إتجاه باب القصبة)

Microbiologie - Hématologie - Toxicologie - Biochimie - Hormonologie - Immunologie - Fécondation in vitro

Dr. Mohamed EL HAJAJI

الدكتور محمد الحاجي

Date du prélèvement : 07-03-2023 à 17:56

Code patient : 1901110005

Né(e) le : 30-06-1952 (70 ans)

Édition du : 08-03-2023

INPE



093002509

Mr BOUJDOUN ABD ELKADER

Référence : 2303070141

Prescripteur :

BIOCHIMIE SANGUINE

15-09-2021

Glycémie à jeun
(Oxydase/peroxydase)

1.89 g/L
10 mmol/L

(0.60–1.00)
(3.3–5.6)

1.38
7.7

DOSAGE DE L'HEMOGLOBINE GLYQUEE (FRACTION A1C)

25-08-2021

HEMOGLOBINE GLYCOSYLE

9.10 %

(<6.50)

7.90

Interprétation des résultats selon la standardisation de l'ADA 2010 et utilisation de l'HbA1c dans le diagnostic du diabète OMS 2011.

- > ou = 6.5 % : Seuil de diagnostic du diabète
- 5.7 – 6.4% : Prédiabète (catégorie présentant un risque accru de diabète)

Suivi du diabète :

- valeur cible pour le cas général : 7% (à moduler selon les particularités du patient HAS 2013).



Dr. Mohamed EL HAJAJI

الطابق السفلي عمارة الدبر ، شارع عبد الرحمن السرغيني (في اتجاه القصبة) - المحمدية

RDC : 1 Immeuble EL HORE , Blv Abderahmane Serghini - Mohammedia - Maroc

Tél. : 05 23 31 20 31 / Fax : 05 23 31 01 46 - E-mail: lc2amohammedia@gmail.com

Pour le Prélèvement à Domicile Veuillez Contacter : **06 73 74 73 88**



الختبر المركزي للتحاليل الطبية

LABORATOIRE CENTRAL ANALYSES MEDICALES

الحمدية - (في إتجاه باب القصبة)

Microbiologie - Hématologie - Toxicologie - Biochimie - Hormonologie - Immunologie - Fécondation in vitro



Dr. Mohamed EL HAJAJI

الدكتور محمد الحاججي

Date du prélèvement : 07-03-2023 à 17:56

Code patient : 1901110005

Né(e) le : 30-06-1952 (70 ans)

Edition du : 08-03-2023

Mr BOUJDOUN ABD ELKADER

Référence : 2303070141

Prescripteur :

15-09-2021

Cholestérol total

(Test colorimétrique enzymatique)

NB:

2.15 g/l

(<2.00)

1.84

5.55 mmol/l

(<5.16)

4.75

NB: Résultat sous réserve de 12 heures de jeûn.

Niveau de risque cardiovasculaire (NCEP ATP III)

Souhaitable < 2,00 g/L (5,2 mmol/L)

Limite de risque 2,00 -2,39 g/L (5,2 -6,1 mmol/L)

Risque élevé >ou égal 2,40 g/L (> 6,2 mmol/L)

15-09-2021

HDL-Cholestérol

0.50 g/L

0.40

Niveau de risque cardiovasculaire (NCEP ATP III)

-HDL < 0.40 g/l facteur de risque majeur de MC(maladie coronarienne)

-HDL > ou égal à 0.60 g/l facteur de risque (effet protecteur de MC)

15-09-2021

LDL-Cholestérol

1.27 g/L

1.05

3.28 mmol/L

2.72

Niveau de risque cardiovasculaire (NCEP ATP III)

- Désirable <1g/l

- Supérieur à l'optimum 1,00-1,29 g/l

- Risque marginal très élevée 1,30-1,59 g/l

- A haut risque 1,60-1,89 g/l

- A très haut risque > 1,90 g/l



Dr. Mohamed EL HAJAJI

www.labocentral.ma

الطابق السفلي عمارة الدرر ، شارع عبد الرحمن السرغيني (في اتجاه القصبة) - المحمدية

RDC : 1 Immeuble EL HORE , Blv Abderahmane Serghini - Mohammedia - Maroc

Tél. : 05 23 31 20 31 / Fax : 05 23 31 01 46 - E-mail: lc2amohammed@gmail.com

Pour le Prélèvement à Domicile Veuillez Contacter : 06 73 74 73 88