

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

M22- 0025158

☐ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 5852 Société :

☐ Actif

☐ Pensionné(e)

☐ Autre :

Nom & Prénom : HIMMI NAFISA

Date de naissance :

Adresse :

Tél. : Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Dr. SALMI Safaa
Médecin Généraliste
Rés. Rachidi : Appt 12, 2ème
étage - Centre Bouskoura
Tél : 05 22 78 11 59

Cachet du médecin :

Date de consultation : 10/01/2023

Nom et prénom du malade : Age :

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : Diabète / Sciatique

Affection longue durée ou chronique : ☐ ALD ☐ ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent(e) :



Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médicin attestant le Paiement des Actes
10/01/23	07	1	150 DH	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	10-01-23	387,10

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient															
				Coefficient DES TRAVAUX														
				MONTANTS DES SOINS														
				DEBUT D'EXECUTION														
				FIN D'EXECUTION														
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE <table border="1"> <tr> <td colspan="2">H</td> </tr> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>G</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> <tr> <td colspan="2">B</td> </tr> </table>		H		25533412	21433552	00000000	00000000	D	G	00000000	00000000	35533411	11433553	B			Coefficient DES TRAVAUX
H																		
25533412	21433552																	
00000000	00000000																	
D	G																	
00000000	00000000																	
35533411	11433553																	
B																		
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS														
				DATE DU DEVIS														
				DATE DE L'EXECUTION														

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

SALFAA SALMI

Omnipraticienne
Médecin Esthétique

Lauréat de la Faculté de Médecine de Casablanca
Ex Médecin Interne à l'hôpital
Mouloud Jousset et Sidi Othmane
Agrée par le Ministère de Santé
pour le Certificat du permis de Conduire



الدكتورة صفاء سالمي

طبيبة عامة
طبيبة تجميل

خريجة كلية الطب بالدار البيضاء
طبيبة داخلية سابقة بمستشفى
مولاي يوسف و سيدي عثمان
مرخصة من طرف وزارة الصحة
لشهادة رخصة السياقة

Bouskoura le 20/11/2023.

Mme Noufissa Hummi

1) Vitaneuril forte 18V

28,80 1 4 x 2 3 1

2) Dose forte 18V
1 amp mois p 3 m

28,00 3 2 Glucophage 1000
3 3 1 - 1 - 1 p 3 mois

44,00 4 Fenac 50 1 4 x 3

PHARMACIE RICHIDI "A"
DR RACHIDI ROUNES
46 LOT DALIA CENTRE BOUSKOURA
CASA. TEL : 05 22 52 06 30

Pharmacie RACHIDI
N°1
DATE 20/11/2023

LOT 22011
PER 06/25
PPV 44DH10

Rés. Rochdal : Appt 2, 12ème étage - Centre Bouskoura (en face de la poste et la Gendarmerie)

إقامة الرشيدى : رقم 12 الطابق الثاني مركز بوسكورة (أمام البريد و الدرك الملكي)

Tél : 0522 78 11 59 - E-mail : dr.salmisafaa@gmail.com

5) Epyloc 75



1 - 0 - 1
75/100 0 - 0 - 1

387,10

DR. SALMI SALBA
Médecin Généraliste
Rés. Rachidi Apt. 12 - 2ème Etage
Boulevard de la Liberté - Tél: 03 44 78 11 11

PHARMACIE RACHIDI
DR RACHIDI MOJNES
V6 LOT 387,10 - BOUSKOURA
CASA. TEL: 05 22 52 06 30

LOT 221
EXP: 11/2025
PPV 28.00DH

LO 221666
EX 11/2025
PP 28.00DH

PPV
LOT 28,80
PER

PPV
LOT 28,80
PER

PPV: 49,60 D
LOT: 22H22
EXP: 08/2025

28,00
LOT 111

Fabriqué par: **SMB**
SMB TECHNOLOGY S.A.
39 rue du Parc Industriel,
B-6900 MARCHE-EN-FAMENNE, Belgique. 6 118001 320103



Remboursable

- التشنجات
- التشنجات في سبيل الحلمات الكبريتية لقلب الحطابطة لاضطرابات ضربات القلب
- أصابع في العفلات
- توريم الذئب، نمو الثدي، غير طبيعي، وزيادة حجم الثدي لدى الرجال
- انقطاع الدماء
- الفشل الكلوي، وانخفاض حجم البول، احتباس البول
- انخفاض عدد خلايا الدم البيضاء
- الصدوك الشاذ
- الحساسية قد تشمل صعوبة في التنفس، والتهاب العين، القرنية، ورد فعل جلدي خطير يتسبب في طلع جلدي، تقرحات، تقشر الجلد، والتهاب

إذا تروم الوجه أو اللسان أو إذا تحول الجلد إلى أحمر وبدا في تكوين بثور أو قشور.

يجب عليك الحصول على المشورة الطبية فوراً.

قد تكون بعض الآثار الجانبية أكثر شديداً، بما في ذلك التماس، لأن المرضى الذين يعانون من إصابات في النخاع الشوكي قد يتلقون أدوية أخرى للألم أو التشنج، التي لها تأثيرات سلبية مماثلة لتلك التي لها بيريغالاباين ويمكن زيادة شدتها عندما يتم أخذ هذه العلاجات معاً.

إذا كان لديك أي آثار جانبية تحدث مع طبيبك أو الصيدلي.

وقدنا نطبق أيضاً على أي آثار جانبية مستحقة في المرحلة في هذه النشرة.

تحذيرات خاصة واحتياطات الاستعمال

تحذيرات خاصة

تحدث مع طبيبك أو الصيدلي قبل أخذ إبيكا.

ظهرت بعض الأعراض على المرضى الذين يتناولون إبيكا قبل أن يروا الفعل. تنحسب: كان هناك تورم في الوجه، والتهيج، والتهاب، والطفح، وكذلك طلع جلدي منتشر. اتصل بطبيبك على الفور إذا كنت تواجه أي من هذه الأعراض.

ارتباط إبيكا بالوجع والتهاب، قد يزيد من حدوث إصابات غير منتظرة بالسفوف عند المرضى المسنين. لذلك يجب أن تكون حذرين حتى تتعود على الأعراض الناتجة عن الدواء.

استعمال إبيكا قد يؤدي إلى اضطراب أو فقدان الرؤية أو التغييرات الأخرى البصرية، ومعناها عابرة. أخبر طبيبك فوراً إذا لاحظت أي تغيير في الرؤية الخاصة بك.

الكثيف مع أدوية مستخدمة في مرض السكري قد يكون ضرورياً لدى بعض مرضى السكري الذين اكتسبوا وزناً خلال فترة العلاج بيريغالاباين.

بعض الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً، بما في ذلك التماس، لأن المرضى الذين يعانون من إصابات في النخاع الشوكي قد يتلقون أدوية أخرى لعلاج الألم أو التشنج، التي قد يكون لها آثار جانبية مشابهة لبيريغالاباين ويمكن زيادة الشدة عندما يتم أخذ هذه العلاجات معاً.

تم الإبلاغ عن حالات فشل القلب لدى بعض المرضى الذين يتناولون إبيكا. وكان هؤلاء معظمهم من كبار السن، والذين يعانون من مشاكل القلب والأوعية الدموية.

قبل أخذ هذا الدواء، يجب إخبار الطبيب إذا كانت لديك أي أمراض القلب في الماضي.

تم الإبلاغ عن حالات الفشل الكلوي لدى بعض المرضى الذين يتناولون إبيكا. إذا لاحظ انخفاض في التبول خلال فترة العلاج بيليكا يجب عليك إخبار الطبيب أو وقف العلاج، يمكن أن يفسد هذه الاضطرابات.

هناك عدد قليل من الناس يعانون من مضاعفات السعال مع إبيكا ويعتقدون بذلك، أو قتل أنفسهم إذا كانت مكنى هذه الآثار تظهر في أي وقت. اتصل بطبيبك على الفور.

يمكن أن تحدث مشاكل الجهاز الهضمي على سبيل المثال، بالإسهال عندما تستخدم إبيكا مع أدوية أخرى مثل مثاق معينة من الأدوية المضادة للألم التي قد تسبب الإسهال. أخبر طبيبك إذا كنت تعاني من الإسهال، وبمجرد ما إذا كنت عرضة لهذه المشكلة.

قبل أخذ هذا الدواء، يجب إخبار الطبيب إذا كنت تتناول الكحول سلباً أو شرب في لحد الدواء أو نتائج من التماس. لا تأخذ أدوية أكثر من الجرعة المحددة.

قد تم الإبلاغ عن التشنجات عند أخذ إبيكا أو بعد وقت قصير من وقف العلاج. في حالة حدوث التشنجات، اتصل بطبيبك على الفور.

تم الإبلاغ عن حالات الخفقان

يمكن أن تؤخذ إبيكا مع وسائل منع الحمل عن طريق الفم.

إبيكا مع أدوية المضاد حيوي والتشويبات والتحول

يمكن أن تؤخذ كبريتات إبيكا في الوقت أو خارج أوقات الطعام

• لا يمنع تناول في وقت واحد والتحول.

يحتوي إبيكا على مونوهيدرات اللاكتوز

إذا قبل قد من قبل الطبيب أن لديك مرض وراثي يسبب عدم تقبل لبعض السكريات. اتصل بالطبيب قبل تناول هذا الدواء.

تناول إبيكا، كبريتات خلال الحمل أو الرضاعة

الحمل والرضاعة

لا ينبغي أن يؤخذ إبيكا أثناء الحمل أو الرضاعة الطبيعية، ما لم يسمح طبيبك بذلك.

يجب على النساء، ذوي إمكانية الإنجاب استخدام وسائل منع الحمل فعالة. إذا كنت حاملًا أو تترسم، أو تعتقدين أنك قد تكونين حاملًا أو تطحنين لتسمين حاملًا، اعلمي استشارة من طبيبك أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء.

الآثار المحتملة على القدرة على قيادة السيارة أو استعمال بعض الآلات والمعدات

إبيكا قد يسبب الدوخة والتعب وانخفاض التركيز.

لا يجب سيطرة أو استخدام الآلات المشددة أو الاضطراب في أنشطة يشتمل أن تكون خطرة حتى يتم تحديد ما إذا كان هذا الدواء يؤثر على قدرتك على أداء هذه الأنشطة.

إذا زادت صعوبة إبيكا، كبريتات عن اللازم.

يجب عليك الاتصال فوراً بطبيبك أو الذهاب إلى قسم الطوارئ في أقرب مستشفى. وأخذ على إبيكا معك.

قد تولد الحساسية، والتهيج، والتورم أو الحساسية إذا كنت قد أخذت من إبيكا أكثر من ما يجب عليه.

في حالة سميان إبيكا، كبريتات

من المهم أن تأخذ كبريتات إبيكا بانتظام في إبيكا ما لم يخبرك الطبيب بذلك. إذا تم إيقاف العلاج، يجب أن يتم التوقف تدريجياً لمدة 1 أسبوع كحد أدنى. بعد إيقاف العلاج الأول أو قصير الأول بيليكا، يجب أن تعرف أن من الممكن مواجهة بعض الآثار الجانبية. وتشمل هذه الآثار اضطرابات النوم، والصداع، والغثان، والتعب، والتقيؤ، والتهاب، وأعراض تشبه التشنج، والتشنجات، والحساسية، والاكواب.

والألم، والتورم، والدوخة. قد تحدث هذه الأعراض على نحو أكثر تواتراً أو شدة عند استعمال إبيكا لفترة طويلة. إذا كان لديك أسئلة حول استخدام هذا الدواء، إسأل طبيبك أو الصيدلي.

احتياطات خاصة للتخزين

احفظ هذا الدواء بعيداً عن راي ومتناول الأطفال.

لا تستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور على العبوة.

تاريخ انتهاء الصلاحية يشير إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.

لا تنحس من الأدوية عن طريق مياه الصرف الصحي أو الفضلات المنزلية. اسأل الصيدلي من كيفية التخلص من الأدوية التي لا تعد بحاجة إليها.

معلومات إضافية

تبقى بعيداً عن متناول الأطفال

شروط وصفات إصدار

الجدول 4 قائمة 2

تاريخ مراجعة المعلومات الدوائية

مارس 2018

إن هذا دواء

- الدواء، مستحضر يؤثر على صحتك وإستعمله خلافاً لتعليمات يعرفك الخطر.
- إنتاج بقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلي.
- الذي مررها قد.
- أن الطبيب والصيداني هما اللذين يقرران بدواء، وينقعه ويصرفه.
- لا تقطع عن العلاج الممنوحة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.



لا تترك الأدوية في متناول الأطفال

Epyca® 75 mg
Prégabaline
14 gélules
PPV.: 75DH10
PROMOPHARM S.A.

611800126090

- التشنجات
- التشنجات في سبيل الحلمات الكبريتية لقلب الحطابطة لاضطرابات ضربات القلب
- أصابع في العفلات
- توريم الذئب، نمو الثدي، غير طبيعي، وزيادة حجم الثدي لدى الرجال
- انقطاع الدماء
- الفشل الكلوي، وانخفاض حجم البول، احتباس البول
- انخفاض عدد خلايا الدم البيضاء
- الصدوك الشاذ
- الحساسية قد تشمل صعوبة في التنفس، والتهاب العين، القرنية، ورد فعل جلدي خطير يتسبب في طلع جلدي، تقرحات، تقشر الجلد، والتهاب

إذا تروم الوجه أو اللسان أو إذا تحول الجلد إلى أحمر وبدا في تكوين بثور أو قشور.

يجب عليك الحصول على المشورة الطبية فوراً.

قد تكون بعض الآثار الجانبية أكثر شديداً، بما في ذلك التماس، لأن المرضى الذين يعانون من إصابات في النخاع الشوكي قد يتلقون أدوية أخرى للألم أو التشنج، التي لها تأثيرات سلبية مماثلة لتلك التي لها بيريغالاباين ويمكن زيادة شدتها عندما يتم أخذ هذه العلاجات معاً.

إذا كان لديك أي آثار جانبية تحدث مع طبيبك أو الصيدلي.

وفقاً لبطاقة إرشاد على أي آثار جانبية مشتبه بها المرفوعة في هذه النشرة.

تعليمات خاصة واحتياطات الاستعمال

تحدث مع طبيبك أو الصيدلي قبل أخذ إبيكا.

ظهرت بعض الأعراض على المرضى الذين يتناولون إبيكا قبل أن يروا الفعل. تنحسب: كان هناك تورم في الوجه، والتهيج، والتهاب، والطفح، وكذلك طلع جلدي منتشر. اتصل بطبيبك على الفور إذا كنت تواجه أي من هذه الأعراض.

• ارتباط إبيكا بالوجع والتهاب، قد يزيد من حدوث إصابات غير منتظرة بالسفوف عند المرضى المسنين. لذلك يجب أن تكون حذرين حتى تتعود على الأعراض.

• استعمال إبيكا قد يؤدي إلى اضطراب أو فقدان الرقبة أو التشنجات الأخرى القوية، ومعشاهة عارئة.

أخبر طبيبك فوراً إذا لاحظت أي تغيير في الرقبة الخاصة بك.

• التكيف مع أدوية مستخدمة في مرض السرطان قد يكون ضرورياً لدى بعض مرضى السرطان الذين اكتسبوا وزناً خلال فترة العلاج بيريغالاباين.

• بعض الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً، بما في ذلك التماس، لأن المرضى الذين يعانون من إصابات في النخاع الشوكي قد يتلقون أدوية أخرى لعلاج الألم أو التشنج، التي قد يكون لها آثار جانبية مشابهة لبيريغالاباين ويمكن زيادة الشدة عندما يتم أخذ هذه العلاجات معاً.

• تم الإبلاغ عن حالات فشل القلب لدى بعض المرضى الذين يتناولون إبيكا. وكان هؤلاء معظمهم من كبار السن، والذين يعانون من مشاكل القلب والأوعية الدموية.

• قبل أخذ هذا الدواء، يجب إخبار الطبيب إذا كانت لديك أي أمراض القلب في الماضي.

• تم الإبلاغ عن حالات الفشل الكلوي لدى بعض المرضى الذين يتناولون إبيكا. إذا لاحظ انخفاض في التبول خلال فترة العلاج بيليكا يجب عليك إخبار الطبيب أو وقف العلاج يمكن أن يفسد هذه الاضطرابات.

• هناك عدد قليل من الناس يعانون من مضاعفات السرج مثل إبيكا ويقلون وزناً، أو تقل أنفسهم إذا كانت مكن هذه الآثار تظهر في أي وقت. اتصل بطبيبك على الفور.

• يمكن أن تحدث مشاكل الجهاز الهضمي على سبيل المثال، بالإسهال عندما تستخدم إبيكا مع أدوية أخرى مثل مثاق معينة من الأدوية المضادة للألم التي قد تسبب الإسهال. أخبر طبيبك إذا كنت تعاني من الإسهال، وبمضغها إذا كنت عرضة لهذه المشكلة.

• قبل أخذ هذا الدواء يجب إخبار الطبيب إذا كنت تتناول الكحول سلباً أو شرف في أخذ الدواء أو تاتني من الكتمان. لا تأخذ أدوية أكثر من الجرعة المحددة.

• قد تم الإبلاغ عن التشنجات عند أخذ إبيكا أو بعد وقت قصير من وقف العلاج. في حالة حدوث التشنجات، اتصل بطبيبك على الفور.

تم الإبلاغ عن حالات الخفقان

يمكن أن تؤخذ إبيكا مع وسائل منع الحمل عن طريق الفم.

• إبيكا مع أدوية المضاد حيوي، والتشنجات والتحول

يمكن أن تؤخذ كبريتات إبيكا في الوقت أو خارج أوقات الطعام

• لا يمنع تناول في وقت واحد الكحول.

• يحتوي إبيكا على مونوهيدرات اللاكتوز

إذا قبل قد من قبل الطبيب أن لديك مرض وراثي يسبب عدم تقبل لبعض السكريات. اتصل بالطبيب قبل تناول هذا الدواء.

• تناول إبيكا، كبريتات خلال الحمل أو الرضاعة

• الحمل والرضاعة

لا ينبغي أن يؤخذ إبيكا أثناء الحمل أو الرضاعة الطبيعية، ما لم يسمح طبيبك بذلك.

يجب على النساء، ذوي إمكانية الإنجاب استخدام وسائل منع الحمل فعالة. إذا كنت حاملًا أو تترعمن، أو تعتقن أنك قد تكونين حاملًا أو تطحنين لتسمين حاملًا، اعلمي استشارة من طبيبك أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء.

• الآثار المحتملة على القدرة على قيادة السيارة أو استعمال بعض الآلات والمعدات

إبيكا قد يسبب الدوخة والتعب وانخفاض التركيز.

لا يجب سيطرة أو استخدام الآلات المشددة أو الاضطراب في أنشطة يشتمل أن تكون خطرة حتى يتم تعديداً ما إذا كان هذا الدواء يؤثر على قدرتك على أداء هذه الأنشطة.

إذا زادت صعوبة إبيكا، كبريتات عن اللازم.

يجب عليك الاتصال فوراً بطبيبك أو الذهاب إلى قسم الطوارئ في أقرب مستشفى. وأخذ على إبيكا معك.

قد تروم التعب، والتهيج، والتعب أو الغثاس إذا كنت قد أخذت من إبيكا أكثر من ما يجب عليه.

في حالة سميان إبيكا، كبريتات

من المهم أن تأخذ كبريتات إبيكا بانتظام في إبيكا ما لم يخبرك الطبيب بذلك. إذا تم إيقاف العلاج، يجب أن يتم التوقف تدريجياً لمدة 1 أسبوع كحد أدنى. بعد إيقاف العلاج الأول أو قصير الأول بيليكا، يجب أن تعرف أن من الممكن مواجهة بعض الآثار الجانبية. وتشمل هذه الآثار اضطرابات النوم، والصداع، والغثاس، والتعب، وانخفاض الشهية، وأعراض تشبه التشنجات، والتشنجات، والغثاس، والتهيج، والتهاب، والتورم، والدوخة. قد تحدث هذه الأعراض على نحو أكثر تواتراً أو شدة عند استعمال إبيكا لفترة طويلة. إذا كان لديك أسئلة حول استخدام هذا الدواء، إسأل طبيبك أو الصيدلي.

• احتياطات خاصة للتخزين

احفظ هذا الدواء بعيداً عن راي ومتناول الأطفال.

لا تستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور على العبوة.

تاريخ انتهاء الصلاحية يشير إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.

لا تنحس من الأدوية عن طريق مياه الصرف الصحي أو الغثاس القوية. اسأل الصيدلي من كيفية التخلص من الأدوية التي لا تعد بحاجة إليها.

معلومات إضافية

تبقى بعيداً عن متناول الأطفال

شروط وصفات إصدار

الجدول 4 قائمة 2

تاريخ مراجعة التعليمات الدوائية

مارس 2018

إين هذا دواء

- الدواء، مستحضر يؤثر على صحتك وإستعمله خلافاً لتعليمات يعرفك الخطر.
- إنتاج بقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلي.
- الذي مرها على.
- أن الطبيب والصحة هذا المخبران بالدواء، وينبغي وخبرهم.
- لا تقطع عن العلاج الممددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.



لا تترك الأدوية في متناول الأطفال

