

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR TIVR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 2772 Société : Ram

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

KADRI HAJSANI Mohamed

Date de naissance :

8/1/1983 155649

Adresse :

Tél. : 1667117245

Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

*Docteur ARAQI HOUSSAINI Najib
Cabinet de Médecine Générale
16, Rue Okba Benou Nafie
33.73.21
ARECHID - Tél. : 33.73.21*

Date de consultation :

Nom et prénom du malade :

Lien de parenté :

Nature de la maladie :

Affection longue durée ou chronique :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent(e) :



Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019

03 AVR 2023

Le : 03 AVR 2023

ACCUEIL

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Nature des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
1/1/2015	1. Consultation	1	200.00	 Dr. ARAKI HASSAN Médecin Généraliste 16, Rue Ouled Djellal BEIRUT - Tél: 01-373555

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
 ASMOUN Samir Docteur en Pharmacie Rue ASSALAM Hay Al Moubarak BEIRUT LIBAN	11.03.2023	218,40

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.


Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
D	
00000000	00000000
35533411	11433553
B	
G	



[Création, remont, adjonction]

Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession



الدكتور عراقي حسين نجيب

MEDECINE GENERALE

Echographie Générale

Ex. Médecin Chef des Forces

Royales Airs de Casablanca

Expert assermenté auprès des Tribunaux

16, Rue Okba Bnou Nafie - Berrechid

Tél. : 05 22 33 73 21

GSM : 06 62 07 65 56

ASMOOUN Samir

Docteur en Pharmacie

Rue ASSALAM Hay Al Houde

BERRECHID

05 22 33 73 21

06 62 07 65 56

طبيب رئيسي سابق بالقوط

الجوية الملكية بالدار البيضاء

خبير محلف لدى المحاكم

16, زنقة عقبة بن نافع - برشيد

05 22 33 73 21

06 62 07 65 56

الهاتف : 05 22 33 73 21

المحمول : 06 62 07 65 56

56, 60

RADHI HOUSSAINI Mohamed

Diff. Parfum

15,50

S.V.

51,00

51

Broulo libes 81167

50,70

95,00 ml

10,00

Distribué par MSD Maroc
AMM 74/19 DMP/21/NR0
P.P.V: 56,60 DH

15,80 du ml

10,00

10,00

- Dodyrane 1000 3 - 11/

S.V.

T: 218,40



Docteur ARAQI HOUSSAINI Najib
Médecine Générale
16, Rue Okba Bnou Nafie
BERRECHID Tél. : 05 22 33 73 21



ASMOOUN Samir
Docteur en Pharmacie
Rue ASSALAM Hay Al Houde
BERRECHID
Tél. : 05 22 33 73 21

EFLOXIN® 500 mg**Lévofoxacine**

Comprimés pelliculés sécables - Boîte de 7

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous serez avec toutes autres plus d'information à votre disposition.

Ce médicament vous a été prescrit à quelqu'un d'autre, cela pourra être une nocal.

Si l'un des effets indésirables ci-dessous survient, n'hésitez pas à en parler à votre pharmacien.

Si l'un des effets indésirables ci-dessous survient, n'hésitez pas à en parler à votre pharmacien.

1. Composition du médicament

EFLOXIN 500 mg : Chaque

substance active : Lévofoxacine

512,46 mg.

Excipients : cellulose microcristalline, cellulose en poudre, amidon de maïs prégalactosylé, amidon de maïs, crospovidone Type A, potassium K25, sodium stéaryl fumarate, Opadry I #312643 Lactose monohydrate, Hydroxytolose 15 g, Titanium dioxide, Macrogol PEG 4000, Oxyde de fer jaune- E172, Oxyde de fer rouge - E172, Oxyde de fer noir - E172.

2. Classe pharmacothérapeutique et le type d'activité

Classe pharmacothérapeutique : antibiotique de la famille des quinolones, fluorquinolones - code ATC : J01MA12.

Le nom de votre médicament est EFLOXIN comprimé pelliculé

sécable. EFLOXIN comprimé contient une substance active appelée la lévofoxacine. Elle appartient à un groupe de médicaments appelés antibiotiques. La lévofoxacine est un antibiotique de type « quinolone ». Elle agit en tuant les bactéries responsables d'infections dans votre organisme.

3. Indications thérapeutiques

EFLOXIN peut être utilisé pour traiter les infections des :

• Sinus.

• Poumons, chez les personnes ayant des problèmes respiratoires chroniques ou une pneumonie.

• Voies urinaires, notamment au niveau de vos reins ou votre vessie.

• Prostate, lorsque vous avez une infection qui dure.

• Peau et tissus sous-cutanés, y compris les muscles. C'est ce que l'on appelle parfois les « tissus mous ».

Dans certaines situations particulières, EFLOXIN comprimé peut être utilisé pour diminuer les risques de contracter une maladie pulmonaire appelée maladie du charbon ou les risques d'aggravation de la maladie après exposition à la bactérie responsable de la maladie du charbon.

4. Posologie :

VEUILLEZ A TOUJOURS PRENDRE CE MEDICAMENT EN SUIVANT EXACTEMENT LES INDICATIONS DE VOTRE MEDECIN, VERIFIEZ AUPRES DE VOTRE MEDECIN OU PHARMACIEN EN CAS DE DOUTE.

Comment prendre ce médicament ?

• Ce médicament doit être pris par la bouche.

• Analysez les comprimés entier avec de l'eau.

• Les comprimés peuvent être pris au cours des repas ou entre les repas.

Si vous prenez déjà des comprimés de fer, des suppléments à base de zinc, des antiacides, de la diurétine ou du sucralfate

• Ne prenez pas ces médicaments en même temps qu'EFLOXIN.

Prenez ces médicaments au moins 2 heures avant ou après EFLOXIN comprimé.

Combien de comprimés prendre :

• Votre médecin décidera du nombre de comprimés d'EFLOXIN qui vous devrez prendre.

• La dose dépendra du type d'infection dont vous souffrez et du siège de l'infection dans votre organisme.

• La durée de votre traitement dépendra de la gravité de votre infection.

• Si vous avez l'impression qu'effet de votre médicament est trop faible ou trop fort, ne modifiez pas la dose de vous-même, mais interrogez votre médecin.

Adultes et personnes âgées

• Infections des sinus

Un comprimé d'EFLOXIN 500 mg, une fois par jour.

• Infections pulmonaires, chez les personnes ayant des problèmes respiratoires à long terme

Un comprimé de EFLOXIN 500 mg, une fois par jour.

prise d'EFLOXIN, consultez immédiatement un ophtalmologiste.

Prévenez votre médecin si l'un des effets indésirables suivants s'aggrave ou dure plus de quelques jours :

• Fréquent (peut toucher jusqu'à 1 personne sur 10)

• Troubles du sommeil.

• Maux de tête, sensation d'éblouissement.

- Interactions avec d'autres médicaments :

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez ou avez récemment pris ou pourrez prendre tout autre médicament. Ceci car EFLOXIN peut affecter le mode d'action d'autres médicaments. De même, certains médicaments peuvent influer sur l'effet d'EFLOXIN.

En particulier, prévenez votre médecin si vous prenez l'un des médicaments suivants, Ceci car ils peuvent augmenter le risque que vous présentez des effets indésirables, lorsqu'ils sont pris avec EFLOXIN :

• Corticoïdes, parfois appelés stéroïdes - utilisés contre l'inflammation. Vous avez plus de risques de développer une inflammation éclat ou une rupture de vos tendons.

• Warfarine - utilisé pour fluidifier le sang. Vous pouvez présenter plus de risques de saignements. Votre médecin vous fera faire des tests sanguins réguliers pour vérifier la qualité de la coagulation de votre sang.

• Théophylline - utilisé pour les problèmes respiratoires. Vous avez plus de risques de faire une crise d'épilepsie (convulsion) si vous la prenez avec EFLOXIN.

• Médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) - utilisés contre la douleur et l'inflammation, tels que l'aspirine, l'ibuprofène, le fenbufène, le kétoprofène, l'indométhacine. Vous avez plus de risques de faire une crise d'épilepsie (convulsion) s'ils sont pris avec EFLOXIN.

• Ciclosporine - utilisée après les transplantations d'organes. Vous pouvez avoir plus de risques de présenter les effets indésirables de la ciclosporine.

• Médicaments connus pour pouvoir modifier le rythme cardiaque. Ceci comprend les médicaments utilisés pour les anomalies du rythme cardiaque (antiarthmiques tels que quinidine, hydroquinidine, disopyramide, dofetidile, ibutilide et amiodarone), pour la dépression (antidépresseurs tricycliques, tels que l'amitriptyline et l'imipramine), pour les troubles psychiatriques (antipsychotiques) et pour les infections bactériennes (antibiotiques de la famille des « macrolides », tels que l'aztreonam, l'aztreonam et la clarthromycine).

• Probenécide - utilisé pour la goutte, il est possible que votre médecin vous recommande une dose plus faible si vous avez des problèmes rénaux.

• Cétodéhyde - utilisée pour les ulcères et les brûlures d'estomac. Votre médecin vous donnera une dose plus faible si vous avez des problèmes rénaux.

Informez votre médecin si l'un des cas ci-dessus s'applique à votre cas.

Ne prenez pas EFLOXIN comprimé en même temps que les médicaments suivants. Ceci car le mode d'action d'EFLOXIN comprimé peut en être affecté :

• Comprimés de fer (pour l'anémie), suppléments à base de zinc, antiacides contenant du magnésium ou de l'aluminium (pour l'acidité ou les brûlures gastriques), diurétiques ou sucralfate (pour les ulcères de l'estomac). Voir rubrique 4 (posologie) . Si vous prenez déjà des comprimés de fer, des antiacides ou du sucralfate .

• Test urinaire pour détecter les opiacés

Chez les personnes prenant EFLOXIN, les tests urinaires peuvent donner des résultats « faussement positifs » lors de la détection des antalgiques forts appelés « opiacés ». Si votre médecin vous a prescrit un test urinaire, prévenez-le que vous prenez EFLOXIN.

• Test de la tuberculose

Ce médicament peut rendre des résultats « faussement négatifs » lors de certains tests de laboratoire pour rechercher les bactéries responsables de la tuberculose.

9. Utilisation en cas de grossesse et d'allaitement

Prenez pas ce médicament si :

• Vous êtes enceinte, vous pourrez être enceinte ou vous pensez que vous pourrez être enceinte.

10. Les effets possibles du traitement sur la capacité à conduire un véhicule ou à utiliser certaines machines

Vous pouvez présenter des effets indésirables après avoir pris ce médicament, notamment des sensations d'étourdissement, de somnolence, une sensation d'avoir la tête qui tourne (vertiges) ou des modifications de la vision. Certains de ces effets indésirables peuvent affecter votre capacité à vous concentrer et votre réaction de conduite.

Si ce produit, he conduisez pas ou n'effectuez aucun travail qui nécessite un niveau d'attention élevé.

11. Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de EFLOXIN comprimé que vous n'auriez dû, prévenez un médecin ou demandez un autre avis médical immédiatement.

Prenez la boîte de médicament avec vous. Ceci afin que le médecin saigne ce que vous avez pris. Les effets suivants peuvent survenir : crise d'épilepsie (convulsions), sensation de confusion, étourdissements, diminution de la conscience, tremblements et palpitations cardiaques - entrainant des battements de cœur irréguliers, nissons ou un essoufflement d'origine cardiaque (tachycardie), des brûlures

Doliprane®

1000 mg comprimé effervescent sécable

PARACÉTAMOL

Veuillez
médic
sans i
avec
de la
phar

PPY 151 H B O
PER 057 24
EOP 112 28
S 1

La substance active est : paracétamol 1000 mg pour un comprimé effervescent sécable. Les autres composants sont : acide citrique anhydre, mannitol, saccharine sodique, laurylsulfate de sodium, povidone K90, bicarbonate de sodium, carbonate de sodium anhydre, leucine, arôme orange.
Teneur en sodium : 408 mg par comprimé.

QU'EST-CE QUE DOLIPRANE 1000 mg, COMPRIMÉ EFFERVESCENT ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament contient du paracétamol.

Il est indiqué en cas de douleurs et/ou fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures, règles douloureuses.

Il peut également être prescrit par votre médecin dans les douleurs de l'arthrose.

Cette présentation est réservée à l'adulte (à partir de 15 ans) :

Lire attentivement la rubrique "Posologie".

Pour les enfants de moins de 15 ans, il existe d'autres présentations de paracétamol : demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT DE PRENDRE DOLIPRANE 1000 mg, COMPRIMÉ EFFERVESCENT.

Contre-indications

Ne pas prendre DOLIPRANE 1000 mg, comprimé effervescent dans les cas suivants :

- allergie connue au paracétamol,
- maladie grave du foie,
- enfants de moins de 15 ans.

PRENDRE DES PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES AVEC DOLIPRANE 1000 mg, COMPRIMÉ EFFERVESCENT

Précautions particulières

- Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours ou en cas d'efficacité insuffisante ou de survenue de tout autre signe, ne pas continuer le traitement sans l'avis de votre médecin.

- En cas de régime sans sel ou pauvre en sel, tenir compte dans la ration journalière de la présence de sodium : 408 mg par comprimé.

- En cas de maladie grave du foie ou des reins, il est nécessaire de consulter votre médecin avant de prendre du paracétamol.

Mises en garde

En cas de surdosage ou de prise par erreur d'une dose trop élevée, consultez immédiatement votre médecin.

Ce médicament contient du paracétamol. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée (cf. chapitre "Posologie").

Grossesse et allaitement

Le paracétamol, dans les conditions normales d'utilisation, peut être utilisé pendant la grossesse ainsi qu'en cas d'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

