

RTANTES A LIRE POUR
NTS ET EVITER LES REJETS

atien lui-même notamment la nature de la maladie.
er de la première consultation.

medicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux,
res, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi

ances de l'accident est à joindre à la feuille de

aux ordonnances.
être jointe.

(sous pli confidentiel) doivent être

mandé par le médecin conseil de

euille de soins.

es séances de

de soins.

soins est

les 6



Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

N° W19-559149

156901

Maladie Dentaire Optique Autres

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule :

500 Jh

Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

AMARI Khadija

Date de naissance :

1926

Adresse :

33 Rue Saad Biou Ali Dukkess - 2^e Etage

APPTE 8 - CASABLANCA

Tél. : **06 74 91 44 17**

Total des frais engagés : **3.141,70** DHS

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

**Dr. Saad SOULAMI
Professeur de Cardiologie
350 Rue Mostafa El Maâni
Casablanca**

Date de consultation :

01/03/2023

Nom et prénom du malade :

AMARI Khadija

Age :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

HTA & dyspnée

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : **CASABLANCA**

Le : **29/03/2023**

Signature de l'adhérent(e) :

29/03/2023

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES			
Dates des soins	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des actes
01/01/2012 à 31/12/2012	Nombre et Coefficient	4000 DT	INP : 091130922
			Centre Cardiologique de Tunisie

EXÉCUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<i>PHARMACIE OICANA Place 31 522 1970 052 21</i>	<i>28/09/23</i>	<i>2961170</i>

ANALYSES - RADIGRAPHIES			
Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX						Montant détaillé des Honoraires	
Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre					
		A M	P C	I M	I V		

Docteur Saâd SOULAMI

Professeur de Cardiologie

Spécialiste des maladies du Cœur et des vaisseaux

Diplômé de la Faculté de Médecine de Paris

Echo Doppler Couleur - Holter



الدكتور سعد السلمي

أستاذ سابق بكلية الطب بالدار البيضاء

اختصاصي في أمراض القلب والأوعية الدموية

خريج كلية الطب بباريس

فحص القلب بالصدى والدوبلير بالألوان

Patient:

Casablanca, le 28 FEV. 2023.

19500x7

TR房率 80/15

47,000x3 / apletur.

Cosinor 6/85

27,900x6 1/2 Echel

Crocoptile

71,300x15 / 4 card

TANAKA

2741,70

PHARMACIE ALMA PLAZA
CC Alma Place d'Afrique Casablanca
Tél. 05 22 79 70 00

Tel.: 05 22 18 84/26.13.36 - CSA
356, Rue Mostafa El Maâni
Professeur de Cardiologie
Dr. Saâd SOULAMI

زنقة مصطفى المعاني (قرب زنقة أڭادير) - الدار البيضاء . 356

356, Rue Mostafa El Maâni (coté Rue d'Agadir) - 1^{er} étage - Casablanca - E-mail : cabinetsoulami@gmail.com

Tél.: 05 22 21 18 84 / 06 62 88 90 91 - Tél./Fax: 05 22 26 13 36 - Urgence : 06 65 14 69 96

CNSS : 2700608 - IF : 41802254 - ICE : 001755076000067 - IPN : 091130922

CARDINOR® 6,25 & 25 mg comprimés sécables (Carvédilol)

CARDINOR® 6,25 mg

30 comprimés sécables

6 118001 101368

métharythmiques de la classe I (médicaque).

Indésirables

sur des effets indésirables :
tous les médicaments, CARDINOR, mais, bien que tout le monde n'y soit pas

indésirables sont classés ci-dessous par

ordre (touche plus d'un patient sur 10) :

• étourdissement, maux de tête,
• insuffisance cardiaque,
• diminution de la tension artérielle,
• fatigue,

Fréquents (touche 1 à 10 patients sur 100) :

• bronchite, pneumonie, infection du nez et de la g

• diminution du nombre de globule rouge dans le s

• prise de poids, augmentation du taux de cholestérol

taux de glucose dans le sang chez les patients dia

• dépression, trouble de l'humeur,

• modification de la vision, diminution du liquide lac

• diminution du rythme cardiaque, gonflement de l

importante dans le corps (réention hydrique),

• sensation de vertige en position debout, perturbation

froides, troubles vasculaires périphériques, augmentation de Raynaud),

• difficultés respiratoires, asthme.

• nausées, diarrhée, vomissements, ballonnements

• extrémités douloureuses,

• insuffisance rénale et anomalies de la fonction ré

circulation sanguine et/ou une insuffisance rénale

• œdème, douleur,

Peu fréquent (touche 1 à 10 patients sur 1000) :

• trouble du sommeil,

• sensation vertigineuse, perte de conscience brus

fouillements dans certaines parties du corps,

• trouble de la conduction cardiaque, angine de po

• réactions cutanées (tel que rougeur, inflammation

cutanées type psoriasis ou lichen), chute des cheveux

• trouble de l'érection

Rare (touche 1 à 10 patients sur 10 000) :

• diminution du taux de plaquettes dans le sang,

• nez bouché,

• Troubles de la miction

Très rare (touche moins d'un patient sur 10 000)

• diminution du taux de globule blanc dans le sang,

• réaction allergique

• augmentation des enzymes hépatiques,

• incontinence urinaire chez les femmes

• réactions cutanées sévères (par exemple érythème

syndrome de Lyell).

Déclaration des effets indésirables :

La déclaration des effets indésirables suspectés a

Elle permet une surveillance continue du rapport

LOT : 211392

EXP : 08/2024

PPV : 47,00DH

de cette notice avant de prendre ce médicament.
Si vous avez un doute, demandez plus d'info

ment prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre,
cela pourra lui être nocif.

aveu ou si vous remarquez un effet indésirable non
mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

CARDINOR® 6,25mg Comprimés sécables, boîtes de 10, 30 et 60

CARDINOR® 25 mg Comprimés sécables, boîtes de 10, 30 et 60

1. Composition du médicament :

CARDINOR® 6,25 mg	CARDINOR® 25 mg
mg/Comprimé	

Substance active

Carvédilol	6,25 mg	25 mg
------------	---------	-------

Excipients: Lactose monohydraté, Cellulose microcristalline, Hypromellose faiblement substituée (L-MPC), Amidon de maïs. Oxyde de fer jaune. Silice colloïdale anhydre, Talc purifié, stéarate de magnésium ...q.s.p 1 Comprimé sécable

Liste des excipients à effet notoire : Lactose

2. Classe pharmaco thérapeutique ou le type d'activité

Alpha et betabloquant

3. Indications thérapeutiques

Ce médicament est prescrit dans le traitement de l'insuffisance cardiaque chronique symptomatique, en complément du traitement habituel de l'insuffisance cardiaque

4. Posologie

- POSOLOGIE ET VOIE D'ADMINISTRATION :

La posologie est adaptée à chaque patient.

Le traitement est instauré par une dose initiale de 3,125 mg.

Si cette première administration est bien tolérée, la posologie est augmentée progressivement sur au moins 6 semaines à 3,125 mg 2 fois par jour puis 6,25 mg 2 fois par jour puis 12,5 mg 2 fois par jour et enfin 25 mg 2 fois par jour. Chaque paquet de dose dure au minimum 2 semaines.

La posologie maximale habituellement recommandée est de 25 mg 2 fois par jour.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A LA PRESCRIPTION MÉDICALE.

- Mode d'administration

Voie orale.

Les comprimés doivent être avalés avec une quantité suffisante d'eau.

- Fréquence d'administration:

CARDINOR doit être pris au moment des repas, chaque jour à la même heure

- Durée du traitement :

SE CONFORMER A LA PRESCRIPTION MÉDICALE.

5. Contre-indications

Ne prenez jamais CARDINOR, comprimé sécable dans les cas suivants :

• Si vous êtes allergique à la substance active (carvédilol) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (cf. Composition).

• Si vous avez déjà eu une réaction allergique grave.

• Si vous êtes asthmatique ou si vous avez un encombrement sévère des bronches et des poumons broncho-pneumopathie chronique obstructive) ou un rétrécissement des bronches (bronchospasme).

• Si votre cœur fonctionne très mal (insuffisance cardiaque sévère) malgré l'utilisation d'un traitement et que vous avez des gonflements (œdèmes), une présence anormale de liquide dans le ventre ou des difficultés à respirer. Dans ce cas, votre état peut nécessiter un traitement par voie veineuse.

• Si vous avez une défaillance grave du cœur (choc cardiogénique).

• Si vous avez des troubles de l'activité électrique du cœur pouvant entraîner un ralentissement des battements du cœur (bloc auriculo-ventriculaire du second et troisième degré, bloc sino-auriculaire, sauf si vous avez un pacemaker).

• Si votre cœur bat trop lentement.

• Si vous avez des troubles de la circulation sanguine au niveau des doigts (de type phénomène de Raynaud) ou dans les artères des jambes (arthrite).

• Si vous avez une tension artérielle très basse (hypotension sévère).

• Si vous avez une maladie du foie (insuffisance hépatique).

• En même temps que certains médicaments :

- la cimetidine (médicament utilisé pour traiter un ulcère de l'estomac ou de l'intestin),

CARDINOR® 6,25 mg

30 comprimés sécables

6 118001 101368

métharythmiques de la classe I (médicaque aque).

Indésirables

sur des effets indésirables : tous les médicaments, CARDINOR, mais, bien que tout le monde n'y soit pas

indésirables sont classés ci-dessous par

ordre (touche plus d'un patient sur 10) :

• étourdissement, maux de tête,
• insuffisance cardiaque,
• diminution de la tension artérielle,
• fatigue,

Fréquents (touche 1 à 10 patients sur 100) :

• bronchite, pneumonie, infection du nez et de la g

• diminution du nombre de globule rouge dans le s

• prise de poids, augmentation du taux de cholestérol

taux de glucose dans le sang chez les patients dia

• dépression, trouble de l'humeur,

• modification de la vision, diminution du liquide lac

• diminution du rythme cardiaque, gonflement de l

importante dans le corps (réention hydrique),

• sensation de vertige en position debout, perturbation

froides, troubles vasculaires périphériques, augmentation de Raynaud),

• difficultés respiratoires, asthme.

• nausées, diarrhée, vomissements, ballonnements

• extrémités douloureuses,

• insuffisance rénale et anomalies de la fonction ré

circulation sanguine et/ou une insuffisance rénale

• œdème, douleur,

Peu fréquent (touche 1 à 10 patients sur 1000) :

• trouble du sommeil,

• sensation vertigineuse, perte de conscience brus

fouillements dans certaines parties du corps,

• trouble de la conduction cardiaque, angine de po

• réactions cutanées (tel que rougeur, inflammation

cutanées type psoriasis ou lichen), chute des cheveux

• trouble de l'érection

Rare (touche 1 à 10 patients sur 10 000) :

• diminution du taux de plaquettes dans le sang,

• nez bouché,

• Troubles de la miction

Très rare (touche moins d'un patient sur 10 000)

• diminution du taux de globule blanc dans le sang,

• réaction allergique

• augmentation des enzymes hépatiques,

• incontinence urinaire chez les femmes

• réactions cutanées sévères (par exemple érythème

syndrome de Lyell).

Déclaration des effets indésirables :

La déclaration des effets indésirables suspectés a

Elle permet une surveillance continue du rapport

7. Mises en garde spéciales et précautions partielles

Adresssez vous à votre médecin ou votre pharmacien

séable en cas :

• D'augmentation des troubles cardiaques, d'œdème

(réention hydrique), de difficulté respiratoire

adaptation par votre médecin de votre dose de car

• De diabète (ce médicament pouvant masquer les

• De maladie rénale,

• D'extrémités froides,

• De ralentissement du rythme cardiaque.

• Des réactions allergiques.

• D'angor de Prinzmetal (variété d'angine de poitrine).

• De phéochromocytome (atteinte d'une glande su

• sévère).

• De troubles thyroïdiens.

• De psoriasis (maladie de peau).

• D'antécédents de taux anormalement bas de

coagulation sanguine). Si vous devez subir une op

que vous prenez ce médicament.

• Des réactions cutanées

Si vous portez des lentilles de contact, le traitemen

te des larmes.

Si vous avez mal toléré ce médicament auparava

Ce médicament contient du lactose

Si votre médecin vous a informé (e) d'une tolér

sacharose, contactez-le avant de prendre ce médi

L'utilisation de ce médicament est déconseillée che

de syndrome de malabsorption du glucose et du g

CARDINOR® 6,25 & 25 mg comprimés sécables (Carvédilol)

CARDINOR® 6,25 mg

30 comprimés sécables

6 118001 101368

métharythmiques de la classe I (médicaque).

Indésirables

sur des effets indésirables :
tous les médicaments, CARDINOR,
mais, bien que tout le monde n'y soit pas
indésirables sont classés ci-dessous par
ordre (touche plus d'un patient sur 10) :

- étourdissement, maux de tête,
- insuffisance cardiaque,
- diminution de la tension artérielle,
- fatigue,

Fréquents (touche 1 à 10 patients sur 100) :

- bronchite, pneumonie, infection du nez et de la gorge,
- diminution du nombre de globule rouge dans le sang,
- prise de poids, augmentation du taux de cholestérol et de sucre dans le sang,
- dépression, trouble de l'humeur,
- modification de la vision, diminution du liquide lacrymal,
- diminution du rythme cardiaque, gonflement de la langue importante dans le corps (réention hydrique),
- sensation de vertige en position debout, perturbation de la circulation sanguine et/ou une insuffisance rénale,

• difficultés respiratoires, asthme,

- nausées, diarrhée, vomissements, ballonnements abdominaux,
- extrémités douloureuses,

• insuffisance rénale et anomalies de la fonction rénale, diminution de la circulation sanguine et/ou une insuffisance rénale,

- œdème, douleur,
- Peu fréquent (touche 1 à 10 patients sur 1000) :

• trouble du sommeil,

- sensation vertigineuse, perte de conscience brusque, diminution de la force et/ou de la coordination et/ou des fourmillements dans certaines parties du corps,
- trouble de la conduction cardiaque, angine de poitrine,

• réactions cutanées (tel que rougeur, inflammation et/ou érythème, type psoriasis ou lichen), chute des cheveux,

• trouble de l'érection,

Rare (touche 1 à 10 patients sur 10 000) :

- diminution du taux de plaquettes dans le sang,
- nez bouché,

• Troubles de la miction,

Très rare (touche moins d'un patient sur 10 000) :

- diminution du taux de globule blanc dans le sang,
- réaction allergique,

• augmentation des enzymes hépatiques,

• incontinence urinaire chez les femmes,

• réactions cutanées sévères (par exemple érythème, syndrome de Lyell).

Déclaration des effets indésirables :

La déclaration des effets indésirables suspectés a pour objectif :

Elle permet une surveillance continue du rapport des effets indésirables.

7. Mises en garde spéciales et précautions particulières

Adresssez-vous à votre médecin ou votre pharmacien si vous avez des symptômes ou des réactions indésirables.

• D'augmentation des troubles cardiaques, d'œdème (réention hydrique), de difficulté respiratoire et/ou de la nécessité d'une adaptation par votre médecin de votre dose de cardiaque.

• De diabète (ce médicament pouvant masquer les symptômes de l'hyperglycémie).

• De maladie rénale,

• D'extrémités froides,

• De ralentissement du rythme cardiaque.

• Des réactions allergiques.

• D'angor de Prinzmetal (variété d'angine de poitrine),

• De phéochromocytome (atteinte d'une glande surrénale sécrétant de l'adrénaline),

• De troubles thyroïdiens,

• De psoriasis (maladie de peau).

• D'antécédents de taux anormalement bas de la pression artérielle et/ou de la coagulation sanguine. Si vous devez subir une intervention chirurgicale, informez votre chirurgien que vous prenez ce médicament.

• Des réactions cutanées.

Si vous portez des lentilles de contact, le traiter avec précaution.

Si vous avez mal toléré ce médicament auparavant, il est recommandé de ne pas prendre ce médicament.

Ce médicament contient du lactose.

Si votre médecin vous a informé (e) d'une tolérance au lactose, contactez-le avant de prendre ce médicament.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les personnes atteintes d'un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose.

LOT : 211392

EXP : 08/2024

PPV : 47,00DH

de cette notice avant de prendre ce médicament.
Si vous avez un doute, demandez plus d'info-

ment prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre,
cela pourrait lui être nocif.

Savez-vous si vous remarquez un effet indésirable non
mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

CARDINOR® 6,25mg Comprimés sécables, boîtes de 10, 30 et 60

CARDINOR® 25 mg Comprimés sécables, boîtes de 10, 30 et 60

1. Composition du médicament :

CARDINOR® 6,25 mg		CARDINOR® 25 mg
mg/Comprimé		
Carvédilol	6,25 mg	25 mg

Substance active

Carvédilol

6,25 mg

25 mg

Excipients: Lactose monohydraté, Cellulose microcristalline, Hypromellose faiblement substituée (L-HPC), Amidon de maïs. Oxyde de fer jaune. Silice colloïdale anhydre, Talc purifié, stéarate de magnésium ...q.s.p 1 Comprimé sécable

Liste des excipients à effet notoire : Lactose

2. Classe pharmaco thérapeutique ou le type d'activité

Alpha et betabloquant

3. Indications thérapeutiques

Ce médicament est prescrit dans le traitement de l'insuffisance cardiaque chronique symptomatique, en complément du traitement habituel de l'insuffisance cardiaque

4. Posologie

- POSOLOGIE ET VOIE D'ADMINISTRATION :

La posologie est adaptée à chaque patient.

Le traitement est instauré par une dose initiale de 3,125 mg.

Si cette première administration est bien tolérée, la posologie est augmentée progressivement sur au moins 6 semaines à 3,125 mg 2 fois par jour puis 6,25 mg 2 fois par jour puis 12,5 mg 2 fois par jour et enfin 25 mg 2 fois par jour. Chaque paquet de dose dure au minimum 2 semaines.

La posologie maximale habituellement recommandée est de 25 mg 2 fois par jour.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A LA PRESCRIPTION MÉDICALE.

- Mode d'administration

Voie orale.

Les comprimés doivent être avalés avec une quantité suffisante d'eau.

- Fréquence d'administration:

CARDINOR doit être pris au moment des repas, chaque jour à la même heure

- Durée du traitement :

SE CONFORMER A LA PRESCRIPTION MÉDICALE.

5. Contre-indications

Ne prenez jamais CARDINOR, comprimé sécable dans les cas suivants :

• Si vous êtes allergique à la substance active (carvédilol) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (cf. Composition).

• Si vous avez déjà eu une réaction allergique grave.

• Si vous êtes asthmatique ou si vous avez un encobrtement sévère des bronches et des poumons (broncho-pneumopathie chronique obstructive) ou un rétrécissement des bronches (bronchospasme).

• Si votre cœur fonctionne très mal (insuffisance cardiaque sévère) malgré l'utilisation d'un traitemen et que vous avez des gonflements (œdèmes), une présence anormale de liquide dans le ventre ou des difficultés à respirer. Dans ces cas, votre état peut nécessiter un traitement par voie veineuse.

• Si vous avez une défaillance grave du cœur (choc cardiogénique).

• Si vous avez des troubles de l'activité électrique du cœur pouvant entraîner un ralentissement des battements du cœur (bloc auriculo-ventriculaire du second et troisième degré, bloc sino-auriculaire, sauf si vous avez un pacemaker).

• Si votre cœur bat trop lentement.

• Si vous avez des troubles de la circulation sanguine au niveau des doigts (de type phénomène de Raynaud) ou dans les artères des jambes (arthrite).

• Si vous avez une tension artérielle très basse (hypotension sévère).

• Si vous avez une maladie du foie (insuffisance hépatique).

• En même temps que certains médicaments :

- la cimetidine (médicament utilisé pour traiter un ulcère de l'estomac ou de l'intestin),

CARDINOR® 6,25 & 25 mg comprimés sécables (Carvédilol)

CARDINOR® 6,25 mg

30 comprimés sécables

6 118001 101368

antiarythmiques de la classe I (médicaque).

Indésirables

Sur des effets indésirables :
• tous les médicaments, CARDINOR, mais, bien que tout le monde n'y soit pas sensible, certains sont classés ci-dessous pour leur fréquence (touche plus d'un patient sur 10) :

- étourdissement, maux de tête,
- insuffisance cardiaque,
- diminution de la tension artérielle,
- fatigue,

Fréquents (touche 1 à 10 patients sur 100) :

- bronchite, pneumonie, infection du nez et de la gorge,
- diminution du nombre de globule rouge dans le sang,
- prise de poids, augmentation du taux de cholestérol et de sucre dans le sang,
- dépression, trouble de l'humeur,
- modification de la vision, diminution du liquide lacrymal,
- diminution du rythme cardiaque, gonflement de la langue importante dans le corps (réention hydrique),
- sensation de vertige en position debout, perturbation de la circulation sanguine et/ou une insuffisance rénale,

• difficultés respiratoires, asthme,

- nausées, diarrhée, vomissements, ballonnements abdominaux,
- extrémités douloureuses,
- insuffisance rénale et anomalies de la fonction rénale,

• circulation sanguine et/ou une insuffisance rénale,

- œdème, douleur,
- Peu fréquent (touche 1 à 10 patients sur 1000) :

• trouble du sommeil,

- sensation vertigineuse, perte de conscience brusque et/ou trouble de la coordination,
- diminution de la conduction cardiaque, arrêt de pouls,

• réactions cutanées (tel que rougeur, inflammation et/ou érosion de la peau ou psoriasis ou lichen), chute des cheveux,

- trouble de l'érection,
- Rare (touche 1 à 10 patients sur 10 000) :

• diminution du taux de plaquettes dans le sang,

- nez bouché,
- Troubles de la miction,

Très rare (touche moins d'un patient sur 10 000) :

- diminution du taux de globule blanc dans le sang,
- réaction allergique,

• augmentation des enzymes hépatiques,

- incontinence urinaire chez les femmes,
- réactions cutanées sévères (par exemple érythème, syndrome de Lyell).

Déclaration des effets indésirables :

La déclaration des effets indésirables suspectés a pour objectif de permettre une surveillance continue du rapport à l'utilisation.

7. Mises en garde spéciales et précautions particulières

Adresssez-vous à votre médecin ou votre pharmacien si vous avez des symptômes ou des réactions indésirables.

• D'augmentation des troubles cardiaques, d'œdème (réention hydrique), de difficulté respiratoire et/ou de la nécessité d'une adaptation par votre médecin de votre dose de cardiaque.

• De diabète (ce médicament pouvant masquer les symptômes de l'hyperglycémie).

• De maladie rénale,

• D'extrémités froides,

• De ralentissement du rythme cardiaque,

• Des réactions allergiques,

• D'angor de Prinzmetal (variété d'angine de poitrine),

• De phéochromocytome (atteinte d'une glande surrénale sécrétant de l'adrénaline),

• De troubles thyroïdiens,

• De psoriasis (maladie de peau).

• D'antécédents de taux anormalement bas de la coagulation sanguine). Si vous devez subir une intervention chirurgicale, informez votre chirurgien que vous prenez ce médicament.

• Des réactions cutanées,

Si vous portez des lentilles de contact, le traiter avec précaution.

Si vous avez mal toléré ce médicament auparavant, il est recommandé de ne pas prendre ce médicament.

Ce médicament contient du lactose.

Si votre médecin vous a informé (e) d'une tolérance au lactose, contactez-le avant de prendre ce médicament.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les personnes atteintes d'un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose.

LOT : 211392

EXP : 08/2024

PPV : 47,00DH

de cette notice avant de prendre ce médicament.
Si vous avez un doute, demandez plus d'informations.

ment prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, car cela pourrait lui être nocif.

aveu ou si vous remarquez un effet indésirable non

mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

CARDINOR® 6,25mg Comprimés sécables, boîtes de 10, 30 et 60

CARDINOR® 25 mg Comprimés sécables, boîtes de 10, 30 et 60

1. Composition du médicament :

CARDINOR® 6,25 mg	CARDINOR® 25 mg
mg/Comprimé	

Substance active

Carvédilol	6,25 mg	25 mg
------------	---------	-------

Excipients: Lactose monohydraté, Cellulose microcristalline, Hypromellose faiblement substituée (L-HPC), Amidon de maïs. Oxyde de fer jaune. Silice colloïdale anhydre, Talc purifié, stéarate de magnésium ...q.s.p 1 Comprimé sécable

Liste des excipients à effet notoire : Lactose

2. Classe pharmaco thérapeutique ou le type d'activité

Alpha et betabloquant

3. Indications thérapeutiques

Ce médicament est prescrit dans le traitement de l'insuffisance cardiaque chronique symptomatique, en complément du traitement habituel de l'insuffisance cardiaque

4. Posologie

- POSOLOGIE ET VOIE D'ADMINISTRATION :

La posologie est adaptée à chaque patient.

Le traitement est instauré par une dose initiale de 3,125 mg.

Si cette première administration est bien tolérée, la posologie est augmentée progressivement sur au moins 6 semaines à 3,125 mg 2 fois par jour puis 6,25 mg 2 fois par jour puis 12,5 mg 2 fois par jour et enfin 25 mg 2 fois par jour. Chaque paquet de dose dure au minimum 2 semaines.

La posologie maximale habituellement recommandée est de 25 mg 2 fois par jour.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A LA PRESCRIPTION MÉDICALE.

- Mode d'administration

Voie orale.

Les comprimés doivent être avalés avec une quantité suffisante d'eau.

- Fréquence d'administration:

CARDINOR doit être pris au moment des repas, chaque jour à la même heure

- Durée du traitement :

SE CONFORMER A LA PRESCRIPTION MÉDICALE.

5. Contre-indications

Ne prenez jamais CARDINOR, comprimé sécable dans les cas suivants :

• Si vous êtes allergique à la substance active (carvédilol) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (cf. Composition).

• Si vous avez déjà eu une réaction allergique grave.

• Si vous êtes asthmatique ou si vous avez un encombrement sévère des bronches et des poumons (broncho-pneumopathie chronique obstructive) ou un rétrécissement des bronches (bronchospasme).

• Si votre cœur fonctionne très mal (insuffisance cardiaque sévère) malgré l'utilisation d'un traitements et que vous avez des gonflements (œdèmes), une présence anormale de liquide dans le ventre ou des difficultés à respirer. Dans ces cas, votre état peut nécessiter un traitement par voie veineuse.

• Si vous avez une défaillance grave du cœur (choc cardiogénique).

• Si vous avez des troubles de l'activité électrique du cœur pouvant entraîner un ralentissement des battements du cœur (bloc auriculo-ventriculaire du second et troisième degré, bloc sino-auriculaire, sauf si vous avez un pacemaker).

• Si votre cœur bat trop lentement.

• Si vous avez des troubles de la circulation sanguine au niveau des doigts (de type phénomène de Raynaud) ou dans les artères des jambes (arthrite).

• Si vous avez une tension artérielle très basse (hypotension sévère).

• Si vous avez une maladie du foie (insuffisance hépatique).

• En même temps que certains médicaments :

- la cimetidine (médicament utilisé pour traiter un ulcère de l'estomac ou de l'intestin),

tanakan 40mg

Ginkgo (extrait sec de)

71,30

comprimé
TILISE ?
médicaments

ans le
sables cognitifs

du sujet âgé (en particulier troubles de la mémoire) à l'exception de tout type de démence confirmée, de troubles secondaires à des médicaments, à une dépression ou à des troubles métaboliques.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TANAKAN 40 mg.

comprimé enrobé ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais TANAKAN 40 mg, comprimé entoilé :

- si vous êtes allergique au ginkgo ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

- si vous êtes enceinte.

Avertissements et précautions

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

En raison du risque d'accroissement des saignements en présence de préparations à base de ginkgo, arrêtez ce médicament 3 à 4 jours avant tout acte chirurgical. L'utilisation concomitante de ce médicament avec l'efavirenz est déconseillée.

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé.

TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé
• Si vous avez des prédispositions à saigner (terrain

avez un traitement
chez un pharmacien si
t pris ou
édicament.
d'autres
médicaments : anticoagulants
(phencoumarone, warfarine),
médicaments anti-plaquettes (clopidogrel),
acide salicylique et autres
anti-inflammatoires non stéroïdiens.
En cas de prise concomitante de ce
médicament avec la warfarine, une
surveillance est nécessaire, consultez
votre médecin.

En cas de prise concomitante de ce
médicament avec l'etexilate de
dabigatran, l'effet de celui-ci peut être
potentialisé, consultez votre médecin.
L'utilisation concomitante de ce médicament avec
l'efavirenz est déconseillée en raison du risque de
baisse de l'effet de ce dernier.

Le ginkgo peut augmenter la concentration de la
nifédipine. Chez certains individus, cette augmentation
peut être importante et provoquer des vertiges et une
augmentation de l'intensité de bouffées de chaleur.

Grossesse et allaitement

Ce médicament est contre-indiqué pendant la grossesse.
L'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant
l'allaitement.

TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé contient du lactose monohydraté.

3. COMMENT PRENDRE TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Les comprimés sont à prendre avec un demi-verre

tanakan 40 mg
30 COMPRIMÉS ENROBÉS
TANAKAN 40



6 118000 0115 5

farmacien si
t pris ou
édicament.
d'autres

médicaments : anticoagulants
(phencoumarone, warfarine),
médicaments anti-plaquettes (clopidogrel),
acide salicylique et autres
anti-inflammatoires non stéroïdiens.

En cas de prise concomitante de ce

médicament avec la warfarine, une

surveillance est nécessaire, consultez

votre médecin.

En cas de prise concomitante de ce

médicament avec l'etexilate de

dabigatran, l'effet de celui-ci peut être

potentialisé, consultez votre médecin.

L'utilisation concomitante de ce médicament avec
l'efavirenz est déconseillée en raison du risque de
baisse de l'effet de ce dernier.

Le ginkgo peut augmenter la concentration de la
nifédipine. Chez certains individus, cette augmentation
peut être importante et provoquer des vertiges et une
augmentation de l'intensité de bouffées de chaleur.

Grossesse et allaitement

Ce médicament est contre-indiqué pendant la grossesse.
L'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant
l'allaitement.

TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé contient du lactose monohydraté.

3. COMMENT PRENDRE TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Les comprimés sont à prendre avec un demi-verre

4000287-02

tanakan 40mg

Ginkgo (extrait sec de)

71,30

comprimé
TILISE ?
médicaments

ans le
sables cognitifs

du sujet âgé (en particulier troubles de la mémoire) à l'exception de tout type de démence confirmée, de troubles secondaires à des médicaments, à une dépression ou à des troubles métaboliques.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TANAKAN 40 mg.

comprimé enrobé ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais TANAKAN 40 mg, comprimé entoilé :

- si vous êtes allergique au ginkgo ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

- si vous êtes enceinte.

Avertissements et précautions

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

En raison du risque d'accroissement des saignements en présence de préparations à base de ginkgo, arrêtez ce médicament 3 à 4 jours avant tout acte chirurgical. L'utilisation concomitante de ce médicament avec l'efavirenz est déconseillée.

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé.

TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé
• Si vous avez des prédispositions à saigner (terrain

avez un traitement
chez un pharmacien si
t pris ou
édicament.
d'autres
médicaments : anticoagulants
(phencoumarone, warfarine),
médicaments anti-plaquettes (clopidogrel),
acide salicylique et autres
anti-inflammatoires non stéroïdiens.
En cas de prise concomitante de ce
médicament avec la warfarine, une
surveillance est nécessaire, consultez
votre médecin.

En cas de prise concomitante de ce
médicament avec l'etexilate de
dabigatran, l'effet de celui-ci peut être
potentialisé, consultez votre médecin.
L'utilisation concomitante de ce médicament avec
l'efavirenz est déconseillée en raison du risque de
baisse de l'effet de ce dernier.

Le ginkgo peut augmenter la concentration de la
nifédipine. Chez certains individus, cette augmentation
peut être importante et provoquer des vertiges et une
augmentation de l'intensité de bouffées de chaleur.

Grossesse et allaitement

Ce médicament est contre-indiqué pendant la grossesse.
L'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant
l'allaitement.

TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé contient du lactose monohydraté.

3. COMMENT PRENDRE TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Les comprimés sont à prendre avec un demi-verre

tanakan 40 mg
30 COMPRIMÉS ENROBÉS
TANAKAN 40



6 118000 0115 5

farmacien si
t pris ou
édicament.
d'autres

médicaments : anticoagulants
(phencoumarone, warfarine),
médicaments anti-plaquettes (clopidogrel),
acide salicylique et autres
anti-inflammatoires non stéroïdiens.

En cas de prise concomitante de ce

médicament avec la warfarine, une

surveillance est nécessaire, consultez

votre médecin.

En cas de prise concomitante de ce

médicament avec l'etexilate de

dabigatran, l'effet de celui-ci peut être

potentialisé, consultez votre médecin.

L'utilisation concomitante de ce médicament avec
l'efavirenz est déconseillée en raison du risque de
baisse de l'effet de ce dernier.

Le ginkgo peut augmenter la concentration de la
nifédipine. Chez certains individus, cette augmentation
peut être importante et provoquer des vertiges et une
augmentation de l'intensité de bouffées de chaleur.

Grossesse et allaitement

Ce médicament est contre-indiqué pendant la grossesse.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant
l'allaitement.

TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé contient du

lactose monohydraté.

3. COMMENT PRENDRE TANAKAN 40 mg,

comprimé enrobé ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Les comprimés sont à prendre avec un demi-verre

4000287-02

tanakan 40mg

Ginkgo (extrait sec de)

71,30

comprimé
TILISE ?
médicaments

ans le
sables cognitifs

du sujet âgé (en particulier troubles de la mémoire) à l'exception de tout type de démence confirmée, de troubles secondaires à des médicaments, à une dépression ou à des troubles métaboliques.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TANAKAN 40 mg.

comprimé enrobé ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais TANAKAN 40 mg, comprimé entoilé :

- si vous êtes allergique au ginkgo ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

- si vous êtes enceinte.

Avertissements et précautions

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

En raison du risque d'accroissement des saignements en présence de préparations à base de ginkgo, arrêtez ce médicament 3 à 4 jours avant tout acte chirurgical. L'utilisation concomitante de ce médicament avec l'efavirenz est déconseillée.

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé.

TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé
• Si vous avez des prédispositions à saigner (terrain

avez un traitement
chez un pharmacien si
t pris ou
édicament.
d'autres
médicaments : anticoagulants
(phencoumarone, warfarine),
médicaments anti-plaquettes (clopidogrel),
acide salicylique et autres
anti-inflammatoires non stéroïdiens.
En cas de prise concomitante de ce
médicament avec la warfarine, une
surveillance est nécessaire, consultez
votre médecin.

En cas de prise concomitante de ce
médicament avec l'etexilate de
dabigatran, l'effet de celui-ci peut être
potentialisé, consultez votre médecin.
L'utilisation concomitante de ce médicament avec
l'efavirenz est déconseillée en raison du risque de
baisse de l'effet de ce dernier.

Le ginkgo peut augmenter la concentration de la
nifédipine. Chez certains individus, cette augmentation
peut être importante et provoquer des vertiges et une
augmentation de l'intensité de bouffées de chaleur.

Grossesse et allaitement

Ce médicament est contre-indiqué pendant la grossesse.
L'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant
l'allaitement.

TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé contient du lactose monohydraté.

3. COMMENT PRENDRE TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Les comprimés sont à prendre avec un demi-verre

tanakan 40 mg
30 COMPRIMÉS ENROBÉS
TANAKAN 40



6 118000 0115 5

farmacien si
t pris ou
édicament.
d'autres

médicaments : anticoagulants
(phencoumarone, warfarine),
médicaments anti-plaquettes (clopidogrel),
acide salicylique et autres

anti-inflammatoires non

stéroïdiens).

En cas de prise concomitante de ce

médicament avec la warfarine, une

surveillance est nécessaire, consultez

votre médecin.

En cas de prise concomitante de ce

médicament avec l'etexilate de

dabigatran, l'effet de celui-ci peut être

potentialisé, consultez votre médecin.

L'utilisation concomitante de ce médicament avec
l'efavirenz est déconseillée en raison du risque de
baisse de l'effet de ce dernier.

Le ginkgo peut augmenter la concentration de la
nifédipine. Chez certains individus, cette augmentation
peut être importante et provoquer des vertiges et une
augmentation de l'intensité de bouffées de chaleur.

Grossesse et allaitement

Ce médicament est contre-indiqué pendant la grossesse.
L'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant
l'allaitement.

TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé contient du lactose monohydraté.

3. COMMENT PRENDRE TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Les comprimés sont à prendre avec un demi-verre

4000287-02

tanakan 40mg

Ginkgo (extrait sec de)

71,30

comprimé
TILISE ?
médicaments

ans le
sables cognitifs

du sujet âgé (en particulier troubles de la mémoire) à l'exception de tout type de démence confirmée, de troubles secondaires à des médicaments, à une dépression ou à des troubles métaboliques.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TANAKAN 40 mg.

comprimé enrobé ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais TANAKAN 40 mg, comprimé entoilé :

- si vous êtes allergique au ginkgo ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

- si vous êtes enceinte.

Avertissements et précautions

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

En raison du risque d'accroissement des saignements en présence de préparations à base de ginkgo, arrêtez ce médicament 3 à 4 jours avant tout acte chirurgical. L'utilisation concomitante de ce médicament avec l'efavirenz est déconseillée.

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé.

TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé
• Si vous avez des prédispositions à saigner (terrain

avez un traitement
chez un pharmacien si
t pris ou
édicament.
d'autres
médicaments : anticoagulants
(phencoumarone, warfarine),
médicaments anti-plaquettes (clopidogrel),
acide salicylique et autres
anti-inflammatoires non stéroïdiens.
En cas de prise concomitante de ce
médicament avec la warfarine, une
surveillance est nécessaire, consultez
votre médecin.

En cas de prise concomitante de ce
médicament avec l'etexilate de
dabigatran, l'effet de celui-ci peut être
potentialisé, consultez votre médecin.
L'utilisation concomitante de ce médicament avec
l'efavirenz est déconseillée en raison du risque de
baisse de l'effet de ce dernier.

Le ginkgo peut augmenter la concentration de la
nifédipine. Chez certains individus, cette augmentation
peut être importante et provoquer des vertiges et une
augmentation de l'intensité de bouffées de chaleur.

Grossesse et allaitement

Ce médicament est contre-indiqué pendant la grossesse.
L'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant
l'allaitement.

TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé contient du lactose monohydraté.

3. COMMENT PRENDRE TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Les comprimés sont à prendre avec un demi-verre

tanakan 40 mg
30 COMPRIMÉS ENROBÉS
TANAKAN 40



6 118000 0115 5

farmacien si
t pris ou
édicament.
d'autres

médicaments : anticoagulants
(phencoumarone, warfarine),
médicaments anti-plaquettes (clopidogrel),
acide salicylique et autres
anti-inflammatoires non stéroïdiens.

En cas de prise concomitante de ce

médicament avec la warfarine, une

surveillance est nécessaire, consultez

votre médecin.

En cas de prise concomitante de ce

médicament avec l'etexilate de

dabigatran, l'effet de celui-ci peut être

potentialisé, consultez votre médecin.

L'utilisation concomitante de ce médicament avec
l'efavirenz est déconseillée en raison du risque de
baisse de l'effet de ce dernier.

Le ginkgo peut augmenter la concentration de la
nifédipine. Chez certains individus, cette augmentation
peut être importante et provoquer des vertiges et une
augmentation de l'intensité de bouffées de chaleur.

Grossesse et allaitement

Ce médicament est contre-indiqué pendant la grossesse.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant
l'allaitement.

TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé contient du

lactose monohydraté.

3. COMMENT PRENDRE TANAKAN 40 mg,

comprimé enrobé ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Les comprimés sont à prendre avec un demi-verre

tanakan 40mg

Ginkgo (extrait sec de)

71,30

comprimé
TILISE ?
médicaments

ans le
sables cognitifs

du sujet âgé (en particulier troubles de la mémoire) à l'exception de tout type de démence confirmée, de troubles secondaires à des médicaments, à une dépression ou à des troubles métaboliques.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TANAKAN 40 mg.

comprimé enrobé ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais TANAKAN 40 mg, comprimé entoilé :

- si vous êtes allergique au ginkgo ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

- si vous êtes enceinte.

Avertissements et précautions

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

En raison du risque d'accroissement des saignements en présence de préparations à base de ginkgo, arrêtez ce médicament 3 à 4 jours avant tout acte chirurgical. L'utilisation concomitante de ce médicament avec l'efavirenz est déconseillée.

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé.

TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé
• Si vous avez des prédispositions à saigner (terrain

avez un traitement
chez un pharmacien si
t pris ou
édicament.
d'autres
médicaments : anticoagulants
(phencoumarone, warfarine),
médicaments anti-plaquettes (clopidogrel),
acide salicylique et autres
anti-inflammatoires non stéroïdiens.
En cas de prise concomitante de ce
médicament avec la warfarine, une
surveillance est nécessaire, consultez
votre médecin.

En cas de prise concomitante de ce
médicament avec l'etexilate de
dabigatran, l'effet de celui-ci peut être
potentialisé, consultez votre médecin.
L'utilisation concomitante de ce médicament avec
l'efavirenz est déconseillée en raison du risque de
baisse de l'effet de ce dernier.

Le ginkgo peut augmenter la concentration de la
nifédipine. Chez certains individus, cette augmentation
peut être importante et provoquer des vertiges et une
augmentation de l'intensité de bouffées de chaleur.

Grossesse et allaitement

Ce médicament est contre-indiqué pendant la grossesse.
L'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant
l'allaitement.

TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé contient du lactose monohydraté.

3. COMMENT PRENDRE TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Les comprimés sont à prendre avec un demi-verre

tanakan 40 mg
30 COMPRIMÉS ENROBÉS
TANAKAN 40



6 118000 0115 5

farmacien si
t pris ou
édicament.
d'autres



4000287-02

tanakan 40mg

Ginkgo (extrait sec de)

71,30

comprimé
TILISE ?
médicaments

ans le
sables cognitifs

du sujet âgé (en particulier troubles de la mémoire) à l'exception de tout type de démence confirmée, de troubles secondaires à des médicaments, à une dépression ou à des troubles métaboliques.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TANAKAN 40 mg.

comprimé enrobé ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais TANAKAN 40 mg, comprimé entoilé :

- si vous êtes allergique au ginkgo ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

- si vous êtes enceinte.

Avertissements et précautions

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

En raison du risque d'accroissement des saignements en présence de préparations à base de ginkgo, arrêtez ce médicament 3 à 4 jours avant tout acte chirurgical. L'utilisation concomitante de ce médicament avec l'efavirenz est déconseillée.

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé.

TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé
• Si vous avez des prédispositions à saigner (terrain

avez un traitement
chez un pharmacien si
t pris ou
édicament.
d'autres
médicaments : anticoagulants
(phencoumarone, warfarine),
médicaments anti-plaquettes (clopidogrel),
acide salicylique et autres
anti-inflammatoires non stéroïdiens.
En cas de prise concomitante de ce
médicament avec la warfarine, une
surveillance est nécessaire, consultez
votre médecin.

En cas de prise concomitante de ce
médicament avec l'etexilate de
dabigatran, l'effet de celui-ci peut être
potentialisé, consultez votre médecin.
L'utilisation concomitante de ce médicament avec
l'efavirenz est déconseillée en raison du risque de
baisse de l'effet de ce dernier.

Le ginkgo peut augmenter la concentration de la
nifédipine. Chez certains individus, cette augmentation
peut être importante et provoquer des vertiges et une
augmentation de l'intensité de bouffées de chaleur.

Grossesse et allaitement

Ce médicament est contre-indiqué pendant la grossesse.
L'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant
l'allaitement.

TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé contient du lactose monohydraté.

3. COMMENT PRENDRE TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Les comprimés sont à prendre avec un demi-verre

tanakan 40 mg
30 COMPRIMÉS ENROBÉS
TANAKAN 40



6 118000 0115 5

farmacien si
t pris ou
édicament.
d'autres

médicaments : anticoagulants
(phencoumarone, warfarine),
médicaments anti-plaquettes (clopidogrel),
acide salicylique et autres

anti-inflammatoires non

stéroïdiens).

En cas de prise concomitante de ce

médicament avec la warfarine, une

surveillance est nécessaire, consultez

votre médecin.

En cas de prise concomitante de ce

médicament avec l'etexilate de

dabigatran, l'effet de

celui-ci peut être

potentialisé, consultez

votre médecin.

L'utilisation concomitante de ce médicament avec

l'efavirenz est déconseillée en raison du risque de

baisse de l'effet de ce dernier.

Le ginkgo peut augmenter la concentration de la

nifédipine. Chez certains individus, cette augmentation

peut être importante et provoquer des vertiges et une

augmentation de l'intensité de bouffées de chaleur.

Grossesse et allaitement

Ce médicament est contre-indiqué pendant la grossesse.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant

l'allaitement.

TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé contient du

lactose monohydraté.

3. COMMENT PRENDRE TANAKAN 40 mg,

comprimé enrobé ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant

exactement les indications de votre médecin ou

pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou

pharmacien en cas de doute.

Les comprimés sont à prendre avec un demi-verre

4000287-02

tanakan 40mg

Ginkgo (extrait sec de)

71,30

comprimé
TILISE ?
médicaments

ans le
sables cognitifs

du sujet âgé (en particulier troubles de la mémoire) à l'exception de tout type de démence confirmée, de troubles secondaires à des médicaments, à une dépression ou à des troubles métaboliques.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TANAKAN 40 mg.

comprimé enrobé ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais TANAKAN 40 mg, comprimé entoilé :

- si vous êtes allergique au ginkgo ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

- si vous êtes enceinte.

Avertissements et précautions

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

En raison du risque d'accroissement des saignements en présence de préparations à base de ginkgo, arrêtez ce médicament 3 à 4 jours avant tout acte chirurgical. L'utilisation concomitante de ce médicament avec l'efavirenz est déconseillée.

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé.

TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé
• Si vous avez des prédispositions à saigner (terrain

avez un traitement avec un traitemen
es
30 COMPRIMÉS ENROBÉS
AKAN 40



6 118000 0115 5

médicaments : anticoagulants (phencoumarone, warfarine), médicaments anti-plaquettes (clopidogrel), acide salicylique et autres anti-inflammatoires non stéroïdiens.

En cas de prise concomitante de ce médicament avec la warfarine, une surveillance est nécessaire, consultez votre médecin.

En cas de prise concomitante de ce médicament avec l'etexilate de dabigatran, l'effet de celui-ci peut être potentiellement, consultez votre médecin. L'utilisation concomitante de ce médicament avec l'efavirenz est déconseillée en raison du risque de baisse de l'effet de ce dernier.

Le ginkgo peut augmenter la concentration de la nifédipine. Chez certains individus, cette augmentation peut être importante et provoquer des vertiges et une augmentation de l'intensité de bouffées de chaleur.

Grossesse et allaitement

Ce médicament est contre-indiqué pendant la grossesse. L'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant l'allaitement.

TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé contient du lactose monohydraté.

3. COMMENT PRENDRE TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Les comprimés sont à prendre avec un demi-verre

tanakan 40mg

Ginkgo (extrait sec de)

71,30

comprimé
TILISE ?
médicaments

ans le
sables cognitifs

du sujet âgé (en particulier troubles de la mémoire) à l'exception de tout type de démence confirmée, de troubles secondaires à des médicaments, à une dépression ou à des troubles métaboliques.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TANAKAN 40 mg.

comprimé enrobé ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais TANAKAN 40 mg, comprimé entoilé :

- si vous êtes allergique au ginkgo ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

- si vous êtes enceinte.

Avertissements et précautions

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

En raison du risque d'accroissement des saignements en présence de préparations à base de ginkgo, arrêtez ce médicament 3 à 4 jours avant tout acte chirurgical. L'utilisation concomitante de ce médicament avec l'efavirenz est déconseillée.

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé.

• Si vous avez des prédispositions à saigner (terrain

avez un traitement
chez un pharmacien si
t pris ou
édicament.
d'autres
médicaments : anticoagulants
(phencoumarone, warfarine),
médicaments anti-plaquettes (clopidogrel),
acide salicylique et autres
anti-inflammatoires non stéroïdiens.
En cas de prise concomitante de ce médicament avec la warfarine, une surveillance est nécessaire, consultez votre médecin.

En cas de prise concomitante de ce médicament avec l'etexilate de dabigatran, l'effet de celui-ci peut être potentiellement, consultez votre médecin.
L'utilisation concomitante de ce médicament avec l'efavirenz est déconseillée en raison du risque de baisse de l'effet de ce dernier.

Le ginkgo peut augmenter la concentration de la nifédipine. Chez certains individus, cette augmentation peut être importante et provoquer des vertiges et une augmentation de l'intensité de bouffées de chaleur.

Grossesse et allaitement

Ce médicament est contre-indiqué pendant la grossesse. L'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant l'allaitement.

TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé contient du lactose monohydraté.

3. COMMENT PRENDRE TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Les comprimés sont à prendre avec un demi-verre

tanakan 40 mg
30 COMPRIMÉS ENROBÉS
TANAKAN 40



6 118000 0115 5

farmacien si
t pris ou
édicament.
d'autres

medicaments : anticoagulants
(phencoumarone, warfarine),
medicaments anti-plaquettes (clopidogrel),
acide salicylique et autres
anti-inflammatoires non steroïdiens.

En cas de prise concomitante de ce
medicament avec la warfarine, une
surveillance est necessaire, consultez
votre medecin.

En cas de prise concomitante de ce
medicament avec l'etexilate de

dabigatran, l'effet de

celui-ci peut etre

potentialise, consultez

votre medecin.

L'utilisation concomitante de ce medicament avec
l'efavirenz est deconseillee en raison du risque de
baisse de l'effet de ce dernier.

Le ginkgo peut augmenter la concentration de la
nifedipine. Chez certains individus, cette augmentation
peut etre importante et provoquer des vertiges et une
augmentation de l'intensite de bouffees de chaleur.

Grossesse et allaitement

Ce medicament est contre-indique pendant la grossesse.
L'utilisation de ce medicament est deconseillee pendant
l'allaitement.

**TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé contient du
lactose monohydraté.**

3. COMMENT PRENDRE TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé ?

Veillez a toujours prendre ce medicament en suivant
exactement les indications de votre medecin ou
pharmacien. Vérifiez aupres de votre medecin ou
pharmacien en cas de doute.

Les comprimes sont a prendre avec un demi-verre

tanakan 40mg

Ginkgo (extrait sec de)

71,30

comprimé
TILISE ?
médicaments

ans le
sables cognitifs

du sujet âgé (en particulier troubles de la mémoire) à l'exception de tout type de démence confirmée, de troubles secondaires à des médicaments, à une dépression ou à des troubles métaboliques.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TANAKAN 40 mg.

comprimé enrobé ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais TANAKAN 40 mg, comprimé entoilé :

- si vous êtes allergique au ginkgo ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

- si vous êtes enceinte.

Avertissements et précautions

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

En raison du risque d'accroissement des saignements en présence de préparations à base de ginkgo, arrêtez ce médicament 3 à 4 jours avant tout acte chirurgical. L'utilisation concomitante de ce médicament avec l'efavirenz est déconseillée.

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé.

TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé
• Si vous avez des prédispositions à saigner (terrain

avez un traitement
chez un pharmacien si
t pris ou
édicament.
d'autres
médicaments : anticoagulants
(phencoumarone, warfarine),
médicaments anti-plaquettes (clopidogrel),
acide salicylique et autres
anti-inflammatoires non stéroïdiens.
En cas de prise concomitante de ce
médicament avec la warfarine, une
surveillance est nécessaire, consultez
votre médecin.

En cas de prise concomitante de ce
médicament avec l'etexilate de
dabigatran, l'effet de celui-ci peut être
potentialisé, consultez votre médecin.
L'utilisation concomitante de ce médicament avec
l'efavirenz est déconseillée en raison du risque de
baisse de l'effet de ce dernier.

Le ginkgo peut augmenter la concentration de la
nifédipine. Chez certains individus, cette augmentation
peut être importante et provoquer des vertiges et une
augmentation de l'intensité de bouffées de chaleur.

Grossesse et allaitement

Ce médicament est contre-indiqué pendant la grossesse.
L'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant
l'allaitement.

TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé contient du lactose monohydraté.

3. COMMENT PRENDRE TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Les comprimés sont à prendre avec un demi-verre

tanakan 40 mg
30 COMPRIMÉS ENROBÉS
TANAKAN 40



6 118000 0115 5

farmacien si
t pris ou
édicament.
d'autres

autres

tanakan 40mg

Ginkgo (extrait sec de)

71,30

comprimé
TILISE ?
médicaments

ans le
sables cognitifs

du sujet âgé (en particulier troubles de la mémoire) à l'exception de tout type de démence confirmée, de troubles secondaires à des médicaments, à une dépression ou à des troubles métaboliques.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TANAKAN 40 mg.

comprimé enrobé ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais **TANAKAN 40 mg, comprimé entoilé**:

- si vous êtes allergique au ginkgo ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

- si vous êtes enceinte.

Avertissements et précautions

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

En raison du risque d'accroissement des saignements en présence de préparations à base de ginkgo, arrêtez ce médicament 3 à 4 jours avant tout acte chirurgical. L'utilisation concomitante de ce médicament avec l'efavirenz est déconseillée.

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre

TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé.

• Si vous avez des prédispositions à saigner (terrain

avez un traitement
chez un pharmacien si
t pris ou
édicament.
d'autres
autres
anti-inflammatoires non stéroïdiens).
En cas de prise concomitante de ce médicament avec la warfarine, une surveillance est nécessaire, consultez votre médecin.

En cas de prise concomitante de ce médicament avec l'etexilate de dabigatran, l'effet de celui-ci peut être potentiellement augmenté. Consultez votre médecin. L'utilisation concomitante de ce médicament avec l'efavirenz est déconseillée en raison du risque de baisse de l'effet de ce dernier.

Le ginkgo peut augmenter la concentration de la nifédipine. Chez certains individus, cette augmentation peut être importante et provoquer des vertiges et une augmentation de l'intensité de bouffées de chaleur.

Grossesse et allaitement

Ce médicament est contre-indiqué pendant la grossesse. L'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant l'allaitement.

TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé contient du lactose monohydraté.

3. COMMENT PRENDRE TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Les comprimés sont à prendre avec un demi-verre

30 COMPRIMÉS ENROBÉS
TANAKAN 40



6 118000 0115 5

médicaments : anticoagulants (phencoumarone, warfarine), médicaments anti-plaquettes (clopidogrel), acide salicylique et autres

anti-inflammatoires non stéroïdiens).

En cas de prise concomitante de ce médicament avec la warfarine, une

surveillance est nécessaire, consultez votre médecin.

En cas de prise concomitante de ce médicament avec l'etexilate de

dabigatran, l'effet de celui-ci peut être potentiellement augmenté. Consultez votre médecin.

L'utilisation concomitante de ce médicament avec l'efavirenz est déconseillée en raison du risque de baisse de l'effet de ce dernier.

Le ginkgo peut augmenter la concentration de la nifédipine. Chez certains individus, cette augmentation peut être importante et provoquer des vertiges et une augmentation de l'intensité de bouffées de chaleur.

Grossesse et allaitement

Ce médicament est contre-indiqué pendant la grossesse. L'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant l'allaitement.

TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé contient du lactose monohydraté.

3. COMMENT PRENDRE TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Les comprimés sont à prendre avec un demi-verre

4000287-02

tanakan 40mg

Ginkgo (extrait sec de)

71,30

comprimé
TILISE ?
médicaments

ans le
sables cognitifs

du sujet âgé (en particulier troubles de la mémoire) à l'exception de tout type de démence confirmée, de troubles secondaires à des médicaments, à une dépression ou à des troubles métaboliques.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TANAKAN 40 mg.

comprimé enrobé ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais TANAKAN 40 mg, comprimé entoilé :

- si vous êtes allergique au ginkgo ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

- si vous êtes enceinte.

Avertissements et précautions

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

En raison du risque d'accroissement des saignements en présence de préparations à base de ginkgo, arrêtez ce médicament 3 à 4 jours avant tout acte chirurgical. L'utilisation concomitante de ce médicament avec l'efavirenz est déconseillée.

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé.

TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé
• Si vous avez des prédispositions à saigner (terrain

avez un traitement
chez un pharmacien si
t pris ou
édicament.
d'autres
médicaments : anticoagulants
(phencoumarone, warfarine),
médicaments anti-plaquettes (clopidogrel),
acide salicylique et autres
anti-inflammatoires non stéroïdiens.
En cas de prise concomitante de ce
médicament avec la warfarine, une
surveillance est nécessaire, consultez
votre médecin.

En cas de prise concomitante de ce
médicament avec l'etexilate de
dabigatran, l'effet de celui-ci peut être
potentialisé, consultez votre médecin.
L'utilisation concomitante de ce médicament avec
l'efavirenz est déconseillée en raison du risque de
baisse de l'effet de ce dernier.

Le ginkgo peut augmenter la concentration de la
nifédipine. Chez certains individus, cette augmentation
peut être importante et provoquer des vertiges et une
augmentation de l'intensité de bouffées de chaleur.

Grossesse et allaitement

Ce médicament est contre-indiqué pendant la grossesse.
L'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant
l'allaitement.

TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé contient du lactose monohydraté.

3. COMMENT PRENDRE TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Les comprimés sont à prendre avec un demi-verre

tanakan 40 mg
30 COMPRIMÉS ENROBÉS
TANAKAN 40



6 118000 0115 5

farmacien si
t pris ou
édicament.
d'autres

médicaments : anticoagulants
(phencoumarone, warfarine),
médicaments anti-plaquettes (clopidogrel),
acide salicylique et autres
anti-inflammatoires non stéroïdiens.

En cas de prise concomitante de ce

médicament avec la warfarine, une

surveillance est nécessaire, consultez

votre médecin.

En cas de prise concomitante de ce

médicament avec l'etexilate de

dabigatran, l'effet de celui-ci peut être

potentialisé, consultez votre médecin.

L'utilisation concomitante de ce médicament avec
l'efavirenz est déconseillée en raison du risque de
baisse de l'effet de ce dernier.

Le ginkgo peut augmenter la concentration de la
nifédipine. Chez certains individus, cette augmentation
peut être importante et provoquer des vertiges et une
augmentation de l'intensité de bouffées de chaleur.

Grossesse et allaitement

Ce médicament est contre-indiqué pendant la grossesse.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant
l'allaitement.

TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé contient du

lactose monohydraté.

3. COMMENT PRENDRE TANAKAN 40 mg,

comprimé enrobé ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant
exactement les indications de votre médecin ou
pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou
pharmacien en cas de doute.

Les comprimés sont à prendre avec un demi-verre

tanakan 40mg

Ginkgo (extrait sec de)

71,30

comprimé
TILISE ?
médicaments

ans le
sables cognitifs

du sujet âgé (en particulier troubles de la mémoire) à l'exception de tout type de démence confirmée, de troubles secondaires à des médicaments, à une dépression ou à des troubles métaboliques.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TANAKAN 40 mg.

comprimé enrobé ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais TANAKAN 40 mg, comprimé entoilé :

- si vous êtes allergique au ginkgo ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

- si vous êtes enceinte.

Avertissements et précautions

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

En raison du risque d'accroissement des saignements en présence de préparations à base de ginkgo, arrêtez ce médicament 3 à 4 jours avant tout acte chirurgical. L'utilisation concomitante de ce médicament avec l'efavirenz est déconseillée.

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé.

TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé
• Si vous avez des prédispositions à saigner (terrain

avez un traitement
chez un pharmacien si
t pris ou
édicament.
d'autres
médicaments : anticoagulants
(phencoumarone, warfarine),
médicaments anti-plaquettes (clopidogrel),
acide salicylique et autres
anti-inflammatoires non stéroïdiens.
En cas de prise concomitante de ce
médicament avec la warfarine, une
surveillance est nécessaire, consultez
votre médecin.

En cas de prise concomitante de ce
médicament avec l'etexilate de
dabigatran, l'effet de celui-ci peut être
potentialisé, consultez votre médecin.
L'utilisation concomitante de ce médicament avec
l'efavirenz est déconseillée en raison du risque de
baisse de l'effet de ce dernier.

Le ginkgo peut augmenter la concentration de la
nifédipine. Chez certains individus, cette augmentation
peut être importante et provoquer des vertiges et une
augmentation de l'intensité de bouffées de chaleur.

Grossesse et allaitement

Ce médicament est contre-indiqué pendant la grossesse.
L'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant
l'allaitement.

TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé contient du lactose monohydraté.

3. COMMENT PRENDRE TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Les comprimés sont à prendre avec un demi-verre

tanakan 40 mg
30 COMPRIMÉS ENROBÉS
TANAKAN 40



6 118000 0115 5

farmacien si
t pris ou
édicament.
d'autres

médicaments : anticoagulants
(phencoumarone, warfarine),
médicaments anti-plaquettes (clopidogrel),
acide salicylique et autres

anti-inflammatoires non

stéroïdiens).

En cas de prise concomitante de ce

médicament avec la warfarine, une

surveillance est nécessaire, consultez

votre médecin.

En cas de prise concomitante de ce

médicament avec l'etexilate de

dabigatran, l'effet de

celui-ci peut être

potentialisé, consultez

votre médecin.

L'utilisation concomitante de ce médicament avec
l'efavirenz est déconseillée en raison du risque de
baisse de l'effet de ce dernier.

Le ginkgo peut augmenter la concentration de la
nifédipine. Chez certains individus, cette augmentation
peut être importante et provoquer des vertiges et une
augmentation de l'intensité de bouffées de chaleur.

Grossesse et allaitement

Ce médicament est contre-indiqué pendant la grossesse.
L'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant
l'allaitement.

TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé contient du lactose monohydraté.

3. COMMENT PRENDRE TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Les comprimés sont à prendre avec un demi-verre

tanakan 40mg

Ginkgo (extrait sec de)

71,30

comprimé
TILISE ?
médicaments

ans le
sables cognitifs

du sujet âgé (en particulier troubles de la mémoire) à l'exception de tout type de démence confirmée, de troubles secondaires à des médicaments, à une dépression ou à des troubles métaboliques.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TANAKAN 40 mg.

comprimé enrobé ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais TANAKAN 40 mg, comprimé entoilé :

- si vous êtes allergique au ginkgo ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

- si vous êtes enceinte.

Avertissements et précautions

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

En raison du risque d'accroissement des saignements en présence de préparations à base de ginkgo, arrêtez ce médicament 3 à 4 jours avant tout acte chirurgical. L'utilisation concomitante de ce médicament avec l'efavirenz est déconseillée.

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé.

TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé
• Si vous avez des prédispositions à saigner (terrain

avez un traitement
chez un pharmacien si
t pris ou
édicament.
d'autres
médicaments : anticoagulants
(phencoumarone, warfarine),
médicaments anti-plaquettes (clopidogrel),
acide salicylique et autres
anti-inflammatoires non stéroïdiens.
En cas de prise concomitante de ce
médicament avec la warfarine, une
surveillance est nécessaire, consultez
votre médecin.

En cas de prise concomitante de ce
médicament avec l'etexilate de
dabigatran, l'effet de celui-ci peut être
potentialisé, consultez votre médecin.
L'utilisation concomitante de ce médicament avec
l'efavirenz est déconseillée en raison du risque de
baisse de l'effet de ce dernier.

Le ginkgo peut augmenter la concentration de la
nifédipine. Chez certains individus, cette augmentation
peut être importante et provoquer des vertiges et une
augmentation de l'intensité de bouffées de chaleur.

Grossesse et allaitement

Ce médicament est contre-indiqué pendant la grossesse.
L'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant
l'allaitement.

TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé contient du lactose monohydraté.

3. COMMENT PRENDRE TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Les comprimés sont à prendre avec un demi-verre

tanakan 40 mg
30 COMPRIMÉS ENROBÉS
TANAKAN 40



6 118000 0115 5

farmacien si
t pris ou
édicament.
d'autres

médicaments : anticoagulants
(phencoumarone, warfarine),
médicaments anti-plaquettes (clopidogrel),
acide salicylique et autres
anti-inflammatoires non stéroïdiens.

En cas de prise concomitante de ce

médicament avec la warfarine, une

surveillance est nécessaire, consultez

votre médecin.

En cas de prise concomitante de ce

médicament avec l'etexilate de

dabigatran, l'effet de celui-ci peut être

potentialisé, consultez votre médecin.

L'utilisation concomitante de ce médicament avec
l'efavirenz est déconseillée en raison du risque de
baisse de l'effet de ce dernier.

Le ginkgo peut augmenter la concentration de la
nifédipine. Chez certains individus, cette augmentation
peut être importante et provoquer des vertiges et une
augmentation de l'intensité de bouffées de chaleur.

Grossesse et allaitement

Ce médicament est contre-indiqué pendant la grossesse.
L'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant
l'allaitement.

TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé contient du

lactose monohydraté.

3. COMMENT PRENDRE TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Les comprimés sont à prendre avec un demi-verre

4000287-02

tanakan 40mg

Ginkgo (extrait sec de)

71,30

comprimé
TILISE ?
médicaments

ans le
sables cognitifs

du sujet âgé (en particulier troubles de la mémoire) à l'exception de tout type de démence confirmée, de troubles secondaires à des médicaments, à une dépression ou à des troubles métaboliques.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TANAKAN 40 mg.

comprimé enrobé ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais TANAKAN 40 mg, comprimé entoilé :

- si vous êtes allergique au ginkgo ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

- si vous êtes enceinte.

Avertissements et précautions

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

En raison du risque d'accroissement des saignements en présence de préparations à base de ginkgo, arrêtez ce médicament 3 à 4 jours avant tout acte chirurgical. L'utilisation concomitante de ce médicament avec l'efavirenz est déconseillée.

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé.

TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé
• Si vous avez des prédispositions à saigner (terrain

avez un traitement
chez un pharmacien si
t pris ou
édicament.
d'autres
médicaments : anticoagulants
(phencoumarone, warfarine),
médicaments anti-plaquettes (clopidogrel),
acide salicylique et autres
anti-inflammatoires non stéroïdiens.
En cas de prise concomitante de ce
médicament avec la warfarine, une
surveillance est nécessaire, consultez
votre médecin.

En cas de prise concomitante de ce
médicament avec l'etexilate de
dabigatran, l'effet de celui-ci peut être
potentialisé, consultez votre médecin.
L'utilisation concomitante de ce médicament avec
l'efavirenz est déconseillée en raison du risque de
baisse de l'effet de ce dernier.

Le ginkgo peut augmenter la concentration de la
nifédipine. Chez certains individus, cette augmentation
peut être importante et provoquer des vertiges et une
augmentation de l'intensité de bouffées de chaleur.

Grossesse et allaitement

Ce médicament est contre-indiqué pendant la grossesse.
L'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant
l'allaitement.

TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé contient du lactose monohydraté.

3. COMMENT PRENDRE TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Les comprimés sont à prendre avec un demi-verre

tanakan 40 mg
30 COMPRIMÉS ENROBÉS
TANAKAN 40



6 118000 0115 5

farmacien si
t pris ou
édicament.
d'autres

médicaments : anticoagulants
(phencoumarone, warfarine),
médicaments anti-plaquettes (clopidogrel),
acide salicylique et autres

anti-inflammatoires non

stéroïdiens).

En cas de prise concomitante de ce

médicament avec la warfarine, une

surveillance est nécessaire, consultez

votre médecin.

En cas de prise concomitante de ce

médicament avec l'etexilate de

dabigatran, l'effet de celui-ci peut être

potentialisé, consultez votre médecin.

L'utilisation concomitante de ce médicament avec
l'efavirenz est déconseillée en raison du risque de
baisse de l'effet de ce dernier.

Le ginkgo peut augmenter la concentration de la
nifédipine. Chez certains individus, cette augmentation
peut être importante et provoquer des vertiges et une
augmentation de l'intensité de bouffées de chaleur.

Grossesse et allaitement

Ce médicament est contre-indiqué pendant la grossesse.
L'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant
l'allaitement.

TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé contient du lactose monohydraté.

3. COMMENT PRENDRE TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Les comprimés sont à prendre avec un demi-verre

4000287-02

tanakan 40mg

Ginkgo (extrait sec de)

71,30

comprimé
TILISE ?
médicaments

ans le
sables cognitifs

du sujet âgé (en particulier troubles de la mémoire) à l'exception de tout type de démence confirmée, de troubles secondaires à des médicaments, à une dépression ou à des troubles métaboliques.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TANAKAN 40 mg.

comprimé enrobé ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais TANAKAN 40 mg, comprimé entoilé :

- si vous êtes allergique au ginkgo ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

- si vous êtes enceinte.

Avertissements et précautions

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

En raison du risque d'accroissement des saignements en présence de préparations à base de ginkgo, arrêtez ce médicament 3 à 4 jours avant tout acte chirurgical. L'utilisation concomitante de ce médicament avec l'efavirenz est déconseillée.

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé.

TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé
• Si vous avez des prédispositions à saigner (terrain

avez un traitement
chez un pharmacien si
t pris ou
édicament.
d'autres
autres
anti-inflammatoires non stéroïdiens).
En cas de prise concomitante de ce médicament avec la warfarine, une surveillance est nécessaire, consultez votre médecin.

En cas de prise concomitante de ce médicament avec l'etexilate de dabigatran, l'effet de celui-ci peut être potentiellement augmenté. L'utilisation concomitante de ce médicament avec l'efavirenz est déconseillée en raison du risque de baisse de l'effet de ce dernier.

Le ginkgo peut augmenter la concentration de la nifédipine. Chez certains individus, cette augmentation peut être importante et provoquer des vertiges et une augmentation de l'intensité de bouffées de chaleur.

Grossesse et allaitement

Ce médicament est contre-indiqué pendant la grossesse. L'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant l'allaitement.

TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé contient du lactose monohydraté.

3. COMMENT PRENDRE TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Les comprimés sont à prendre avec un demi-verre

tanakan 40 mg
30 COMPRIMÉS ENROBÉS
TANAKAN 40



6 118000 0115 5

medicaments : anticoagulants

(phencoumarone, warfarine),

medicaments anti-plaquettes (clopidogrel),

acide salicylique et autres

anti-inflammatoires non stéroïdiens).

En cas de prise concomitante de ce

médicament avec la warfarine, une

surveillance est nécessaire, consultez

votre médecin.

En cas de prise concomitante de ce

médicament avec l'etexilate de

dabigatran, l'effet de celui-ci peut être

potentialisé, consultez votre médecin.

L'utilisation concomitante de ce médicament avec

l'efavirenz est déconseillée en raison du risque de baisse de l'effet de ce dernier.

Le ginkgo peut augmenter la concentration de la nifédipine. Chez certains individus, cette augmentation peut être importante et provoquer des vertiges et une augmentation de l'intensité de bouffées de chaleur.

Grossesse et allaitement

Ce médicament est contre-indiqué pendant la grossesse. L'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant l'allaitement.

TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé contient du lactose monohydraté.

3. COMMENT PRENDRE TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Les comprimés sont à prendre avec un demi-verre



1- Dénomination du médicament

EXFORGE®

5mg/80mg, 5mg/160mg,

10mg/160mg,

Comprimés pelliculés. Boîte de 28.

Amlodipine / Valsartan

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin, ou à votre



611800103058 3

EXFORGE

5mg/80mg

28 comprimés pelliculés

PPV : 195,00 DH

3- Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

Exforge contient de l'amlopidine, un principe actif de la classe des antagonistes du calcium, et du valsartan, qui fait partie de la classe dite des antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II. Ces deux principes actifs ont pour effet de contrôler une tension artérielle élevée (hypertension artérielle). L'amlopidine bloque les canaux calcium des vaisseaux sanguins. Le valsartan agit en bloquant spécifiquement les sites de liaison endogènes (appelés récepteurs de l'angiotensine II). Il en résulte une relaxation des vaisseaux sanguins, ce qui fait baisser la tension artérielle.

4- Indications thérapeutiques :

Exforge est utilisé pour traiter l'hypertension artérielle chez des patients dont la tension doit être contrôlée par une préparation combinée.

Exforge doit être utilisé uniquement sur prescription médicale.

5- Posologie :

Il est déconseillé d'administrer Exforge aux adolescents de moins de 18 ans.



1- Dénomination du médicament

EXFORGE®

5mg/80mg, 5mg/160mg,

10mg/160mg,

Comprimés pelliculés. Boîte de 28.

Amlodipine / Valsartan

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin, ou à votre



611800103058 3

EXFORGE

5mg/80mg

28 comprimés pelliculés

PPV : 195,00 DH

3- Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

Exforge contient de l'amlopipine, un principe actif de la classe des antagonistes du calcium, et du valsartan, qui fait partie de la classe dite des antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II. Ces deux principes actifs ont pour effet de contrôler une tension artérielle élevée (hypertension artérielle). L'amlopipine bloque les canaux calcium des vaisseaux sanguins. Le valsartan agit en bloquant spécifiquement les sites de liaison endogènes (appelés récepteurs de l'angiotensine II). Il en résulte une relaxation des vaisseaux sanguins, ce qui fait baisser la tension artérielle.

4- Indications thérapeutiques :

Exforge est utilisé pour traiter l'hypertension artérielle chez des patients dont la tension doit être contrôlée par une préparation combinée.

Exforge doit être utilisé uniquement sur prescription médicale.

5- Posologie :

Il est déconseillé d'administrer Exforge aux adolescents de moins de 18 ans.



1- Dénomination du médicament

EXFORGE®

5mg/80mg, 5mg/160mg,

10mg/160mg,

Comprimés pelliculés. Boîte de 28.

Amlodipine / Valsartan

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin, ou à votre



611800103058 3

EXFORGE

5mg/80mg

28 comprimés pelliculés

PPV : 195,00 DH

3- Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

Exforge contient de l'amlopidine, un principe actif de la classe des antagonistes du calcium, et du valsartan, qui fait partie de la classe dite des antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II. Ces deux principes actifs ont pour effet de contrôler une tension artérielle élevée (hypertension artérielle). L'amlopidine bloque les canaux calcium des vaisseaux sanguins. Le valsartan agit en bloquant spécifiquement les sites de liaison endogènes (appelés récepteurs de l'angiotensine II). Il en résulte une relaxation des vaisseaux sanguins, ce qui fait baisser la tension artérielle.

4- Indications thérapeutiques :

Exforge est utilisé pour traiter l'hypertension artérielle chez des patients dont la tension doit être contrôlée par une préparation combinée.

Exforge doit être utilisé uniquement sur prescription médicale.

5- Posologie :

Il est déconseillé d'administrer Exforge aux adolescents de moins de 18 ans.



1- Dénomination du médicament

EXFORGE®

5mg/80mg, 5mg/160mg,

10mg/160mg,

Comprimés pelliculés. Boîte de 28.

Amlodipine / Valsartan

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin, ou à votre



611800103058 3

EXFORGE

5mg/80mg

28 comprimés pelliculés

PPV : 195,00 DH

3- Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

Exforge contient de l'amlopidine, un principe actif de la classe des antagonistes du calcium, et du valsartan, qui fait partie de la classe dite des antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II. Ces deux principes actifs ont pour effet de contrôler une tension artérielle élevée (hypertension artérielle). L'amlopidine bloque les canaux calcium des vaisseaux sanguins. Le valsartan agit en bloquant spécifiquement les sites de liaison endogènes (appelés récepteurs de l'angiotensine II). Il en résulte une relaxation des vaisseaux sanguins, ce qui fait baisser la tension artérielle.

4- Indications thérapeutiques :

Exforge est utilisé pour traiter l'hypertension artérielle chez des patients dont la tension doit être contrôlée par une préparation combinée.

Exforge doit être utilisé uniquement sur prescription médicale.

5- Posologie :

Il est déconseillé d'administrer Exforge aux adolescents de moins de 18 ans.



1- Dénomination du médicament

EXFORGE®

5mg/80mg, 5mg/160mg,

10mg/160mg,

Comprimés pelliculés. Boîte de 28.

Amlodipine / Valsartan

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin, ou à votre



611800103058 3

EXFORGE

5mg/80mg

28 comprimés pelliculés

PPV : 195,00 DH

3- Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

Exforge contient de l'amlopipine, un principe actif de la classe des antagonistes du calcium, et du valsartan, qui fait partie de la classe dite des antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II. Ces deux principes actifs ont pour effet de contrôler une tension artérielle élevée (hypertension artérielle). L'amlopipine bloque les canaux calcium des vaisseaux sanguins. Le valsartan agit en bloquant spécifiquement les sites de liaison endogènes (appelés récepteurs de l'angiotensine II). Il en résulte une relaxation des vaisseaux sanguins, ce qui fait baisser la tension artérielle.

4- Indications thérapeutiques :

Exforge est utilisé pour traiter l'hypertension artérielle chez des patients dont la tension doit être contrôlée par une préparation combinée.

Exforge doit être utilisé uniquement sur prescription médicale.

5- Posologie :

Il est déconseillé d'administrer Exforge aux adolescents de moins de 18 ans.



1- Dénomination du médicament

EXFORGE®

5mg/80mg, 5mg/160mg,

10mg/160mg,

Comprimés pelliculés. Boîte de 28.

Amlodipine / Valsartan

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin, ou à votre



611800103058 3

EXFORGE

5mg/80mg

28 comprimés pelliculés

PPV : 195,00 DH

3- Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

Exforge contient de l'amlopipine, un principe actif de la classe des antagonistes du calcium, et du valsartan, qui fait partie de la classe dite des antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II. Ces deux principes actifs ont pour effet de contrôler une tension artérielle élevée (hypertension artérielle). L'amlopipine bloque les canaux calcium des vaisseaux sanguins. Le valsartan agit en bloquant spécifiquement les sites de liaison endogènes (appelés récepteurs de l'angiotensine II). Il en résulte une relaxation des vaisseaux sanguins, ce qui fait baisser la tension artérielle.

4- Indications thérapeutiques :

Exforge est utilisé pour traiter l'hypertension artérielle chez des patients dont la tension doit être contrôlée par une préparation combinée.

Exforge doit être utilisé uniquement sur prescription médicale.

5- Posologie :

Il est déconseillé d'administrer Exforge aux adolescents de moins de 18 ans.



1- Dénomination du médicament

EXFORGE®

5mg/80mg, 5mg/160mg,

10mg/160mg,

Comprimés pelliculés. Boîte de 28.

Amlodipine / Valsartan

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin, ou à votre



611800103058 3

EXFORGE

5mg/80mg

28 comprimés pelliculés

PPV : 195,00 DH

3- Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

Exforge contient de l'amlopipine, un principe actif de la classe des antagonistes du calcium, et du valsartan, qui fait partie de la classe dite des antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II. Ces deux principes actifs ont pour effet de contrôler une tension artérielle élevée (hypertension artérielle). L'amlopipine bloque les canaux calcium des vaisseaux sanguins. Le valsartan agit en bloquant spécifiquement les sites de liaison endogènes (appelés récepteurs de l'angiotensine II). Il en résulte une relaxation des vaisseaux sanguins, ce qui fait baisser la tension artérielle.

4- Indications thérapeutiques :

Exforge est utilisé pour traiter l'hypertension artérielle chez des patients dont la tension doit être contrôlée par une préparation combinée.

Exforge doit être utilisé uniquement sur prescription médicale.

5- Posologie :

Il est déconseillé d'administrer Exforge aux adolescents de moins de 18 ans.

Cardioaspirine 100 mg/30cps
Acide acétylsalicylique

P.P.V. 27.70 DH
Bayer S.A.



Veuillez lire atte

- Gardez cette r
- Si vous avez d
cien.
- Ce médicament a été prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

cette notice avant de prendre ce médicament.

besoin de la relire.

tez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharma-



CARDIOASPIRINE®

100 mg, comprimés gastro-résistants



Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que CardioAspirine 100 mg et dans quel cas est-il utilisé ?

Cardioaspirine 100 mg/30cps
Acide acétylsalicylique

P.P.V. 27.70 DH
Bayer S.A.



Veuillez lire atte

- Gardez cette r
- Si vous avez d
cien.
- Ce médicament a été prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

cette notice avant de prendre ce médicament.

besoin de la relire.

tez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharma-



CARDIOASPIRINE®

100 mg, comprimés gastro-résistants



Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que CardioAspirine 100 mg et dans quel cas est-il utilisé ?

Cardioaspirine 100 mg/30cps
Acide acétylsalicylique

P.P.V. 27.70 DH
Bayer S.A.



Veuillez lire atte

- Gardez cette r
- Si vous avez d
cien.
- Ce médicament a été prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

cette notice avant de prendre ce médicament.

besoin de la relire.

tez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharma-



CARDIOASPIRINE®

100 mg, comprimés gastro-résistants



Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que CardioAspirine 100 mg et dans quel cas est-il utilisé ?

Last: AMARI
First: KHADJA
ID:
DOB:
Age: 0yr
Sex: F
*Dr Saad
Professeur de Cardiologie
35 Rue Hossegor et Maâni
Casablanca*

28-Feb-2023 03:24:06

Vent rate: 68 BPM
PR int: 184 ms
QRS dur: 137 ms
QT/QTc: 420 / 438 ms
P-R-T axes: 102 -63 71

RYTHME SINUSAL AVEC ARYTHMIE SINUSALE
BLOC DE BRANCHE DROIT COMPLET
HEMIBLOC ANTERIEUR GAUCHE
TRACE EN FAVEUR D'HVG DEVANT
ECG ANORMAL

Revu par _____



Site # 0 Cart # 0 ELI Link 4.11.6.0 Sequence # 61750 25mm/s 10mm/mV 0.05-300 Hz