

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



Déclaration de Maladie

N° W21-780033

☒ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)


Matricule : 1537 Société : RAM
☐ Actif ☒ Pensionné(e) ☐ Autre :
 Nom & Prénom : HOUBAN MOHAMED
 Date de naissance : 16.06.50
 Adresse : BD. TAHA HOUSSEN, RUE 61 N°3 NADOR
 Tél. : 0661089117 Total des frais engagés : #738,70 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin : 
 Date de consultation : 05/11/23
 Nom et prénom du malade : AMROUSSI YAMNA Age : 68 ANS
 Lien de parenté : ☐ Lui-même ☒ Conjoint ☐ Enfant
 Nature de la maladie : Bimétabolisme
 En cas d'accident préciser les causes et circonstances : —

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : NADOR Le : 05/10/2023
 Signature de l'adhérent(e) : 

Autorisation CNDF N° : A-A-215/2019

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
05/11/23	C5	-	100,00	081035792 Cachet du Médecin N°13 05-30-81 05-91

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
 Bd. Taha Hassen N°65 - NADOR Tél: 05.36.60.55	05.04.23	538,70 DH



[illegible][illegible]

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INF :														
				COEFFICIENT DES TRAVAUX														
				MONTANTS DES SOINS														
				DEBUT D'EXECUTION														
				FIN D'EXECUTION														
O.D.F. PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <th>D</th> <th>G</th> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> <tr> <th colspan="2">B</th> </tr> </tbody> </table>			H		25533412	21433552	00000000	00000000	D	G	00000000	00000000	35533411	11433553	B		COEFFICIENT DES TRAVAUX
	H																	
	25533412	21433552																
	00000000	00000000																
	D	G																
	00000000	00000000																
	35533411	11433553																
	B																	
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS														
				DATE DU DEVIS														
			DATE DE L'EXECUTION															

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Jamal BOUDHEN

Spécialiste en Médecine Interne

Diplômé de la Faculté de Médecine de Rabat

Diplômé d'Echographie Clinique

de la Faculté de Montpellier (France)



الدكتور جمال بوهن

اختصاصي في الطب الباطني

خريج كلية الطب بالرباط

حائز على دبلوم التشخيص بالصدى

من جامعة مونبيلييه بفرنسا

INPE 08103579 2

Nador, Le

05/04/93

الناظور، في

Nom :

Ammari hammam

66,30 x 2 - Darnid 5mg 1 hp

1 hp 2x 1/2 nt upon (3mms)

28,00 x 6 - glucophage 1000 1 hp

1 hp 2x 1/2 nt upon (3mms)

97,70 } + 49,40 - Amp 5mg 1 hp

1 hp 1/2 (3mms)

91,00 - Statinal 200 mg 1 hp

1 hp 1/2 (3mms)

Pharmacie Babel
Bd. Taha Hciem, N°65 - NADOR
INPE: 082013558 - Tél: 05.36.60.55.44

Dr. Jamal BOUDHEN
Spécialiste en Médecine Interne
110, Rue Al Massira Appt N°13
2ème Etage NADOR Tél: 05.36.33.67.97

110، شارع المسيرة، شقة رقم 13 - الطابق الثاني (قبالة مقر البنك الشعبي) الهاتف : 05 36 33 67 97 - الناظور

110, Rue Al Massira, Appt. n° 13 - 2^{ème} Etage (en face du siège de la Banque Populaire) - Tél.: 05 36 33 67 97 - NADOR

80 mg. Le risque d'atteinte musculaire est aussi plus grand chez certains patients. Parlez à votre médecin si un de ces éléments vous concerne :

- Vous consommez une grande quantité d'alcool,
- Vous avez des problèmes rénaux,
- Vous avez des problèmes thyroïdiens,
- Vous êtes 65 ans ou plus,
- Vous êtes une femme,
- Vous avez déjà eu des problèmes musculaires pendant un traitement par médicament hypolipémiant appelé "statine" ou "fibrate",
- Vous ou un membre proche de votre famille avez un trouble musculaire héréditaire.

Enfants

La sécurité d'emploi et l'efficacité ont été étudiées chez des garçons et des filles réglées depuis au moins un an âgés de 10 à 17 ans. **STATICOL®** n'a pas été étudié chez les enfants âgés de moins de 10 ans. Pour plus d'informations, parlez-en à votre médecin.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

Interactions avec d'autres médicaments :

En raison du risque accru de problèmes musculaires lors de la prise de **STATICOL®** avec les médicaments contenant l'une des substances actives suivantes (certains d'entre eux sont déjà listés dans la rubrique "Ne prenez pas **STATICOL®**"), il est particulièrement important que vous informiez votre médecin si vous prenez :

- Cyclosporine (souvent utilisée chez les patients transplantés),
- Dansol (une hormone de synthèse utilisée pour traiter l'endométriose, lorsque l'ovulation et la muqueuse utérine se développent à l'extérieur de l'utérus),
- Médicaments avec une substance active telle qu'itraconazole, kétoconazole, posaconazole ou voriconazole (utilisés pour traiter les infections fongiques),
- Fibrates avec des substances actives telles que gemfibrozil et bezafibrate (utilisés pour diminuer le cholestérol),
- Erythromycine, clarithromycine, tétracycline ou acide fusidique (utilisés pour traiter les infections bactériennes). Ne prenez pas d'acide fusidique pendant l'utilisation de ce médicament. Voir aussi la rubrique 4 de cette notice.
- Inhibiteurs de protéase du VIH tels qu'indinavir, nelfinavir, ritonavir et saquinavir (utilisés pour traiter le SIDA),
- Bocoprevir ou telaprevir (utilisés pour traiter les infections dues au virus de l'hépatite C),
- Néfazodone (antidépresseur),
- Médicament contenant la substance active cobicistat,
- Amiodarone (utilisé pour traiter un rythme cardiaque irrégulier),
- Vérapamil, diltiazem ou amlodipine (utilisés pour traiter l'hypertension artérielle, les douleurs thoraciques associées à une maladie cardiaque ou d'autres troubles cardiaques),
- Lomitapide (utilisé pour traiter une maladie génétique très grave et rare, liée au cholestérol),
- Colchicine (utilisée dans le traitement de la goutte).

De même que pour les médicaments listés ci-dessus, informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez ou avez pris un autre médicament obtenu sans ordonnance. En particulier, informez votre médecin si vous prenez des médicaments contenant l'une des substances actives suivantes :

- Des médicaments avec une substance active pour éviter la formation de caillots sanguins, tels que warfarine, phenprocoumon, acénocoumarol (anticoagulants),
- Du fenofibrate (également utilisé pour baisser le cholestérol),
- De la niacine (également utilisée pour baisser le cholestérol).
- De la rifampicine (utilisée dans le traitement de la tuberculose).

Vous devez également prévenir le médecin qui vous prescrit un nouveau médicament que vous prenez **STATICOL®**. **SIGNALER SYSTEMATIQUÉMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MEDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.**

Interactions avec les aliments et les boissons

Le jus de pamplemousse contient une ou plusieurs substances qui peuvent modifier la façon dont votre corps utilise certains médicaments, dont **STATICOL®**. La consommation de jus de pamplemousse doit être évitée.

GROSSESSE - ALLAITEMENT

Ne prenez pas **STATICOL®** si vous êtes enceinte, désirez le devenir ou pensez l'être. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, arrêtez immédiatement de prendre **STATICOL®** et consultez votre médecin. Ne prenez pas **STATICOL®** si vous allaitez, car on ne sait pas si ce médicament passe dans le lait maternel.

Demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Si vous êtes enceinte, désirez le devenir ou pensez l'être, ou si vous allaitez, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

EFFETS SUR LA CAPACITÉ

STATICOL® n'a pas ou peu

de conduite de véhicules ou de

après la prise de **STATICOL®**

CONDUITE A TENIR EN CAS

Si vous avez pris plus de

Consultez immédiatement

INFORMEZ IMMEDIATEMENT

CONDUITE A TENIR AU CAS

Si vous oubliez de prendre

Ne prenez pas un comprimé

RISQUE DE SYNDROME DE

informez-en votre médecin et

Liste 1

PRECAUTIONS PARTICULIERES

A conserver dans un endroit sec

Tenir hors de la portée et de la vue

Ne pas utiliser après la date de péremption

NOM ET ADRESSE DE L'EPI TITULAIRE

PHARMACIE

Rue Amyot d'Inville, Quartier Arsalane

Casablanca-Maroc

Dr. T. BELABDA - Pharmacien Responsable

Date de la dernière vérification du texte :

Mars 2021

91,00

avant.

The safety of amlodipine in human pregnancy has not been established. If you think you might be pregnant, or are planning to get pregnant, you must tell your doctor before you take AMEP®.

Breast-feeding:

It has been shown that amlodipine is passing into breast milk in small amounts. If you are breast-feeding or about to start breast-feeding you must tell your doctor before taking AMEP®.

If you are pregnant or breast-feeding, think you may be pregnant or are planning to have a baby, ask your doctor or pharmacist for advice before taking this medicine.

The possible effects on the ability to drive and use machines

AMEP® may affect your ability to drive or use machines. If the tablets make you feel sick, dizzy or tired, or give you a headache, do not drive or use machines and contact your doctor immediately.

Notices relating to excipients with known effect

Not applicable.

3. How to take AMEP® tablets?

Always take this medicine exactly as your doctor or pharmacist has told you. Check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

The recommended initial dose of AMEP® is 5 mg once daily. The dose can be increased to 10 mg of AMEP® once daily.

This medicine can be used before or after the consumption of food and drinks. You should take this medicine at the same time each day with a drink of water. Do not take AMEP® with grapefruit juice.

Use by children and adolescents

For children and adolescents (6-17 years old), the recommended usual starting dose is 2.5 mg a day. The maximum recommended dose is 5 mg a day. The tablets of AMEP® 2.5 mg are not currently available.

It is important to keep taking the tablets. Do not wait until your tablets are finished before seeing your doctor.

If you take more AMEP® tablets than you should:

Taking too many tablets may cause your blood pressure to become low or even dangerously low. You may feel dizzy, lightheaded, faint or weak. If blood pressure drop is severe enough shock can occur. Your skin could feel cool and clammy and you could lose consciousness. Seek immediate medical attention if you take too many AMEP®.

If you forget to take AMEP® tablets:

Do not worry. If you forget to take a tablet, leave out that dose completely. Take your next dose at the right time. Do not take a double dose to make up for a forgotten dose.

If you stop taking AMEP® tablets:

Your doctor will advise you how long to take this medicine. Your condition may return if you stop using this medicine before you are advised.

If you have any further questions on the use of this medicine, ask your doctor or pharmacist.

4. What are the possible side effects?

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them.

Visit your doctor immediately if you experience any of the following side effects after taking this medicine.

- Sudden wheeziness, chest pain, shortness of breath or difficulty in breathing
- Swelling of eyelids, face or lips
- Swelling of the tongue and throat which causes great difficulty breathing
- Severe skin reactions including intense skin rash, hives, reddening of the skin over your whole body, severe itching, blistering, peeling and swelling of the skin, inflammation of mucus membranes (Stevens-Johnson Syndrome, toxic epidermal necrolysis) or other allergic reactions.
- Heart attack, abnormal heart beat.
- Inflamed pancreas which may cause severe abdominal and back pain accompanied with feeling ve

The following v
or if it lasts for 1

Very common

• Oedema (fl

The following

problems or if

Common side

• Headache,

• Palpitations

• Abdominal

• Altered boi

• Tiredness, weakness

• Visual disturbances, double vision

• Muscle cramps

• Ankle swelling

Other side effects that have been reported include the following list. If any of these get serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell your doctor or pharmacist.

Uncommon side effects: may affect up to 1 in 100 people

- Mood changes, anxiety, depression, sleeplessness
- Trembling, taste abnormalities, fainting
- Numbness or tingling sensation in your limbs, loss of pain sensation
- Ringing in the ears
- Low blood pressure
- Sneezing and running nose caused by inflammation of the lining of the nose (rhinitis)
- Cough
- Dry mouth, vomiting (being sick)
- Hair loss, increased sweating, itchy skin, red patches on skin, skin discoloration
- Disorder in passing urine, increased need to urinate at night, increased number of times of passing urine
- Inability to obtain an erection, discomfort or enlargement of the breasts in men
- Pain, feeling unwell
- Joint or muscle pain, back pain
- Weight increase or decrease

Rare side effects: may affect up to 1 in 1 000 people

• Confusion

Very rare side effects: may affect up to 1 in 10 000 people

- Decreased numbers of white blood cells, decrease in blood platelets which may result in unusual bruising or easy bleeding
- Excess sugar in blood (hyperglycaemia)
- A disorder of the nerves which can cause muscular weakness, tingling or numbness
- Swelling of the gums
- Abdominal bloating (gastritis)
- Abnormal liver function, inflammation of the liver (hepatitis), yellowing of the skin (jaundice), liver enzyme increase which may have an effect on some medical tests
- Increased muscle tension
- Inflammation of blood vessels, often with skin rash
- Sensitivity to light
- Disorders combining rigidity, tremor, and/or movement disorders

Reporting of side effects.

The declaration of suspected side effects after authorization of the medicinal product is important. It allows continuous monitoring of the benefit / risk ratio of drugs.

5. How to store Amlodipine AMEP® Tablets?

- No special storage conditions.
- Keep out of the reach and sight of children
- Do not use this medicine after the expiry date which is stated on the pack
- Medicines should not be disposed of via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how to dispose of medicines no longer required. These measures will help to protect environment.

6. Further informations:

What AMEP® Tablets contains ?

For one tablet

Active substance :	AMEP 10 en mg	AMEP 5 en mg
Amlodipine besylate	13.90	6.95
Equivalent to amlodipine	10.00	5.00

Excipients: Microcrystalline cellulose, calcium hydrogen phosphate dihydrate, silica colloidal anhydrous, carboxymethyl starch (Type A), magnesium stearate.

List of Excipients with known effect: Not applicable.

Name and address of Marketing Authorisation Holder in Morocco

COOPER
PHARMA

41, rue Mohamed Diouri 20110 Casablanca

This leaflet was last revised in : January 2019

Conditions of regulation and delivery

Table A (list I).

The safety of amlodipine in human pregnancy has not been established. If you think you might be pregnant, or are planning to get pregnant, you must tell your doctor before you take AMEP®.

Breast-feeding:

It has been shown that amlodipine is passing into breast milk in small amounts. If you are breast-feeding or about to start breast-feeding you must tell your doctor before taking AMEP®.

If you are pregnant or breast-feeding, think you may be pregnant or are planning to have a baby, ask your doctor or pharmacist for advice before taking this medicine.

The possible effects on the ability to drive and use machines

AMEP® may affect your ability to drive or use machines. If the tablets make you feel sick, dizzy or tired, or give you a headache, do not drive or use machines and contact your doctor immediately.

Notices relating to excipients with known effect

Not applicable.

3. How to take AMEP® tablets?

Always take this medicine exactly as your doctor or pharmacist has told you. Check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

The recommended initial dose of AMEP® is 5 mg once daily. The dose can be increased to 10 mg of AMEP® once daily.

This medicine can be used before or after the consumption of food and drinks. You should take this medicine at the same time each day with a drink of water. Do not take AMEP® with grapefruit juice.

Use by children and adolescents

For children and adolescents (6-17 years old), the recommended usual starting dose is 2.5 mg a day. The maximum recommended dose is 5 mg a day. The tablets of AMEP® 2.5 mg are not currently available.

It is important to keep taking the tablets. Do not wait until your tablets are finished before seeing your doctor.

If you take more AMEP® tablets than you should:

Taking too many tablets may cause your blood pressure to become low or even dangerously low. You may feel dizzy, lightheaded, faint or weak. If blood pressure drops is severe enough shock can occur. Your skin could feel cool and clammy and you could lose consciousness. Seek immediate medical attention if you take too many AMEP®.

If you forget to take AMEP® tablets:

Do not worry. If you forget to take a tablet, leave out that dose completely. Take your next dose at the right time. Do not take a double dose to make up for a forgotten dose.

If you stop taking AMEP® tablets:

Your doctor will advise you how long to take this medicine. Your condition may return if you stop using this medicine before you are advised.

If you have any further questions on the use of this medicine, ask your doctor or pharmacist.

4. What are the possible side effects?

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them.

Visit your doctor immediately if you experience any of the following side effects after taking this medicine.

- Sudden wheeziness, chest pain, shortness of breath or difficulty in breathing
- Swelling of eyelids, face or lips
- Swelling of the tongue and throat which causes great difficulty breathing
- Severe skin reactions including intense skin rash, hives, reddening of the skin over your whole body, severe itching, blistering, peeling and swelling of the skin, inflammation of mucous membranes (Stevens-Johnson Syndrome, toxic epidermal necrolysis) or other allergic reactions.
- Heart attack, abnormal heart beat.
- Inflamed pancreas

with feeling very tired and headache accompanied by the following very severe problems

or if it lasts for more than 24 hours

Very common side effects

• Oedema (fluid retention)

The following are common side effects

• Headache, dizziness

• Palpitations (fast or irregular heartbeats)

• Abdominal pain

• Tiredness, weakness

• Visual disturbances, double vision

• Muscle cramps

• Ankle swelling

Other side effects that have been reported include the following list. If any of these get serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell your doctor or pharmacist.

Uncommon side effects: may affect up to 1 in 100 people

- Mood changes, anxiety, depression, sleeplessness
- Trembling, slight abnormalities, fainting
- Numbness or tingling sensation in your limbs, loss of pain sensation
- Ringing in the ears
- Low blood pressure
- Sneezing and running nose caused by inflammation of the lining of the nose (rhinitis)
- Cough
- Dry mouth, vomiting (being sick)
- Hair loss, increased sweating, itchy skin, red patches on skin, skin discoloration
- Disorder in passing urine, increased need to urinate at night, increased number of times of passing urine
- Inability to obtain an erection, discomfort or enlargement of the breasts in men
- Pain, feeling unwell
- Joint or muscle pain, back pain
- Weight increase or decrease

Rare side effects: may affect up to 1 in 10 000 people

• Confusion

Very rare side effects: may affect up to 1 in 10 000 people

- Decreased numbers of white blood cells, decrease in blood platelets which may result in unusual bruising or easy bleeding
- Excess sugar in blood (hyperglycaemia)
- A disorder of the nerves which can cause muscular weakness, tingling or numbness
- Swelling of the gums
- Abdominal bloating (gastritis)
- Abnormal liver function, inflammation of the liver (hepatitis), yellowing of the skin (jaundice), liver enzyme increase which may have an effect on some medical tests
- Increased muscle tension
- Inflammation of blood vessels, often with skin rash
- Sensitivity to light
- Disorders combining rigidity, tremor, and/or movement disorders

Reporting of side effects

The declaration of suspected side effects after authorization of the medicinal product is important. It allows continuous monitoring of the benefit / risk ratio of drugs.

5. How to store Amlodipine AMEP® Tablets?

- No special storage conditions.
- Keep out of the reach and sight of children
- Do not use this medicine after the expiry date which is stated on the pack
- Medicines should not be disposed of via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how to dispose of medicines no longer required. These measures will help to protect environment.

6. Further information:

What AMEP® Tablets contains ?

For one tablet

Active substance :	AMEP 10 en mg	AMEP 5 en mg
Amlodipine besylate	13.90	6.95
Equivalent to amlodipine	10.00	5.00

Excipients: Microcrystalline cellulose, calcium hydrogen phosphate dihydrate, silica colloidal anhydrous, carboxymethyl starch (Type A), magnesium stearate.

List of Excipients with known effect: Not applicable.

Name and address of Marketing Authorisation Holder in Morocco

COOPER
PHARMA

41, rue Mohamed Diouri 20110 Casablanca

This leaflet was last revised in : January 2019

Conditions of regulation and delivery

Table A (list I).

IMPRI/MEPEL 773.054.002.019

بحاجة إلى إرسولين وتولاع السكر في تعانين منه. عليك إعلام أو تقدير أن ذلك يحمل الذي يستعمله عند علاجك. هذا الدواء إذا كنت ترضعين طفلك أو إذا كانت لديك ألبية بضرعاء. **تخادم الألات:**

الانخفاض معدل السكر في الدم. هذا يعني أن ليس له تأثير على استخدام الألات. خاص إذا كنت تتناول كليوكافاج مع أدوية أخرى ضد السكر معدل السكر في الدم مثل الإنسولين. انخفاض معدل السكر (تنبؤات). أعراض انخفاض معدل السكر في الدم تشمل زيادة تعصب العرق، تسارع نظم القلب، اضطرابات البصر، دسيرة ولا تستخدم إلا إذا بدأت بالإنسولين بهذه الأعراض.

كليوكافاج قرص مخلف: نصفاها كالتالي. عليك استشارة الطبيب

نظام المعيشي الجيد، عليك الاستمرار في اتباع نصائح والقيام بتمارين بدنية بصورة منتظمة.

ما فوق ولدى المراهقين: يبدأ العلاج عادة بـ 500 مغ أو 1000 مغ في اليوم. الجرعة اليومية القصوى هي 2000 مغ متوزعة

الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 12 سنة يوصى به من طرف الطبيب، علم بأن الخبرة في ما يخص هذا الفئة

عادة بـ 500 مغ أو 850 مغ مع كليوكافاج مرتين أو ثلاث مرات القصوى هي 3000 مغ متوزعة على ثلاث دفعات.

تلي لكوك ضعيفة: سيصف لك الطبيب الجرعة التي ستلائمك أيضا، سيصف لك الطبيب الجرعة الواجب تناولها مع كليوكافاج.

تلي بصورة منتظمة معدل السكر في الدم لديك وسيضيف الجرعة التي لكليوكافاج تبعاً لمعدل السكر في الدم. عليك استشارة الطبيب بصورة منتظمة. نوع خاص لدى الأطفال ولدى المراهقين وكذلك لدى الستين. الطبيب أيضا يوصي في السنة على الأقل حالة كل كليتيك قد يكون من الضروري فحوصات إذا كنت ستم أو في حالة خلل وظيفية كليتيك.

اول كليوكافاج: في كليوكافاج أثناء وجبة الطعام أو بعدها. هذا سيسمح بتجنب التثورات غير

مضطربة. **الأفراص ولا تمضغها.** يبلغ كل قرص مع كاش ماء. تتناول جرعة واحدة في اليوم، تناولها في الصباح (مع وجبة الفطور).

تتناول جرعتين في اليوم، تناول جرعة في الصباح (مع وجبة الفطور) وجرعة في وجبة العشاء).

تتناول ثلاث جرعات في اليوم، تناول جرعة في الصباح (مع وجبة الفطور) وجرعة في وجبة الغداء وجرعة في المساء (مع وجبة العشاء).

بعد وضع الوقت، بأن مفعول كليوكافاج قوي جدا أو ضعيف جدا، عليك إعلام الصيدلي بذلك.

الطريقة: من كليوكافاج اكش مما كان يلزم: كليوكافاج اكش مما كان يلزم، قد يسبب ذلك حماسا لبيا. أعراض الحماس

محددة، مثل التعرق، أوجاع في البطن مع تشنجات عضلية، إحساس عام تعب شديد وسعويات في التنفس.

أض الأخرى انخفاض في درجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب، ناري من هذه الأعراض تحتاج إلى رؤية الطبيب على الفور لأن الحماس

أدي إلى غيبوبة. كليوكافاج قورا واتصل بالطبيب أو اقرب مستشفى على الفور. كليوكافاج

نصافة للتوضيح عن الجرعة المناسبة. تناول الجرعة التالية في موعدا المعتاد. **الانقطاع**

أخذ كليوكافاج

لديك أسئلة أخرى حول استعمال هذا الدواء، اطلب المزيد من المعلومات من الطبيب

ما هي التثورات غير المرغوبة المحتملة؟ يمكن أن يسبب الجلوكلوكافاج تأثيرا جانبيا نادرا جدا قد يؤثر على 1 من أصل 10000 شخص، ولكن تأثير جانبي خطير جدا يسمى الحماس البيني (انظر قسم "التحذيرات والاحتياطات"). إذا حدث توقف عن تناول كليوكافاج واتصل بالطبيب على الفور أو اذهب إلى اقرب مستشفى لأن الحماس البيني يمكن أن يؤدي إلى غيبوبة. ومن أجل كل الأدوية، يمكن أن يسبب هذا الدواء آثارا جانبية، حتى ولو أن كل الأشخاص غير معرضين لها.

قد تظهر التثورات غير المرغوبة التالية: **تثورات غير مرغوبة متواترة جدا (سجلت لدى أكثر من شخص من أصل 10 أشخاص)** اضطرابات هضمية، مثل الغثبان، التقيؤ، الإسهال، أوجاع في البطن، فقدان الشهية. تظهر هذه التثورات غير المرغوبة في أغلب الأحيان في بداية العلاج بكليوكافاج. قد يساعد توزيع الجرعات خلال النهار وتناول كليوكافاج أثناء وجبات الطعام أو حالا بعدها. إذا استمرت الأعراض، عليك التوقف عن تناول كليوكافاج واستشارة الطبيب. **تأثيرات غير مرغوبة متواترة (سجلت لدى أقل من شخص من أصل 10 أشخاص)** اضطراب مذاق.

تأثيرات غير مرغوبة نادرة جدا (سجلت لدى أقل من شخص من أصل 10 000 شخص) حماس لبني. هذه المضاعفة نادرة جدا، لكنها خطيرة، خاصة إذا كانت كليتيك لا تعملان بصورة جيدة.

أعراض الحماس البيني غير محددة (انظر القسم "التحذيرات والاحتياطات").

تغير في الفحوصات البولوية في ما يخص الكبد أو الكلى (انظر الكبد الذي قد يسبب التعب، فقدان الشهية، فقدان بعض الوزن، مع أو دون اصفرار الجلد أو بياض العينين). إذا وجدت نفسك في هذه الحالة، عليك التوقف عن تناول كليوكافاج واستشارة الطبيب.

ردود فعل جلدية، مثل احمرار الجلد (حماسي) أو الحكاك أو طفح جلدي مع حكة (شرى). انخفاض معدل الفيتامين B12 في الدم.

الأطفال والمراهقون وقد أظهرت بيانات محدودة لدى الأطفال والمراهقين أن الآثار غير المرغوبة كانت مماثلة في طبيعتها وشدها لتلك التي سجلت لدى الكبار.

الإبلاغ عن الآثار الجانبية إذا حصلت على أي آثار جانبية، تحدث مع طبيبك أو الصيدلي. وينطبق هذا أيضا على أي تأثير غير مرغوب فيه لم يرد ذكره في هذه النشرة. يمكنك التبليغ عن التثورات غير المرغوبة مباشرة عبر النظام الوطني للتبليغ عن خلال الإبلاغ عن الآثار الجانبية، يمكنك المساعدة في تقديم المزيد من المعلومات حول سلامة الدواء.

5- ما هي طريقة حفظ كليوكافاج، قرص مخلف: يحفظ هذا الدواء بعيدا عن متناول الأطفال وانظروهم.

لا يجوز استعمال كليوكافاج بعد التاريخ القصوى للاستعمال المذكور على العلبة أو على الصفحة المشكلة حاربا بعد علامة "EXP"، يشير هذا التاريخ إلى آخر يوم من الشهر. ليس هناك احتياطات خاصة بالحفظ.

6- محتوى العلبة ومعلومات إضافية لا يجب أبدا طرح الأدوية في مجاري المياه أو مع النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي عن كيفية التصرف في الدواء غير المستعمل. هذه الإجراءات لحماية البيئة.

على ماذا يحتوي كليوكافاج 500 مغ، قرص مخلف: المادة الفعالة هي: كلوريدرات المتفورمين.

يحتوي كل قرص مخلف على 500 مغ من كلوريدرات المتفورمين، مما يقابل 390مغ من المتفورمين قاعده.

السواغات هي: بوفيدون K30، ستيارات المغنيزيوم، هيبرميلوز، ما هو كليوكافاج 500 مغ، قرص مخلف وما هو محتوى العلبة؟

يصرف هذا الدواء بشكل قرص مخلف، يصر في علبة تحتوي على 10 قرص. **على ماذا يحتوي كليوكافاج 850 مغ، قرص مخلف:** المادة الفعالة هي: كلوريدرات المتفورمين.

يحتوي كل قرص مخلف على 850 مغ من كلوريدرات المتفورمين، مما يقابل 662,90 مغ من المتفورمين قاعده.

السواغات هي: بوفيدون K30، ستيارات المغنيزيوم، هيبرميلوز، ما هو كليوكافاج 850 مغ، قرص مخلف وما هو محتو العلبة؟

يصرف هذا الدواء بشكل قرص مخلف، يصر في علبة تحتوي على 10 قرص. **على ماذا يحتوي كليوكافاج 850 مغ، قرص مخلف:** المادة الفعالة هي: كلوريدرات المتفورمين.

يحتوي كل قرص مخلف على 850 مغ من كلوريدرات المتفورمين، مما يقابل 662,90 مغ من المتفورمين قاعده.

السواغات هي: بوفيدون K30، ستيارات المغنيزيوم، هيبرميلوز، ما هو كليوكافاج 850 مغ، قرص مخلف وما هو محتو العلبة؟

يصرف هذا الدواء بشكل قرص مخلف، يصر في علبة تحتوي على 10 قرص. **على ماذا يحتوي كليوكافاج 850 مغ، قرص مخلف:** المادة الفعالة هي: كلوريدرات المتفورمين.

يحتوي كل قرص مخلف على 850 مغ من كلوريدرات المتفورمين، مما يقابل 662,90 مغ من المتفورمين قاعده.

السواغات هي: بوفيدون K30، ستيارات المغنيزيوم، هيبرميلوز، ما هو كليوكافاج 850 مغ، قرص مخلف وما هو محتو العلبة؟

يصرف هذا الدواء بشكل قرص مخلف، يصر في علبة تحتوي على 10 قرص. **على ماذا يحتوي كليوكافاج 850 مغ، قرص مخلف:** المادة الفعالة هي: كلوريدرات المتفورمين.

LOT 221256
EXP 09/2025
PPV 28.00DH

صنع من طرف
COOPER
PHARMA

41، رفقة بديوي 20110 أدار البيضاء
بترخيص من ميرو سالتيني - فرنسا

تاريخ مراجعة هذه النشرة: 01/2017

بحاجة إلى إرسولين وتولاع السكر في تعانين منه. عليك إعلام أو تقدير أن ذلك يحمل الذي يستعمله عند علاجك. هذا الدواء إذا كنت ترضعين طفلك أو إذا كانت لديك ألبية بضرعاء. **تخادم الألات:**

الانخفاض معدل السكر في الدم. هذا يعني أن ليس له تأثير على استخدام الألات. خاص إذا كنت تتناول كليوكافاج مع أدوية أخرى ضد السكر معدل السكر في الدم مثل الإنسولين. انخفاض معدل السكر (تنبؤات). أعراض انخفاض معدل السكر في الدم تشمل زيادة تعصب العرق، تسارع نظم القلب، اضطرابات البصر، دسيرة ولا تستخدم إلا إذا بدأت بالإنسولين بهذه الأعراض.

كليوكافاج قرص مخلف: وصفها كطبيب، في حال الشك، عليك استشارة الطبيب

نظام المعيشي الجيد، عليك الاستمرار في اتباع نصائح والقيام بتمارين بدنية بصورة منتظمة.

ما فوق ولدى المراهقين: يبدأ العلاج عادة بـ 500 مغ أو 1000 مغ في اليوم. الجرعة اليومية القصوى هي 2000 مغ متوزعة

الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 12 سنة يوصى به من طرف الطبيب، علم بأن الخبرة في ما يخص هذا الفئة

عادة بـ 500 مغ أو 850 مغ مع كليوكافاج مرتين أو ثلاث مرات القصوى هي 3000 مغ متوزعة على ثلاث دفعات. **تلي لك ضعيفة:** سيصف لك الطبيب الجرعة التي ستلائمك أيضاً، سيصف لك الطبيب الجرعة الواجب تناولها مع كليوكافاج.

تلي بصورة منتظمة معدل السكر في الدم لديك وسيضيف الجرعة التي كليوكافاج تبعاً لمعدل السكر في الدم. عليك استشارة الطبيب بصورة منتظمة. **تلي خاص لدى الأطفال ولدى المراهقين:** وكذلك لدى الستين. طبيب أيضاً يوصي في السنة على الأقل حالة كل كليتيك قد يكون من الضروري فحوصات إذا كنت ستم أو في حالة خلل وظيفية كليتيك.

أول كليوكافاج: في كليوكافاج أثناء وجبة الطعام أو بعدها. هذا سيسمح بتجنب التثاثير غير

معتدلة. **الأعراض ولا تعضفها:** يبلغ كل قرص مع كأس ماء. تتناول جرعة واحدة في اليوم، تناولها في الصباح (مع وجبة الفطور). تتناول جرعتين في اليوم، تناول جرعة في الصباح (مع وجبة الفطور) وجرعة في

وجبة العشاء). تتناول ثلاث جرعات في اليوم، تناول جرعة في الصباح (مع وجبة الفطور) وجرعة وجبة الغداء وجرعة في المساء (مع وجبة العشاء). بعد بضع الوقت، بأن مفعول كليوكافاج قوي جداً أو ضعيف جداً، عليك إعلام الصيدلي بذلك.

الطريقة: من كليوكافاج اكش مما كان يلزم:

كليوكافاج أكثر مما كان يلزم، قد يسبب ذلك حماساً لبنيًا. أعراض الحماس محدودة، مثل التقيؤ، أوجاع في البطن مع تشنجات عضلية، إحساس عام تعب شديد وصعوبات في التنفس.

أض الأخرى انخفاض في درجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب، أي من هذه الأعراض تحتاج إلى رؤية الطبيب على الفور لأن الحماس قد يؤدي إلى غيبوبة.

كليوكافاج فوراً واتصل بالطبيب أو أقرب مستشفى على الفور. **كليوكافاج:** ساعفة للتوضيح عن الجرعة المناسبة، تناول الجرعة التالية في موعدا المعتاد.

الانقطاع: إذا أخذ كليوكافاج

لديك أسئلة أخرى حول استعمال هذا الدواء، اطلب المزيد من المعلومات من الطبيب

ما هي التثاثير غير المرغوبة المحتملة؟

من أن يسبب الجلوكونفاج تآثيراً جانبياً نادراً جداً قد يؤثر على 1 من أصل 10000 شخص، ولكن تآثير جانبي خطير جداً يسمى الحماس البيني (انظر قسم "التحذيرات والاحتياطات"). إذا حدث توقف عن تناول كليوكافاج واتصل بالطبيب على الفور أو اذهب إلى أقرب مستشفى لأن الحماس البيني يمكن أن يؤدي إلى غيبوبة. ومن أجل كل الأدوية، يمكن أن يسبب هذا الدواء آثاراً جانبية، حتى ولو أن كل الأشخاص غير معرضين لها.

قد تظهر التثاثير غير المرغوبة التالية. **تثاثيرات غير مرغوبة متواترة جداً (سجلت لدى أكثر من شخص من أصل 10 أشخاص):** اضطرابات هضمية، مثل الغثبان، التقيؤ، الإسهال، أوجاع في البطن، فقدان الشهية. تظهر هذه التثاثيرات غير المرغوبة في أغلب الأحيان في بداية العلاج بكليوكافاج. قد يساعد توزيع الجرعات خلال النهار وتناول كليوكافاج أثناء وجبات الطعام أو حلاً بعدها. إذا استمرت الأعراض، عليك التوقف عن تناول كليوكافاج واستشارة الطبيب. **تثاثيرات غير مرغوبة متواترة (سجلت لدى أقل من شخص من أصل 10 أشخاص):** اضطراب مذاق.

تثاثيرات غير مرغوبة نادرة جداً (سجلت لدى أقل من شخص من أصل 10 000 شخص): حماس لبني. هذه المصاعبة نادرة جداً، لكنها خطيرة، خاصة إذا كانت كليتيك لا تعملان بصورة جيدة.

أعراض الحماس البيني غير محددة (انظر القسم "التحذيرات والاحتياطات"). **تغير في الفحوصات البيولوجية في ما يخص الكبد أو الكلى:** الكلى (الكبد الكبد الذي قد يسبب التعب، فقدان الشهية، فقدان بعض الوزن، مع أو دون اصفرار الجلد أو بياض العينين). إذا وجدت نفسك في هذه الحالة، عليك التوقف عن تناول كليوكافاج واستشارة الطبيب.

ردود فعل جلدية، مثل احمرار الجلد (حماسي) أو الحكاك أو طفح جلدي مع حكة (شرى). انخفاض معدل الفيتامين B12 في الدم.

الأطفال والمراهقون: وقد أظهرت بيانات محدودة لدى الأطفال والمراهقين أن الآثار غير المرغوبة كانت مماثلة في طبيعتها وشدها لتلك التي سجلت لدى الكبار.

الإبلاغ عن الآثار الجانبية: إذا حصلت على أي آثار جانبية، تحدث مع طبيب أو الصيدلي. وينطبق هذا أيضاً على أي تآثير غير مرغوب فيه لم يرد ذكره في هذه النشرة. يمكنك التبليغ عن التثاثيرات غير المرغوبة مباشرة عبر النظام الوطني للتبليغ عن خلال الإبلاغ عن الآثار الجانبية، يمكنك المساعدة في تقديم المزيد من المعلومات حول سلامة الدواء.

5- ما هي طريقة حفظ كليوكافاج، قرص مخلف:

يُحفظ هذا الدواء بعيداً عن متناول الأطفال وانظارهم. لا يجوز استعمال كليوكافاج بعد التاريخ القصوى للاستعمال المذكور على العلبة أو على الصفحة المشكلة حارياً بعد علامة "EXP"، يشير هذا التاريخ إلى آخر يوم من الشهر.

6- محتوى العلبة ومعلومات إضافية: لا يجب إبداء طرح الأدوية في مجاري المياه أو مع النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي عن كيفية التصرف في الدواء غير المستعمل. هذه الإجراءات لحماية البيئة.

على ماذا يحتوي كليوكافاج 500 مغ، قرص مخلف:

المادة الفعالة هي: كلوريدات المنقورمين. يحتوي كل قرص مخلف على 500 مغ من كلوريدات المنقورمين، مما يقابل 390 مغ من المنقورمين قاعده.

السواغات هي: بوفيدون K30، ستيارات المغنيزيوم، هيبرميلوز،

ما هو كليوكافاج 500 مغ، قرص مخلف وما هو محتوى العلبة؟ يصرف هذا الدواء بشكل قرص مخلف، يصرف في علبة تحتوي على 10 قرص.

على ماذا يحتوي كليوكافاج 850 مغ، قرص مخلف:

المادة الفعالة هي: كلوريدات المنقورمين. يحتوي كل قرص مخلف على 850 مغ من كلوريدات المنقورمين، مما يقابل 662,90 مغ من المنقورمين قاعده.

السواغات هي: بوفيدون K30، ستيارات المغنيزيوم، هيبرميلوز،

ما هو كليوكافاج 850 مغ، قرص مخلف وما هو محتو العلبة؟ يصرف هذا الدواء بشكل قرص مخلف، يصرف في علبة تحتوي على 10 قرص.

على ماذا يحتوي كليوكافاج 850 مغ، قرص مخلف:

المادة الفعالة هي: كلوريدات المنقورمين. يحتوي كل قرص مخلف على 850 مغ من كلوريدات المنقورمين، مما يقابل 662,90 مغ من المنقورمين قاعده.

السواغات هي: بوفيدون K30، ستيارات المغنيزيوم، هيبرميلوز،

ما هو كليوكافاج 850 مغ، قرص مخلف وما هو محتو العلبة؟ يصرف هذا الدواء بشكل قرص مخلف، يصرف في علبة تحتوي على 10 قرص.

على ماذا يحتوي كليوكافاج 850 مغ، قرص مخلف:

المادة الفعالة هي: كلوريدات المنقورمين. يحتوي كل قرص مخلف على 850 مغ من كلوريدات المنقورمين، مما يقابل 662,90 مغ من المنقورمين قاعده.

السواغات هي: بوفيدون K30، ستيارات المغنيزيوم، هيبرميلوز،

LOT 221256
EXP 09/2025
PPV 28.00DH

صنع من طرف
COOPER
PHARMA

41، رفقة بيجوري 20110 أدار البيضاء
بترخيص من ميرو سالتيني - فرنسا

تاريخ مراجعة هذه النشرة: 01/2017

بحاجة إلى إرسولين لتوليع السكر في تعانين منه. عليك إعلام أو تعقيد ذلك حاصل لكي يستقيم عمل عواكج. هذا الدواء إذا كنت ترضعين طفلك أو إذا كانت لديك آليات بضرعاء. **تخدام الآلات:**

الانخفاض معدل السكر في الدم. هذا يعني أن ليس له تأثير على استخدام الآلات. خاص إذا كنت تتناول كليوكافاج مع أدوية أخرى ضد السكر معدل السكر في الدم مثل الإنسولين. انخفاض معدل السكر (تنبؤات). أعراض انخفاض معدل السكر في الدم تشمل زيادة تصبب العرق، تسارع نظم القلب، اضطرابات البصر، دسيرة ولا تستخدم إلا إذا بدأت بالإنسولين بهذه الأعراض.

كليوكافاج قرص مخلف: نصفاها كالتالي. عليك استشارة الطبيب

نظام المعيشي الجيد، عليك الاستمرار في اتباع نصائح والقيام بتمارين بدنية بصورة منتظمة.

ما فوق ولدى المراهقين: يبدأ العلاج عادة بـ 500 مغ أو 1000 مغ في اليوم. الجرعة اليومية القصوى هي 2000 مغ متوزعة

الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 12 سنة يوصى به من طرف الطبيب، علم بأن الخبرة في ما يخص هذا الفئة

عادة بـ 500 مغ أو 850 مغ مع كليوكافاج مرتين أو ثلاث مرات القصوى هي 3000 مغ متوزعة على ثلاث دفعات.

تلي لكوك ضعيفة: سيصف لك الطبيب الجرعة التي ستحتاجها. سيصف لك الطبيب الجرعة الواجب تناولها مع كليوكافاج.

تلي بصورة منتظمة معدل السكر في الدم لديك وسيضيف الجرعة التي كليوكافاج تبعاً لمعدل السكر في الدم. عليك استشارة الطبيب بصورة منتظمة. نوع خاص لدى الأطفال ولدى المراهقين وكذلك لدى الستين.

طبيب أيضا يوصي في السنة على الأقل حالة كل كليتيك قد يكون من الضروري فحوصات إذا كنت ستم أو في حالة خلل وظيفية كليتيك.

اول كليوكافاج: في كليوكافاج أثناء وجبة الطعام أو بعدها. هذا سيسمح بتجنب التثنيات غير

مضغمة. الأفراس ولا تمضغها. يبلغ كل قرص مع كأس ماء. تتناول جرعة واحدة في اليوم، تناولها في الصباح (مع وجبة الفطور).

تتناول جرعتين في اليوم، تناول جرعة في الصباح (مع وجبة الفطور) وجرعة في وجبة العشاء).

تتناول ثلاث جرعات في اليوم، تناول جرعة في الصباح (مع وجبة الفطور) وجرعة في وجبة الغداء وجرعة في المساء (مع وجبة العشاء).

بعد وضع الوقت، بأن مفعل كليوكافاج قوي جدا أو ضعيف جدا، عليك إعلام الصيدلي بذلك.

الطريقة: من كليوكافاج اكش مما كان يلزم: كليوكافاج اكش مما كان يلزم، قد يسبب ذلك حماسا لبثيا. أعراض الحماس

محددة، مثل التقيؤ، أوجاع في البطن مع تشنجات عضلية، إحساس عام تعب شديد وسعويات في التنفس.

أض الأخرى انخفاض في درجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب، ناري من هذه الأعراض تحتاج إلى رؤية الطبيب على الفور لأن الحماس

أدي إلى غيبوبة. كليوكافاج فورا واتصل بالطبيب أو أقرب مستشفى على الفور.

كليوكافاج: ساعفة للتوضيح عن الجرعة المناسبة، تناول الجرعة التالية في موعدا المعتاد.

الانقطاع: إذا أخذ كليوكافاج

قد تظهر التثنيات غير المرغوبة التالية.

تأثيرات غير مرغوبة متواترة جدا (سجلت لدى أكثر من شخص من أصل 10 أشخاص) اضطرابات هضمية، مثل الثقلان، التقيؤ، الإسهال، أوجاع في البطن، فقدان الشهية، تظهر هذه التأثيرات غير المرغوبة في أغلب الأحيان في بداية العلاج بكليوكافاج. قد يساعد توزيع الجرعات خلال النهار وتناول كليوكافاج أثناء وجبات الطعام أو حالا بعدها. إذا استمرت الأعراض، عليك التوقف عن تناول كليوكافاج واستشارة الطبيب.

تأثيرات غير مرغوبة متواترة (سجلت لدى أقل من شخص من أصل 10 أشخاص) اضطراب مذاق.

تأثيرات غير مرغوبة نادرة جدا (سجلت لدى أقل من شخص من أصل 10 000 شخص) حماس لبثي. هذه المصاعبة نادرة جدا، لكنها خطيرة، خاصة إذا كانت كليتيك لا تعلن بصورة جيدة.

أعراض الحماس البثي غير محددة (انظر القسم "التحذيرات والاحتياطات").

تغير في الفحوصات البولوية في ما يخص الكبد أو الكلى (انظر القسم "التحذيرات والاحتياطات").

يسبب التعب، فقدان الشهية، فقدان بعض الوزن، مع أو دون اصفرار الجلد أو بياض العينين). إذا وجدت نفسك في هذه الحالة، عليك التوقف عن تناول كليوكافاج واستشارة الطبيب.

ردود فعل جلدية، مثل احمرار الجلد (حماسي) أو الحكاك أو طفح جلدي مع حكة (شرى). انخفاض معدل الفيتامين B12 في الدم.

الأطفال والمراهقون: وقد أظهرت بيانات محدودة لدى الأطفال والمراهقين أن الآثار غير المرغوبة كانت مماثلة في طبيعتها وشدها لتلك التي سجلت لدى الكبار.

الإبلاغ عن الآثار الجانبية: إذا حصلت على أي آثار جانبية، تحدث مع طبيبك أو الصيدلي، وينطبق هذا أيضا على أي تأثير غير مرغوب فيه لم يرد ذكره في هذه النشرة. يمكنك التبليغ عن التأثيرات غير المرغوبة مباشرة عبر النظام الوطني للتبليغ عن خلال الإبلاغ عن الآثار الجانبية، يمكنك المساعدة في تقديم المزيد من المعلومات حول سلامة الدواء.

5- ما هي طريقة حفظ كليوكافاج ، قرص مخلف: يحفظ هذا الدواء بعيدا عن متناول الأطفال وانظراهم.

لا يجوز استعمال كليوكافاج بعد التاريخ القصوى للاستعمال المذكور على العلبة أو على الصفحة المشكلة حاربا بعد علامة "EXP" ، يشير هذا التاريخ إلى آخر يوم من الشهر.

6- محتوى العلبة و معلومات إضافية: لا يجب أبدا طرح الأدوية في مجاري المياه أو مع النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي عن كيفية التصرف في الدواء غير المستعمل، هذه الإجراءات لحماية البيئة.

على ماذا يحتوي كليوكافاج 500 مغ، قرص مخلف: المادة الفعالة هي: كلوريدرات المتفورمين.

يحتوي كل قرص مخلف على 500 مغ من كلوريدرات المتفورمين، مما يقابل 390مغ من المتفورمين قاعده.

السواغات هي: بوفيدون K30، ستيارات المغنيزيوم، هيبروميلوز ،

ما هو كليوكافاج 500 مغ، قرص مخلف وما هو محتوى العلبة؟ يصرف هذا الدواء بشكل قرص مخلف ، يصرف في علبة تحتوي على 10 قرص.

على ماذا يحتوي كليوكافاج 850 مغ، قرص مخلف: المادة الفعالة هي: كلوريدرات المتفورمين.

يحتوي كل قرص مخلف على 850 مغ من كلوريدرات المتفورمين، مما يقابل 662,90 مغ من المتفورمين قاعده.

السواغات هي: بوفيدون K30، ستيارات المغنيزيوم، هيبروميلوز ،

ما هو كليوكافاج 850 مغ، قرص مخلف وما هو محتوى العلبة؟ يصرف هذا الدواء بشكل قرص مخلف ، يصرف في علبة تحتوي على 10 قرص.

على ماذا يحتوي كليوكافاج 850 مغ، قرص مخلف: المادة الفعالة هي: كلوريدرات المتفورمين.

يحتوي كل قرص مخلف على 850 مغ من كلوريدرات المتفورمين، مما يقابل 662,90 مغ من المتفورمين قاعده.

LOT 221256
EXP 09/2025
PPV 28.00DH

صنع من طرف
COOPER
PHARMA

41، رفقة بديوي 20110 أدار البيضاء
بترخيص من ميرو سالتيني - فرنسا

تاريخ مراجعة هذه النشرة: 01/2017

بحاجة إلى إرسولين لتوليع السكر في تعانين منه. عليك إعلام أو تعقيد ذلك حاصل لكي يستقيم عمل عواكج. هذا الدواء إذا كنت ترضعين طفلك أو إذا كانت لديك آليات بضرعاء. **تخدام الآلات:**

الانخفاض معدل السكر في الدم. هذا يعني أن ليس له تأثير على استخدام الآلات. خاص إذا كنت تتناول كليوكافاج مع أدوية أخرى ضد السكر معدل السكر في الدم مثل الإنسولين. انخفاض معدل السكر (تنبؤات). أعراض انخفاض معدل السكر في الدم تشمل زيادة تصبب العرق، تسارع نظم القلب، اضطرابات البصر، دسيرة ولا تستخدم إلا إذا بدأت بالإنسولين بهذه الأعراض.

كليوكافاج قرص مخلف: نصفاها كالتالي. عليك استشارة الطبيب

نظام المعيشي الجيد، عليك الاستمرار في اتباع نصائح والقيام بتمارين بدنية بصورة منتظمة.

ما فوق ولدى المراهقين: يبدأ العلاج عادة بـ 500 مغ أو 1000 مغ في اليوم. الجرعة اليومية القصوى هي 2000 مغ متوزعة

الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 12 سنة يوصى به من طرف الطبيب، علم بأن الخبرة في ما يخص هذا الفئة

عادة بـ 500 مغ أو 850 مغ مع كليوكافاج مرتين أو ثلاث مرات القصوى هي 3000 مغ متوزعة على ثلاث دفعات.

تلي لكوك ضعيفة: سيصف لك الطبيب الجرعة التي ستحتاجها. سيصف لك الطبيب الجرعة الواجب تناولها مع كليوكافاج.

تلي بصورة منتظمة معدل السكر في الدم لديك وسيضيف الجرعة التي كليوكافاج تبعاً لمعدل السكر في الدم. عليك استشارة الطبيب بصورة منتظمة. نوع خاص لدى الأطفال ولدى المراهقين وكذلك لدى الستين.

طبيب أيضا يوصي في السنة على الأقل حالة كل كليتيك قد يكون من الضروري فحوصات إذا كنت ستم أو في حالة خلل وظيفية كليتيك.

اول كليوكافاج: في كليوكافاج أثناء وجبة الطعام أو بعدها. هذا سيسمح بتجنب التثنيات غير

مضغمة. **الأفراص ولا تمضغها.** يبلع كل قرص مع كأس ماء. تتناول جرعة واحدة في اليوم، تناولها في الصباح (مع وجبة الفطور).

تتناول جرعتين في اليوم، تناول جرعة في الصباح (مع وجبة الفطور) وجرعة في وجبة العشاء).

تتناول ثلاث جرعات في اليوم، تناول جرعة في الصباح (مع وجبة الفطور) وجرعة في وجبة الغداء وجرعة في المساء (مع وجبة العشاء).

بعد وضع الوقت، بأن مفعل كليوكافاج قوي جدا أو ضعيف جدا، عليك إعلام الصيدلي بذلك.

الطريقة: من كليوكافاج اكش مما كان يلزم: كليوكافاج اكش مما كان يلزم، قد يسبب ذلك حماسا لبيا. أعراض الحماس

محددة، مثل التقيؤ، أوجاع في البطن مع تشنجات عضلية، إحساس عام تعب شديد وسعويات في التنفس.

أض الأخرى انخفاض في درجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب، ناري من هذه الأعراض تحتاج إلى رؤية الطبيب على الفور لأن الحماس

أدي إلى غيبوبة. كليوكافاج قورا واتصل بالطبيب أو اقرب مستشفى على الفور.

كليوكافاج: ساعفة للتوضيح عن الجرعة المناسبة، تناول الجرعة التالية في موعدا المعتاد.

الانقطاع: إذا أخذ كليوكافاج

قد تظهر التثنيات غير المرغوبة التالية.

تأثيرات غير مرغوبة متواترة جدا (سجلت لدى أكثر من شخص من أصل 10 أشخاص) اضطرابات هضمية، مثل الغثيان، التقيؤ، الإسهال، أوجاع في البطن، فقدان الشهية. تظهر هذه التأثيرات غير المرغوبة في أغلب الأحيان في بداية العلاج بكليوكافاج. قد يساعد توزيع الجرعات خلال النهار وتناول كليوكافاج أثناء وجبات الطعام أو حالا بعدها. إذا استمرت الأعراض، عليك التوقف عن تناول كليوكافاج واستشارة الطبيب.

تأثيرات غير مرغوبة متواترة (سجلت لدى أقل من شخص من أصل 10 أشخاص) اضطراب مذاق.

تأثيرات غير مرغوبة نادرة جدا (سجلت لدى أقل من شخص من أصل 10 000 شخص) حماس لبني. هذه المصاعبة نادرة جدا، لكنها خطيرة، خاصة إذا كانت كليتيك لا تعلن بصورة جيدة.

أعراض الحماس البطني غير محددة (انظر القسم "التحذيرات والاحتياطات").

تغير في الفحوصات البولوية في ما يخص الكبد أو الكلى (انظر القسم "التحذيرات والاحتياطات").

يسبب التعب، فقدان الشهية، فقدان بعض الوزن، مع أو دون اصفرار الجلد أو بياض العينين. إذا وجدت نفسك في هذه الحالة، عليك التوقف عن تناول كليوكافاج واستشارة الطبيب.

ردود فعل جلدية، مثل احمرار الجلد (حماسي) أو الحكاك أو طفح جلدي مع حكة (شرى). انخفاض معدل الفيتامين B12 في الدم.

الأطفال والمراهقون: وقد أظهرت بيانات محدودة لدى الأطفال والمراهقين أن الآثار غير المرغوبة كانت مماثلة في طبيعتها وشدها لتلك التي سجلت لدى الكبار.

الإبلاغ عن الآثار الجانبية: إذا حصلت على أي آثار جانبية، تحدث مع طبيبك أو الصيدلي. وينطبق هذا أيضا على أي تأثير غير مرغوب فيه لم يرد ذكره في هذه النشرة. يمكنك التبليغ عن التأثيرات غير المرغوبة مباشرة عبر النظام الوطني للتبليغ عن خلال الإبلاغ عن الآثار الجانبية، يمكنك المساعدة في تقديم المزيد من المعلومات حول سلامة الدواء.

5- ما هي طريقة حفظ كليوكافاج ، قرص مخلف: يحفظ هذا الدواء بعيدا عن متناول الأطفال وانظروهم.

لا يجوز استعمال كليوكافاج بعد التاريخ القصوى للاستعمال المذكور على العلبة أو على الصفحة المشكلة حاربا بعد علامة "EXP" ، يشير هذا التاريخ إلى آخر يوم من الشهر.

6- محتوى العلبة ومعلومات إضافية: لا يجب أبدا طرح الأدوية في مجاري المياه أو مع النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي عن كيفية التصرف في الدواء غير المستعمل. هذه الإجراءات لحماية البيئة.

على ماذا يحتوي كليوكافاج 500 مغ، قرص مخلف: المادة الفعالة هي: كلوريدرات المتفورمين.

يحتوي كل قرص مخلف على 500 مغ من كلوريدرات المتفورمين، مما يقابل 390مغ من المتفورمين قاعده.

السواغات هي: بوفيتون K30، ستيارات المغنيزيوم، هيبروميلوز.

ما هو: كليوكافاج 500 مغ، قرص مخلف وما هو محتوى العلبة؟ يصرف هذا الدواء بشكل قرص مخلف ، يصرف في علبة تحتوي على 10 قرص.

على ماذا يحتوي كليوكافاج 850 مغ، قرص مخلف: المادة الفعالة هي: كلوريدرات المتفورمين.

يحتوي كل قرص مخلف على 850 مغ من كلوريدرات المتفورمين، مما يقابل 662,90 مغ من المتفورمين قاعده.

السواغات هي: بوفيتون K30، ستيارات المغنيزيوم، هيبروميلوز.

ما هو: كليوكافاج 850 مغ، قرص مخلف وما هو محتوى العلبة؟ يصرف هذا الدواء بشكل قرص مخلف ، يصرف في علبة تحتوي على 10 قرص.

على ماذا يحتوي كليوكافاج 850 مغ، قرص مخلف: المادة الفعالة هي: كلوريدرات المتفورمين.

يحتوي كل قرص مخلف على 850 مغ من كلوريدرات المتفورمين، مما يقابل 662,90 مغ من المتفورمين قاعده.

تاريخ مراجعة هذه النشرة: 01/2017

صنع من طرف

COOPER PHARMA

41، رفقة بديوي 20110 أدار البيضاء
بترخيص من ميرو سالتيني - فرنسا

LOT 221256
EXP 09/2025
PPV 28.00DH

بحاجة إلى إرسولين وتولاع السكر في تعانين منه. عليك إعلام أو تعقيد ذلك حول الحمل الذي يستقيم عليك علاجك. هذا الدواء إذا كنت ترضعين طفلك أو إذا كانت لديك ألبية بضرعاء. **تخادم الألات:**

الانخفاض معدل السكر في الدم. هذا يعني أن ليس له تأثير على استخدام الألات. خاص إذا كنت تتناول كليوكافاج مع أدوية أخرى ضد السكر معدل السكر في الدم مثل الإنسولين أو الأدوية الخفضة لمعدل السكر (نيتيدات). أعراض انخفاض معدل السكر في الدم تشمل زيادة تصبب العرق، تسارع نظم القلب، اضطرابات البصر، دسيرة ولا تستخدم إلا إذا بدأت بالإنسولين بهذه الأعراض.

كليوكافاج قرص مخلف: وصفها لك الطبيب. في حال الشك، عليك استشارة الطبيب

نظام المعيشي الجيد، عليك الاستمرار في اتباع نصائح والقيام بتمارين بدنية بصورة منتظمة.

ما فوق ولدى المراهقين: يبدأ العلاج عادة بـ 500 مغ أو 1000 مغ في اليوم. الجرعة اليومية القصوى هي 2000 مغ متوزعة

الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 12 سنة يوصى به 500 مغ من طرف الطبيب، علم بأن الجرعة في ما يخص هذا الفئة

عادة بـ 500 مغ أو 850 مغ من كليوكافاج مرتين أو ثلاث مرات القصوى هي 3000 مغ متوزعة على ثلاث دفعات.

تلي لك ضعيفة: سيصف لك الطبيب الجرعة أقل من 500 مغ أو 850 مغ، سيصف لك الطبيب الجرعة الواجب تناولها من كليوكافاج.

في بصورة منتظمة معدل السكر في الدم لديك وسيضيف الجرعة التي كليوكافاج تبعاً لمعدل السكر في الدم. عليك استشارة الطبيب بصورة منتظمة

عوض خاص لدى الأطفال ولدى المراهقين وكذلك لدى الستين. طبيب أيضاً يوصي في السنة على الأقل حالة كل كليتيك قد يكون من الضروري فحوصات إذا كنت ستم أو في حالة خلل وظيفية كليتك.

أول كليوكافاج: في كليوكافاج أثناء وجبة الطعام أو بعدها. هذا سيسمح بتجنب التثنيات غير

مضغمة. الأقراس ولا تمضغها. يبلغ كل قرص مغ كاش ماء. تتناول جرعة واحدة في اليوم، تناولها في الصباح (مع وجبة الفطور).

تتناول جرعتين في اليوم، تناول جرعة في الصباح (مع وجبة الفطور) وجرعة في وجبة العشاء).

تتناول ثلاث جرعات في اليوم، تناول جرعة في الصباح (مع وجبة الفطور) وجرعة وجبة الغداء) وجرعة في المساء (مع وجبة العشاء).

بعد وضع الوقت، بأن مفعول كليوكافاج قوي جداً أو ضعيف جداً، عليك إعلام الصيدلي بذلك.

الطريقة: من كليوكافاج اكش مما كان يلزم: كليوكافاج اكش مما كان يلزم، قد يسبب ذلك حماساً لبنيًا. أعراض الحماس

محددة، مثل التقيؤ، أوجاع في البطن مع تشنجات عضلية، إحساس عام تعب شديد وسعويات في التنفس.

أض الأخرى انخفاض في درجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب، ناري من هذه الأعراض تحتاج إلى رؤية الطبيب على الفور لأن الحماس

أدي إلى غيبوبة. كليوكافاج فوراً واتصل بالطبيب أو أقرب مستشفى على الفور.

كليوكافاج: ساعفة للتوضيح عن الجرعة المناسبة. تناول الجرعة التالية في موعدا المعتاد.

الانقطاع: لا أخذ كليوكافاج

في عليك استشارة أخرى حول استعمال هذا الدواء، اطلب المزيد من المعلومات من الطبيب

قد تظهر التثنيات غير المرغوبة التالية: **تأثيرات غير مرغوبة متواترة جداً (سجلت لدى أكثر من شخص من أصل 10 أشخاص)** اضطرابات هضمية، مثل الغثبان، التقيؤ، الإسهال، أوجاع في البطن، فقدان الشهية، تظهر هذه التأثيرات غير المرغوبة في أغلب الأحيان في بداية العلاج بكليوكافاج. قد يساعد توزيع الجرعات خلال النهار وتناول كليوكافاج أثناء وجبات الطعام أو حالا بعدها. إذا استمرت الأعراض، عليك التوقف عن تناول كليوكافاج واستشارة الطبيب.

تأثيرات غير مرغوبة متواترة جداً (سجلت لدى أقل من شخص من أصل 10 أشخاص) حماس لبني. هذه المصاعبة نادرة جداً، لكنها خطيرة، خاصة إذا كانت كليتك لا تعلن بصورة جيدة.

أعراض الحماس البيني غير محددة (انظر القسم "التحذيرات والاحتياطات").

تغير في الفحوصات البولوية في ما يخص الكبد أو الكلى (انظر القسم "التحذيرات والاحتياطات").

يسبب التعب، فقدان الشهية، فقدان بعض الوزن، مع أو دون اصفرار الجلد أو بياض العينين). إذا وجدت نفسك في هذه الحالة، عليك التوقف عن تناول كليوكافاج واستشارة الطبيب.

ردود فعل جلدية، مثل احمرار الجلد (حماسي) أو الحكاك أو طفح جلدي مع حكة (شرى). انخفاض معدل الفيتامين B12 في الدم.

الأطفال والمراهقون: وقد أظهرت بيانات محدودة لدى الأطفال والمراهقين أن الآثار غير المرغوبة كانت مماثلة في طبيعتها وشدها لتلك التي سجلت لدى الكبار.

الإبلاغ عن الآثار الجانبية: إذا حصلت على أي آثار جانبية، تحدث مع طبيبك أو الصيدلي. وينطبق هذا أيضاً على أي تأثير غير مرغوب فيه لم يرد ذكره في هذه النشرة. يمكنك التبليغ عن التأثيرات غير المرغوبة مباشرة عبر النظام الوطني للتبليغ عن خلال الإبلاغ عن الآثار الجانبية، يمكنك المساعدة في تقديم المزيد من المعلومات حول سلامة الدواء.

5- ما هي طريقة حفظ كليوكافاج، قرص مخلف: يحفظ هذا الدواء بعيداً عن متناول الأطفال وانظارهم.

لا يجوز استعمال كليوكافاج بعد التاريخ القصوى للاستعمال المذكور على العلبة أو على الصفحة المشكلة حارياً بعد علامة "EXP"، يشير هذا التاريخ إلى آخر يوم من الشهر.

6- محتوى العلبة ومعلومات إضافية: لا يجب إبداء طرح الأدوية في مجاري المياه أو مع النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي عن كيفية التصرف في الدواء غير المستعمل. هذه الإجراءات لحماية البيئة.

على ماذا يحتوي كليوكافاج 500 مغ، قرص مخلف: المادة الفعالة هي: كلوريدرات المتفورمين.

يحتوي كل قرص مخلف على 500 مغ من كلوريدرات المتفورمين، مما يقابل 390 مغ من المتفورمين قاعده.

السواغات هي: بوفيتون K30، ستيارات المغنيزيوم، هيبروميلوز،

ما هو كليوكافاج 500 مغ، قرص مخلف وما هو محتوى العلبة؟ يصرف هذا الدواء بشكل قرص مخلف، يصرف في علبة تحتوي على 10 قرص.

على ماذا يحتوي كليوكافاج 850 مغ، قرص مخلف: المادة الفعالة هي: كلوريدرات المتفورمين.

يحتوي كل قرص مخلف على 850 مغ من كلوريدرات المتفورمين، مما يقابل 662,90 مغ من المتفورمين قاعده.

السواغات هي: بوفيتون K30، ستيارات المغنيزيوم، هيبروميلوز،

ما هو كليوكافاج 850 مغ، قرص مخلف وما هو محتوى العلبة؟ يصرف هذا الدواء بشكل قرص مخلف، يصرف في علبة تحتوي على 10 قرص.

على ماذا يحتوي كليوكافاج 850 مغ، قرص مخلف: المادة الفعالة هي: كلوريدرات المتفورمين.

يحتوي كل قرص مخلف على 850 مغ من كلوريدرات المتفورمين، مما يقابل 662,90 مغ من المتفورمين قاعده.

السواغات هي: بوفيتون K30، ستيارات المغنيزيوم، هيبروميلوز،

LOT 221256
EXP 09/2025
PPV 28.00DH

صنع من طرف
COOPER
PHARMA

41، رفقة بديوي 20110 أدار البيضاء
بترخيص من ميرو سالتيني - فرنسا

تاريخ مراجعة هذه النشرة: 01/2017

بحاجة إلى إرسولين وتولاع السكر في تعانين منه. عليك إعلام أو تعقيد ذلك حول الحمل الذي يستقيم عليك علاجك. هذا الدواء إذا كنت ترضعين طفلك أو إذا كانت لديك ألبية بضرعاء. **تخادم الألات:**

الانخفاض معدل السكر في الدم. هذا يعني أن ليس له تأثير على استخدام الألات. خاص إذا كنت تتناول كليوكافاج مع أدوية أخرى ضد السكر معدل السكر في الدم مثل الإنسولين أو الأدوية الخفضة لمعدل السكر (نيتيدات). أعراض انخفاض معدل السكر في الدم تشمل زيادة تصبب العرق، تسارع نظم القلب، اضطرابات البصر، دسيرة ولا تستخدم إلا إذا بدأت بالإنسولين بهذه الأعراض.

كليوكافاج قرص مخلف: وصفها لك الطبيب. في حال الشك، عليك استشارة الطبيب

نظام المعيشي الجيد، عليك الاستمرار في اتباع نصائح والقيام بتمارين بدنية بصورة منتظمة.

ما فوق ولدى المراهقين: يبدأ العلاج عادة بـ 500 مغ أو 1000 مغ في اليوم. الجرعة اليومية القصوى هي 2000 مغ متوزعة

الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 12 سنة يوصى به من طرف الطبيب، علم بأن الخبرة في ما يخص هذا الفئة

عادة بـ 500 مغ أو 850 مغ مع كليوكافاج مرتين أو ثلاث مرات القصوى هي 3000 مغ متوزعة على ثلاث دفعات.

تلي لك ضعيفة: سيصف لك الطبيب الجرعة أقل من 500 مغ أو 850 مغ. سيصف لك الطبيب الجرعة الواجب تناولها مع كليوكافاج.

تلي بصورة منتظمة معدل السكر في الدم لديك وسيضيف الجرعة التي كليوكافاج تبعاً لمعدل السكر في الدم. عليك استشارة الطبيب بصورة منتظمة. نوع خاص لدى الأطفال ولدى المراهقين وكذلك لدى الستين.

طبيب أيضاً يوصي في السنة على الأقل حالة كل كليتيك قد يكون من الضروري فحوصات إذا كنت سمن أو في حالة خلل وظيفية كليتيك.

أول كليوكافاج: في كليوكافاج أثناء وجبة الطعام أو بعدها. هذا سيسمح بتجنب التثنيات غير

مضغلة. الأفراس ولا تمضغها. يبلغ كل قرص مع كأس ماء. تتناول جرعة واحدة في اليوم، تناولها في الصباح (مع وجبة الفطور).

تتناول جرعتين في اليوم، تناول جرعة في الصباح (مع وجبة الفطور) وجرعة في وجبة العشاء).

تتناول ثلاث جرعات في اليوم، تناول جرعة في الصباح (مع وجبة الفطور) وجرعة في وجبة الغداء وجرعة في المساء (مع وجبة العشاء).

بعد وضع الوقت، بأن مفعول كليوكافاج قوي جداً أو ضعيف جداً، عليك إعلام الصيدلي بذلك.

الطريقة: من كليوكافاج اكش مما كان يلزم: كليوكافاج اكش مما كان يلزم، قد يسبب ذلك حماساً لبنيًا. أعراض الحماس

محددة، مثل التقيؤ، أوجاع في البطن مع تشنجات عضلية، إحساس عام تعب شديد وصعوبات في التنفس.

أض الأخرى انخفاض في درجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب، ناري من هذه الأعراض تحتاج إلى رؤية الطبيب على الفور لأن الحماس

أدي إلى غيبوبة. كليوكافاج فوراً واتصل بالطبيب أو أقرب مستشفى على الفور.

كليوكافاج: ساعفة للتوضيح عن الجرعة المناسبة، تناول الجرعة التالية في موعدا المعتاد.

الانقطاع: إذا أخذ كليوكافاج

قد تظهر التثنيات غير المرغوبة التالية.

تثنيات غير مرغوبة متواترة جداً (سجلت لدى أكثر من شخص من أصل 10 أشخاص) اضطرابات هضمية، مثل الثقلان، التقيؤ، الإسهال، أوجاع في البطن، فقدان الشهية، تظهر هذه التثنيات غير المرغوبة في أغلب الأحيان في بداية العلاج بكليوكافاج. قد يساعد توزيع الجرعات خلال النهار وتناول كليوكافاج أثناء وجبات الطعام أو حلاً بعدها. إذا استمرت الأعراض، عليك التوقف عن تناول كليوكافاج واستشارة الطبيب.

تأثيرات غير مرغوبة متواترة (سجلت لدى أقل من شخص من أصل 10 أشخاص) اضطراب مذاق.

تأثيرات غير مرغوبة نادرة جداً (سجلت لدى أقل من شخص من أصل 10 000 شخص) حماس لبني. هذه المصاعبة نادرة جداً، لكنها خطيرة، خاصة إذا كانت كليتيك لا تعلن بصورة جيدة.

أعراض الحماس البيني غير محددة (انظر القسم "التحذيرات والاحتياطات").

تغير في الفحوصات البولوية في ما يخص الكبد أو الكلى (انظر القسم "التحذيرات والاحتياطات").

يسبب التعب، فقدان الشهية، فقدان بعض الوزن، مع أو دون اصفرار الجلد أو بياض العينين). إذا وجدت نفسك في هذه الحالة، عليك التوقف عن تناول كليوكافاج واستشارة الطبيب.

ردود فعل جلدية، مثل احمرار الجلد (حماسي) أو الحكاك أو طفح جلدي مع حكة (شرى). انخفاض معدل الفيتامين B12 في الدم.

الأطفال والمراهقون: وقد أظهرت بيانات محدودة لدى الأطفال والمراهقين أن الآثار غير المرغوبة كانت مماثلة في طبيعتها وشدها لتلك التي سجلت لدى الكبار.

الإبلاغ عن الآثار الجانبية: إذا حصلت على أي آثار جانبية، تحدث مع طبيبك أو الصيدلي. وينطبق هذا أيضاً على أي تأثير غير مرغوب فيه لم يرد ذكره في هذه النشرة. يمكنك التبليغ عن التثنيات غير المرغوبة مباشرة عبر النظام الوطني للتبليغ عن خلال الإبلاغ عن الآثار الجانبية، يمكنك المساعدة في تقديم المزيد من المعلومات حول سلامة الدواء.

5- ما هي طريقة حفظ كليوكافاج، قرص مخلف: يحفظ هذا الدواء بعيداً عن متناول الأطفال وانظروهم.

لا يجوز استعمال كليوكافاج بعد التاريخ القصوى للاستعمال المذكور على العلبة أو على الصفحة المشكلة حارياً بعد علامة "EXP"، يشير هذا التاريخ إلى آخر يوم من الشهر.

6- محتوى العلبة ومعلومات إضافية: لا يجب إبداء طرح الأدوية في مجاري المياه أو مع النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي عن كيفية التصرف في الدواء غير المستعمل، هذه الإجراءات لحماية البيئة.

على ماذا يحتوي كليوكافاج 500 مغ، قرص مخلف: المادة الفعالة هي: كلوريدرات المتفورمين.

يحتوي كل قرص مخلف على 500 مغ من كلوريدرات المتفورمين، مما يقابل 390 مغ من المتفورمين قاعدة.

السواغات هي: بوفيتون K30، ستيارات المغنيزيوم، هيبروميلوز.

ما هو: كليوكافاج 500 مغ، قرص مخلف وما هو محتوى العلبة؟ يصرف هذا الدواء بشكل قرص مخلف، يصرف في علبة تحتوي على 10 قرص.

على ماذا يحتوي كليوكافاج 850 مغ، قرص مخلف: المادة الفعالة هي: كلوريدرات المتفورمين.

يحتوي كل قرص مخلف على 850 مغ من كلوريدرات المتفورمين، مما يقابل 662,90 مغ من المتفورمين قاعدة.

السواغات هي: بوفيتون K30، ستيارات المغنيزيوم، هيبروميلوز.

ما هو: كليوكافاج 850 مغ، قرص مخلف وما هو محتوى العلبة؟ يصرف هذا الدواء بشكل قرص مخلف، يصرف في علبة تحتوي على 10 قرص.

على ماذا يحتوي كليوكافاج 850 مغ، قرص مخلف: المادة الفعالة هي: كلوريدرات المتفورمين.

يحتوي كل قرص مخلف على 850 مغ من كلوريدرات المتفورمين، مما يقابل 662,90 مغ من المتفورمين قاعدة.

تاريخ مراجعة هذه النشرة: 01/2017

صنع من طرف

COOPER PHARMA

41، رفقة بديوي 20110 أدار البيضاء
بترخيص من ميرو سالتيني - فرنسا

LOT 221256
EXP 09/2025
PPV 28.00DH



être pris au moins 4 heures avant le colesévelam.

DAONIL 5 mg, comprimé sécable avec des aliments et boissons

En cas de consommation d'alcool, un effet antabuse (chaleur, rougeur, vomissements, accélération du rythme cardiaque) peut survenir.

Grossesse, allaitement

Grossesse

Si vous êtes enceinte, votre diabète doit être traité par de l'insuline.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte alors que vous prenez DAONIL 5 mg, comprimé sécable, votre traitement doit être arrêté.

Consultez rapidement votre médecin qui se chargera d'adapter votre traitement.

Allaitement

Vous ne devez jamais prendre DAONIL 5 mg, comprimé sécable pendant toute la période de l'allaitement.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Au cours de votre traitement, des épisodes d'hypoglycémie sont possibles. Leurs symptômes et leurs effets sur la vigilance peuvent rendre dangereuse la conduite d'un véhicule ou l'utilisation d'une machine.

DAONIL 5 mg, comprimé sécable contient du lactose

Ce médicament contient un sucre (le lactose) qui se décompose en galactose et en glucose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance

ou un syndrome de galactose (r
3. Comme
sécable

Posologie

Respectez l

En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

La posologie habituelle est d'un demi-comprimé à 3 comprimés par jour.

Les comprimés sont sécables, c'est-à-dire que vous

pouvez les casser en deux parts égales.

Avalez les comprimés avec environ un demi-verre d'eau, juste avant un repas (voie orale).

Si vous avez pris plus de DAONIL 5 mg, comprimé sécable que vous n'auriez dû :

Consultez immédiatement votre médecin ou les urgences médicales.

Si vous ressentez des signes d'hypoglycémie tels que faiblesse, sueurs, fringale, tremblements, somnolence, vertiges, maux de tête, troubles de la vision, mangez ou buvez quelque chose de sucré.

Si vous oubliez de prendre DAONIL 5 mg, comprimé sécable :

Prenez un comprimé au repas suivant. Ne doublez pas la dose.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, DAONIL 5 mg, comprimé sécable peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

La classification des événements indésirables en fonction de leur fréquence est la suivante : très fréquent (peuvent affecter plus de 1 personne sur 10), fréquent (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 10), peu fréquent (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 100), rare (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 1000), très rare (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 10 000), fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles).

Effets indésirables très fréquents :

- hypoglycémie parfois sévère (voir les rubriques «Avertissements et précautions» et «Si vous avez pris plus de DAONIL 5 mg, comprimé sécable que vous n'auriez dû»).

Effets indésirables fréquents :

- réactions sur la peau : éruptions de boutons ou de plaques,
- nausées, diarrhées,
- prise de poids.

Effets indésirables peu fréquents :

- gêne à l'estomac.

Effets indésirables dont la fréquence est indéterminée :

- troubles transitoires de la vision tels qu'un flou visuel,





être pris au moins 4 heures avant le colesévelam.

DAONIL 5 mg, comprimé sécable avec des aliments et boissons

En cas de consommation d'alcool, un effet antabuse (chaleur, rougeur, vomissements, accélération du rythme cardiaque) peut survenir.

Grossesse, allaitement

Grossesse

Si vous êtes enceinte, votre diabète doit être traité par de l'insuline.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte alors que vous prenez DAONIL 5 mg, comprimé sécable, votre traitement doit être arrêté.

Consultez rapidement votre médecin qui se chargera d'adapter votre traitement.

Allaitement

Vous ne devez jamais prendre DAONIL 5 mg, comprimé sécable pendant toute la période de l'allaitement.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Au cours de votre traitement, des épisodes d'hypoglycémie sont possibles. Leurs symptômes et leurs effets sur la vigilance peuvent rendre dangereuse la conduite d'un véhicule ou l'utilisation d'une machine.

DAONIL 5 mg, comprimé sécable contient du lactose

Ce médicament contient un sucre (le lactose) qui se décompose en galactose et en glucose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance

ou un syndrome de galactose (r
3. Comme
sécable

Posologie

Respectez l

En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

La posologie habituelle est d'un demi-comprimé à 3 comprimés par jour.

Les comprimés sont sécables, c'est-à-dire que vous

pouvez les casser en deux parts égales.

Avalez les comprimés avec environ un demi-verre d'eau, juste avant un repas (voie orale).

Si vous avez pris plus de DAONIL 5 mg, comprimé sécable que vous n'auriez dû :

Consultez immédiatement votre médecin ou les urgences médicales.

Si vous ressentez des signes d'hypoglycémie tels que faiblesse, sueurs, fringale, tremblements, somnolence, vertiges, maux de tête, troubles de la vision, mangez ou buvez quelque chose de sucré.

Si vous oubliez de prendre DAONIL 5 mg, comprimé sécable :

Prenez un comprimé au repas suivant. Ne doublez pas la dose.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, DAONIL 5 mg, comprimé sécable peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

La classification des événements indésirables en fonction de leur fréquence est la suivante : très fréquent (peuvent affecter plus de 1 personne sur 10), fréquent (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 10), peu fréquent (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 100), rare (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 1000), très rare (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 10 000), fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles).

Effets indésirables très fréquents :

- hypoglycémie parfois sévère (voir les rubriques «Avertissements et précautions» et «Si vous avez pris plus de DAONIL 5 mg, comprimé sécable que vous n'auriez dû»).

Effets indésirables fréquents :

- réactions sur la peau : éruptions de boutons ou de plaques,
- nausées, diarrhées,
- prise de poids.

Effets indésirables peu fréquents :

- gêne à l'estomac.

Effets indésirables dont la fréquence est indéterminée :

- troubles transitoires de la vision tels qu'un flou visuel,

