

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

M22- 0050508

☒ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 2617 Société : RAM
☐ Actif ☒ Pensionné(e) ☐ Autre :
Nom & Prénom : CHASIA MOHAMED 157050
Date de naissance : 02/11/56
Adresse : HABITUELLE
Tél. 0670274025 Total des frais engagés : -378- Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :
Date de consultation : 12/04/2023
Nom et prénom du malade : ZIBEN EL MOUADJID
Lien de parenté : ☐ Lui-même ☒ Conjoint ☐ Enfant
Nature de la maladie :
Affection longue durée ou chronique : ☐ ALD ☐ ALC Pathologie :
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : ASA Le : 11/04/2023
Signature de l'adhérent(e) :

Autorisation CNDP N° : AA-215 / 2019

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
10/04/2023	St F - K10	3000		

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	05/04/2023	678.00

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES


Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES

Dents Traitées Nature des Soins Coefficient



COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DEBUT D'EXECUTION

FIN D'EXECUTION

O.D.F PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
D	G
00000000	00000000
35533411	11433553
B	

(Création, remont, adjonction)

Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DATE DU DEVIS

DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

مركز طب وجراحة العيون بوركون

CENTRE D'OPHTALMOLOGIE BOURGOGNE

Enfants & Adultes

للأطفال و الكبار

Dr. Abdellatif ZAKARRYA

Maladies et chirurgies des yeux Bordeaux France
Membre de la Société Française d'Ophtalmologie
Membre de l'Association américaine d'ophtalmologie
Certificat Moorfield Londres
Certificat Vitrectomie Schruns Autriche
Forces Armées Royales

د. عبد اللطيف زكرياء

طب وجراحة العيون بوردو فرنسا
عضو الجمعية الفرنسية لطب العيون
عضو الجمعية الأمريكية لطب العيون
شهادة العضوية لمورفيلد بلندن
شهادة جراحة الماء الزجاجي بشرونز النمسا
طبيب القوات المسلحة الملكية

05 avril 2023

Mme ZNIBER EL ANDALOUSSI
Faouzia

TRAVATAN: collyre

1 goutte par jour, le soir à 21h, pendant 6 Mois

THEALOSE collyre

1 GOUTTE 4 FOIS PAR JOUR X 6 MOIS, dans le

XOLAMOL: collyre

1 goutte x 2/ jour; 8h et 20 h, pendant 6 Mois



زولامول®
Xolamol®

Lot: 260251
Fab: 07 22
Exp: 07 24

P.P.V : 110 DH 70

Agrée Pour le Permis de Conduire

بدل لرخصة السياقة

05 22 39 83 39 - 05 22 95 01 27

شارع طانطان زنقة السلطان عبد الحميد - إقامة زكرياء - بوركون - الدار البيضاء

Bd Tantan, Rue Sultan Abdelhamid - Rés. ZAKARRYA - Bourgogne - Casablanca - Oelevision.zakarrya351@gmail.com

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Dénomination du médicament :

Collyre en solution

Travaprost

TRAVATAN® 40 ml

070619
118001
9

Laboratoires Sothema Bouskoura

Travatan® 40 g/ml collyre en solution, 2,5 ml

A.M.M.: N°5413 DMP / 21 / NCV

PPV : 140.10 DH

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce

Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la lire.
d'informations à votre médecin, ou à votre pharmacien.
Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à
quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui
nuire, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet
indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin, ou à
votre pharmacien.

Cette notice contient la notice :

- 1- Qu'est-ce que TRAVATAN et dans quel cas est-il utilisé ?
- 2- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ou d'utiliser TRAVATAN ?
- 3- Comment prendre ou utiliser TRAVATAN ?
- 4- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5- Comment conserver TRAVATAN ?
- 6- Informations supplémentaires.

1- QU'EST-CE QUE TRAVATAN ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

TRAVATAN contient du travaprost, qui fait partie d'un groupe de médicaments appelé **analogues des prostaglandines**. Il agit en diminuant la pression dans l'œil. Il peut être utilisé seul ou en association avec d'autres collyres comme les bêta-bloquants, qui réduisent aussi la pression oculaire. TRAVATAN est utilisé pour réduire une pression élevée à l'intérieur de l'œil chez l'adulte, les adolescents et les enfants âgés de 2 mois et plus. Cette pression peut conduire à une maladie appelée **glaucome**.

2- QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE OU D'UTILISER TRAVATAN

N'utilisez jamais TRAVATAN

- Si vous êtes allergique au travaprost ou à l'un des autres composants de ce médicament
- Demandez l'avis de votre médecin si vous êtes atteint de ces troubles.

Avertissements et précautions

- TRAVATAN peut augmenter la longueur, l'épaisseur, la couleur et/ou le nombre de vos cils. Ces modifications au niveau des paupières, y compris une pilosité ciliaire anormale et des anomalies au niveau des tissus autour de l'œil, ont aussi été observées.
- TRAVATAN peut modifier la couleur de votre iris (partie colorée de votre œil). Ce changement peut être permanent. Il peut aussi également une modification de la couleur de la peau autour de l'œil.
- Si vous avez eu une chirurgie de la cataracte, parlez-en à votre médecin avant d'utiliser TRAVATAN.
- Si vous avez ou avez déjà eu une inflammation de l'œil (iris ou uvéite), parlez-en à votre médecin avant d'utiliser TRAVATAN.
- TRAVATAN peut, à de rares occasions, provoquer des essoufflements ou une respiration sifflante ou augmenter les symptômes de l'asthme. Si vous observez des changements dans votre manière de respirer lorsque vous utilisez TRAVATAN, prévenez immédiatement votre médecin.
- Le travaprost peut être absorbé par la peau. Si ce médicament vient en contact avec la peau, il doit être essuyé immédiatement. Ceci est



du flacon de l'œil. Utilisez un miroir pour vous aider.
les paupières, les surfaces voisines ou d'autres
mupé-gouttes. Cela peut infecter le collyre.
sur le flacon pour libérer une goutte de TRAVATAN à
AVATAN, gardez la paupière fermée, maintenez une
nyuant avec un doigt sur le coin de l'œil près du nez
moins 1 minute. Ceci permet d'empêcher
le reste du corps.

Refermez bien le flacon immédiatement après usage.
Utilisez un seul flacon à la fois. Ne pas ouvrir le sachet tant que vous
n'avez pas besoin du flacon.

Si une goutte tombe à côté de l'œil, recommencez.

Si vous ne portez pas de lunettes : portez des lunettes ou des lunettes de soleil.
Si vous portez des lunettes, portez-les avec de l'eau tiède. Ne mettez pas d'autres gouttes jusqu'à ce que
le moment soit venu de prendre la goutte suivante.

Si vous oubliez d'utiliser TRAVATAN
Continuez avec la goutte suivante comme prévu.

Ne mettez pas de dose double pour compenser une dose oubliée. N'utilisez jamais plus d'une goutte
par jour dans l'œil (les yeux) atteints).

Si vous arrêtez d'utiliser TRAVATAN
N'arrêtez pas de prendre TRAVATAN sans en avoir préalablement parlé à votre
médecin ou au médecin traitant votre enfant, la pression de votre œil ou de
celui de votre enfant ne sera pas contrôlée ce qui pourrait provoquer une perte
de la vue.

4- QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?
Comme tous les médicaments, ce médicament est susceptible d'avoir des
effets indésirables, encore que ceux que les patients ne soient pas affectés.

Vous pouvez continuer à utiliser le collyre, à moins que les effets indésirables
soient graves. Si vous vous inquiétez, contactez votre médecin ou votre
pharmacien. Ne pas interrompre l'administration de TRAVATAN sans en parler
à votre médecin.

Effets indésirables très fréquents : peut survenir chez plus d'1
personne sur 10
Effets indésirables fréquents : peut survenir au maximum chez 1
personne sur 10
Effets oculaires : Rougeur oculaire
Effets oculaires : Changement de la couleur de l'iris (partie colorée de l'œil),
douleur oculaire, inconfort oculaire, œil sec, démangeaisons oculaires,
irritation oculaire.

Effets indésirables moins fréquents : peut concerner jusqu'à 1 personne sur 100
Effets oculaires : troubles de la cornée, inflammation de l'œil, inflammation de
l'iris, inflammation dans l'œil, inflammation de la surface de l'œil avec ou sans
lésion de surface, sensibilité à la lumière, acquiescement de l'œil, inflammation de
la paupière, vision trouble, augmentation de la production de larmes, infection
ou inflammation de la conjonctive (conjonctivite), renversement externe
anormal de la paupière (entropion), opacification de l'œil, croûte sur le bord de la
paupière, croissance des cils.

Effets secondaires généraux : augmentation des symptômes allergiques, mal
être, rythme cardiaque irrégulier, toux, nez bouché, irritation de la gorge,
assombrissement de la peau autour des yeux, assombrissement de la peau,
texture de cheveux anormale, croissance capillaire excessive.

Effets indésirables rares : peut concerner jusqu'à 1 personne sur 1000
Effets oculaires : augmentation des symptômes allergiques, mal être, rythme cardiaque irrégulier, toux, nez bouché, irritation de la gorge,
assombrissement de la peau autour des yeux, assombrissement de la peau,
texture de cheveux anormale, croissance capillaire excessive.

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Dénomination du médicament :

Collyre en solution

Travaprost

TRAVATAN® 40 ml

070619
118001
9

Laboratoires Sothema Bouskoura

Travatan® 40 g/ml collyre en solution, 2,5 ml

A.M.M.: N°5413 DMP / 21 / NCV

PPV : 140.10 DH

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce

Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la lire.
d'informations à votre médecin, ou à votre pharmacien.
Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à
quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui
nuire, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet
indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin, ou à
votre pharmacien.

Cette notice contient la notice :

- 1- Qu'est-ce que TRAVATAN et dans quel cas est-il utilisé ?
- 2- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ou d'utiliser TRAVATAN ?
- 3- Comment prendre ou utiliser TRAVATAN ?
- 4- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5- Comment conserver TRAVATAN ?
- 6- Informations supplémentaires.

1- QU'EST-CE QUE TRAVATAN ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

TRAVATAN contient du travaprost, qui fait partie d'un groupe de médicaments appelé **analogues des prostaglandines**. Il agit en diminuant la pression dans l'œil. Il peut être utilisé seul ou en association avec d'autres collyres comme les bêta-bloquants, qui réduisent aussi la pression oculaire. TRAVATAN est utilisé pour réduire une pression élevée à l'intérieur de l'œil chez l'adulte, les adolescents et les enfants âgés de 2 mois et plus. Cette pression peut conduire à une maladie appelée **glaucome**.

2- QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE OU D'UTILISER TRAVATAN

N'utilisez jamais TRAVATAN

- Si vous êtes allergique au travaprost ou à l'un des autres composants de ce médicament
- Demandez l'avis de votre médecin si vous êtes atteint de ces troubles.

Avertissements et précautions

- TRAVATAN peut augmenter la longueur, l'épaisseur, la couleur et/ou le nombre de vos cils. Ces modifications au niveau des paupières, y compris une pilosité ciliaire anormale et des anomalies au niveau des tissus autour de l'œil, ont aussi été observées.
- TRAVATAN peut modifier la couleur de votre iris (partie colorée de votre œil). Ce changement peut être permanent. Il peut aussi également une modification de la couleur de la peau autour de l'œil.
- Si vous avez eu une chirurgie de la cataracte, parlez-en à votre médecin avant d'utiliser TRAVATAN.
- Si vous avez ou avez déjà eu une inflammation de l'œil (iris ou uvéite), parlez-en à votre médecin avant d'utiliser TRAVATAN.
- TRAVATAN peut, à de rares occasions, provoquer des essoufflements ou une respiration sifflante ou augmenter les symptômes de l'asthme. Si vous observez des changements dans votre manière de respirer lorsque vous utilisez TRAVATAN, prévenez immédiatement votre médecin.
- Le travaprost peut être absorbé par la peau. Si ce médicament vient en contact avec la peau, il doit être essuyé immédiatement. Ceci est



du flacon de l'œil. Utilisez un miroir pour vous aider.
les paupières, les surfaces voisines ou d'autres
mupé-gouttes. Cela peut infecter le collyre.
sur le flacon pour libérer une goutte de TRAVATAN à
AVATAN, gardez la paupière fermée, maintenez une
nyuant avec un doigt sur le coin de l'œil près du nez
moins 1 minute. Ceci permet d'empêcher
le reste du corps.

Refermez bien le flacon immédiatement après usage.
Utilisez un seul flacon à la fois. Ne pas ouvrir le sachet tant que vous
n'avez pas besoin du flacon.

Si une goutte tombe à côté de l'œil, recommencez.

Si vous avez un autre enfant traité d'autres collyres ou pomades ophtalmiques
en même temps, attendez au moins 5 minutes entre chaque traitement.
Si vous ou votre enfant avez reçu trop de TRAVATAN dans les yeux
Rincez-les avec de l'eau tiède. Ne mettez pas d'autres gouttes jusqu'à ce que
le moment soit venu de prendre la goutte suivante.

Si vous oubliez d'utiliser TRAVATAN
Continuez avec la goutte suivante comme prévu.
Ne mettez pas de dose double pour compenser une dose oubliée. N'utilisez jamais plus d'une goutte
par jour dans l'œil (les yeux atteints).

Si vous arrêtez d'utiliser TRAVATAN
N'arrêtez pas de prendre TRAVATAN sans en avoir préalablement parlé à votre
médecin ou au médecin traitant votre enfant, la pression de votre œil ou de
celui de votre enfant ne sera pas contrôlée ce qui pourrait provoquer une perte
de la vue.

4- QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?
Comme tous les médicaments, ce médicament est susceptible d'avoir des
effets indésirables, encore que ceux que les patients ne soient pas affectés.
Vous pouvez continuer à utiliser le collyre, à moins que les effets indésirables
soient graves. Si vous vous inquiétez, contactez votre médecin ou votre
pharmacien. Ne pas interrompre l'administration de TRAVATAN sans en parler
à votre médecin.

Effets indésirables très fréquents : peut survenir chez plus d'1
personne sur 10
Effets indésirables fréquents : peut survenir au maximum chez 1
personne sur 10
Effets oculaires : Rougeur oculaire

Effets oculaires : troubles de la cornée, inflammation de l'œil, inflammation de
l'iris, inflammation dans l'œil, inflammation de la surface de l'œil avec ou sans
lésion de surface, sensibilité à la lumière, acquiescement de l'œil, inflammation de
la paupière, vision trouble, augmentation de la production de larmes, infection
du système de la paupière, rougeur de paupière, gonflement autour de l'œil, démanchement externe
anormal de la paupière inférieure, opacification de l'œil, croûte sur le bord de la
paupière, croissance des cils.

Effets secondaires généraux : augmentation des symptômes allergiques, mal
de tête, rythme cardiaque irrégulier, toux, nez bouché, irritation de la gorge,
assourdissement de la peau autour des yeux, assourdissement de la peau,
texture de cheveux anormale, croissance capillaire excessive.

Effets indésirables rares : peut concerner jusqu'à 1 personne sur 1000

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Dénomination du médicament :

Collyre en solution

Travaprost

TRAVATAN® 40 ml

070619
118001
9

Laboratoires Sothema Bouskoura

Travatan® 40 g/ml collyre en solution, 2,5 ml

A.M.M.: N°5413 DMP / 21 / NCV

PPV : 140.10 DH

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce

Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la lire.
d'informations à votre médecin, ou à votre pharmacien.
Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à
quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui
nuire, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet
indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin, ou à
votre pharmacien.

Cette notice contient la notice :

- 1- Qu'est-ce que TRAVATAN et dans quel cas est-il utilisé ?
- 2- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ou d'utiliser TRAVATAN ?
- 3- Comment prendre ou utiliser TRAVATAN ?
- 4- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5- Comment conserver TRAVATAN ?
- 6- Informations supplémentaires.

1- QU'EST-CE QUE TRAVATAN ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

TRAVATAN contient du travaprost, qui fait partie d'un groupe de médicaments appelé **analogues des prostaglandines**. Il agit en diminuant la pression dans l'œil. Il peut être utilisé seul ou en association avec d'autres collyres comme les bêta-bloquants, qui réduisent aussi la pression oculaire. TRAVATAN est utilisé pour réduire une pression élevée à l'intérieur de l'œil chez l'adulte, les adolescents et les enfants âgés de 2 mois et plus. Cette pression peut conduire à une maladie appelée **glaucome**.

2- QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE OU D'UTILISER TRAVATAN

N'utilisez jamais TRAVATAN

- Si vous êtes allergique au travaprost ou à l'un des autres composants de ce médicament
- Demandez l'avis de votre médecin si vous êtes atteint de ces troubles.

Avertissements et précautions

- TRAVATAN peut augmenter la longueur, l'épaisseur, la couleur et/ou le nombre de vos cils. Ces modifications au niveau des paupières, y compris une pilosité ciliaire anormale et des anomalies au niveau des tissus autour de l'œil, ont aussi été observées.
- TRAVATAN peut modifier la couleur de votre iris (partie colorée de votre œil). Ce changement peut être permanent. Il peut aussi également une modification de la couleur de la peau autour de l'œil.
- Si vous avez eu une chirurgie de la cataracte, parlez-en à votre médecin avant d'utiliser TRAVATAN.
- Si vous avez ou avez déjà eu une inflammation de l'œil (iris ou uvéite), parlez-en à votre médecin avant d'utiliser TRAVATAN.
- TRAVATAN peut, à de rares occasions, provoquer des essoufflements ou une respiration sifflante ou augmenter les symptômes de l'asthme. Si vous observez des changements dans votre manière de respirer lorsque vous utilisez TRAVATAN, prévenez immédiatement votre médecin.
- Le travaprost peut être absorbé par la peau. Si ce médicament vient en contact avec la peau, il doit être essuyé immédiatement. Ceci est



du flacon de l'œil. Utilisez un miroir pour vous aider.
les paupières, les surfaces voisines ou d'autres
mupé-gouttes. Cela peut infecter le collyre.
sur le flacon pour libérer une goutte de TRAVATAN à
AVATAN, gardez la paupière fermée, maintenez une
nyuant avec un doigt sur le coin de l'œil près du nez
moins 1 minute. Ceci permet d'empêcher
le reste du corps.

Refermez bien le flacon immédiatement après usage.
Utilisez un seul flacon à la fois. Ne pas ouvrir le sachet tant que vous
n'avez pas besoin du flacon.

Si une goutte tombe à côté de l'œil, recommencez.

Si vous avez un autre enfant traité d'autres collyres ou pomades ophtalmiques
en même temps, attendez au moins 5 minutes entre chaque traitement.
Si vous ou votre enfant avez reçu trop de TRAVATAN dans les yeux
Rincez-les avec de l'eau tiède. Ne mettez pas d'autres gouttes jusqu'à ce que
le moment soit venu de prendre la goutte suivante.

Si vous oubliez d'utiliser TRAVATAN
Continuez avec la goutte suivante comme prévu.
Ne mettez pas de dose double pour compenser une dose oubliée. N'utilisez jamais plus d'une goutte
par jour dans l'œil (les yeux atteints).

Si vous arrêtez d'utiliser TRAVATAN
N'arrêtez pas de prendre TRAVATAN sans en avoir préalablement parlé à votre
médecin ou au médecin traitant votre enfant, la pression de votre œil ou de
celui de votre enfant ne sera pas contrôlée ce qui pourrait provoquer une perte
de la vue.

4- QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?
Comme tous les médicaments, ce médicament est susceptible d'avoir des
effets indésirables, encore que ceux que les patients ne soient pas affectés.
Vous pouvez continuer à utiliser le collyre, à moins que les effets indésirables
soient graves. Si vous vous inquiétez, contactez votre médecin ou votre
pharmacien. Ne pas interrompre l'administration de TRAVATAN sans en parler
à votre médecin.

Effets indésirables très fréquents : peut survenir chez plus d'1
personne sur 10
Effets indésirables fréquents : peut survenir au maximum chez 1
personne sur 10
Effets oculaires : Rougeur oculaire

Effets oculaires : troubles de la cornée, inflammation de l'œil, inflammation de
l'iris, inflammation dans l'œil, inflammation de la surface de l'œil avec ou sans
lésion de surface, sensibilité à la lumière, acquiescement de l'œil, inflammation de
la paupière, vision trouble, augmentation de la production de larmes, infection
du système de la paupière, rougeur de paupière, gonflement autour de l'œil, démanchement externe
anormal de la paupière inférieure, opacification de l'œil, croûte sur le bord de la
paupière, croissance des cils.

Effets secondaires généraux : augmentation des symptômes allergiques, mal
de tête, rythme cardiaque irrégulier, toux, nez bouché, irritation de la gorge,
assourdissement de la peau autour des yeux, assourdissement de la peau,
texture de cheveux anormale, croissance capillaire excessive.

Effets indésirables rares : peut concerner jusqu'à 1 personne sur 1000