

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

M23-000823

☒ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1241 Société : RAM
☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre : retraite
 Nom & Prénom : THAILI ZINEB
 Date de naissance :
 Adresse : Messini, Rue 22, n° 18-20 Hay
 Raoudi, CASA BLANCA
 Tél. : 0661418487 Total des frais engagés : 2056,30 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :
 Dr. DEMBRI Khaled
 Endocrinologie - Diabétologie et Nutrition
 9, Rue Al Kadi Lass - Casablanca
 Tel : 05 22 23 37 00 Fax : 05 22 23 42 14
 Date de consultation : 20-03-23
 Nom et prénom du malade : N° THAILI Zineb Age:
 Lien de parenté : ☐ Lui-même ☒ Conjoint ☐ Enfant
 Nature de la maladie : Diabète
 Affection longue durée ou chronique : ☐ ALD ☒ ALC Pathologie :
 En cas d'accident préciser les causes et circonstances :
 Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance relative à la protection des données personnelles.

Fait à :
 Signature de l'adhérent :

Le : 04/2023

Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
28-03-23		9	300 ✓	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Pharmacie Lamouroux Rue P. Lamouroux 91100 Evry-Courcouronnes Tél : 01 69 22 25 42 - Fax : 01 69 22 25 42 15	25/03/23	1756,30

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient															
				COEFFICIENT DES TRAVAUX														
				MONTANTS DES SOINS														
				DEBUT D'EXECUTION														
				FIN D'EXECUTION														
O.D.F. PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE																	
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">H</td> </tr> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>G</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> <tr> <td colspan="2">B</td> </tr> </table>			H		25533412	21433552	00000000	00000000	D	G	00000000	00000000	35533411	11433553	B		COEFFICIENT DES TRAVAUX
	H																	
	25533412	21433552																
	00000000	00000000																
	D	G																
	00000000	00000000																
	35533411	11433553																
	B																	
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS														
				DATE DU DEVIS														

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Khaled DEMBRI

Spécialiste en Endocrinologie Diabétologie et Nutrition

Echographie

Diabète - Goitre - Anorexie - Hypertension Artérielle

Cholestérol - Lipides - Troubles de croissance

Andropause - Ménopause

Traitement complet de l'obésité



الدكتور خالد دمبري
اختصاصي في أمراض الغدد والسكري والتغذية

الفحص بالصدى
مرض السكري والغدة الدرقية
الضغط الدموي - الكوليسترول - الدهون
فقدان الشهية - اضطرابات النمو - البلوغ والجنس
سن اليأس - العقم عند الرجل والمرأة
العلاج الكامل للسمنة

الدار البيضاء، في : 25-03-23
Casablanca, Le :

THARZI

152,50 x 7

substitut

36 ans le 01

98,40 x 7

Agenda substitut

1 an + 30

1756,30

CABINET DEMBRI

Tar
03 mar



Signature of Dr. Khaled Dembri

شارع القاضي اياس، الطابق الثاني المعاريف - الدار البيضاء - جماعة المعاريف

9, Rue Al Kadi lass au 2ème étage (face école Bienfaisance à côté de la commune du mairat) - Casablanca

Tél : 05 22 23 37 91 / Fax : 05 22 23 42 15 / GSM (si urgence) : 06 61 63 32 50

Email : kdembri@hotmail.com / khaled1966dembri@gmail.com - Site Web : www.dembri-encocrino.com



Prenez y penser dans toutes les situations où vous devez mettre votre vie et celle d'autres personnes en jeu (telles que la conduite d'un véhicule ou l'utilisation de machines). Vous devez demander conseil à votre médecin sur vos capacités à conduire si :
- Vous avez des épisodes d'hypoglycémie fréquents, des symptômes avant-coureurs qui vous aident à reconnaître une hypoglycémie sont diminués ou absents.

Informations importantes de

Médicament
à prendre par voie orale
à base de sodium

Le produit contient

Le produit contient
des ions allerg

Suivez très

COMMENT

agie

à toujours t
ment les indi

de votre médecin ou de votre pharmacien en cas

on de votre mode de vie, de vos résultats
glycémique (glucose) et de votre précédente
tise, votre médecin déterminera la dose

Avant utilisation fixez toujours le produit à l'endroit indiqué et effectuez un test de sécurité dont l'utilisation est comprise dans le « Mode d'emploi » de Solos.

Examinez la cartouche soigneusement avant de l'utiliser. Le produit est incolore et ne doit pas contenir de particules visibles. Ne pas l'agiter ou le secouer.

Utilisez toujours un nouveau produit pour le contrôle de votre glycémie. Vous devez avoir un problème de glycémie pour consulter votre professionnel de santé.

Si vous avez utilisé plus d'un produit, consultez votre professionnel de santé.

- Si vous avez injecté un produit de Apidra, votre glycémie sera faible (hypoglycémie). Généralement, pour prévenir une hypoglycémie, vous devez vous alimenter d'un produit sucré. Si vous ne pouvez pas le faire, consultez votre professionnel de santé. Pour plus d'informations sur l'hypoglycémie, voir l'annexe 1.

Si vous oubliez d'utiliser le produit, consultez votre professionnel de santé.

- Si vous avez oublié d'utiliser le produit, consultez votre professionnel de santé. Si vous n'avez pas injecté de produit, votre glycémie peut devenir trop élevée.

valent to 3.49 mg).
flet for further information),
ric acid, sodium hydroxide
s.

and reach of children.

star.
ze.
protect from light.
m of 4 weeks,

Sanofi-aventis Maroc

Route de Rabat - R.P.1

Aïn Sebaâ Casablanca

Apidra 100U/ml inj b1 sty

P.P.V : 98,40 DH



6 118001 081622



Prenez y penser dans toutes les situations où vous devez mettre votre vie et celle d'autres personnes en jeu (telles que la conduite d'un véhicule ou l'utilisation de machines). Vous devez demander conseil à votre médecin sur vos capacités à conduire si :
- Vous avez des épisodes d'hypoglycémie fréquents, les symptômes avant-coureurs qui vous aident à reconnaître une hypoglycémie sont diminués ou absents.

Informations importantes de

Médicament
à base de sodium

Il contient

Il contient
des ions allerg

Suivez très

COMMENT

agie

à toujours t
nent les indi

de votre médecin ou de votre pharmacien en cas

on de votre mode de vie, de vos résultats
glycémique (glucose) et de votre précédente
tise, votre médecin déterminera la dose

Avant utilisation fixez toujours le capot et effectuez un test de sécurité. L'indication dont l'utilisation est comprise dans le « Mode d'emploi » de Solos.

Examinez la cartouche soigneusement avant de l'utiliser. Le liquide doit être incolore et ne doit pas contenir de particules visibles. Ne pas l'agiter ou le secouer.

Utilisez toujours un nouveau stylo à insuline et vérifiez le contrôle de votre glycémie avant et après l'injection. Vous devez avoir un problème de glycémie, consultez votre professionnel de santé.

Si vous avez utilisé plus d'une cartouche, vérifiez la date d'expiration.

- Si vous avez injecté une dose trop élevée de Apidra, votre glycémie sera faible (hypoglycémie). Généralement, pour prévenir une hypoglycémie, vous devez vous alimenter d'aliments riches en glucides. Si vous ne pouvez pas manger, consultez votre médecin. Pour plus d'informations sur l'hypoglycémie, voir l'annexe 1.

Si vous oubliez d'utiliser Apidra, consultez votre médecin.

- Si vous avez oublié une injection, ne doublez pas la dose. Vous pouvez devenir trop épuisé si vous ne prenez pas de sucre.

equivalent to 3.49 mg).
for further information),
acid, sodium hydroxide
s.

and reach of children.

star.
ze.
protect from light.
m of 4 weeks,

Sanofi-aventis Maroc

Route de Rabat - R.P.1

Aïn Sebaâ Casablanca

Apidra 100U/ml inj b1 sty

P.P.V : 98,40 DH



6 118001 081622



Prenez y penser dans toutes les situations où vous devez mettre votre vie et celle d'autres personnes en jeu (telles que la conduite d'un véhicule ou l'utilisation de machines). Vous devez demander conseil à votre médecin sur vos capacités à conduire si :
- Vous avez des épisodes d'hypoglycémie fréquents, les symptômes avant-coureurs qui vous aident à reconnaître une hypoglycémie sont diminués ou absents.

Informations importantes de

Médicament
à base de sodium

Il contient

Il contient
des ions allerg

Suivez très

COMMENT

agie

à toujours t
nent les indi

de votre médecin ou de votre pharmacien en cas

on de votre mode de vie, de vos résultats
glycémique (glucose) et de votre précédente
tise, votre médecin déterminera la dose

Avant utilisation fixez toujours le capot et effectuez un test de sécurité. L'indication dont l'utilisation est comprise dans le « Mode d'emploi » de Solos.

Examinez la cartouche soigneusement avant de l'utiliser. Le liquide est clair, incolore et ne doit pas contenir de particules visibles. Ne pas l'agiter ou le secouer.

Utilisez toujours un nouveau stylo à insuline et vérifiez le contrôle de votre glycémie avant et après l'injection. Vous devez avoir un problème de glycémie, consultez votre professionnel de santé.

Si vous avez utilisé plus d'une cartouche, vérifiez la date d'expiration.

- Si vous avez injecté une dose trop élevée de Apidra, votre glycémie sera faible (hypoglycémie). Généralement, pour prévenir une hypoglycémie, vous devez vous alimenter d'aliments riches en glucides. Si vous ne pouvez pas manger, consultez votre médecin. Pour plus d'informations sur l'hypoglycémie, voir l'annexe 1.

Si vous oubliez d'utiliser Apidra, consultez votre médecin.

- Si vous avez oublié d'utiliser Apidra, votre glycémie peut devenir trop élevée. Consultez votre médecin.

valent to 3.49 mg).
flet for further information),
ric acid, sodium hydroxide
s.

and reach of children.

star.
ze.
protect from light.
m of 4 weeks,

Sanofi-aventis Maroc

Route de Rabat - R.P.1

Aïn Sebaâ Casablanca

Apidra 100U/ml inj b1 sty

P.P.V : 98,40 DH



6 118001 081622



Prenez y penser dans toutes les situations où vous devez mettre votre vie et celle d'autres personnes en jeu (telles que la conduite d'un véhicule ou l'utilisation de machines). Vous devez demander conseil à votre médecin sur vos capacités à conduire si :
- Vous avez des épisodes d'hypoglycémie fréquents, des symptômes avant-coureurs qui vous aident à reconnaître une hypoglycémie sont diminués ou absents.

Informations importantes de

Médicament
à prendre par voie orale
à base de sodium

Il contient

Il contient
des ions allerg

Suivez très

COMMENT

agie

à toujours t
ment les indi

de votre médecin ou de votre pharmacien en cas

on de votre mode de vie, de vos résultats
glycémique (glucose) et de votre précédente
tise, votre médecin déterminera la dose

avant utilisation fixez toujours
effectuez un test de sécurité
dont l'utilisation est comp
« Mode d'emploi » de Solos

Examinez la cartouche so
jetable avant de l'utiliser
est claire, incolore et ne c
visibles. Ne pas l'agiter ou

ains

23 mg) de
iellement

afiner des

suivant
n. Vérifiez

Si vous oubliez d'utiliser

— Si vous avez oublié un
n'avez pas injecté as
peut devenir trop éle

Avant utilisation fixez tou
effectuez un test de sécur
dont l'utilisation est comp
« Mode d'emploi » de Solos

Examinez la cartouche so
jetable avant de l'utiliser
est claire, incolore et ne c
visibles. Ne pas l'agiter ou

Utilisez toujours un nouve
le contrôle de votre glycém
vous pensez avoir un probl
consulter votre profession

Si vous avez utilisé plus d

— Si vous avez injecté un
de Apidra, votre glycém
faible (hypoglycémie). C
Généralement, pour pr
devez vous alimenter d
glycémie. Pour plus d'in
l'hypoglycémie, voir l'e

Si vous oubliez d'utiliser

— Si vous avez oublié un
n'avez pas injecté as
peut devenir trop éle

valent to 3.49 mg).
flet for further information),
ric acid, sodium hydroxide
s.
and reach of children.

star.
ze.
protect from light.
m of 4 weeks,

Sanofi-aventis Maroc

Route de Rabat - R.P.1

Aïn Sebaâ Casablanca

Apidra 100U/ml inj b1 sty

P.P.V : 98,40 DH



6 118001 081622



Prenez y penser dans toutes les situations où vous devez mettre votre vie et celle d'autres personnes en jeu (telles que la conduite d'un véhicule ou l'utilisation de machines). Vous devez demander conseil à votre médecin sur vos capacités à conduire si :
- Vous avez des épisodes d'hypoglycémie fréquents, des symptômes avant-coureurs qui vous aident à reconnaître une hypoglycémie sont diminués ou absents.

Informations importantes de

Médicament
à prendre par voie orale
à base de sodium

Il contient

Il contient
des ions allerg

Suivez très

COMMENT

agie

à toujours t
ment les indi

de votre médecin ou de votre pharmacien en cas

on de votre mode de vie, de vos résultats
glycémique (glucose) et de votre précédente
tise, votre médecin déterminera la dose

avant utilisation fixez toujours
effectuez un test de sécurité
dont l'utilisation est comp
« Mode d'emploi » de Solos

Examinez la cartouche so
jetable avant de l'utiliser
est claire, incolore et ne c
visibles. Ne pas l'agiter ou

ains

23 mg) de
iellement

afiner des

suivant
n. Vérifiez

Si vous oubliez d'utiliser

— Si vous avez oublié un
n'avez pas injecté as
peut devenir trop éle

Avant utilisation fixez tou
effectuez un test de sécur
dont l'utilisation est comp
« Mode d'emploi » de Solos

Examinez la cartouche so
jetable avant de l'utiliser
est claire, incolore et ne c
visibles. Ne pas l'agiter ou

Utilisez toujours un nouve
le contrôle de votre glycém
vous pensez avoir un probl
consulter votre profession

Si vous avez utilisé plus d

— Si vous avez injecté un
de Apidra, votre glycém
faible (hypoglycémie). C
Généralement, pour pr
devez vous alimenter d
glycémie. Pour plus d'in
l'hypoglycémie, voir l'e

Si vous oubliez d'utiliser

— Si vous avez oublié un
n'avez pas injecté as
peut devenir trop éle

valent to 3.49 mg).
flet for further information),
ric acid, sodium hydroxide
s.
and reach of children.

star.
ze.
protect from light.
m of 4 weeks,

Sanofi-aventis Maroc

Route de Rabat - R.P.1

Aïn Sebaâ Casablanca

Apidra 100U/ml inj b1 sty

P.P.V : 98,40 DH



6 118001 081622



Prenez y penser dans toutes les situations où vous devez mettre votre vie et celle d'autres personnes en jeu (telles que la conduite d'un véhicule ou l'utilisation de machines). Vous devez demander conseil à votre médecin sur vos capacités à conduire si :
- Vous avez des épisodes d'hypoglycémie fréquents, des symptômes avant-coureurs qui vous aident à reconnaître une hypoglycémie sont diminués ou absents.

Informations importantes de

Médicament
à prendre par voie orale
à base de sodium

Il contient

Il contient
des ions allerg

Suivez très

COMMENT

agie

à toujours t
ment les indi

de votre médecin ou de votre pharmacien en cas

on de votre mode de vie, de vos résultats
glycémique (glucose) et de votre précédente
tise, votre médecin déterminera la dose

valent to 3.49 mg).
flet for further information),
ric acid, sodium hydroxide
s.
and reach of children.
star.
ze.
protect from light.
m of 4 weeks,

ains

23 mg) de
iellement

afiner des

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat - R.P.1
Aïn Sebaâ Casablanca
Apidra 100U/ml inj b1 sty
P.P.V : 98,40 DH



6 118001 081622

Avant utilisation fixez toujours le capot. Effectuez un test de sécurité avant l'utilisation est compléte. « Mode d'emploi » de Solos.

Examinez la cartouche soigneusement avant de l'utiliser. Le liquide est clair, incolore et ne doit pas contenir de particules visibles. Ne pas l'agiter ou le secouer.

Utilisez toujours un nouveau stylo à injecter. Effectuez le contrôle de votre glycémie avant et après l'injection. Vous pensez avoir un problème ? Consultez votre professionnel de santé.

Si vous avez utilisé plus d'une cartouche

- Si vous avez injecté une dose trop élevée de **Apidra**, votre glycémie sera faible (hypoglycémie). Généralement, pour prévenir une hypoglycémie, vous devez vous alimenter d'aliments riches en glucides. Si la glycémie ne s'améliore pas, consultez votre médecin. Pour plus d'informations sur l'hypoglycémie, voir l'annexe 1.

Si vous oubliez d'utiliser votre Apidra

- Si vous avez oublié d'utiliser votre Apidra, votre glycémie peut devenir trop élevée. Consultez votre médecin.



Prenez y penser dans toutes les situations où vous devez mettre votre vie et celle d'autres personnes en jeu (telles que la conduite d'un véhicule ou l'utilisation de machines). Vous devez demander conseil à votre médecin sur vos capacités à conduire si :
- Vous avez des épisodes d'hypoglycémie fréquents, les symptômes avant-coureurs qui vous aident à reconnaître une hypoglycémie sont diminués ou absents.

Informations importantes de

Médicament
à base de sodium

Il contient

Il contient
des ions allerg

Suivez très

COMMENT

agie

à toujours t
nent les indi

de votre médecin ou de votre pharmacien en cas

on de votre mode de vie, de vos résultats
glycémique (glucose) et de votre précédente
tise, votre médecin déterminera la dose

Avant utilisation fixez toujours le capot. Effectuez un test de sécurité avant l'utilisation est complétement sûr. « Mode d'emploi » de Solos.

Examinez la cartouche soigneusement avant de l'utiliser. Le liquide est clair, incolore et ne doit pas contenir de particules visibles. Ne pas l'agiter ou le secouer.

Utilisez toujours un nouveau stylo. Le contrôle de votre glycémie est très important. Vous devez vous assurer de consulter votre professionnel de santé.

Si vous avez utilisé plus d'une cartouche, vous devez la jeter.

- Si vous avez injecté une dose de Apidra, votre glycémie sera faible (hypoglycémie). Généralement, pour prévenir une hypoglycémie, vous devez vous alimenter d'un repas riche en glucides. Si vous ne pouvez pas manger, consultez votre médecin. Pour plus d'informations sur l'hypoglycémie, voir l'annexe 1.

Si vous oubliez d'utiliser Apidra, consultez votre médecin.

- Si vous avez oublié une dose, ne la réinjectez pas. Vous devez vous alimenter d'un repas riche en glucides. Si vous ne pouvez pas manger, consultez votre médecin. Pour plus d'informations sur l'hypoglycémie, voir l'annexe 1.

valent to 3.49 mg).
flet for further information),
ric acid, sodium hydroxide
s.

and reach of children.

star.
ze.
protect from light.
m of 4 weeks,

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat - R.P.1
Aïn Sebaâ Casablanca
Apidra 100U/ml inj b1 sty
P.P.V : 98,40 DH



6 118001 081622



ôle particulièrement soigneux de votre et la prévention de l'hypoglycémie sont s pour la bonne santé de votre bébé. allaitiez, consultez votre médecin car des ons de vos doses d'insuline et de votre alimentaire peuvent être nécessaires.

de de véhicules et utilisation de

s

cités de concentration ou de réaction être diminuées si :
 vez une hypoglycémie (faible taux de sucre : sang),
 vez une hyperglycémie (taux élevé de sucre : sang),

vez des problèmes de vue.

ez y penser dans toutes les situations où rriez mettre votre vie ou celle d'autres s en danger (telles que la conduite ule ou l'utilisation de machines). Vous ander conseil à votre médecin sur vos

Sanofi-aventis Maroc

Route de Rabat - R.P.1

Aïn Sebaâ Casablanca

Lantus Solostar 100U/ml inj

b1 Sty 3ml

P.P.V : 152,50 DH



6 118001 081608

Comment manipuler SoloStar
 SoloStar est un stylo prérempli de l'insuline glargine. Lantus doit être exclusivement utilisé avec besoin d'injecter votre insuline. De cette façon, contactez votre médecin.

Lire attentivement le



ôle particulièrement soigneux de votre et la prévention de l'hypoglycémie sont s pour la bonne santé de votre bébé. allaitiez, consultez votre médecin car des ons de vos doses d'insuline et de votre alimentaire peuvent être nécessaires.

de de véhicules et utilisation de

s

cités de concentration ou de réaction être diminuées si :
 vez une hypoglycémie (faible taux de sucre : sang),
 vez une hyperglycémie (taux élevé de sucre : sang),

vez des problèmes de vue.

ez y penser dans toutes les situations où rriez mettre votre vie ou celle d'autres s en danger (telles que la conduite ule ou l'utilisation de machines). Vous ander conseil à votre médecin sur vos

Sanofi-aventis Maroc

Route de Rabat - R.P.1

Aïn Sebaâ Casablanca

Lantus Solostar 100U/ml inj

b1 Sty 3ml

P.P.V : 152,50 DH



6 118001 081608

Comment manipuler SoloStar
 SoloStar est un stylo prérempli de l'insuline glargine. Lantus doit être exclusivement utilisé avec besoin d'injecter votre insuline. De cette façon, contactez votre médecin.

Lire attentivement le



ôle particulièrement soigneux de votre et la prévention de l'hypoglycémie sont s pour la bonne santé de votre bébé. allaitiez, consultez votre médecin car des ons de vos doses d'insuline et de votre alimentaire peuvent être nécessaires.

de de véhicules et utilisation de

s

cités de concentration ou de réaction être diminuées si :
 vez une hypoglycémie (faible taux de sucre : sang),
 vez une hyperglycémie (taux élevé de sucre : sang),

vez des problèmes de vue.

ez y penser dans toutes les situations où rriez mettre votre vie ou celle d'autres s en danger (telles que la conduite ule ou l'utilisation de machines). Vous ander conseil à votre médecin sur vos

Sanofi-aventis Maroc

Route de Rabat - R.P.1

Aïn Sebaâ Casablanca

Lantus Solostar 100U/ml inj

b1 Sty 3ml

P.P.V : 152,50 DH



6 118001 081608

Comment manipuler SoloStar
 SoloStar est un stylo prérempli de l'insuline glargine. Lantus doit être exclusivement utilisé avec besoin d'injecter votre insuline. De cette façon, contactez votre médecin.

Lire attentivement le



ôle particulièrement soigneux de votre et la prévention de l'hypoglycémie sont s pour la bonne santé de votre bébé. allaitiez, consultez votre médecin car des ons de vos doses d'insuline et de votre alimentaire peuvent être nécessaires.

de de véhicules et utilisation de

s

cités de concentration ou de réaction être diminuées si :
 vez une hypoglycémie (faible taux de sucre : sang),
 vez une hyperglycémie (taux élevé de sucre : sang),

vez des problèmes de vue.

ez y penser dans toutes les situations où rriez mettre votre vie ou celle d'autres s en danger (telles que la conduite ule ou l'utilisation de machines). Vous ander conseil à votre médecin sur vos

Sanofi-aventis Maroc

Route de Rabat - R.P.1

Aïn Sebaâ Casablanca

Lantus Solostar 100U/ml inj

b1 Sty 3ml

P.P.V : 152,50 DH



6 118001 081608

Comment manipuler SoloStar
 SoloStar est un stylo prérempli de l'insuline glargine. Lantus doit être exclusivement utilisé avec besoin d'injecter votre insuline. De cette façon, contactez votre médecin.

Lire attentivement le



ôle particulièrement soigneux de votre et la prévention de l'hypoglycémie sont s pour la bonne santé de votre bébé. allaitiez, consultez votre médecin car des ons de vos doses d'insuline et de votre alimentaire peuvent être nécessaires.

de de véhicules et utilisation de

s

cités de concentration ou de réaction être diminuées si :
 vez une hypoglycémie (faible taux de sucre : sang),
 vez une hyperglycémie (taux élevé de sucre : sang),

vez des problèmes de vue.

ez y penser dans toutes les situations où rriez mettre votre vie ou celle d'autres s en danger (telles que la conduite ule ou l'utilisation de machines). Vous ander conseil à votre médecin sur vos

Sanofi-aventis Maroc

Route de Rabat - R.P.1

Aïn Sebaâ Casablanca

Lantus Solostar 100U/ml inj

b1 Sty 3ml

P.P.V : 152,50 DH



6 118001 081608

Comment manipuler SoloStar
 SoloStar est un stylo prérempli de l'insuline glargine. Lantus doit être exclusivement utilisé avec besoin d'injecter votre insuline. De cette façon, contactez votre médecin.

Lire attentivement le



ôle particulièrement soigneux de votre et la prévention de l'hypoglycémie sont s pour la bonne santé de votre bébé. allaitiez, consultez votre médecin car des ons de vos doses d'insuline et de votre alimentaire peuvent être nécessaires.

de de véhicules et utilisation de

s

cités de concentration ou de réaction être diminuées si :
 vez une hypoglycémie (faible taux de sucre : sang),
 vez une hyperglycémie (taux élevé de sucre : sang),

vez des problèmes de vue.

ez y penser dans toutes les situations où rriez mettre votre vie ou celle d'autres s en danger (telles que la conduite ule ou l'utilisation de machines). Vous ander conseil à votre médecin sur vos

Sanofi-aventis Maroc

Route de Rabat - R.P.1

Aïn Sebaâ Casablanca

Lantus Solostar 100U/ml inj

b1 Sty 3ml

P.P.V : 152,50 DH



6 118001 081608

Comment manipuler SoloStar
 SoloStar est un stylo prérempli de l'insuline glargine. Lantus doit être exclusivement utilisé avec besoin d'injecter votre insuline. De cette façon, contactez votre médecin.

Lire attentivement le



ôle particulièrement soigneux de votre et la prévention de l'hypoglycémie sont s pour la bonne santé de votre bébé. allaitiez, consultez votre médecin car des ons de vos doses d'insuline et de votre alimentaire peuvent être nécessaires.

de de véhicules et utilisation de

s

cités de concentration ou de réaction être diminuées si :
 vez une hypoglycémie (faible taux de sucre : sang),
 vez une hyperglycémie (taux élevé de sucre : sang),

vez des problèmes de vue.

ez y penser dans toutes les situations où rriez mettre votre vie ou celle d'autres s en danger (telles que la conduite ule ou l'utilisation de machines). Vous ander conseil à votre médecin sur vos

Sanofi-aventis Maroc

Route de Rabat - R.P.1

Aïn Sebaâ Casablanca

Lantus Solostar 100U/ml inj

b1 Sty 3ml

P.P.V : 152,50 DH



6 118001 081608

Comment manipuler SoloStar
 SoloStar est un stylo prérempli de l'insuline glargine. Lantus doit être exclusivement utilisé avec besoin d'injecter votre insuline. De cette façon, contactez votre médecin.

Lire attentivement le